





PAVLI AEGII

NETAE OPVS DE RE MEDICA VNVC

primum integrum, Latinitate donatum per

IOANNEM GVINTERIVM

ANDERNACVM, do-

ctorem medicum.



COLONIAE OPERA ET

IMPENSA IOANNIS SOTERIS

ANNO M. D. XXXIIII.

MENSE AVGVSTO.

Cum gratia & priuilegio ad sexennium.

12. 8. p. 15.

## CANDIDO LECTORI S.



**A**M pridem Paulum Aeginetam a me conversum, optime lector & didissem, nisi meliorum exemplarum spes aliqua me detinuisset. Cupiebam enim optimum auctorem non mutilum, ut in impresso codice haberetur, sed quatenus liceret, integrum, si delit ac pure expressum, studiosis hominibus impartire. Quispe uidebam parum adeo militatis ad studiosos perueniturum, si Aldo exemplari duntaxat usus, in quo permulta desiderantur, scriptorem inter pretandum susceperem. Imo plurimum dignitatis ipsius decessurum sciebam, tandemque interpretis te meritate optimum auctorem iri neglectum. Itaque primum laboravi sedulo, ut codicem meum ex alijs exemplaribus manuscriptis, sine quibus reminem puto gli bri ingeniosum aliquid profecturum, emenderem: deinde sententiam Pauli, si qua erat obscurior, cū scriptoribus unde transcripserat, conferrem, ac statim in Ioannis Lascaris uiri incomparabilis antiquum exemplar incidi, sed non ita per omnia fidele, ad hæc sepius Ruellij medici clarissimi, admittē dæ uetustatis codicem inspexi, sed ne is quidem omni ex parte respondit, præsertim in Chirurgia, licet alijs quos uiderim fuerit emendatior. Porro non contentus fui hjs solum exemplaribus, uerū longis iumentibus antiquissimum Oribasij uolumen, lueris longobardicis scriptum, egregium uetustatis monumentum consului, quod sane quo minus elegantius & ornatus, eo plus fidei et authoritatis habu it, Vnde non paucos correxi locos, quos Paulus ad uerbū ex illo transcripsit. Omitto quot ex Galeno, Hippocrate, Alexandro insinorari, qui in cunctis exemplaribus erant deperati. Sed ecce, dum tanta sollicitudine & diligentia, pulcherrimo auctori conor subuenire, rumor hic spargitur, eū dem Basileæ latinitate donatum excudi. Quod sane non potui non demerari, quam typographi illie anno, antequam interpres ille cogitasset eum uertere, me prope modum absoluisse, per meas & amicorum literas cognouissem. Non tamen ideo morori me dedā, quasi oleum ei operam perdidicim, quum opus non integrum, ut in quo tū aliarum sexus liber, ut optimus ita difficillimus desideraretur. Id tamen male me habuit, quod statim ubi hæc fama de Pauli impressione uenisset meū coactus sum prælo cōmittere, nondum dedolatus imo ne runcinas quidē experiri, ut iam tertius liber esset impressus fere, anteq̃ ex Germania alter aduheretur. Illud uerissimum, si domi libros istos diutius pat lo & in manibus habere atque regulare inierim ex inuuallo licuisset, longe elimatores produuros fuisset. Quam uero per typographum id non licuerit, festinata operis descriptione factū est, ut aliquoties dictio una pro altera posita sit, quæ optime in præcedentibus habebatur. Sed omnia libris iam impressis ad fidem restituiimus, ut secunda recognitionis loco esse possim. Præterea in singulos libros annotauimus, quibus locutiones uulgo incognitæ exponantur, aut quando exemplaria uariata, nuq̃ interpretationem alterā reprehendimus. Nam id censui & parum candidū, & prope infinitum. Nostra duntaxat uoluimus esse emendata, Hippocratis exemplum imitati, qui ingenue aliquando a futuris se deceptum fuisse fateatur, more scilicet magnorū uirorum, et fiduciam magnarū rerum habentū. Nam lenia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahūt. Magno ingenio, multatq̃, nihilominus habituro conuenit etiam simplex ueri erroris confessio, præcipueq̃ in eo minifesto, quod utilitatis causa posteris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis ante deceptus est. Vale Lector candidissime.



# AD CLARISSIMVM

VIRVM IOANNEM BELLAIVM, PRAESVLEM PARI-  
siensem, & Francisci Christianissimi Francorum regis  
consiliariũ, in sanctiore cõsilio: Ioannis Guin-  
terii Andernaci in Paulũ Aeginetã  
è Græco in Latinũ trala-  
tum, præfatio.



Voniã nuper lueubrationes nostras Præsul Clarissime,  
tanta excepsisti hilaritate & beneuolentia, ut in me adiu-  
uando ornando que nihil feceris reliqui, immensa animo  
meo cura subiit, quomodo me gratum beneficiis tuis ap-  
probem, reponam que gratiam. Non enim tantum in me  
ingenii, non eam sentio dicẽdi facultatem, qua, ut par est,  
nominis tui memoria, celebritas que frequẽter ur: uerum & dis lacte rustici,  
ut Plinianis uerbis utar, multaq; gentes supplicant, & mola tantum salũ li-  
tant, qui non habent thura. Offero igitur tibi integrum Pauli Aeginetæ de  
re medica opus, in Latinam orationẽ à me superioribus annis conuersum,  
non tam referendæ gratiæ studio ( uix enim condignum tuis meritis existi-  
mo, ut quibus summa studiorum meorum debeatur omnis ) quàm ut auspi-  
cato in uulgus procedat, ac ancipitem iudiciorum aleam secure experiatur,  
tanti celebritate nominis commendatum. Noui enim hosce meos labores,  
nisi magno aliquo patrociniõ defendantur, à moribus uilitigatorũ tutos  
nõ fore: isto præsertim tẽpore, quo homines honestum quidẽ illud Hesiodi  
certamen inter sese negligunt, uerum ubi studiosior aliquis ingenii sui fœ-  
turas, magno sudore multisq; uigiliis in communem partas usum emittit,  
statim nullo iudicio calumniantur, eleuant, traducunt. Tuam itaq; authori-  
tatem, Pontifex ornatissime appello: eius uiri authoritatẽ qui ob admirabi-  
lem animi probitatem, singularem doctrinam, ad multos honores amplissi-  
mos euectus est, cuius tantam prudentiã Franciscus Christianissimus Gal-  
liarum Rex, tum in Sanctiore suo consilio, tum apud externos Principes sen-  
tit, ut Homericum illud uerẽ dicat,

*Αἰὲρ σὺν ἡρώεσσιν ἀνέστηντο καὶ δόξαν  
ταῖσιν Ἀλέξανδρον καταπαύσαντι τὸν Ἀχαιοῖν.*

Eoq; nuper Parisiẽsibus nullum alium antistitem inter tot præclaros alio-  
qui uiros sua sponte delegerit: quem in hoc à Deo terris cõcessum arbitror,  
ut esset qui hoc seculo Mœcenatis illius Romani imaginẽ nobis referret.  
Proinde à parã cãdidis iudicibus ad te prouoco, sic difficultatibus aliquan-  
do tanti operis uictus, utilitatem iuuãdi prætulerim gratiæ placendi. Cum  
enim uiderem medicos hætenus medendirationem à barbaris indoctisq;

## EPISTOLA.

scriptoribus petere, omni cura authorem e' Græcia aliquem interpretandū mihi censui, ex quo rectius practicen ( sic enim uocant ) suā cōdiscerent. Occurrit autem in primis Paulus Aegineta excellens medicinę scriptor, annis iam mille desideratus, qui compendio, ordine, artificio, perspicuitate, & doctrina, omnes facile superauerit. Adde quòd multa feliciter tractet quę Galenus, Oribasius, Alexander, Aëtius, Rufus, & reliqui huius disciplinæ proceres omiserunt. Vnde nō dubitem asserere, hunc unum Paulum, si Galeni theoria adiciās, ad medicinam perfectē discendā sufficere. Toto igitur animo & cogitatione ineubui, ut hunc authorem in studiosorū gratiam quasi latinitate donarem: in quo sane laboris mihi plurimum fuit subeūdum, rū exemplariorum uitio, quamuis tria obtigerint diuersa, tum quod in chirurgica uel instrumentorū nomine difficillima, nulli fere latini authores habentur, quos turò queas æmulari. Quippe is semper mihi in uertēdis Græcorum monumētis fuit animus, ut præter fidē, qua nihil in interprete est optabilius, pure omnia, latine & mūde, quatenus liceret, exprimerē. quanquam hodiē multos agrestes hircososq; philosophos, si diis placet, uideā, quos impolitā magis & rudia delectant exalciata que magis quā dedolata: ex horum numero nōnulli grauiores disciplinas exponere aggressi, uoculis sortididis & ex intima plebei sermonis fæce acceptis, fœdant contaminant que. Vnde sit ut qui paulo humanius edueati instituti que sunt, non reformidēt illas adeò, sed fugiant, oderint & despūent, cum maxime referret, egregias mentes præclaraque ingenia sermonis uenustate & gratia ad seueriores illas, ut ita dicam, matronas allicere. Quæ an ego præstiterim, quod in tam grandi opere uix potest fieri, aliorum esto iudiciū: certe hoc audacter assero, qui nunquam inter politionis musæ æmulo certationibus disceptationibusq; elimati, nunquam per Celsi, Largi, Plinii, Varronis, Columellæ aliorūque literas sunt peregrinati, eos parū adeo fructū hinc relatuuros. Tu interea hæce meas uigilias, Pontifex Optime ne contemne, ad quas absoluendas & author & auxiliarius extitisti. Perge fauere doctis, perge literas excitare, perge ueterem recipere medicinam, quę hætenus egrota erat & propē desperata. Habes in hoc puleherrimo negotio Iacobū Colinum uirū ex animo omnium doctorum maximum, instar albæ linæ, amatorem: habes fratres tuos clarissimos, ut omnium genere uirtutū, sic literis supra ueri fidem excultos, qui te ueluti Hercules Arlāntem strenue adiuuabunt. Vale præsul clarissime. Lutetiæ, Calendis Octobribus, Anno ab orbe redempto millesimo quingentesimo trigesimo secundo.

# INDEX TOTIVS OPE- RIS, CVIVS PRIMVS NVMERVS PAGINAM, secundus paginæ uerum significat.

<b>A</b> Baptismi fo 339. li. 14	esse debeat	libi. 31	le	40. 31	aloë stomacho conda- cit	432. 27
abdomi- nis nullo rati signa fol. 395. li. 1	acopon Acanthæ	491. 11	acquinoctium uerni	lib. 30	alopec	318. 26
abdominis interioris mē- brana uulnera qua rati- one manu curent	acopon Rafiij	libi. 14	ura, id est solium	318. 26	alopecia unde dicta	77. 16
abdominis fufidiō	acopon dyodori à fardo		ueris flos	431. 1	slopecia remedia	lib. 31
abies	odore dictū	492. 4. et 14	urugo	378. 12	alos achne	318. 22
abrafiorū curatio	acopon pœcilon, à uarne- tate sic dictum	491. 25	uruginis coctio	483. 14	alos antheros	libi. 30
abrocanum	acopon cul nomen est py- xis	492. 26	utis fit	18. 17	alphi unde generē	202. 5
abfcessus quid	acopon ex ablete Gale- ni	libi. 31. et 19	us combustum	420. 21	alphi duplici, albi et ni- gri	libidem 6
abfcessuū differēt	acopon ex atramento li- brario, cutis ruborē pec- culiater inducens, id que pocissimum in ijs qui bule altera pars capitis dolet	491. 19	acethionis	315. 22	alporum curatio	lib. 36
abfcessuū notæ	acopon ex nigra populo, die agryos dicitur	lib. 3	aceton	315. 25	alpos nigros collētia	lib.
abfcessum curatio ma- nu adhibita	acoron	357. 15	acremati coctio	481. 30	alpos albos et merētia	lib.
abfcessus corporis extērio- res quō curentur	acridis	libi. 19	agalochum	314. 21	ala, id est, fal	117. 27 (18)
abfcessus uulnere curatio	acrum ole	317. 22	agapeti cōpositio ad po- dagram	446. 29	aline	318. 26
abfcessus rumpentia	acrocordion	312. 21	agaurum	314. 26	alcerum	418. 16
abfcessuū adhibita	acrocetrasmos	311. 11	agauri nigri remedia	272. 1	alceri signa	261. 19
abfcessum	acete	317. 22	ageraton	314. 30	alceri remedia	libi. 40
acacia	aculeos educētia medica- menta	319. 5	ageratus	398. 16	alternantia medicamen- ta	502. 19 per totum
acalyphe	adace	391. 10	aglutinamenta	459. 29	al hwa	317. 22
acanthus	adeps animi hū	14. 29. 411.	et	460. 28	alumen	414. 14
acanthus leuce	adeps anserinus	419. 22 (18)	agglutinamenta oculo- rum quō deflutionibus infestantur	467. 25	aluminis coctio	423. 28
acanthum	adeps bubulus	lib. 26	agmus	314. 22	alumi astragalos	414. 4
acanthobolon	adeps caprillus	lib. 21	agminis sanguis	398. 15	alumi rotundū	lib. (16)
acerasos, hoc est ceræ ex- pers, glutinat, concoquit, ulcera ad suppurationē perducit	adeps galli	lib. 24	agrisolcorodon	412. 7	alumi scissile	lib.
acetabulum	adeps galline	libi.	agroillis, gramen	314. 28	alumen placent	lib. 17
acetum	adeps leoninus	libi.	arizoon maius, et mi- nus	315. 18	alumen plimhates	lib.
aceti fars	adeps fulvus	libi. 20	alabastrites	391. 22	alumi circū curatio	64. 27
acrum scillites	adeps uiperinus	lib. 27	alae adustio quomodo ad- ministranda	396. 20	alui crutē curatio	lib. 41
acrum scillites quibus uti- le	adeps urinus	lib. 26	alana gleba	308. 18	alui detēctōnes quid præ- sagiant	14. 4
achores unde flant et quo- modo curentur	adeps unguis	lib. 27	alauda	307. 27	alus optima	lib. 2
achras	adeps marium calidior et ficcior quā mformina- rum	lib. 22	album diarhodon	465. 1	alus pessima	lib. 14
acidorum uis	adeps uetustate calidior cedidit	libi. 20	albugines oculorum curā- tia	311. 14	alum sanis subducen- tia	14. 23
actinus herba	adiantum	315. 14	alcaes	317. 41	alypion	318. 29. 426. 10
acini mali pumici	adustio infantum	4. 17	alcibiadion	374. 30	amantium notæ	318. 22
aconitum	ad optimus qualis	16. 21	alcibiados anchusa	315. 8	amantium curatio	98. 5
aconiti notæ	ad urinosus	lib. 16	alcyonium	318. 1	amores	97. 17
aconiti remedia	agilops	315. 27 (18)	alcyonium Milefij	lib. 5	amaracum	318. 41
acopa	agilops morbi	104. 17. 201.	alexandri Cyphoides	441.	amaranthus	456. 11
acopa caleticentia quib- us consistit, quibus in- conueniant	agilops curatio	106. 18	alexandri purgatio	437.	amarantus uis	319. 25
acopa emollētia quid pig- stent	et	341. 40	alchodometet confē- ctia	427. 23	amaurosis	114. 22
acoporum spissitudo que	agrimum	469. 22	alga	420. 23	ambrosia	319. 366. 19
	agryptia artaba	309. 14	alica	312. 10	amblyopia	114. 28
	agryptium lucum	308. 15	alimētorū facultates	312. 21	ambrosia, ad febres arcē- das apta	490. 25
	agryptia stomatica	417. 22	alimon	317. 27	ambustorum igni cura- tio	210. 21
	agryos	315. 20	alipse	319. 23	ami	319. 9
	agma	316. 1	allium	30. 29. 4. 13. 7	amianthus la pis	lib. 12
	acquinoctium autumnu-		allium sykefite	412. 6	amazonū paillius	498. 18
			alme	318. 10	amirhabis emplastrū	473
			aloë	libi. 35	amomacizæ fungi	310. 1. 4
			alots coctio	481. 29	amomos	319. 16
					ammonij hygidion colly- rium	libi.

# INDEX.

rium 463.2 (2a)	ani excrecencias curan-	apocynon 361.30	adrofione mamilla 9
ammoniacū fuffiē 359.	dia 371.29	apollinaris herba 416.16	cum malignitate 135.39
ammoniacū thymiaia l.	ani fistularum curatio ma-	apolliphania malagma 416.16	archigenis medicamentū
ammoniaci coctio 428.38	ou administrata 318.38	apomeli 419.19 (419.39)	ad carcinoma & cacoc-
ammoniaci gutta ibi.38	ani inflammationem cu-	apophlegmasimi 31.31	the ulceria 223.20
amomum 360.17	rantia 170.40	apophlegmasimus ad ce-	arcon 362.16
ampeloprason 31.359.29	ani non perforati cura-	phalcam 36.27	arcbion 362.30; 366.28
ampelos agria 319.33	tio 330.31	apoplexia quid 360.14	arex unde fiat 77.14
ampelos hereros ibi.35	ani procidentiam curan-	apoplexie causa ibi.31	arexum curatio ibi.17
ampelos leuce ibi.38	tia 172.29	apoplexie signa 360.14	arena 319.16
ampelos melana 360.3	ani ulcers remedia 189.39	apoplexie curatio ibi.39	argemon oculi ulc 310.33
amphibeng morfus notē	animalium partes 34.16	apofceparnifmos 337.33	argemone 362.3
& remedia 217.23	animalia pedestria ibi.3	apolyriatū curatio 311.31	argenti crementū 373.16
amphora italica 307.2	animalia uolatilia 37.24	ap othraufia 327.10	argenti spuma 303.28
amurca 319.21	animæ defectum curan-	appetitus caninus quomo-	argenti spumæ coctio 461.19
amygdaia 31.18	tia 71.39	do curandus 72.18	argenti spumæ eme-
amygdaia amara ibi.14	anifum 161.18	aqua 418.28	dia ibi.31
ec 360.7	anodynon medicamen-	aqua que optima 16.39	argemum uiuū 418.28
amygdaia dulcia 360.9	tim ad abraha, higris cē	aqua uiuola ibi.23	argenti uiui notē & reme-
amygdaalum 496.27	ta, et articulum conto-	aque malæ quomodo cor	dia 371.28
amygdaalum quod & me-	tionē 318.13	eigantur 17.16	arida medicamenti 453.2
tropro discitur 497.1	anodimon hygrocollyriū	aquæ aluminosæ quibus	aridoriū medicamentū
amyum 31.34	anonis 361.19 (366.16)	utiles 37.40	uaniū differentie ibi.9
amylon 360.11	anorexia 140.30	aqua bituminosa 418.33	arida caro ē generātia ibi.7
anabrochimus 379.40	anorexiā curantia 141.3	aquæ bituminosæ quibus	arida reprimētia ibi.4
anacolemata 400.54	anifer 33.20	utiles 16.3	arida uerucia & exedra-
anagallis 360.20	anfermus adeps 418.22	aqua marina 377.17	tia ibi.17
anagryia 360.16	anferum oua 418.22	aqua nirofa 418.22	arida sanguinem reprimē-
anaphorici 329.24	anferisanguis 316.21	aquæ nirofæ & falis, qui-	tia ibi.21
anaphonon 360.16	aonheris 421.23	bis utiles 37.38	aridorum que ulceribus fa-
anarsa hydrops 190.5	anthera ad ciffuras calca-	aquæ sulfurosæ quibus uti-	ciunt specia ibi.9
anas 37.39	neori & planipedū 198.5	utiles 18.2	aridorum que cuti admo-
anatis sanguis 316.35	antheron 454.30	aqua fluuialis 418.28	uentur genera ibi.33
anchilops quid 108.17	anthylla 361.9	aqua in quo ferrum retin-	arida que capiet admoē
anchilops curatio ibi.18	anthracis 337.7	etur est 420.21	tur ibi.22
anchusa quatuor 314.41	ancidorum quid 414.21	aquarum sponte proueni-	aridum cephalicum, capti-
anchusa sine nomine 331.7	ancidororum triplex diffē-	entium uires 37.16	ti conueniēs ibi.22 & 74
ancyle 243.23	entia ibi.20	aquæ frigide uniuersum e-	aridum ad crustam in ca-
ancylosia ibi.4	anidodū dia hēmatid, hoc	poræ remedium 373.16	nia rabidi morfu excruci-
ancyon 286.28	est ex sanguinib 479.39	aquam educētia 426.36	dam 32.9
ancyloglosson ibi.29	anidodū Mshidatū, dia	aquam educētia quibus	aridum dia crocu 466.41
ancylocomon 287.16	stinguu ibi.21	conueniant ibidem 37	aridum collyrium Galeni,
andracne 360.27	antidodū Philonis 419.4	aqua inter cutem unde o-	quod oculos rufi ibi.29
andronius pastillus 410.11	antiochi hiera 421.4	riatur 319.28	arretum testiculi 34.25
androfæmon 30.32	antirrhion 361.16	aquæ iocet cutem cura-	ariobarzanius 471.20
anemone ibi.40	antitafis 322.19	tio 360.8	aridum 362.5
anethum 361.3	antylidum 499.29	aqua inter cutem laboran-	aristolochia ibi.7 (10
anethum uiride ibi.7	aparine 361.22	tium uictus 361.20	aristolochia clematidis ibi.
anethum uisum ibi.4	apetheia 327.40	aqua inter cutem qua ra-	aristolochia longa ibi.11
anethinum 493.29	aphace 364.22	tione educatur 399.9	aristolochia rotunda ibi.10
anethine malagma 390.3	aphrodes papauer 397.2	aquæ totæ quam hydro-	aristophanum empla-
aneryfina 291.11 (39)	aphroditium 414.11	rosium dicunt compo-	strum 479.9
aneryfmatū dicretio ibi.	aphronium 364.26	stio 419.4	armena 599.5
aneryfmatū curō 292.4	aphrotesnes lapis 393.28	aquosorum uis 319.27	armenia, fractura accom-
aneryfmatū incurabilia	aphthæ quō cureō 4.2	aquosum ramicē curantia	modata 471.14
angina nigra 126.10. (ibi.)	apiastrum 396.19	arabie lapis 394.21 (166.28)	armenia mala 32.49
anguria curatio ibi.13	apios 361.25	arache 361.29	armeniaca lapis 369.242
angiologia 391.3	apiū morfus notē 239.19	araneus ibidem 37	er 399.28
anguis fnectus 369.41	apiū morfus remedia ibi.	arane & lectus remedia 254.	armeriacum 362.28
anictos ab insuperabili	apium 310.409.29 (23)	arbutus 386.16 (1)	anabo ibi.25
oi apellatū emplastrū,	apium montanū 401.24	arctothos 362.13	araboglossum ibi.13
glutinatū, discutiū, figura	apium palustre 379.9	archigenis hiera 491.16	aron ibi.18
mas separata, et ad aricu-	apium syluestre 412.29	archigenis medicamentū	arquetus 162.28
los recenti cicatrice con-	apochyma 361.16 (9)	ad uiperæ morfus 397.4	arquati multæ differe-
tractos, uales 479.2	apochymatis coctio 481.	archigenis medicamentū	2

# I N D E X.

tiz *ibidem* 31  
 arqueti caufæ & noxæ 90-16  
 arqueti curatio 104-16  
 arcticum 169-1  
 artaba Aegyptia 107-14  
 artemif. 104-19: 169-1  
 arteria ad abfcidum uo-  
 cis fouum & eius clari-  
 tatem faciens 129-9  
 artenace, hypogloffa pa-  
 pellata, ad abfcidionem  
 uocis, raucitatē, & egre-  
 rentientes *ibidem* 22  
 arretix per quas polius  
 fit 46-1  
 arteria diuidendi ra-  
 tio 27-4-28  
 arteriotomia *ibidem* 29  
 arteriacton 127-18  
 arturus quid 190-1  
 articulati morbi *ibidem*  
 articulati morbi unde p-  
 creentur 109-16  
 articulario morbo pre-  
 cedentia 190-19  
 articularium morborum  
 curatio 190-37: 192-5  
 articulis morbi labo-  
 ratiū uictus 191-39: 192-13  
 articuloꝝ contractio fe-  
 ligant quomodo corre-  
 tur 142-21  
 articuli relaxati quomo-  
 do curentur 144-15  
 articuloꝝ ulcera quomo-  
 do curentur 148-17  
 articuloꝝ contufum cu-  
 ratio 124-11  
 articuloꝝ luxatorū cu-  
 ratio *ibidem*  
 artos 161-9  
 arundines extrahētia me-  
 dicamenta 239-3  
 asarum 101-11  
 asbole *ibidem* 14  
 ascalabotes *ibide* 18  
 ascarides lumbrici 147-29  
 ascarides lumbrici unde na-  
 ſcantur *ibidem* 39  
 ſcarides lumbrici quomo-  
 do curentur *ibide* 34  
 alcythion 163-25  
 et 160-34  
 alcythoides 160-34  
 alcires hydropa 119-18  
 alilepsia 161-21  
 alſcepiion panacea 403-18  
 alſcepiion ſmegmari-  
 dum 451-9  
 alſili quid 142-18  
 alſix petraſ ſios 192-18  
 alſpalathus 161-20  
 alſparagus *ibidem* 30  
 alſparagus myracanthi-  
 nus 169-31

alſparagus petraſus *ibide*  
 alſparagi 10-16  
 alſparagi ſpinioſa ſtirpi-  
 bus *ibidem* 20  
 alſphalus 104-8  
 alſphodelum *ibidem* 10  
 alſpidis exuium 169-2  
 alſpidum tria genera 159-9  
 alſpis cherſia *ibidem*  
 alſpis chelidonia *ibidem* 10  
 alſpis pyraſ omnium petſi-  
 ma 219-11  
 alſpidis morſus noctæ ib-30  
 alſpidis morſus remedia 1-  
 alſpienon 163-24 (*ibide* 28  
 alſtaphia *ibidem* 37  
 alſtaphia domeſtica ib-39  
 alſtaphia ſylueſtria *ibide*  
 alſter Articus *ibid.* 41  
 alſter Magi 407-19  
 alſter paſtilius 447-40  
 alſthmaſici 110-16  
 alſtragalus 164-4  
 alſtringerium uis 111-20  
 araſcōs, cōpoſitus ad po-  
 dagram 446-24  
 araſia naſia dolore len-  
 ens 419-10  
 aſhena, ad ulcera ſordida,  
 impaſta neruorum uul-  
 nera 473-18  
 aſtheromatiſ curatio 217-  
 aſthera 337-24 (41: 291-12  
 atra bilis duobꝝ modis ge-  
 neratur 101-11  
 atra ſtylis 164-11  
 atraſcion 124-21  
 atraſciens ſi indicum 191-21  
 atraſciens ſi ſcriptum ibi-37  
 atraſciens ſi ſuſoni 420-16  
 atraſciens ſi ſoror coſctio 483-3  
 atraplex 29-41: 196-4-19  
 atrophia oculi 111-20  
 atrophiam oculi cura-  
 tio *ibidem* 25  
 atrogena 119-26  
 atenucia alimēta 29-1  
 auditionis meatus non per-  
 foratus curatio 284-14  
 auditꝝ grauis quōd corrigit  
 auditꝝ graue (ſur 10-22  
 curanſia 118-22  
 auellanae nuclea 192-9  
 auena 11-29: 167-3  
 aures humentes curanſia  
 aures animalū 14-20 (4-15  
 aurū curra quomodo lar-  
 ciantur 288-39  
 auribus inciſioſia quomo-  
 do extrahantur 284-29  
 aurū ſi ſamina cōpreſſa  
 quōd curetur 118-39  
 aurum dolore quōd cure-  
 tur 111-33  
 auribus cōuenientia me-

dicamenta 117-1, &c.  
 aurū uermes curatio ib-35  
 aurū ſonitus curatio 118-8  
 aurū ſordeſcunt 408-24  
 auricula muſta 118-26  
 et 198-21  
 auripigmentꝝ noxæ 271-19  
 auripigmentꝝ remedia 161-  
 auripigmentū 163-1  
 auripigmentū coſctio 483-8  
 auctio quæ uictus ratio  
 conueniat 18-20  
 axillarum ſordū odorē ſol-  
 uencia 139-7  
 azanizacopon 491-31  
 Baccæ prunorum ſyluo-  
 ſtrum 198-1  
 baccharis 161-2  
 baſion 487-40  
 balaninon 497-13  
 balanus myreſtica 161-3  
 balauſium *ibidem* 12  
 balenæ 161-31  
 balloce 161-30  
 balneꝝ calidū 17-18  
 balnium 161-16  
 barbara, emplaſtrū quod  
 cruentis prius uulneri-  
 bus inſicit, & ſi ſtatura  
 callos firmat 474-19  
 barbarici dia euphorbiū,  
 ad eorundem dolores &c.  
 alia pleraqꝝ 493-19  
 barbæ alopecūꝝ efficac  
 medicamentū 109-24  
 baſiliſci morſus noctæ 239-  
 baſiliſci morſus reme- (37  
 dia *ibidem* 38  
 baſilicum tetrapharma-  
 cum 468-28  
 baſiliꝝ acopon 491-34  
 baſiliꝝ hygra ad hypopi-  
 os 111-26  
 batina mora 417-8  
 batrachos 169-34  
 batrachion *ibide* 10  
 batrachus quid 124-28  
 batrachū curatio *ibide* 28  
 batrus 161-22  
 bellium *ibidem* 39  
 belliliꝝ coſctio 484-1  
 bellium ſcythiciꝝ 161-39  
 bellium Arabicū *ibidem*  
 bechiū 161-29  
 bechicum *ibidem* et  
 bechicon, ad tuſſim 129-35  
 et 400-29  
 belulcon 124-24: 199-1  
 beſaſa 416-27  
 beca 116-8  
 betonica 161-41  
 bilem purgātia quibus cō-  
 ueniant 423-11  
 bilem ſi uacuantia 414-11

bilis atra duobꝝ modis ge-  
 neratur 201-19  
 bilis atram educentia  
 426-8  
 bilē atrā purgātia quibus  
 conueniant *ibidem* 8  
 bilē ſlauā purgātia 421-18  
 bilis uomitum curan-  
 tia 73-20  
 biuomus 164-8  
 bichynus paſtilius 410-19  
 bituminis coſctio 421-12  
 biſta quæ in piſtino ſi-  
 uenit 410-39  
 blepharoxiſton 109-2  
 blitum 166-18  
 boleti 11-9  
 bolus 168-24  
 boranicon emplaſtrū 469-  
 botrycis cadmea 100-11 (12  
 botryon uicꝝ oculi 110-20  
 boorys 166-18  
 bonus femur 402-27  
 bouillum lac 161-3  
 braſſica canina 161-38  
 brachialis luxatio quomo-  
 do curetur 145-27  
 brachiꝝ fractū curatio 161-1  
 braſſica plumbi 197-28  
 braſſica 161-25  
 braſſica Aegyptia *ibide* 10  
 braſſica elculera *ibide* 24  
 braſſica marina *ibidem* 33  
 braſſica ſylueſtria *ibide* 28  
 brathy 166-40  
 britanica 167-2  
 bromion acopon 491-30  
 bromus 167-5  
 bromi coſctio 11-24  
 bronchos quid 127-18  
 et 288-28  
 bronchocele 166-2  
 bryon thaliſſion *ibide* 9  
 bryonia 119-40: 160-4  
 et 167-17  
 bubonoccele 166-9  
 bubonoccele curatio per  
 uſionem 111-40  
 bubonium 166-22  
 bubonium curatio 119-19  
 bubulus adreps 419-26  
 bubula caro 142-12  
 bubulus ſanguis *ibide* 28  
 bubulus talis uſiꝝ 402-24  
 buccina 166-12  
 et 164-9  
 buſſellatus purgā 422-14  
 buſſellum 166-24  
 bulbus 166-14  
 bulbus aggreſſus 203-8  
 bulbus eſculentus 166-25  
 bulbus quomodo cis ib-16  
 bulmos 72-6  
 bulmos curatio *ibide* 8  
 bunium 166-27

# I N D E X.

buphthalmoo	ib. 37	curetor	214. 7	capitis morbos que signa		caro cucumeris esculent-	
buprestis	ibid. 30	calli immo dici fracturis		præcedant	19. 3	ti	410. 26
buprestis notæ	20. 4. 11	obducti quod currit	241. 39	capitis morborum quæ		caro bobala	24. 28
buprestis remedia	ib. 36	callus si fractus non obdu-		ctus apparuerint quod la-		caro capilla	ib. 21
buryrom	30. 8. 32	cat quid sciendū	142. 15	ciendum	ibid. 9	caro cecurina	ib. 13
		caluæ fractæ curæ	228. 37	capitis morborum signa		caro hircina	ib. 28
<b>C</b> acalia	180. 16	caluum unde fiat	2. 37	neglectis qui morbi se-		caro leporina	ib. 10
cachexia	119. 14	caluæ curatio	ib. 17. 18	quantur	ib. 12	caro ouilla	ib. 10
cachexia curatio	119. 14	campæ	180. 24	capitis dolor in febribus		caro sunila	ibid. 6
calculus arbor	272. 12	camparofus	187. 18	curatio	228. 7	caro thynei salis	411. 28
cadmia	280. 10	canceri	181. 29	capitis fractura	173. 11	caro ulceribus supercre-	
cadmia botrytis	ib. 21	cancer fluorilis	ib. 23	capitis fracturarum cura		scens qua ratione exceda-	
cadmia concremata	ib. 12	cancerum fluuiatilium ci-		no	128. 37	tur	221. 14
cadmia placitis	ibid.	nis	ibidem. 20	capitis uasa latentia		carpesis liqida signa	227. 6
cadmie coctio	422. 22	cancerorum marinorum ci-		modo diuidantur	275. 1	carpesis liquoris reme-	
cactopodina nocturna cu-		nis	ibid. 22	capitis uasa latentia adurē		dia	ib. 7
ratio	119. 22	cancer quid	297. 27	ti modus	287. 19	carpesium	181. 18
cephalus flagris curatio	211. 49	cancer latens	ibid. 28	capitis dolor unde oria-		carya	ib. 41
calamintha	280. 21	canceri curatio per manū		tur	28. 23	caryinum	497. 25
calamus	ib. 27	adhuc	ib. 28	capitis dolor ex solis æstu		caryophyllon	182. 10
calamus odoratus	ibid. 28	cancer in qualibet cor-		cōtractus quibus noctis		calamus	487. 3
calamus phragmites	ib. 28	poris parere oriri solet, sed		diagnosticatur	281. 1	cafeus	410. 2
calamagrostis	ibid. 28	per præcipue io mulierum		capitis dolor ex æstu solis		cafeus laudatoris qñis	418. 24
calidum in primo gra-		menstrui	222. 24	cōtractus quomodo cu-		cafeus oxygalaclum	222. 9
du	152. 19	canceri curatio	ibid. 25	retor	ibid. 4	linea	171. 18. 5
calidum in secundo gra-		cancerorum uulnus notæ	179. 9	capitis dolorem ex frigi-		cafeosum lactis	107. 22
calidū in tertio gradu	ib. 4	cancer uulnus leuiss	ib. 11	da interpenetantia	ib. 18	callisum	282. 26
calidum in quarto absc-		cancerus	180. 2	capitis dolorē ex frigida		callia	ib. 28
fu		cancerum	ib. 8	met perie curantia	ib. 22	callisæ	112. 22
calcaneorum scissuras cu-		cancerabi signa	251. 7	capitis dolorem ex bilio		castorium	22. 22
rancia	198. 3	cancerabi biter plerumq̃		humore quomodo cu-		catagmatica empla-	
calcanei aetritus ex longo		æstu uehementiore	ib. 3	re	ib. 23	stra	407. 40
decubitu, curantia	ib. 23	canis qui momordit rabi-		capos conforti lege indo-		catagmaticæ, quod est fra-	
calc uia	410. 40	osus si non, quæ ratio		lectus quomodo cure-		ctus idoneum empla-	
calc relictus	ib.	ne cognoscas	ib. 4	tur	ib. 41	ctus, Orbasii	480. 35
calcis potæ signa	271. 19	canis rabiosi morsum re-		capiti dolor ex uino quo		catagmaticæ ad fracturas	
calcis potæ remedia	ib. 20	media	251. 1	modo curetur	24. 14	cum uulnere, ciaraly	
calcis oxulatum quomo-		canis no rabiosi morsus		capitis dolor ex iclu quo-		factas Heraclei	ibid. 41
do currit	181. 28	remedia	ibid. 3	modo curetur	ib. 22	caualepsie	90. 41
calculorum in renibus no-		caninus appetitus quomo-		caput adurēti modus	272. 11	cataplasma	411. 2
ta	150. 25. 21. 8	do curandus	72. 14	caput per nares purgan-		cataphora	18. 26
calculorum materia	181. 10	cannabis	282. 2	tia	ib. 22	cataphoræ curatio	27. 40
calculorum causa	ibid. 12	canopus	427. 20	cataplasma quod oras uul-		cataplasma	
calculorum io reobuseu-		canopoo	181. 5	neria lætas in rabidi canis		morsu feruat	222. 16
rario	ibid.	cantharides	180. 37	cataplasma, ad sacrum la-		gnē, herpetas, abicctus,	
calcoli ne creentur	ib. 37	cantharidis notæ	205. 14	cataplasma, ad sacrum la-		gnē, herpetas, abicctus,	
calculosorum curatio	108. 31	cantharidis remedia	ib. 41	gnē, herpetas, abicctus,		parotidas et ambu-	
calculorum in uesica no-		caasper lyuaticua	212. 6	cataplasma	ib. 23	ta	219. 2
ta	ib. 21	caprillus ad pæ-		cataplasma	ib. 23	ta	
calculi puerorum ofis ad		caprilla caro	14. 11	cataplasma	ib. 27	ta	
annum decimumque		caprilla lac	25. 4	cataplasma	181. 29	ta	
tum facile curantur	ib. 26	caprillus sanguis	14. 29	cataplasma	411. 11	ta	
calculi io semibus diffi-		capro piscis	18. 2	cataplasma	181. 22	ta	
ciliorum	ibid. 22	caprio	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	
calculi maiores facilius		caprifolios, parillius	110. 7	cataplasma	92. 19	ta	
curantur, minores diffi-		capnos	181. 7	cataplasma	411. 28	ta	
cilios	ib. 30	capnos	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	
calculi remedia	444. 17	capnos	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	
et	ib. 21. ib. 21. 17. 17	capnos	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	
callicephala (megma-)		capnos	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	
ta)	109. 18	capnos	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	
callus quid	219. 11	capnos	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	
callus olentia	190. 29	capnos	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	
callus qui membrum dū-		capnos	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	
rum firmatur quomodo		capnos	181. 7	cataplasma	181. 27	ta	

# I N D E X.

carotche	90. 40	cerebrum galli ibidem	39	chamgleuce	431. 12	ciccinum	498. 29
carochos	87. 35	cerebrum hircundia	372. 1	chamamelon	ib. 21	cicuta	390. 26
carochi caufa	ibidem 22	cerebrum leporis	371. 37	chamamelon	495. 25	cicutæ figna	366. 3
carochi notæ	50. 17	cerebrum mustelæ	ibide	chamaplyra	411. 24	cicutæ remedia ibidem	32
carochi curatio	91. 2	cerebrum ouillum	ib. 2	chamraphanos	426. 33	cimex	387. 28
carochi ficut carochomeni		cerebri ræperati notæ	32. 37	chamglyce	411. 32	cinnara	30. 2
uode dicti ficut	90. 39	cerebri calidioria notæ	ib.	characina	416. 35	cinerula	413. 9
caucalis	382. 30	cerebri frigidioria no-	(31)	chelidonium	431. 38	cineret quod Spodacom	
cauda equina	379. 9	tæ	ibide 38	chelidonium minus	ib. 41	dicitur, ad iofammatio-	
caufos lcheia	60. 16	cerebri ficcioria notæ	32. 1	chelidon	422. 3	nes, de lufus & chemo-	
cecia	388. 18	cerebri humidioria no-		chemofia quid	107. 14	fio	462. 8
cedræa	382. 39	tæ	ibi. 8	chemofia quæcoret	ib. 16	cinis	416. 14
cedrus	ibidem 37	cerebri inflammati no-		cheradicum medicamen-	327. 20	cinis acriter arborib. ib.	16
cedrus arbor	ibidem 38	tæ	80. 30	tum ad ftrumas	327. 20	cinis acriter arborib. ibide	18
cedrus frutex	ibidem	cerebri inflammati cura-		cheradici exedens	ib. 37	cinnabaris	384. 16
cedrinus liquor ibidem	39	tio	ib. 34	chezanance	412. 14	cinnamomum	ibidem 18
cenchros	39	cerebri vulnerati notæ	316.	chiamum collyrium	461. 4	cinnamomis	ibidem 21
céchni morfus notæ	358. 39	cerebri mēbranzæ con-	(30)	chimeihla	197. 17	cinnæa	ibidem 38
cenchri morfus reme-		uulnertatæ figna	ib. 31	chironii panacea	405. 18	circuncifio curatio	304. 35
dia	359. 2	cerebri membranzæ inflam-		chironia ulcera	357. 2	cirfocele	309. 28
centaurium	388. 3	matæ curatio	320. 32	chirurgica duo funt par-		ciffampelus	373. 34
cētaurium maius ibide	4	cerebri membrana nigre-		tes	373. 2	ciffaro	314. 32
cētaurium minus ibide	5	fcens quomodo cure-		chenix	307. 15	ciffanthemos	390. 2
et	359. 2	tur	331. 4	chozras	290. 26	ciffaria	314. 26
centunculus	309. 38	cerion	328. 31	chole	422. 6	ciffimum, ad neruorū uul-	
cepa	30. 39; 389. 22	cerion quid	318. 15	cholera	142. 39	nera, puocfus, & maxi-	
cepa	381. 41	cerii curatio	ibide 16	cholera figna	ibidem 40	me diurna	471. 1
cephalagm curæ apophle-		cerion capitis unde nafca-		cholera curatio	143. 1	ciffos	104. 36
gmaticum	86. 27	tur, & quæ ratione cure-		chondrus	31. 14; 422. 23	ciffhos	390. 38
cephalagm curans epithe-		tur	81. 30	chondri coctio	31. 35	ciffos	384. 32
ma	81. 27	ceruina caro	34. 11	chondrilla	422. 20	ciffum malum	39. 2
cephalæa	84. 35	ceruicæ morbi	302. 28	chorion	318. 21	ciffum	383. 2
caphalæa curatio	85. 8; 39	ceruicæ tumorum cura-		chryfanthos	379. 25	ciffum	410. 22
cephalici aridi	418. 12; 14	tio	292. 20	chryfe cruētis vulneribus		citra grauidæ uitæ	3. 19
cephalalgia	82. 22	cerufa	422. 1	accommodata	420. 22	clauicula	333. 7
cephalalgia unde oria-		ceruicæ coctio	422. 11	chryfios	422. 22	clauiculæ luxatæ cura-	
tur	ibidem 38	ceruicæ figna	371. 7	chryfocolla	ibidem 25	tio	348. 39
ceca	104. 4	ceruicæ remedia	ibide 11	chryfocome	ibide 11	clauicula foli homini dī na	
cece coctio	422. 18	cecyces	384. 8	chyma parua	506. 39	tura dāra eſt	344. 6
cece cum oleo in medica-		cictron	366. 4	ciborū corruptione labo-		clauiculæ fractæ cura-	
mentis quæ modus eſſe		ceceæa	36. 31	rantes quō curadi	1189	tio	388. 18
debeat	422. 19	chalazion quid fit	281. 13	ciborum repletionis cura-		claudiacum dia fmyr-	
ceramium italicū	506. 26	chalazion	109. 4	tio	ibidem 30	non	462. 29
ceras	388. 11	chalazij curatio	ibi.	cibi faſtidium	140. 30	clausus quid	198. 36; 388. 3
cerafia	ibidem 18	chalazium quæ nia cure-		cibi faſtidij curatio	141. 3	clausos curatio	198. 38
cerafia acida	ibidem 20	tur	281. 16	cibi faſtidij in febribus q-		clausos curatio	323. 4
cerafia aſtringētia	32. 31	chalbane	420. 80	modo curandum	211. 4	clausus oculi	101. 6
cerafia auſtera	388. 39	chalcacochon	ib. 36	ciborum uires	22. 41	elemeis	357. 18
cerafia dulcia ibidem	32. 38	chalcis	ibide 32	cicada	416. 4	eleonis collyrium	464. 31
ceracia	388. 24	chalcididia coctio	481. 39	cicatrix quomodo ulceri		cleopatrz mora	219. 14
ceracum Thaidis faciē ru-		chalcoo	420. 40	ducenda	288. 31	clidion Aphrodiſiaſi-	
befaciens	122. 26	chalcoo anthos	411. 3	cicatrice nigrae tollen-		con	462. 29
cerastis morfus figna	259.	chamæ pifces	398. 40	tia	395. 38	clidion Oribafii ad dyſen-	
cerastis morfus reme-	(10)	chamæactæ	377. 33	cicatrice oculorum	111. 32	tericos & celiacos ib. 35	
dia	ibidem 28	chamæciſſus	421. 9	cicatrice oculorum tingē		clinopodium	381. 20
ceratoides mēbranzæ	118. 16	chamædaphne	370. 35	tia	112. 6	collyrium dia hydrya, re-	
et	280. 32	chamædrops	411. 29	cicatricem indocentia, me-		pellens	462. 8
ceratonia arbor	373. 33	chamædryas	ibide & 30	dica menta	314. 9	chyſterea quibus uileſe, &	
ceraman ad eryſipclata &		chamæzela	421. 26	cicer	32. 1; 374. 12	quales eſſe debeant	11. 2
ambuſta	209. 30	chamgleon	ib. 14	cicer arietinum	ibidem 15	cneum ſiue cnicū	387. 22
cercoſia quid	313. 38	chamgleos albi radix	421	cicer crico	ibidem	cneoron	427. 4
cercoſia curatio ibidem	24	chamgleonidia nigri ra-		cicer orobiscum	ibidem 17	cnicum ſyſte eſte	304. 17
cerebrū animalū	343. 16	dix	ibi. 18	cicer ſylueſtre	ibidem	coagulum	409. 29
et	371. 36	chamgleonidis notæ	281. 20	cichorium	395. 8	coagulum cqui	ibide 26
cerebrum cameli	ibide 41	chamgleos remedia	ib. 33	cici	394. 13	coagulum leporis	ib. 24



# INDEX.

coagulum phocę ibidē 37	bet	ibidē 28	collyrium uino exceptum	coniza	386.38
coagulati lacus ignis 270.	coctio thapſiæ	484.1	dia tenu dicitur	oepos	490.22
coagulan lactare. (24	coctio unguentorū	482.35	collyrium ex duobus lap-	copros	380.33
media	colia	381.27	diſ* ad alperitudinē ibi 24.	copron ad duricię ſtoma-	
cochlea	colicac affectus	142.40	collyrium e chure, dia liba	chi & icinoria	489.58
cochleæ	coloma ulcus oculi	110.21	nu nuncupatur	cor animalium	34.29
cochleæ crematæ	colu immo dico laſi quo-		collyrium ex oleo turſionū	coracem ex oſymetide ad	
cochleæ non crematæ ibi	modo curandi	12.16	ſucco tenerum, dia thali-	naturalium curia, & no-	
coccoſe bapſi- (dem 17	coruſ comoda	11.37	ſu uocatur	maſ accōmodari	473.16
coſ	coruſ adiuuantiā	12.15	color non arguit ſimplici-	corallum	387.18
coccus gnidius ibidē 33	corre neque uores quomo-		temperamentum	cordi affectus	137.12
coccymclea ibidē 39	do uentur	13.27	color malus qua ratio e-	cordis palpitatio quomo-	
coctio medicamentū quæ	colchicon	268.7	mendetur	do curetur	ib. 37
emplaſtra ingrediēſ 181.	colle glia nuda qua ra-		colobomara	cordia temperatur no-	
coctio æris crema- (17	tione tegetur	305.4	colocyntha	te	34.17
ti	colom quid	147.24	colocynthis	cordis vulnerati notæ	335.
coctio æruginiſ	coluſ doloſ uarij ex cau-		colpos	coramara	402.19 (14
coctio aloſ	ſiſ accidit ibidē 25		columbinus pulluſ	cora ueterum calcem in	
coctio alumiuiſ	colici doloriſ notæ ibi. 29		columella	corum	376.40
coctio ammoniaci	colici doloriſ curatio	141.	columbadaſ oliuæ	coranum ſeu coriſ	387.30
coctio apochymariſ ib. 9	colicorę notę	110.35 (4	coluæ	coriandrum	ib.
coctio argēti pumę	colla, idēſ glutinū	386.7	comarot	coriandiſ notæ	266.8
coctio antamentſ ſuro-	colletica emplaſtra	467.19	comitaliſ morbi cauſa	corian diſ remedia	ib. 11
rij	collyria	459.29	comitaliſ morbuſ cuiſa	coria animal	387.23
coctio auripigmetri	collyriorum aridorum ge-		ti accidit	coriſ herba	ib. 26
coctio bdelli	neria	459.30	comitaliſ morbi notę ibi. 2	coriſ	383.41
coctio buuminiſ	collyriorum liquidorū ma-		comitaliſ morbi curatio	cornu caprillū	ib. 12
coctio cadmiæ	teria	ibidē	cometiſ	cornu cerui	ib. 12
coctio ceræ ibidē 38	collyrium aridum ad ſic-		cōpoſitioſ dia citriuſ, quod	cornu hircinū	ib. 12
coctio ceruſæ	cat. ſipitudinē in, quæ		eſt ex malo medico, ſlo-	cornu taurinū	ib. 16
coctio chalcitidiſ	xerophiſ halmia dicitur,		macho utiliſ	cornuſ	382.11
coctio conchilioſ	ſyſcoluſ, ſepedonaſ, car-		compoſitioſ dia coronoſo	coronopuſ	387.41
coctio diphyriæ	niſ ex creſcentiaſ	467.3	diſ ſtomacho utiliſ	corpore habitum calca-	
coctio floriæ æriſ	collyria ſtatica qd	107.1	cōpoſitioſ dia hermo-	ciencia	9.31
coctio galbani	collyrium Cleonaſ	464.31	daſtiluſ ad podagrā	corporeſ tēperatiſ notę	11.7
coctio herbarum	collyriū Chiacum	461.4	conchulæ Indicię	corporeſ interperatiſ no-	
coctio lachrymæ papau-	collyriū Galkni aridiſ	466.	conchyla	te	ib. 14
ria	collyrium ſlambo-	(29	cōchylionum coctio	corporeſ calidiſ notæ	31.15
coctio lachrymæ thu-	niſ	462.7	concoctioſ ſigna nuſſiſ	corporeſ frigidiſ notæ	301.26
riſ	collyriū dia mamia	112.1	ſiſ ſiſtrē apparent	corporeſ ſiccioſiſ (ibi. 19	
coctio lapidum	collyrium liquidū ex cau-		conditum ſ alculuſ cōſuſ	notæ	ibidē 23
coctio māgę thuriſ	calide	467.9	getuſ	corporeſ humidioruſ no-	
coctio māgę	collyrium liquidum ad ſy-		condyloma quid	te	ibidē 27
coctio myſiſ	coſſo, encaſtidaſ, & ex-		condyloma ani	corporeſ rugoſiſ curatio	9.
coctio myſiſ	creſcentiam carniſ ibi. 13		condylomariſ aniſ cura-	corporeſ ſuauem odorem	
coctio myſiſ	collyrium ex cornu, dia ce-		tio	facientia	9.26
coctio niriſ	raioſ dicif, Galkni	464.4	condyloma mullebruſiſ lo-	corporeſ quod tabe conſu-	
coctio olei	collyriū malabaſtrum,		corum quomodo cure-	mitur coratio	67.18
coctio opopanaciſ	quod & ſiſtheouſ dici-		tur	corporeſ color maluſ quo-	
coctio picis	tur	466.7	confuſioneſ oculorū quo-	modo emendetur	9.38
coctio pinguium	collyriū ex aloē, dia aloē		modo curentur	facientia	9.26
coctio plūbaginiſ	dictum	465.5	congiuſ	corporeſ odoraſ, tenuia	
coctio plumbi uſti	collyrium ex decoctioſ, dia		conia	ſiſne & calida	377.18
coctio pōpholygia	zematō dicitur	461.18	conium	corporeſ excreſcentiaſ	20.5
coctio propoliſ	collyrium ex opobali-		conioſ	corporeſ tenueſ impletiſ ibi,	
coctio pumiſ	mo	465.37	coſtantiſ ſiſpo	corporeſ iſodoraſ, ſub- (29	
coctio radicū	collyrium ex ſucco ſcoru-		coſtrefuſo	ſiſuſ craſſa ſunt	377.18
coctio reſiniſ	graci	464.28	coſtuſorum articuloſiſ cu-	cordialluſ	387.29
coctio ſagapeniſ	collyrium ex ſucco ſceni-		ratio	corydōſ	ibidē
coctio ſaliſ	culi	467.10	coſtuſorum unguium cu-	coryza quid	137.18
coctio ſandarachiſ	collyrium quod priuſ		ratio	coſtuſum fracturum uo-	
coctio ſeminū	doloreſ in ſedet, monohē-		coſuſ uſioſer unde oſen-	te	314.38
coctio ſoriſ	meron dictum, ad inci-		tur	coſtuſ	386.2
coctio ſquamę	piene in uerſam' que ſip-		coſuſ ſiſionū coratio	coſuſ Naſiſ detrimen-	
coctio ſulphuriſ	piudinē	468.39	coſuſ ſiſonū curatio		
coctio terræ culuſ-					



# INDEX.

tum	393. 28	cubili gibber luxatus quo	390. 18	dia asphodelo empla-	
cois oleariae detimen-		modo curetur	ib. 10	strum	469. 17
tum	ibidem 30	colini fracti curatio	318. 8	dia bacani medicamen-	
cotonea mala	31. 3	cucumer	32. 19	tum hegati accommo-	
et	197. 9	cucumis	410. 24	datum	448. 38
coryledon	108. 10	eucumis sylvestris	ib. 29	dia barinon moron	457. 8
coxa laxata	148. 26	cucurbita	32. 91 285. 30	dia beula, ex ruta sylv-	
coxae in anteriorem par-		cucurbita sylvestris	385. 19	stri	ibidem 35
te prolapsa signa	ib. 30	cucurbitulari usus	295. 27	dia cadmia emplastru ci-	
coxae in exteriora prolapsa		cucurbitula levis quid effi-		catrie ieducens	472. 14
signa	ib. 40	ciat	ib. 28	dia caryon, qd est ex nuc-	
coxae io florē parē pro-		cucurbitula cum scarifica-		bis simplex	457. 11
motu signa	349. 2	tione quid praestet	ib. 31	dia caryon cōpositū	ib. 14
coxae in posteriora prola-		cucurbitulam admodū		dia caryophyllu	455. 12
pse signa	ibid. 4	modus	ib. 35. per corū ca-	dia californi pastillus ad ul-	
coxae luxata curatio	ib. 8	modum persequēcia fugi-		cera, nomas & defluxio-	
coaxarum fractura signa		tialy	249. 19	nes	411. 2
coaxarum fractura signa		quomodo	190. 4	dia caualidos collyrium	
curatio	135. 20	comula	185. 28	dia cedria empla	467. 9
coaxarum morbi quomo-		compressus	390. 6	strum	477. 28 373
do curentur	187. 11	cura quid fie	37. 28	dia ceratō collyriū	464. 4
coendices adurendi mo-		cureti malagma	428. 22	dia ceratō elaphi colly-	
dus	316. 17	cura in aurib' quomo-		rium	ibidem
coendix morbus quomo-		faciantur	281. 19	dia chartiu pastillus	431. 22
do curetur	187. 25	cursa in labria qua ratione		dia chartu, hoc est, char-	
crambe	108. 25	faciantur	ibidem	ta medicamentum, ad no-	
crania id est cornu	ib. 21	curtia fracta	7. 27	mas oris porifitum et	
crataegones	ib. 34	cureis astricte curatio	ib. 39	naturalia ulcera	454. 14
cremastrea	108. 12	cyasmoa	189. 27	dia chylon emplastrū	468.
creta furoria	191. 35	cyasos	ib. 35	dia cinnabaro em-	
crerhemon	108. 27	cyathiflora	279. 25	plastrum, quod Pampie-	
crimmon	189. 4	cyathus	106. 29 107. 8	thes dicitur	479. 9
crimmon poliarion	ibi 6	cyclaminus	289. 26	dia cinriu	428. 8
crimmon poles	ibidem	cyctiflora	329. 11	dia citrin, hoc est, ex ma-	
crisoon	ibidem 2	cydonatum confusum ira		lo medico rade conco-	
crinaton sūmēn	100. 15	gnetris salus	441. 39	quibus efficac	442. 23
crines	417. 26	cygnarum	461. 9	dia codion, id est, ex pa-	
criogenea pastillus	471. 39	cygnus rubens	ib. 11	paueris capibus & sa-	
crithe	108. 40	cygnus albus	ib. 17	pa	479. 10
crithe tuberculum	109. 7	cyminum	190. 4	dia codion, composi-	
crithe curatio	ibi 9	cyne' spasm'	100. 4 100. 4	tum	ibidem 39
criticon, medicamentū ad		cyonocrotē	361. 30 (435. 18)	dia coralli pastillus	448. 18
stigmata	209. 17	cynostatos	390. 6	dia coronopodū	429. 12 18
criticon smegma pepona		cynomoron	361. 22	dia crocuarium	460. 4 8
com	435. 25	cynoforchus	402. 9	dia daphnoid mala-	
crocus	289. 19	cyparissus	390. 6	gma	469. 19
crocinū diarhodon	469. 9	cynanthe	126. 9	dia dictamnū emplastrū	
crocinū io quo & alerius		cyprua	ib. 14	glutinoso, ad canō mor-	
crocosmagmaris cōfectu		cyphi	390. 1	bus, & omnigena ulce-	
ca explicatur	499. 4	cyphis materia	ib. 2	ra	474. 4
crocodilon	399. 15	cyphis usus	ibidem 2	dia dion pipereon	459. 18
crocodilū terrestris	411. 26	cyphi magnū, quod vocat		dia draconitū empla-	
crocodili morbus reme-		solare, ex rebus atrigra-		strum	471. 35
dia	260. 26	lex cōfectum	ib. 20	dia elates acopon	453. 18
crocodes hoc est crocus		cyphi quod rebus nigriti-		et	39
pastillus	448. 9	octo constat, lunare ap-		dia electu pastillū	448. 12
crocodes pēllus	101. 25	pellatum	ib. 24	dia erigeronitō empla-	
crocosmagmaris prepara-		cyphi lunare	ib. 35	strum	475. 18
tio	444. 28	cyphi solare	ib. 20	dia euphorbiū acopō	492.
croemmyon	389. 22	cypholdea, adiecorofos et		gma	490. 5
crucinum pūctum unde fi		pectoralia ultia	442. 20	dia glaucosa	417. 28
ae	122. 1	cypholdea Alexandri	ib. 27	dia gyreos emplastrū	469.
crucifigui curatio	ib. 29	cyphosia	147. 7	dia hyematon ku-	
cruris reponendi sō	140. 4	cyphosia	416. 17		
cubiti gibber	446. 1	cyprissus	494. 11 412		

# INDEX.

didonum 417. 39	dia scorodon emplastrū 197. 39	dia 197. 39	dia ibidem 37
dia halon emplastrū 473.	dia symyon ad (470. 3)	digitus ossa fracta qmo-	dulcia radícula 369. 26
dia helycymacoem (48	thyailas & agylopas 380. 23	do cuentur 380. 23	duicium vis 312. 29
plastrum 470. 29	dia symyon, (463. 32)	digitus sextus 396. 26	dulcū & ut liposumum
dia hermedactyli 438. 41	Claudiacum ibidem 27	duonylia, ad abscissus mi-	dūfferent & 418. 2
dia hydras cullyriū 492. 1	dia spermaton malagma 27	tabulis, item ad mima-	duplici pipere confitas me-
dia neon emplastrū 474.	dia spermaton (489. 16)	& inguina, & epipastice	dicamentum 429. 16
dia lepocaryon em- (24	pastrum 448. 6	que per latentes meatus	dylentia 161. 25
plastrum 479. 28	dia iphecles, hoc est, ex fa-	dilunt 215. 5	dyfenterie curatio 161. 39
dia libanu 415. 11	ce uni combusta, Mane	dionylia 360. 37. 37. 37.	dyfodias cupon 492. 8. 14
dia libanu collyriū 464. 9	thosis 471. 40	dioclis epistola ad ualeu-	dyfodias malagma 459. 28
dia lithospermū, ex litho-	dia fractis emplastrū uni-	dinem tutodam 38. 35	
spermo medicamentum	dia struthu em- (478. 27)	dioptrismos 178. 20	<b>E</b> benus 371. 32
dia lotarion pastil- (447. 12	plastrum 469. 30	dioiporon 393. 26	<b>E</b> chibicus 317. 32
lux, id est, ex lotu sylue-	dia styraeos, bechicō, hoc	driopolites 442. 18	echinacur curatio 11. 32
stri, ad sedis naturalium	est, tussifeficax 440. 29	diphryges 371. 9	ebulus 316. 28
uitia 451. 20	dia tcolicho, id est, ex lapi-	diply yge coctio 481. 24	ecchymomatis species 225
dia lyciu heparos, hoc est,	de iudaico medicamen-	dipylon 114. 41	ecchymoma ibidem 2. 168
ex recore lupino medica-	rum 443. 19	diplosos 371. 12	eccepe 327. 20
mentum 442. 40	dia tclaron medicamen-	diplosis mortis non e 378. 6	echidna 314. 17
dia mamia collyriū 112. 1	tum 189. 12	diplosis mortis reme-	echinosa herba ibidem 22
dia mellorion malagma	dia tetrigon, id est, ex cica-	dia ibidem 112	echinus ibidem 24
dia meliros em- (485. 15	dia, medicamentum ne-	diplos unde dictus 161. 10	echion 374. 30
plastrum 468. 35	phricum 445. 1	ditichia 279. 5	eclegma ad tussim 129. 7
dia metalicon, emplastrū	dia thalme collyriū 468. 18	ditichia 276. 32	eclegma ex marubio, sim-
dia moron sim- (475. 10	et 81	dudecathion medicamen-	plex, tabidis maxime ac
plex 417. 1	dia rhapsias medicamen-	tum 440. 15	commodatum 440. 1
dia moron, cōpositū ib. 4	rum, ad omnes iouera-	dolehon 32. 6	ecpiefma 327. 17
dia nira u ad abscissus, fcti-	ros affectus 38. 70	dolores unde oriaut 66. 12	ecpiefmos oculi 111. 10
rhues, & uimores 478. 34	dia thapsias pastillus 412.	dolor pullatilis ibidem 15	ecpiefmos curatio amari ad-
dia nira emplastrum, ad	dia tragematon, id (29	dolor pertundens ibidem	ministrata 279. 20
carbunculo ibidem 3	est, ex bellaris medica-	dolor tensus ibidem 81	ecrupion 108. 11. 279. 34
dia ochras emplastrū 477.	mentum ne phricū, ne-	doloris causae & curatioes	ecrupi curatio 108. 12
dia oenanthos mala. (91	dia & tenum exulera-	doloris capiti in se. (ib. 20	educatio pueri 2. 38
gma 459. 35	tionem idoneum 445. 24	bribus curatio 88. 7	etaz 312. 4
dia enu, hoc est, ex uino	dia trion pipereon, ex tri-	dolores oculum unde fiat	elaxon ibidem 18
collyriū 466. 11. 17. 18	plici pipere 443. 6	dolores oculum q. (105. 4	elaxomell ibidem 25
dia omphacos 488. 14	dia trion pipereon Oribasi	modo curentur ibid. 9	elaphobolus ibidem 23
dia opobalsamo collyri-	si 442. 10. ibidem 14	doracia 32. 39	elate ibidem 35
um 485. 27	dia turpines ceratū ad po-	dorias 375. 31	elaterium ibidem 30
dia orobon 440. 12	dogrā, dolorē leniens mi-	dorycnion 371. 15	elaterij media 371. 2
dia ostreon 414. 8	rabiter 479. 29	dostheci catapotia ad ic-	elatine 373. 30
dia oxytelion emplastrū	dia zernaton collyriū 461.	cur inscripta 444. 5	electrum 376. 12
dia oxymyrines, (473. 16	diabetes quid 114. 39 (38	doctien 230. 19	eleliphacus 373. 2
qd est c' myrro syluetri	diabetes origo ib. 41	doctiene emplastrū 469.	eleofelinon ibidem 9
medicamentum 454. 40	diabetes curatio 155. 3	drachma 306. 22 (16	elephantus ibidem 12
dia phellō pastil- (470. 24	diabrolo 122. 12	dracuncium 371. 19	elephantia 801. 6
dia physalton pastillus	diabromus 329. 29	dracunculus ibidem	elephantia 801. 6
dia prafu, hoc (449. 83	diapede fia 22. 6	dracuncul 246. 15	elephantia 801. 6
est, ex maerubio compo-	diaphanes 418. 2	dracunculū curatio ib. 21	elephantia 801. 6
sium 440. 6	diastale 345. 27	draconis marini ictus re-	elephantia 801. 6
dia prafu simplex 440. 1	dichromon emplastrū, a	media 800. 9	elephantia 801. 6
dia prermes emplastrum,	du plici colore sic appel-	dropax duplicē recipi fi-	elephantia 801. 6
hoc est, ex perna, topopho-	larum 476. 25	parationē, materiā ac o-	elephantia 801. 6
soluit 479. 3	dichlamon 371. 4	pis & emplastris confi-	elephantia 801. 6
dia rhodon, hoc est, ex ro-	dies decretorij 47. 3	nem 490. 14	elephantia 801. 6
sa, que septuaginta duas	dies specularij ibid. 24	dropax Galij Orbasij 475.	elephantia 801. 6
uncias pendunt 464. 25	dignit adnari sunt duplices	dropax simplex ib. 23 (14	elephantia 801. 6
dia rhodon albu 405. 1	dignit adnari fci- (296. 39	druppax oliaz 37. 7	elephantia 801. 6
dia rhodon crocinū ib. 9	no quō fieri debet 297. 3	dryopretia 371. 24	elephantia 801. 6
dia rhodon Nili ibidem 15	dignit adnari luxatio quomo-	drys 371. 27	elephantia 801. 6
dia rhodon pastillus 442.	do curetur 346. 37	dryinus, pestiferos serpens	elephantia 801. 6
dia sampfychu mala. (14	digitonum pedis luxatio q	dryini morfus fi- (237. 28	elephantia 801. 6
gma 489. 26	modo curetur 331. 16	gna ibidem 24	elephantia 801. 6
dia scinco 417. 21	digitonum rimas curan-	dryini morsum reme-	elephantia 801. 6

# I N D E X.

emmoton ad fordida plan- ta ulcera facit etiam ge- nitali emulceratio 196. 19	gricis alijque duricis ac- comin. Jac. m. ibidē 31	lyge, pompholygeriō di- ctum 472. 31	81. 27
empetron 272. 29	emplastrum anchusa am- bulis efficac 472. 25	emplastrum ex radice iana- ria, dia sturuthi dictum, lirumaa dicunt 469. 10	epalymum 274. 1
emphysemata quid 107. 22	emplastrum ex anemo- ne 472. 7	emplastrum ex sale, dia ha- lon dicitur 472. 19	epathybrium 416. 7
emphyllitatum curatio	emplastrum dia apyrrou ad discutiendum 470. 8	emplastrum ex sale flore, articulatis in decinato se 4. cōmodatū 460. 12	epomphalum medicamē- tum quod umbilicū illu- nitur ad alium subducen- dam 416. 17 et 23
emplastrum (ib. 10 et 12)	emplastrum ex aulaniis, dia leptocaryon dicitur, ad articulorum tophos pro- baum 479. 22	emplastrum ex salicibus, dia neou dictum, glutu- nans, cruenta excreanti- bus et purulētis efficac, thoraci impositū 474. 4	epulis quid 122. 21 et 27
emplastrum differētib. ibi- dem 472. 14	emplastrum ex cedrina emol- litas 477. 11	emplastrum ex sene (et 4) cione, quod dia erigei o- to dicitur 472. 16	epulidis curatio 122. 22
emplastrum aegagema (38 tica ibidem 40	emplastrum ex cedrina, glutu- nar, digerit austeritque emplastrum ex ceisu (ib. 28 sa uel ouis 472. 5	emplastrum a succo dia chy- lon dictum 468. 40	et 265. 8
emplastrum cicatricem du- cencia 468. 4	emplastrum ex cinere alpi- dum, discutiit tumores de podagra 476. 14	emplastrum ex succo lili- scumini ibidem 469. 10	equus fluuiatilis 279. 3
emplastrum coctum (19)	emplastrum ex cinere lili- uo illanens, coctū dicitur doloribus, articulis, et tumoris oedema re. e- rectibus, utile 472. 27	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	equinum oaguli 407. 26
emphraque 468. 11	emplastrum ex cinabari ad emphos, alioquin omni- genos tumores indura- tos 479. 9	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erastitrat panchrestis hy- dra 467. 18
emplastrum digerētū ib. 8	emplastrum ex dictaculo emplastrum e' herme (471. 11 to, abiceffus rūpens 469. 9	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	et ibidem 25
emplastrum emollientia ib. 30	emplastrum ex harula (21 regia, dia aphodelu dicitur 469. 17	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	engerum 277. 11
emplastrum excreta ib. 4	emplastrum ex lapidis asu- flore, Galeni ibidē 9	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaeus 274. 22
emplastrum quig lenius ib. 19	emplastrum ex liquore syc- mino 476. 19	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaeus marinus ibid. 28
emplastrum siccatū (ib. 17 tia ibidem 11	emplastrum ex lignis, dia aron dicunt ibidē 17	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris fel ib. 24
emplastrum quando et qui- bus adhibenda ibidē 23	emplastrum ex melle, dia melinos dictum 468. 21	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum Amthionis ad articulos recti cicatricē coactos consiliiouig est etiam ad extrahendū efficax 472. 4	emplastrum ex metallo emplastrum e' nistro (471. 10 ad abiceffus, scitros et tumores 476. 24	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum Aristophaniū emollientis ibidē 9	emplastrum ex perna 479. 3	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum botanici ab herbis dictū 469. 11	emplastrum ex pumice ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum Daphnē ib. 25	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum ematicum 460.	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum Italicū, ad (18 purgandū fordida indu- cendū, iungit carnem ib. 21	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum Macherionis utridē, ad coxendū cru- ciatū, articulos inflectos et abiceffus 479. 10	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum Mnasi disci- tens 477. 27	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum Neris, ad aci- dū omnēque particulari car- nosū dolorē 475. 12	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum Nicolai, ad re- cens uulnera et finū glu- tinandos apertum 474. 22	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum parygū, hoc ē, liquidi Oribati 472. 8	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum pyrene, ad duri- tate et scitros 479. 10	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum ad Chironia ul- cera 477. 21	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum quid nuntide ultrum carni est 460. 19	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum ex achate, disci- tens emollientia 472. 27	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum ex alio, dia scondon dictum, ad rū- pendum 470. 2	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24
emplastrum ex alhga, poda-	emplastrum ex pulvere ad cicatricē ducēdā 477. 26	emplastrum ex urina mu- li, podagricis utile 479. 18	erinaei terrestris pelis ib. 24

## INDEX.

exanthema pueri obor- 3-4  
ta quò curen? 3-4  
exanthema 242-4  
exercitium ani curatio  
exercitatio 5-8 (171-2)  
exercitatio 6-8 obor- ib.  
exercitatio 6-8 gila ib. 37  
exercitatio ceteris ibid. 32  
exercitatio cōposita ib. 37  
exercitatio violata ibid. 22  
exomphalon 299-30  
expellens oculorū causa  
expulsionis oculo- (113)  
tum curatio ibid. 13  
extra-actio eorū que in au-  
ribus inciderunt 284-285

Faba	31. 40: 39. 39
Faba Aegyptia	31. 40
facies aspectus uide tollentia	
facies pilos tollere	(11. 3)
tia	122. 28
facies uicia	121. 24
facies uirgula affectu ibi. 25	
facies nigritas tollere ibi.	
facula	455. 11
sex acteri	417. 39
sex uini	ibide 31
sex uini cremata	ibide 34
fame grande curatio 72. 4	
fastidium cibi	140. 31
fasti diu cibi curatio ibi. 16	
fastidium cibi in febribus cu-	
modo curandi 71. 14	
fastigium ex intere reme-	
dia	79. 10
fastidia unde fiat	51. 31
faustus quid	212. 31
faustum curatio	ibide 31
faui capitis unde nascitur	
et quo curatur	31. 10
fauium pituitos	410. 15
febris ardenti figura 61. 4	
febris ardenti curatio ibi. 3	
febris continens 60. 14	
febris continens uirg-	
lebrum continen-	(11. 30)
tium nome	ibide 31
februm continens cu-	
ratio	ibide 34
febris diaria quia ratio di-	
gnoscatur	55. 10
febris diarie quo opportu-	
no	ibide 23
febris diarie curatio ibi. 35	
febris diaria laboratur u-	
ctus 56. 3 (C. 61. 3)	
februm hecticum non	
februm hecticum dose	
specie 31	ibide 39
februm hecticum cura-	
tio	62. 19
februm puridarum no-	
me	56. 10
februm puridarum cura-	
tio	ibide 39

febris quartana cogni-  
 tio 59. 20  
 febris quartana d. ferr. an-  
 ni tempore incipiat ibi. 31  
 febris quartana cura-  
 tio ibidem 33  
 febris quotidianus quibus  
 non agnoscitur 59. 33  
 febris quotidianae cura-  
 tio ibidem 33  
 febris femtertiana 68. 33  
 febris femtertiana dupli-  
 modis generatur ibidem 33  
 febris femtertiana cura-  
 tio 69. 6  
 febris tertiana agnitio 77  
 febris tertiana cura-  
 tio ibidem 30  
 febris tertianae notae cura-  
 tio 58. 11  
 februm quae ex affectu vi-  
 scerum erysipelas referre-  
 re oriuntur notae 61. 18  
 earundem curatio ibi. 33  
 februm ex crudoribus hu-  
 morum redundans ora-  
 rarum notae 55. 21  
 earundem curatio ibi. 35  
 fel 4. 32. 6  
 fel accipitulum ibidem 18  
 fel aequilum ibidem 18  
 fel bovinum ibidem 18  
 fel caprillum ibidem 18  
 fel rapae hyemalis ibidem 18  
 fel trinaeci terrestris 77. 5  
 fel gallicum 4. 32. 17 (25)  
 fel hyemae ibidem 11  
 fel guillum ibidem 11  
 fel perdurum ibidem 17  
 fel piscis callionymi lb. 18  
 fel scorpionis ibidem 9  
 fel suillum ibidem 9  
 fel taurinum ibidem 18  
 fel thudicis marinis lb. 15  
 feluri ibidem 17  
 fel omnium amentium hu-  
 moris calidissimi est ibi. 9  
 fel flavum pallido calidi-  
 um ibidem 9  
 fel viride flavo calidi-  
 um ibidem 9  
 fel volucrum omnium a-  
 cius et sic cido vehement-  
 dius est, quam quadrup-  
 pedum ibidem 18  
 felis morbus remedia 35.  
 femur bouis 4. 08. 27 (25)  
 femoris fracturae quae rati-  
 one curentur 138. 36  
 femorum intertrogines cu-  
 raotia 4. 9  
 ferre rotatum 565. 11  
 ferri 410. 10  
 ferrum stercus 411. 16  
 ferula 139. 23  
 ferula mordula 139. 23

ficus morbus	83. 10
ficum curatio	ibide 12
ficus	83. 10: 414-21
ficus arbor	ibide 24
ficus Aegyptia	ibide 24
ficus indica	ibide 22
ficus caprifol	ibide 22
ficus humilis	431. 23
ficus pinguis	414. 23
ficus fylvestris	ibidem 12
ficus urticae	ibide 25
filix	407. 2
filum in futurum habet unum quale esse debeat	301. 27
filula	371. 24: 408. 8
filum cicotiarum	287. 10
filum crocodili	ibidem 12
filum crocodili	(ibide 15)
terrestre	ibide 15
filum murium	ibide 14
filula quid	287. 28: 287. 2
filulum d' differente	219. 14
filularum ani laetentium	108. 18
filularum curatio	279. 29
filularum ani manifestarum inocum	218. 20
filulae in infans biles ibid.	29
filulae aegre constantem tunc	ibidem 31
filulari ani curatio, quae manu peragitur ibide 33	
filum utericali uteris	143. 17
filum utericali quomodo curentur	ibide 20
forma tria cecitio	482. 1
fiuofylvestris pennis	263. 1
fluor muliebri	179. 29 (18)
fluor muliebri multiplex	ibidem 18
fluor muliebri (ib. 18)	notae
ibidem 35	
fluor muliebri curatio	ibidem 35
feniculum	195. 28 (ib. 39)
foetugraculi	32
et	216. 24
foetum ex utero excipere ratio	214. 38
formica quid	214. 30
formicae unum curatio ib.	24
fractura quid	388. 4
fracturarum multae differe rentiae	323. 1
fractura alaphitidis	ib. 8
fractura calamididis	ibide
fractura caryeum ibi.	10
fractura raulodon ibide 4	
fractura oenycha ibid.	7
fractura raphanidis	ib. 6
fractura schizoididis	ib. 6
fractura bicydon ibide 4	
fractura capitis ibidem 31	
fracturarum capitis differe rentiae	ibidem 31
fractura capitis speciei un de deprehendas	238. 10

fracturatum capiei curatio ibidem 17  
fractura cum luxatione q-  
modo curetur 352-37  
fractura cui vulnere quo-  
modo curetur 246-39  
fractura inmodice callo  
obducta quò curet 241  
fractura si callo nò fit 249  
mel qd faciendum 142-15  
frangementum vestis attri-  
re 470-13  
fraxinea 196-13  
frictionum genera 6-2  
frictio dura ibidem 9  
frictio mollis ibidem  
frictio multa & dura ib. 15  
frictio modica & mollis  
frictionis congrua (ib. 14)  
tiones nouem ibidem 16  
frictio preparatoria 1-2  
frigidum in primo ordine  
frigidum in lecto (151-41)  
do gradu 314-8  
frigidum in tertio gradu  
frigidum in quarto (ib. 4)  
ordine ibidem 5  
frigoris nimis curatio 11-30  
ingoris inmodici in febre  
bus curatio 69-4  
frontis incisio 275-35  
fugata fructuum uinandi  
fume 22-2  
fuligo 352-38  
fuligo cecidi ibidem 25  
fuligo lachrymae tha-  
ris ibidem 4  
fuligo myrrhae ibidem  
fuligo piceae ibidem 20  
fuligo picis liquida 11-25  
fuligo pictorum 161-14  
fuligo pini 292-30  
fulgo styrae ibidem 25  
fulgo terebinthae ibidem  
fulgo thuris ibidem 29  
fumaria 380-8  
fungi 31-8  
fungorum nomine 256-14  
fungorum remedia ibidem  
fungus capiti (27)  
80-15  
fungorum capitis cura-  
tio ibidem 40  
fungus quid 220-23  
fungus curatio ibidem 24  
fungus pueri & stomaci ho-  
grati 438-39

**G**  
gala 367-19  
galactites lapidis 191-4  
galenicocochis 472-23  
gargaris 291-19  
galbanum 470-10  
gale 367-19  
galeni Accentes 472-32

# I N D E X.

galeni acopon ex abie-	dum	ibid. 11	halacia, quâ si dicat ex fâle	herculeum panaceae	401. 19
te	492. 11 17 19		côfecta purgatio	hermaproditorum quatuor	113. 4
galeni hiera	411. 14	glaucomura	halimion	hermaproditorum cura-	113. 4
galeni picra	442. 18	glaucomata curatio	halimades oliuz	tio	ibid. 11
galeni polyarchi	481. 11	glauz	harmala	hermodactylus	174. 11
galeni	486. 10 (19)	gleba Alana	harmarion collyrii	herpes	117. 10. 11. 9
galieria	187. 17	glechon	hastula regia	herpes exedae	117. 11
galancones	145. 10	glecium, embolus pri-	herbetudo oculorum	herpes miliaris	ibid. 14
galibidolon	167. 18	ma	herbetudinis oculorum cura-	herpesi curatio	ibid. 18
galion	ibid. 11	Embolus secunda	tio	herpillum	174. 18
galioptis	ibid. 17	Embolus tertia	hecatombe ad cicatrices	hexap. harmacon medicam-	
galla	181. 11	gloros	crallae	mentum	197. 15
galla combusta	ibid. 40	glorofocatochon	hectica febris	hibe. ius	191. 18
galla imatura	ibid. 14	glutinium	hedera	hidros	178. 11
galla quâ flauo colore est		gluten piscium	hedera lachryma	hiera cossicidj modus	411. 4
galla omphaci-	(ibid. 17)	glycyde	hedera terrestris	hiera Anisochi	411. 4 (19)
tia	ibidem 14	glycyra ulcera quibus cutē	hedricum ad ani dolo-	hiera Arrhigenae	ibid. 15
gallina	11. 16	tur	tes	hiera Galeni	ibid. 14
gallinae adeps	411. 14	glycytriza	hedricum optimum ad a-	hiera Iusti	ibid. 16
gallinae ius	176. 17	glycytis	nistum masones ex	hiera Rufi	ibid. 19
gallinarum oua	11. 16	gnaphalum	crefcentiae	hieracites lapides	191. 11
galli adeps	11. 14	gnaphalon	ibidem	hippocampus	178. 16
galli uterius ius	176. 16	gonchoira tela	ibid. 14	hippolapathum	ibid. 19
gallidropax Orbafii	491. 1	gone, pelvis ad concipien-	gredid cossicidj	hippomarathum	ibid. 4
galopis	167. 18 (11)	dum	he. yofinus	hippophages	179. 18
gammari	16. 11	gongylis	hedyarum	hippophyses	ibid. 14
ganglii quid sit	11. 11	gocylon	heli. yfina	hippopotamus	ibid. 4
ganglii notae	151. 15	gramen	helenium	hippopotami pelvis	170. 1
ganglii curatio	11. 11	grati. arundinacei	ibid. 14	hippoclinon	170. 1 (17)
ti	11. 11	gramm. gaudium	heliocopiae	et	411. 19 179. 7
gangrena	116. 11	gramm. hincetium	ib. 15	hippuris	179. 9
gangrenae curatio	ib. 14	grauedo quid	117. 11	hircinus caro	14. 18
gangrenarum per manus		grauedina curatio	ibid. 18	hircorum testiculi	14. 18
curatio	191. 1	grauedinis notae	ib. 1	hirundinum notae	165. 10
gauum	167. 11	grauedinem pueri curati-	11. 14	hirundinum remedia	ib. 11
gastrostomia	116. 11	cia	11. 14	hirundo	411. 1
ge	158. 11	grauis superuenientia	11	hirudinaria herba	411. 10
genifita	411. 17	graudia superuenientia q-		holocleros	161. 11
genitale exulcerantis cu-		modo curetur	ibid. 6	holofichnos	411. 11
ramia	191. 10	grosficus 400. 14: 411. 17		hominis morbus remedia	
genus articulus luxatus q-		gruta	11. 11	hominis in lupos	160. 15
modo reponatur	111. 11	gummi	191. 19	conuersionis notae	17. 11
gentiana	168. 4	gummi ex pruno	181. 11	hominum in lupos ceter-	
gerodes lapis	191. 17	gummi cerati acboris	181. 11	hominum in lupos ceter-	
geranium	191. 17	gulifia cerebri et simp-		hominum in lupos ceter-	
geranecra	169. 4	cium temperamenta no-		hominum in lupos ceter-	
gigax	ibid. 8	scunur	111. 17	hominum in lupos ceter-	
gignidum	10. 10: ibid. 11	guttur quomodo inciden-		hominum in lupos ceter-	
gingiua reprimens	114. 1	dum	181. 17	hominum in lupos ceter-	
gingiua excesa curatio		guttur q modo spinæ exi-		hominum in lupos ceter-	
gingiuarum pruri-	(ib. 11)	mantur	ibid. 11	hominum in lupos ceter-	
curatio	11. 10 17. 11	gyffum	170. 6	hominum in lupos ceter-	
gladiolus	400. 14	gyffi notae et remedia	170. 6	hominum in lupos ceter-	
glanula	119. 16	gyffum uultu	170. 6 (40)	hominum in lupos ceter-	
glanulae animati	14. 11	gyria	ibid. 4	hominum in lupos ceter-	
glanulae	11. 11			hominum in lupos ceter-	
glans unguentaria	181. 4			hominum in lupos ceter-	
glans colore nuda quomo-				hominum in lupos ceter-	
do regatur	101. 4			hominum in lupos ceter-	
glans perapucio adhaerens				hominum in lupos ceter-	
quomodo curetur	104. 7			hominum in lupos ceter-	
glans penis clausa quâ ape-				hominum in lupos ceter-	
riatur	101. 10			hominum in lupos ceter-	
glides unde fingatur	11. 11			hominum in lupos ceter-	
glandibus quando uen-				hominum in lupos ceter-	

**H**abitus quâ incalcat  
 Hæmatites 191. 41 (9-11)  
 hæmorrhoidæ 119. 1  
 hæmorrhoidæ remedia  
 hæmorrhoides (ibid. 11)  
 hæmorrhoidum cura-  
 tio 119. 11  
 hæmorrhoides in mulieri-  
 bus quâ curetur 119. 11

## INDEX.

[illegible]



# INDEX.

lanae, quae sordibus carent	lennificon	390. 11	314. 25	lilaceum	495. 15	lunare cyphi	500. 15	
lapis lazuli 391. 8 (ibi. 21)	lennosum	391. 14		lilium suffimen	500. 15	lupinum	32. 2: 377. 11	
lapis 392. 40	lentes	419. 23		linet panniculi	407. 13	lupinum eculeniū ibi. 13		
lapis ageratus 392. 10	lenticula	31. 27		lingua animalium	34. 21	lupinum sylvestre ibidē 13		
lapis albastrites ibidē 32	lenticula palustris	419. 23		lingua bubula	505. 24	lupus pilcis	36. 4	
lapis aphrodisiens ibidē 31	lenticulus carulea	121. 29		lingua hgaisio duobus mo-	dis accidit	285. 29	luxatio quid	342. 10
lapis Arabicus ibidem 31	lenticulus	415. 11		lingue ligatio qua ratione	curritur ibidem 37	luxationis duae species ibi.		
lapis Armeniacus ibidē 31	lentonum	497. 23		linguae morbus	124. 25	luxatio articuloꝝ (13)		
lapis Asiflos ibidem 18	lentinus adeps	418. 24		linguae scabrities hume-	clantia	77. 11	luxatio cum fractura quo-	
lapis in Argento nati ibi. 5	lepidion	108. 25: 191. 27		lioi semeti	392. 19	modo curetur ib. 35		
lapis gagates ibidem 19	lepidoides ossa	273. 29		linospermon	ibidem	lycanthropia signa 37. 23		
lapis galatites ibidem 4	lepis	391. 10		linosoftia	394. 1	lycathropia curatio ibi. 29		
lapis geodes ibidem 27	leporina caro	14. 13		lippitudo unde fiat 105. 14		lyconis noxae ibi. 23		
lapis haemastites 392. 41	leporis coagulum	407. 24		lippitudinis curatio ibi. 26		lyconis curatio ibidē 29		
lapis heraclius 392. 20	leporinus sanguis	14. 25		lippitudini utile medica-	mentum	436. 20	lychnis	394. 20
lapis hieracites ibidem 31	leporis marini noxae	364. 1		liquidi hyssopi medicame-	nti preparatio	481. 17	lyci medicamentum ad ul-	
lapis lapis ibidem 9	leporis marini reme-	dia	265. 3	liquor Cyrenaiscus 401. 28		lycium	124. 19	
lapis Indicus ibidem 21	lepra quid	304. 10		liquor Medicus ibidem		lycium Indicum ibidē 25		
lapis Iudaicus ibidem 12	lepra unde nascatur ibi. 18			liquor Syriacus ibidem		lycoctonum	357. 18	
lapis magnes ibidem 20	lepra curatio ibidē 23			liohargyros	392. 10	lycopis	394. 10	
lapis melchites ibidem 9	lepra facientia medicame-	nta	ibidem 28	liohargyri noxae	391. 20	lycopis anchusa	311. 5	
lapis morochthus ibidem	leptocarya	382. 8		liohargyri remedia ibi. 21		lygos	214. 18	
lapis ophiatis ibidem 25	lethargus unde contra ha-	tur	89. 6	lithi	392. 4	lyncus ad claritatem oca-		
lapis ostracites ibidem 25	lethargicorum noxae ibi. 27			lithospermon	392. 15	lorum	465. 10	
lapis Phrygius ibidem 14	lethargi curatio ibidem 23			litrum	394. 6	lypyriac febris	60. 18	
lapis pyrites ibidem 17	leuca seu leuce qd	207. 12		liuores corporis arden-	tia	10. 7	lyrisponium acopon	422. 8
lapis sapphyrus ibidē 12	leuca (seu leuce) aut infama-	bilis noxae ibidē 14		lixivium	395. 31			
lapis schistos ibidem 3	leuca curatio ibidē 20			lixivium protofactum ibi. 25				
lapis specularis 412. 41	leucacanthum	391. 37		locustis	38. 12: 397. 19			
lapisum coctio 422. 28	leucas ibidem 40			locustines	16. 20			
lapilli qui in spongia inue-	leuce	392. 8		lolum	395. 22			
niuntur 393. 23	leucographia	392. 6		lonchitis	394. 12			
lappago 379. 12	leucocion	392. 1		lordosis	147. 7			
lappana 391. 6	leucoclegmatia hy-	drops	160. 5	locus arbor	396. 28			
larix refina 408. 10	leucus pastillus	411. 24		locus herba ibidem 37				
laserpilulum 411. 1	leuicaria	395. 26		locus Aegyptia ibidem 37				
lasitudo inflammatoria 7.	leuicaria intestinomy	143. 22		locus sylvestris ibidem 35				
lasitudinis inflammatio (14)	libanum	404. 12		locus domestica ibidē 14				
lasitudo ibidem 24	libanum pessus	391. 40		lumbicorum tres differe-	tiae	244. 25		
lasitudo testoris ibidē 11	libanotis	391. 10		lumbri unde fiunt ibi. 26				
lasitudo testoris reme-	libanotis coronaria ibi. 12			lumbri alcarides 247. 29				
dia ibidem 20	libellula	392. 21		lumbri alcarides unde na-	scantur ibi. 21			
lasitudo ulcerosa ibidē 10	libra	392. 21		lumbri alcarides quo cu-	rentur ibidem 14			
lasitudo ulcerosa reme-	lichenes equorum	391. 21		lumbri lat ibidem 2				
dia ibidem 19	lichen herba ibidem 17			lumbri lat ibidem 2				
lasitudines sporaeque di-	lichenion medicamentum	391. 21		lumbri lat ibidem 2				
modis curentur 8. 5	lichenion animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lateralis dolor 125. 6	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lateralis doloris noxae ibi. 2	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lateralis doloris curatio	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lathyrus 391. 8 (ibi. 21)	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lauacra quibus utilia 17. 25	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lauacra naturalia ibidē 14	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lauroleia 370. 22	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
laurea Alexandria ibid. 20	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
laurea arbor ibid. 20	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
laureum 497. 17: 497. 19	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
legna, siccata digerunt 497. 19	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lema alia, corpus recoilli-	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
git humores quae euacu-	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
as ibidem 7	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lectionis commoda 6. 25	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
legumina 31. 10	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lemniscus 492. 24	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lemnina rubrica 398. 7	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				
lemnina sphaerica ibidem 18	lien animalium 31. 20			lumbri lat ibidem 2				

**M**acedonicum 477. 10  
 macer 395. 8  
 macheroneis emplastrum  
 onide 478. 10  
 madarosis quid 105. 10  
 madarosis curatio ibid. 38  
 magnes 393. 20  
 magni Aster 404. 19  
 malagmata gria 484. 10  
 malagmata alui pthium  
 laboribus utilia 491. 6  
 malagmata ardoris uicem  
 congruentia ibidem 8  
 malagmata febribus ardē  
 cibis convenientia ibi. 9  
 malagmata leoni inijcien-  
 da ibidem 8  
 malagmata leni applica-  
 da ibidem 4  
 malagmata pectori codu-  
 cenna ibidem 12  
 malagmata romacho in-  
 jicienda ibidem 8  
 malagmata in tace qua  
 pthiis dicitur coduce-  
 tia ibidem 13  
 malagmata uiscerum per-  
 frictionis utilia ibidem 18  
 malagmata apollophanis  
 adiecorosis 429. 29  
 malagma Curei 482. 29  
 malagma dyfodes a fardo  
 odore dictum, ad picul  
 26 13

# INDEX.

ricos	489. 21	mandragora signa	387. 9	exanthemata uocat, sic	citur	ibidem	19
malagma Nili ad hinc, o-		mandragora remedia ib.	11	teferita, xya plini	82. 26	medulla ferulae	399. 26
monemly durne	478. 24	manichonius dia sphecia		medicamenta ad icteru odo		mel	396. 5
malagma ad cephalagi-		manis 95. 16	(43. 40)	rem axillari et fucatio-		mel coctum ib.	61. 127. 11
am	84. 30	manusumme ossa haeta		nea	139. 7	mel non coctum	37. 11
malagma ex bacis lauri		quod cunctur	368. 22	medicamentu palpebra		mel sacchar	196. 9
malagma ex aena (489. 13)		mannu thuris	397. 20	dure dis congrui	375. 19	mel amarum, quod in 8ar	
the	439. 31	manu thuris coctio	414. 4	medicamenta spina, ai du-		mel a marum, quod in 8ar	
malagma ex simplicio		maribus	395. 22 (10)	nes, spicula, aculeos, fur-		mel a sic	ibidem 8
malagma ex ferri (ib. 16)		marfimos	69. 6	culos, quod educit	339. 3	mel oko grauiseft	306. 1
nibus	ibidem 16	medicamentu thron	401. 25	medicamentu x alo	432. 1	mel uno ponderosius	124
malagma ex ferula cam-		marcellium ad permonia		medicamentu tuffim	(37)	est	ibidem 14
pana, dia meliloton dici-		marcutu 486. 10 (197. 28)		ueteri coquois	129. 41	melis qd in Herachia Poo-	
tur	485. 15	Euifide dia omphacon		medicamentu ex capitibus		ti naicxur noer et reme-	
malagma ex fterore ca-		Embole prima ibidem 14		papaerum et melle	439. 1	dia	370. 24
prillo Oribafii, ad icteru		Euifide dia caryophyl-		medicamentu ex melle	(37)	melis rofacei quod rhodo	
induratu, lientof, et hy-		lumbo fecuda ib. 18		ralio qd dia corallu dici-		mel uocatur coctura	
dropicos	408. 17	Euifide medicamentu tertia		tur podagricis idoneum		melan	397. 31 (419. 8)
malagma ex fimo capri-		marubium 406. 31 (81)		medicamentu x (446. 11)		melan Scrapionis	475. 38
lioni, fpongione, hydropici-		marubiu nigrum 305. 20		medicamentu x (446. 11)		melampycon	475. 38
efficax	489. 4	maffalioi medicamentu		cyrenaco hignre ad fe-		melampyillon	316. 35
malagma ex dinaceta, dia		maffiche 391. 25 (435. 5)		breum quanta	439. 24	melancholia qud	91. 11
grigartion dicitur	490. 3	maffiche Argypcia ib. 29		medicamentum ex dupli-		melancholia causa ibidem	
mala	397. 4	maffiche Chia ibidem 26		ci pipere	439. 31	melancholia hign	12. 19
mala acerba	ibidem 9	maffichini 497. 21 (739)		medicamentum ex cruia		melancholia curat oib.	36
mala acida ibidem 8 et 13. 1		maluaphu coctio 301. 5		medicamentu ex (440. 12)		melancholia hypuchon-	
mala aquofa ibidem 6		maffichu confectio ib. 1		lupino iecore pigritenti-		draca	ibidem 7
mala auctera	393. 2	maffichu confectio ib. 1		finum	442. 40	melanchloron cruentis a-	
mala cotonea	393. 3	maffichu confectio ib. 1		medicamentum ex malom		psum	471. 8
mala dulcia	32. 43	maffichu confectio ib. 1		colone om carnib	441. 18	melanchloron fpaftu u.	
mala mndragora	397. 16	maffichu confectio ib. 1		medicamentum ex marta		nigro unidig colore fic	
mala praecocia	397. 17	maffichu confectio ib. 1		hifemine	441. 15	duclius	432. 4
mala Punica	397. 18	maffichu confectio ib. 1		medicamentu ex moria ba-		melaneria	397. 35
mala fructua	397. 19	maffichu confectio ib. 1		tonia q rubi fructus funt		melaphion	ibidem 40
malum Medicum	397. 2	maffichu confectio ib. 1		medicamentum (447. 8)		melaphionis praeparat-	
malum Punicum	408. 19	maffichu confectio ib. 1		multo, dia gleucus di-		ti o	441. 32
malu Punicu dulce ib. 10		maffichu confectio ib. 1		cucet	ibidem 28	melica mal <sup>9</sup> Perfica	397. 12
malu Punicu acutu ib. 21		maffichu confectio ib. 1		medicamentum ex olifera,		mel	396. 5
malu Punicu auctera ib. 10		maffichu confectio ib. 1		dia olifera dicit	454. 8	melia	ibidem 12
malicorium ibidem 23		maffichu confectio ib. 1		medicamentu ex felis u-		meliceridia propteriaes	
malus terrae	397. 2	maffichu confectio ib. 1		ptem celtan	447. 5	meliceridia cura-	(391. 22)
malus Armeiaca	397. 17	maffichu confectio ib. 1		medicamentum ex far gui-		ti o 227. 40: 228. 4: 229. 22	
malus Perfica ibidem 22		maffichu confectio ib. 1		ne hicino	444. 17	melilotos	396. 16
malabathrum cohyli-		maffichu confectio ib. 1		medicamentu ex succo ma-		meline	397. 35
um	466. 7	maffichu confectio ib. 1		li Punci	437. 19	melinum	496. 19
malabathrum	397. 16	maffichu confectio ib. 1		medicamentum ex fucca		melilophyllon	396. 19
malacia ibidem 8		maffichu confectio ib. 1		malom ad appetentiam		melitruia Oribafii	44. 4
malacia	395. 19	maffichu confectio ib. 1		atolism et uigra conco-		melitimus	396. 16
malis corporis habitus cu-		maffichu confectio ib. 1		ctione probati	441. 34	melitruia	396. 16
ratio	395. 11	maffichu confectio ib. 1		medicamentu ex fylvetis		melitruia	396. 16
malicoli luxaet curatio	391. 1	maffichu confectio ib. 1		malur femine	445. 26	melitruia	396. 16
malua 29. 12: 191. 8 (17)		maffichu confectio ib. 1		medicamentu ex thapfia,		melitruia	396. 16
malua bostenia ibidem 9		maffichu confectio ib. 1		ad oes inueteratos affe-		memoriae cura-	(391. 22)
malua fylvetia ibidem 10		maffichu confectio ib. 1		ctus	396. 10	do accidit	391. 18
malua ibidem 11		maffichu confectio ib. 1		medicamentu ex thure, dia		memoriae cura-	(391. 22)
malua ibidem 12		maffichu confectio ib. 1		hibanu	414. 11	reparetur	ibidem 27
malua ibidem 13		maffichu confectio ib. 1		medicus liquor	401. 28	melitruia ceratoides	396. 16
malua ibidem 14		maffichu confectio ib. 1		medion	396. 27	melitruia	396. 16
malua ibidem 15		maffichu confectio ib. 1		medimnus Atticus	396. 16	melitruia	396. 16
malua ibidem 16		maffichu confectio ib. 1		medulla animalu	34. 28	melitruia	396. 16
malua ibidem 17		maffichu confectio ib. 1		medulla cereuina	396. 19	melitruia	396. 16
malua ibidem 18		maffichu confectio ib. 1		medulla uicina	ibidem	melitruia	396. 16
malua ibidem 19		maffichu confectio ib. 1		medulla uicula	ibidem	melitruia	396. 16
malua ibidem 20		maffichu confectio ib. 1		medulla taurina	ibidem	melitruia	396. 16
malua ibidem 21		maffichu confectio ib. 1		medulla q in arbutu con-		melitruia	396. 16
malua ibidem 22		maffichu confectio ib. 1		tinetur	ibidem 13	melitruia	396. 16
malua ibidem 23		maffichu confectio ib. 1		medulla quae de spina el-		melitruia	396. 16



# INDEX.

duclius quò curet 143. 8	figna 89. 1	muftum 400. 31	renux 320. 29
emende fili malagma 406. 1	morbus lethalis notan- 41. 26	myaxes 396. 8	naphria 394. 4
emendes ibidem	tiā 41. 26	ibide 3	naphex 399. 25
emnyogophylax 89. 21	morbi non lethalis figna	ibide 12	nasturtium 30. 71 101. 19
menicla ducentia 16. 3	morbi quatuor no- (42. 8	ibide 20	natrix morfus figna 238.
menium purgatio q̄ xcare 17. 2. 40	tie dignofcitur ibide 14	113. 11	natrix morfus icame. (29
accidat 17. 2. 40	morbus an iudiciū fubi- 3	mydrasia caufa & cura- 18	ibidem 38
menfium purgationē que adruent 173. 6	curtus foluendus ue fit q̄ 3	ibide 15	naturalium dolores fedan- 370. 25
menfium purgatio immode- rata unde oriaf 174. 28	modo preciafas ibide 32	myeloe 396. 13	naugantiū uictus 19. 20
menfium purgatiois immo- dicæ purgatio 174. 32	morbi iudiciū futurū quò p̄nofcatur 44. 10	myoccephalon 111. 8	nauticū curatio 79. 24
menfium fuppreffio unde menfium fuppreff- (175. 13	agnofcas ibide 22	myopafia 105. 28	naxia cotis detrimētum 191. 38
tionis curatio ibide 19	morbi iudiciū optatū pa- 41. 26	myopie ibidem 39	palpebrarū affectus 109.
menfura 301. 29	ctū quò agnofcat 41. 26	myrascopa quæ fini 494. 21	nephriticorum acci- (28
menfurarū notæ ibide 27	morbi principii qd̄ 41. 24	myrica 398. 28	denia 151. 1
menfura aridoz 307. 28	morbi publicæ graffantes 32. 9	myriophyllon ibide 33	nepita 180. 21
menfura liquidorū 305. 22	morbi publicæ graf- (32. 9	myrmecia quid 322. 8	nera paffillus 450. 1
menfura 376. 20	fontes unde oriant̄ ib. 12	myrmecia curatio ib. 11	netion 399. 411 412. 7
meon 397. 18	morbi comitalis caufæ 32.	myrmecion 212. 21	neron emplaftrum, ad i- 470. 12
mercualis herba 394. 1	morbus comitalis cui (33	myrrha 398. 31 412. 22	ctus omnemq̄ particu- 474. 14
metula 17. 27	ferē xari accidat 92. 1	myrrha Æthetica 412. 26	larum carpoſorum dola- 475. 12
metoposamenon 499. 26	morbi comitalis notæ ib. 2	myrrha coctio 398. 39	nerum conuulſorato- 241. 6
metopla 81. 4 195. 22	morbi comitalis curatio 163. 31 (ib. 9	myrrhis ibide 35	neurax 399. 29
metafynctrica 212. 41	morbi ægri multæ differe- 35	myrſinatum 472. 9	nicolai dactylorum ge- 470. 12
metafynctricon medica- mentum 180. 18	tiæ ibide 35	myrſine 398. 19	nus 470. 12
metopion 497. 1	morbi regū caufa & notæ 164. 16	myrſinoides 395. 12	nicolai emplaftrū 474. 12
milax 394. 21	morbi regū cura- (ib. 16	myrſinoides 479. 27	nigella 395. 40
milax alpera ibide 22	morbi uinulentorū reme- dia cōmonia 249. 29	myrtula 398. 41	nigellæ remedia 399. 20
milax Igula ibide 22	morbus 397. 29	myrtus ibide 40	nili dia rhodon 455. 12
milium 31. 29 183. 33	morbus 397. 29	myſcion 77. 17	nili malagma 480. 24
milfolium 398. 13	morbus ex fœtu ſuo mori- turæ, notæ 311. 2	myſtrum par- (6	nirum 474. 6
milphofia quid 109. 31	mulieri grauidæ ſuperue- nientia 1. 1	uum 306. 307. 9	nirum chalaſtreū ibide 29
milphofia curatio ibide 16	mulieri grauidæ ſuperue- nientia 1. 1	mytuli 398. 8	niræ 482. 25
milui caput 381. 30	muliebri grauidæ ſuperue- nientia 1. 1	myza ibide 26 & 73. 17	notæ ponderum & men- ſurarum 301. 37
mina Atrica ibide 16	muliebri quò curetur ib. 5		nubecula oculorū 111. 37
mina Aegyptia ibide 16	muliebri fluor 177. 29		nubecula oculorum curā 32. 35
mina Romana ibide 481. 23	muliebri fluor multiplex 30		nucleus pini 32. 35
minif coctio 397. 38	notæ ibide 35		nuclei acinorū uuz 169. 9
miſyos coctio 482. 6	muliebri fluocia curatio 30		nucia arborea colicū 321. 8
mitridatis antidotū dia- ſcinu 477. 21	muliebrū locoq̄ (ibid. 39		nux arida 31. 18
mitridatis antidotū qui- bus utile fit ibide 31	clauſura quò curet 184. 4		nux uridia ibidem 321. 18
mitridatis mora 262. 2	mollis pifcis 35. 4: 477. 21		nuxes 322. 8
mnafci emplaftrū 471. 27	mulla 37. 20		nuxes auellane ibidem 3
mochlila 149. 21	mulla quò paranda ib. 25		nuxes iuglandes ibidem 3
mochlifcos 341. 7	multipede 401. 10		nuxes Fonticæ ibidem 3
modus Aegyptius 307. 14	mura mæ maris morfus 300. 2		nuxis q̄lis eē debeat 1. 29
modus Italicus ibide 14	auxilia 300. 2		nuxitiquæ uranda 2 3
molaris 395. 14	muria 302. 10		nuxitric lac quale eſſe de- beat ibidem 3
mola quid 181. 4	muria falſorū pifcū ib. 12		nuxitric lac uictatum quo- modo corrigat̄ ibide 16
mola figna ibide 6	muria oliuarum colymba- denū ibidem 301. 30		nyctalops quid 303. 28
mola curatio ibide 14	muria caput 301. 30		nyctalops curatio ibid. 32
moly 399. 4	muria aranei morſū notæ 301. 30		nymphea 400. 2
molybdos 397. 10	muria aranei mor- (301. 30		et 377. 19
molybdama ibide 27	muria remedia ibide 31		nymphea radice albo ib. 4
monobte meron collyriū 398. 24	muria auricula 449. 15		nymphe quid 313. 17
mora 32. 26	muria paſſillū 467. 29		nymphe exciſio ib. 20 (24
mora bacina 477. 8	mutela 397. 29		nympheodot paſſillū 450. 1
mora 397. 19	mutela cerebrum 397. 29		
morbi omnes habent ſua 395. 22	mutela uenter 395. 22		

**N** Acaphthon 399. 10  
 Naocanthion ibide 9  
 napus 30. 20  
 napy 399. 15  
 Narce ibidem 28  
 narcifus ibidem 39  
 narcotica medicamēta 191.  
 nardofachia 399. 14 (28  
 nardus gallica ibide 19  
 nardus moncana ibide 22  
 nardi ſpica ibide 14  
 nardū colliriū 422. 19  
 nardus cizicene 487. 15  
 Embole prima ibide 15  
 Altera embole ibide 21  
 Tertia embole ibi. 25  
 narium contuſarum cura- tio 301. 30  
 nariū fracturæ curatio ib.  
 nariū ima pars nō ſit. (21  
 giteur, ſed cōrundē ib. 15  
 nariū ſocidus odor q̄modo emendetur 320. 24  
 nariū oſia quomodo cu- renetur 319. 32  
 nazium ulcera quibus cu-

# INDEX.

Ocellaria	877. 11	nu curetur	281. 12	oliva druppa	ibidem 7	ormi non sylvestre	ibide 4
obolus	106. 23	oculi cure nō cōfecti cura	281. 12	oliva halsiades	ibidem	orobanche	401. 26
obscuritas oculorum	114. 12	quo qualis	278. 16	oliva purgantes	400. 12	orobanchum cicor	374. 17
obscureta oculorum cura	114. 12	odor corpora tenuia sunt	112. 12	olivetum	400. 17	orobos	401. 28
ochra terra 308. 19	(10. 12)	et calida	112. 12	olympus collyriū	401. 8	orthopnea unde nascitur	
ocimum	423. 24	odoratu non potest iudica		olympiacū collyriū	ibide	orthopnea cura	(10. 18)
ocimum aquaticū	374. 28	ri de simplicium temper		olynti	400. 24	no	ibidem 21
ocimoides	423. 28	lumentio	ibidem 10	oliva	120. 24	orthopnoici	ibide 18
ocularia remedia quo tempore paranda	400. 12	odore corporis bonum		olventi procidentia	400. 10	oryza	401. 5
oculū medicamentorum		eccidentia	9. 26	ole manu curet	302. 26	ocheon	307. 8
varia est materies	419. 30	oē	400. 18	omotribea	372. 11	os cyboidea	129. 19
oculorum caliginis curatio	10. 12	cedema unde fiat	221. 25	omphacium	400. 29	os kaphoidea	ibidem 41
oculi carcinoma	111. 27	cedemati curatio	ib 24	omphacocarpus	101. 21	ossa	402. 20
oculi carbūculus	ibide 24	cenantharia	409. 12	omphacomeilus pigras		ossa cremata	ibide 21
oculi carbunculum curatio	ibidem 26	cenantharion osus	ib. 16	oio	419. 24	ossa humana	ibidem 22
oculorum cicatrices	111. 27	cenanche	400. 24	onagra	401. 1	ossa lepidoides	273. 29
oculorum cicatrices curatio	112. 7	cenanthini cōfectio	409. 17	oni	ibidem 10	ossa elephanti ramēta	171.
oculorum albugines curatio	111. 27	emot	400. 29	onobrychis	ibide 7	ossa sacra structura cu-	171.
oculorum nubes curatio	ibide 35	oxyphus	ibide 32	onochelos anchusa	311. 6	tacio	335. 41
oculorum nubes curatio	ibide 35	oxyphus medicamentum paratio	481. 7	onocitara anchusa	ibidem 1	ossa	402. 20
oculorum unguis qui pretygion dicitur	111. 12	olea	372. 4	onoma	401. 5	ossaca	ibide 29
oculorum unguis curantia	111. 12	olea Aethiopica	ibidem 9	ononia	301. 18	ostracacelapia	393. 26
oculorum cōfusio quōd	(10. 12)	olea hyalūca	ibidem 12	onothera	401. 2	ostracococlea	10. 2
curetur	111. 22	oleg colicolum succi cōfectio	402. 14	onochuria	ibidem	osteica	ibidem 9
oculorum defluxio impetū quōd curet	100. 20	oleo	421. 26	onyches	ibide 15	osteocorum testa	402. 29
oculi dolor causa	10. 12	oleanx coris detrimere	101. 22	oon, id est, oom	412. 12	osyria	ibide 17
oculi dolor curatio	ib. 9	olecomel	372. 25	oxyhalis unde appellatur	(37. 25)	orthoona	400. 20
oculorum expressio causa	10. 12	olera	29. 28	ophiofocodon	412. 6	400. 18	467. 12
oculorum expressio quōd curetur	ibidem 17	olera cruda peiores succos procreant quā cōcti	21. 2	ophites lapis	397. 21	ovina pelvis	370. 26
oculorum helvetudo	114. 21	olera sylvestria	10. 11	ophthalmia unde fiat	101.	ova anserum	370. 32
oculorum heretudinis curatio	ibide 21	oleum	372. 13	ophthalmis curatio	24	ova gallinarum	ibidem
oculorum obsecritas	ib 12	oleum coctio	422. 21	oio	ibidem 16	ova meli na meli reliqua	422. 28
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum ematū	202. 28	opidiotonon	102. 27	ova phasianorum	37. 18
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum ex illis	389. 10	opidiotonon accommoda posito	104. 9	ova pincta	14. 1
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum ex nucibus	382. 5	opion	395. 40	ova recens ueteribus meliora	37. 29
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum picinum	404. 40	opium	401. 27	ova forbita	37. 40
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum raphaninū	372. 25	opoponacis coctio	401. 20	ova treuola	31. 40
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum ricinum	ibide 22	orchis herba	402. 8	ovule dadi quōd tenuet	412. 18
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum sabonum	ibide 20	orchis scirpasia	ibidem 12	ovulorum	ibidem 16
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum sesaminum	ibide 23	orchis maior	ibidem 10	ovulum solium	ibidem 17
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum utius	ibidem 17	orchis minor	ibidem 11	ovum aceto incoctū	ibide 18
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	orectumica	304. 11	ovum crudum	ibidem 20
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	orectum	31. 23	oxyphus	324. 22
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	ordines temperamenti pri marum qualitarum quatuor	311. 28	osia	311. 9
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	orectolinum	401. 24	osia multiplici usus	400. 24
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	oribasi Caragmatica	450.	oxygalactico cafe	229. 19
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	oribasi clidion	385. 35	oxyapapalio	37. 18
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	oribasi dropax	423. 14	oxymel calculosum efflu-	444. 15
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	oribasi emplastrum parvum	423. 8	oxymel libani	427. 15
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	oribasi medicamentū ad uterum morbus	316. 39	oxymel scilites	ibidem 10
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	oribasi Melitica	416. 4	oxymel simplex	ibidem 6
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	origanum	401. 21	oxymel splenicū, hoc est, leni dactum	444. 9
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	oris affectus	112. 21	oxylichon	411. 20
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	orisus uariis facitis	124.	oxos	400. 21
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	oris uenericuli infiam-	124.	ozana quid	120. 7
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	marones quomodo curantur	399. 22	ozana curantia	ibide 7
oculorum obsecritate curatio	ibide 21	oleum in quo coctū sit curatio	102. 14	ormiloon	400. 1		

# I N D E X.

<b>P</b>	<b>Aederotes</b> 336. 30	<b>papaver choras</b> ibidem 34	<b>paſtilus Muſæ</b> 449. 37	<b>colleſcia</b> 81. 39
<b>p</b>	<b>patonia</b> 349. 30	<b>papaver iſemum</b> 407. 31	<b>paſtilus Neræ</b> 410. 1	<b>pediculus in palpebris cu</b>
<b>p</b>	<b>poma cōpoſicio</b> 444. 1	<b>papaveris liquoris nota</b>	<b>paſtili Nymphodori</b> 411. 3	<b>ratio</b> 109. 11
<b>p</b>	<b>paguri</b> 36. 12	<b>papaveris liquo.</b> 366. 34	<b>paſtilus Paſionis</b> 408. 3	<b>pediſſima curatio</b> 197. 39
<b>p</b>	<b>paluron</b> 402. 9	<b>paracetamida</b> ibidem 37	<b>paſtilus Philippi ad uere</b>	<b>pediſſima curatio quod cur</b>
<b>p</b>	<b>palma</b> 410. 11	<b>pappopom</b> 373. 13	<b>ſtimoneſormina</b> 449. 39	<b>ſuc</b> 319. 37
<b>p</b>	<b>palmutæ</b> 33. 5	<b>paracanthemida</b> ibidem	<b>paſtilus Trigonuſ</b> 448. 3	<b>pediſſima curatio quod cur</b>
<b>p</b>	<b>palmutæum phœocæ di</b>	<b>papyrus</b> 403. 31	<b>paſtilus purgans</b> 448. 18	<b>ibidem</b>
<b>p</b>	<b>clum</b> 474. 18	<b>paralyſis</b> 98. 18	<b>paſtili ad corallu</b> 448. 18	<b>peganera ad pleuriticuſ</b>
<b>p</b>	<b>palpebrarum commiſſam</b>	<b>paraplexia</b> ibidem 28	<b>paſtiluſ ad ſubere, dia phel</b>	<b>pergamum</b> 404. 30 (478. 33)
<b>p</b>	<b>curatio manu adhibita</b>	<b>parathrema</b> 341. 16	<b>lon dictuſ</b> 410. 14	<b>peſtanon ad ulceſa</b> 461. 21
<b>p</b>	<b>palpebrarum uſio</b> 381. 2	<b>paraſitæ</b> 306. 37	<b>paſtiluſ diarthodon</b> 442.	<b>pelanon ex ſcoria argenti</b>
<b>p</b>	<b>ex uenæ medicamento</b>	<b>paraſynanche</b> 116. 7	<b>paſtiluſ ad ſemibus,</b> (14	<b>dia helcyſimatuſ dictuſ, ad</b>
<b>p</b>	<b>facta</b> 278. 30	<b>paracynanche</b> ibidem 9	<b>dia ſpermatuſ dictuſ ibi</b>	<b>ſimilia abraſis</b> 470. 39
<b>p</b>	<b>palpebrarum uſio ad uete</b>	<b>pardalianche</b> 157. 11	<b>paſtiluſ ex amygdaliſ a</b>	<b>pelecinoſ</b> 376. 35
<b>p</b>	<b>ribuſ damnata</b> ibidē 12	<b>parciliſ curatio</b> 99. 23	<b>maria</b> 449. 14	<b>pelluſ</b> 370. 35
<b>p</b>	<b>palpebræ inferioriſ ſutura</b>	<b>parcatoria</b> 373. 39	<b>paſtiluſ ex caſtoreo, collu</b>	<b>pelluſ hippopotami</b> ibidē 37
<b>p</b>	<b>palpebræ inferio</b> (279. 1	<b>paronychia</b> 199. 9 (401. 25	<b>cuiſ effica</b> 411. 6	<b>pelluſ ouina</b> ibidem 38
<b>p</b>	<b>uſio per medicamē</b>	<b>paronychium cauſa</b> 119. 7	<b>paſtiluſ ex cornu ceruini</b>	<b>pelluſ uiperæ</b> ibidem 39
<b>p</b>	<b>ta</b> ibidem 12	<b>parouduſ curatio</b> ibi. 9	<b>dyſenterici &amp; ſanguis</b>	<b>penis glanſ clauſa quomo</b>
<b>p</b>	<b>palpebræ ſuperioſi ſu</b>	<b>paruleniſ</b> 373. 30	<b>nem excrementuſ ſaluſ</b>	<b>do aperit</b> 300. 10
<b>p</b>	<b>ra quomodo adminiſtre</b>	<b>pariculaſ inefficaciū</b>	<b>rio</b> 448. 39	<b>penicaphyſon</b> 405. 37
<b>p</b>	<b>tur</b> 376. 39	<b>curatio</b> 169. 25	<b>paſtili ex charta, dia char</b>	<b>permarion</b> 369. 13
<b>p</b>	<b>palpebræ encantheſia q</b>	<b>partuſ anæſtheſiaſi</b> 40. 31	<b>tu appellat</b> 410. 31	<b>permarion</b> 487. 33
<b>p</b>	<b>modo auferi de</b> 381. 21	<b>ratio</b> 30. 38	<b>paſtiluſ ex duplici uera</b>	<b>peperi</b> 409. 37
<b>p</b>	<b>palpebrarum piluſ oculu</b>	<b>parium extrematuſ uſio</b>	<b>tro, idem uero ex acacia</b>	<b>peplion ibi</b> 10 (19
<b>p</b>	<b>iritantes quomodo curen</b>	<b>curatio</b> 311. 31	<b>duplici</b> 411. 32	<b>pepon</b> 31. 101 (404. 3
<b>p</b>	<b>tuſ</b> 109. 38	<b>pariuſ difficiliſ unde fiat</b>	<b>paſtiluſ ex electo</b> 448. 12	<b>peponatuſ ſinegma</b> 415. 30
<b>p</b>	<b>palpebrarum piluſ oculu</b>	<b>pariuſ difficiliſ q.</b> (186. 20	<b>paſtiluſ ex erica liens dica</b>	<b>perdix</b> 32. 26
<b>p</b>	<b>iritantes qua ratione e</b>	<b>modo aduenerit</b> ibidē 38	<b>tuſ</b> 449. 18	<b>perdicuſ</b> 373.
<b>p</b>	<b>uſio</b> 379. 36	<b>pariuſ ex uero excutiendi</b>	<b>paſtiluſ ex lapide Phry</b>	<b>perſicron curatio</b> (30
<b>p</b>	<b>palpebrarum piluſ oculu</b>	<b>ratio per totuſ cap</b> 314. 38	<b>gio, naturalium uſio ac</b>	<b>perſicron</b> 374. 2 (31. 19
<b>p</b>	<b>iritantes quomodo pec</b>	<b>pariuſ qd</b> 121. 28 (236. 8	<b>commodat</b> 411. 15	<b>perichymenon</b> 404. 4
<b>p</b>	<b>uſionem curat</b> 280. 10	<b>parulidaſ curatio</b> ibidem	<b>paſtiluſ ex cinelmo, ſediſ</b>	<b>periphymioſ</b> 301. 20
<b>p</b>	<b>palpebrarum ueruſ quomodo tollit</b>	<b>parulidæ curatio</b> 410. 8	<b>&amp; naturalium uſio uſio</b>	<b>peripneumonia qd</b> 121. 18
<b>p</b>	<b>tuſ</b> 381. 21	<b>paſſer</b> 33. 27 (417. 40	<b>paſtiluſ ex ſpina</b> (ib. 10	<b>peripneumoniſ cura</b> (16
<b>p</b>	<b>palmarum cordiſ quomo</b>	<b>paſſum</b> 375. 14	<b>Aegyptia</b> 448. 35	<b>ibidem 22</b>
<b>p</b>	<b>do curen</b> 117. 37	<b>paſtiluſ iſem ſpecies</b> 447	<b>paſtiluſ ex iſapia, hemi</b>	<b>perſicythiſmuſ</b> 376. 7
<b>p</b>	<b>palmuſ ſtercuſ</b> 316. 7	<b>paſtiluſ uſio qui poſi</b> (12	<b>cranico dolori effica</b>	<b>perſicron</b> 404. 9
<b>p</b>	<b>palmuſ</b> 31. 39	<b>tur uſio ſpecies iſem</b> 12	<b>paſtiluſ ex uſio</b> (413. 39	<b>perſicron</b> 399. 19
<b>p</b>	<b>palmuſ uſio</b> 381. 30	<b>paſtiluſ qui in aliuſ indu</b>	<b>carſia, dia phyſalidon uo</b>	<b>perſicron</b> 197. 16
<b>p</b>	<b>pſiſtheſis emplaſtri</b> 479.	<b>tur uſio ſpecies iſem</b> 31	<b>cant</b> 449. 35	<b>perſicron curatio</b> ib. 18
<b>p</b>	<b>panaces</b> 401. 14 (9	<b>paſtiluſ in aliuſ inferen</b>	<b>paſtili ſcillini cōſecti</b> 413.	<b>perone</b> 339. 28
<b>p</b>	<b>panacea Aſclepiuſ</b> ib. 18	<b>di moduſ</b> ibidē 37	<b>paſtili theriaci</b> ib. 11 (7	<b>perſica</b> ib. 31. 37 (12
<b>p</b>	<b>panacea Chironiſ</b> ibidem	<b>paſtili qui ab inferioſibus</b>	<b>paſtinaca</b> 411. 11	<b>peſſicuſ malum</b> 397. 18
<b>p</b>	<b>panacea Herculeſ</b> ibidē 15	<b>paribūſ inſiciuſ nūſ, qui</b>	<b>paſtinacæ radix</b> 30. 33	<b>peruſatio oculi qd</b> 101. 19
<b>p</b>	<b>pſiſtheſis Aſclepiuſ</b> 467.	<b>buſ uſioſ</b> ibidem 10	<b>paſtinaca marina</b> 417. 28	<b>peruſatio oculi coram</b>
<b>p</b>	<b>pancratio</b> 403. 7 (18	<b>paſtili qui delinunt qui</b>	<b>paſtinacæ mariniſ moruſ</b>	<b>tio</b> ibidem 16
<b>p</b>	<b>panicum</b> 373. 36	<b>buſ conueniunt</b> ibidē 32	<b>remedia</b> 410. 23	<b>peruſio ſediſ uentriſ</b> 16
<b>p</b>	<b>panuſ</b> 363. 9	<b>paſtili Amazoniſ</b> 449. 10	<b>paſtinaca ſylueſtris</b> 413. 14	<b>uſio, chezanance</b> 411. 14
<b>p</b>	<b>paniſtriciuſ</b> 31. 20	<b>paſtiluſ Androniſ</b> 410. 11	<b>paſtinacæ piſceſ</b> 30. 24	<b>per corniciſ</b> 397. 43
<b>p</b>	<b>paniſ ſignatuſ</b> ibidem 22	<b>paſtiluſ quem o. a. l. 23. 13</b>	<b>paſilla</b> 119. 10	<b>peſſuſ qd</b> 174. 9
<b>p</b>	<b>paniſ ſignatuſ</b> ibidem	<b>aphrodiſiaſticuſ clidion</b>	<b>paſillaſ fractuſ curatio</b> ibi.	<b>peſſuſ tres diſſerit</b> ib. 18
<b>p</b>	<b>paniſ ſyncomiſ</b> ibi. 23	<b>inſcribit</b> 448. 29	<b>paſillaſ fractuſ paluſtra</b> (14	<b>peſſuſ emollit uſio</b>
<b>p</b>	<b>paniſ cibariuſ</b> ibidem	<b>paſtiluſ aſter dictuſ</b> 447.	<b>cum</b> 408. 33	<b>peſſuſ emollit</b> (ib. 14.
<b>p</b>	<b>paniſ oſtendiſ</b> ibidē 27	<b>paſtiluſ, Capniſtoſ</b> 440	<b>paſilla emplaſtri ſtrumiſ</b>	<b>rium materia</b> ibidem 16
<b>p</b>	<b>paniſ oſtendiſ</b> ibidē 27	<b>ſumo dictuſ, ad tuſſim</b>	<b>et bubſiſ effica</b> 478. 1	<b>peſſuſ aperientiſ uſio</b>
<b>p</b>	<b>paniſ oſtendiſ</b> ibidē 27	<b>continuuſ</b> 170. 7	<b>paſilla</b> 31. 10	<b>peſſuſ aperientiſ</b> (ib. 18
<b>p</b>	<b>paniſ oſtendiſ</b> ibidē 27	<b>paſtiluſ Criogeniſ</b> 411. 39	<b>peſſuſ oſſiſ fracta qd</b>	<b>rium materia</b> ibidem 19
<b>p</b>	<b>papauer</b> 366. 31	<b>paſtiluſ Crocoduſ</b> 448. 9	<b>ſcanſ, curenſ uſio</b> 117. 37	<b>peſſuſ aſtringentiſ uſio</b>
<b>p</b>	<b>papauer aphrodeſ</b> 397. 2	<b>paſtiluſ Fauſtini</b> 410. 16	<b>peſſuſ impreſſioſ nota</b>	<b>peſſuſ aſtringentiſ ma</b>
<b>p</b>	<b>papauer cornutuſ</b> 396. 41	<b>paſtiluſ qd ano ſubſci</b>	<b>peſſuſ impreſſioſ</b> (114. 19	<b>teria</b> ibidem 23
<b>p</b>	<b>papaueris cornutuſ nota</b>	<b>hypocriſi dictuſ, ad in</b>	<b>ſionuſ curatio</b> ibidem 33	<b>peſſuſ craſſuſ do qualiſ eſſe</b>
<b>p</b>	<b>cededa</b> 269. 8	<b>teſtimoniſ tormina &amp; ani</b>	<b>peſſuſ ruſtiſ curatio</b> 118	<b>debeat</b> ibidē 24
<b>p</b>	<b>papauer Heraclion</b> 397. 2	<b>doloreſ</b> 412. 30	<b>pediculuſ capidiſ</b> (ib. 23	<b>peſſuſ Aegyptia</b> 302. 18
<b>p</b>	<b>papauer horrenſ</b> 396. 22	<b>paſtiluſ Leucuſ</b> 411. 24		

# INDEX.

peffus chryſos ab aureo co- lore dict <sup>us</sup> emolliens 301. 31	moda 311. 40	pili ruſi qua ratione ſtave- ſcant ib. d. m.	plombago 397. 37
peffus crocod <sup>us</sup> , ad inſi- mariones, auct <sup>us</sup> h <sup>u</sup> ic <sup>us</sup> , du- ritias, & miſiſi <sup>us</sup> ib. 38	phlegmona curatio ib. 18	pili nigri qua ratione ſtave- ſcant ibidem 7	plumbum ibidem 13
peffus emolliens 300. 31	phlogiſta 401. 5	pili qua ratione aurei colo- re reddantur ibidem 11	plumbi cōcreta ib. 36
peffus encephalac <sup>us</sup>	phlogiſta quōd <sup>us</sup> curat <sup>ur</sup> 111.	plurimum glutinans medi- camentum 110. 4	plumbi cōcreta ib. 36
peffus Gona ad cō- (102. 5)	phlogiſta curat <sup>ur</sup> 110. 12	pinguedo animal <sup>is</sup> 34. 39	plumbi epoca noct <sup>is</sup> & ac- t <sup>is</sup> media 371. 35
peffus libani <sup>us</sup> , mēſe euo- cis & uulva uarij ſing <sup>u</sup> lariter accommod <sup>us</sup> 301. 40	phlogiſta coagulans 407. 27	pinguiſ <sup>us</sup> coctio 482. 31	pluvialis aqua 416. 18
peffus Tinnius 303. 8	phlogiſta emplāſt <sup>er</sup> 472.	pinon 481. 11	perumom 401. 38
peffus ſit <sup>us</sup> ſigna ſuper ueni- peffus 371. (centia 67. 36)	phlogiſta arbor 410. 11 (18)	pinus 390. 38	puncta oua 34. 8
cautiones 64. 2	phlogiſta herba ibidem 8	pine nucleus 32. 35	pungition 97. 5
peffus ſit <sup>us</sup> arcetia ibidē 19	phormion ibidem 17	pine ſeſina 408. 11	podagra quid 189. 40
petasites 404. 15	phragmites calam <sup>us</sup> 360. 30	piper 403. 27	podagra unde natiſc <sup>it</sup> 10.
petroſelinon ibidem 18	phrenitis 67. 17	piper album ibidem 40	podagra in qua ratio- (18)
petuce ibidem 28	phrenitis quid 86. 19	piper aquaucum 416. 35	ne eſt fugia 196. 8
peucedanum ibidem 21	phrenitis cauſa ibidē 41	piper longum 403. 19	podagra remedia 446. 11
phaci 419. 31	phrenitis noſc <sup>it</sup> 87. 6	piper nigrum ibidem 40	et 4. 6. 21. 479. 29. & 10. 18
phagnomon 104. 40	phrenitis curatio ib. 26	pira grandia 31. 3	porcion apocōn 491. 35
phaxon ad oculos ſangu- ne ſuſuſos, & magnos affectus 401. 28	phrygialis lapis 352. 14	pirum greſſe 364. 33	potemionium 405. 26
phagedenarum per mē- ſis curatio 298. 3	phrygion 406. 31	pirus domeſtica 361. 35	potiora 31. 301. 289. 2
phalagion ſchibus cōtēn- ens medic <sup>us</sup> mēt <sup>is</sup> 113. 40	phthiſia noſc <sup>it</sup> 131. 8	picea 35. 37	potium 405. 30
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phthiſia curatio ibidē 13	pices ſaxatiles oim opri- mi ibidem 39	pollen larinae 370. 4
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phthiſia oculi quid 111. 31	pices deterimi 16. 3	polyarchon 401. 48. 39
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phthiſia oculi cauſa ib. 22	pices cartilaginei ibidē 24	polyenemō 406. 6 (ib. 28)
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phthiſia oculi curatio ib. ſe heoe 212. 32 (31)	pices ceraei ibidem 30	polycoſa 187. 14
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phlu 410. 20	pices cruſtati ib. 11 & 34	polygonat <sup>us</sup> 391. 27. 405. 27
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phluſca ad coneritū cal- culos 444. 31	pices molles ibidem 19	polygonon 406. 1
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phlycos 420. 33	pices reſtacei ibidem 8	polygonoides 381. 13
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phlyctes ibidem 26	piceum gluteo 379. 19	polydactyl <sup>us</sup> 410. 4
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phyma quid 219. 30	piceum ruſo 376. 11	polydactyl <sup>us</sup> 120. 2185. 9
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phyma curatio 220. 11	piceum recenteſc <sup>it</sup> ib. 12	polypodas curatio 120. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	phyma curatio 220. 11	puffa 404. 34	polyp <sup>us</sup> mēſis curatio 186.
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	puffera emplāſt <sup>er</sup> 341. 2	polypipices 10. 20
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	polydion 406. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	poma 33. 15. 37
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	pompholygon emplā- ſtrum 472. 31
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	pompholyx 406. 10
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	pōpholygon coctio 482. 31
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	pōnd <sup>us</sup> 109. 20. 106. 30
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	pōnd <sup>us</sup> mēt <sup>is</sup> ibidē 17
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	pōnd <sup>us</sup> nuce 382. 13
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	populus alba 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10	piliſimon 404. 40	porculus nuce 392. 8
phalangion morbus noſc <sup>it</sup>	picea cortex 405. 10		

# I N D E X.

præcisio	337. 11	petris	407. 6	pulsus epineuocostæ	43.	cōfecta alexandri ibidē	36
præcocia	32. 19	petrygion	331. 17	pulsus fluctuans	45. 6 (17	purpure	406. 18
præputium glandi adha-		petrygion curatio	ibidē 10	pulsus fluctuosus	49. 14	purpure pilices	36. 10
rens qua ratione curetur		petrygion digitorū	199. 14	pulsus formicans	ibidē 16	purpureus adultio qdō ad-	
præstion	406. 13 (104. 1	petrygion unde fiat ib.	33	pulsus frequens	47. 8	hibenda	297. 9
præstoides	373. 40	petrygion curatio ibidē	37	pulsus gracilis	31. 15	purpurea excreatio unde	
præstion	406. 37	petrygia digitorū putrida		pulsus hecticus	49. 31	purpurea ex. (fiat 114. 28	
præster unde dictus	191. 10	quibus curatur ibidē	33	pulsus heterorhythmus	47.	crenations notæ ib.	37
præster morbus notē ib.	6	petrygium oculorum	112. 13	pulsus humilis	46. 23 (27	purule et excreatio cura-	
præster morbus notē ib.	6	petrygium oculorum cu-		pulsus inæqualis	47. 16	tio	135. 13
præstipicon linamē-	(359. 1	rancia ibidē	16	pulsus inclinans	49. 1	pustula curatio	310. 14
cum	121. 6	petrygium unguis	322. 6	pulsus inordinatus ibi.	33	pustulæ puero obortæ quō	
præstipiconus	169. 4	petrygium unguis uo-		pulsus inordinati differen-		curentur	3. 8
præstipicon curatio	ibidē 7	de fiat	ibidē 7	tiæ	50. 1	pyncocomon	407. 10
prinos	406. 31	petrygion unguis curatio		pulsus languidus	46. 17	pyrethrum	ibidē 14
proclī copiosio podagra		pelliois qd 109. 79 (ib. 14		pulsus latus	ibidē 31	pyrexia	33. 28
et cōtendit doloribus		pelliois curatio ibidē	29	pulsus longus	ibidē 31	pyrexia emplastrū	470. 16
accommodata	445. 40	præstia	189. 8	pulsus magnus ibidē	31	pyrexia 193. 11 pyritus 199.	
proficientium uicibus ra-		pulsam coquēdi modus		pulsus mediocris ibidē	14	pyrox	407. 19 (13
tio	19. 9	pudendum mascul-	(11 18	et	28 67 38	pyria ib. 21 pyrucon 171. 4	
propolis	406. 31	li cerui	175. 15	pulsus meiorus	48. 40	pyria acopon	493. 20
propolis coctio	483. 19	pudenda incumescens q-		pulsus moderat⁹	46. 37 37	Vercus	371. 27
propomata	478. 18	modo curatur	170. 18	et	47. 14	Quinquiesolū	409. 27
propolis oculi quō curet		pudendum remedia	169. 18	pulsus mollis	46. 36	Acollis	312. 20
proptosis oculi quō curet		puerū educatio	2. 35	pulsus myurizans	48. 4	Racolia curatio ibidē	
proptosis oculi quō curet		puerū ab anno vi. aut vii.		pulsus myurus ib.	67 40	radices cibi rationem ha-	
collyrium	462. 18	quid faciendum	4. 10	pulsus myurus deficiens		benes	10. 15
proptosis	368. 17	pulegium	169. 10	pulsus myurus re-	(48. 7	radicum coctio	484. 16
proptosis	367. 4	pulsaria herba	418. 3	currentia ibidē	10	radicula 10. 171. 407 38	
proctus collyrium	475. 13	pulsus columbinus	31. 26	pulsus naturalis	46. 31	radicula fracta curatio	170. 8
protofractos	469. 38	pulsio animalū	34. 11. 405.	pulsus necrocotis	49. 1	radix	166. 26
prunum	366. 4	pulsio agnatus 401. 31 (23		pulsus ordinatus ibidē	33	ramenta denticū elephant	
pruna Damascena	ibidē 5	pulsio fulvis ibidē		pulsus paralythm⁹	47. 16	ramenta ex unguit	(371. 14
prunus	385. 19	pulsio vulpinus ibidē		pulsus parvus	46. 24	elephant⁹ ibidē	12
prunorum sylvestris bac-		pulsio marinus ibidē	24	pulsus pinctuocotis	48. 37	ramicū curatio	166. 10
ca	ibidē 3	pulsio temperaturæ	110	et	49. 2	ramicū genera ibidē	1
prunus unde notat	106. 17	12	34. 5	pulsus plenus	46. 40	ramex aquosus	307. 9
pruritus curatio ibidē	19	pulmonis vulnerati notæ		pulsus rarus	47. 14	ramicū aquos⁹ notæ ib.	10
pruritus gingivarum cu-		pulsæ chidōris 115 (125. 17		pulsus ferratus	49. 18	ramicū adli curatio ib.	12
rantia	3. 31 67 40	pulsæ purgandū	409. 13	pulsus tardus	46. 11	et	166. 18
præstio medicamentū	414. 14	pulicula	189. 7	pulsus turbulenti	49. 7	ramicū adli adultio	308.
pseudobulium	422. 18	pulsus quid	45. 16	pulsus uacuus	46. 41	ramicū aquosum (14	
pseudocinnamomū	184. 23	pulsus usus duplex ibidē	37	pulsus uehemens	46. 37	curatio	166. 13
pseudodictamnion	171. 6	pulsus causi et pepsigra		pulsus uermiculans	49. 6	ramex carosus	309. 2
et	422. 40	pulsus hominis ulius (10. 21		pumex 114. 26 (17. 14		ramicū catenosi curatio ib.	
pfiliorum	185. 12	nunq̄ deficit	31. 35	pumex crepans ibidē	39	ramex inguinis 166. 9 (7	
pfiliorū uitis genus	159. 40	pulsus eleuatio	45. 17	pumex lotus ibidē	30	ramicū inguinum curatio	
pfilmyrthion	423. 1	pulsus submissio ibidē	40	pumicis coctio	48. 28	ramicū inguinū cu. (111. 12	
pfilicium	471. 18	pulsus boni rhythm⁹	47. 10	punica mala 33. 4. 409. 19		ratio per unctionē ib.	40
pfilora quid	104. 16	pulsus ouilius rhythm⁹ ibi.		purgatio nō effect⁹	424. 4	ramex intestinoꝝ	166. 10
pfilora unde nascat⁹ ibidē	18	pulsus aequalis ibidē	34	purgationes quibus uritis		ramicū intesti-	(17 110 10
pfilora curatio ibidē	23	pulsus altus	46. 34	purgationis tem-	(ibidē 7	norum causæ	310. 12
pfilora abigentia medica-		pulsus amplus	51. 27	pus	ibidē 13	ramicū intestinoꝝ no-	
menta	ibidē 36	pulsus an⁹ 67 40		purgatio leuio debet da-		re	ibidē 15
pfilorico	422. 6	pulsus arcus	46. 23	ri	490. 8	ramicū intestini cura-	
pfilorophthalmia quid	107.	pulsus breuis	ibidē	purgatio qd requirit ib.	1	tio	ibidē 14
pfilorophthalmis cura-	(32	pulsus capitis	48. 21	purgatio nō euacuante		ramex omenti	ibidē 29
tio	ibidē 25	pulsus citatus	46. 12	quid faciendū ibidē	18	ramex omenti intestini	
pfilochrotophon	306. 5	pulsus coincidē	48. 1	purgatio qd fieri debet		ramex tophacē	(ibidē 10
pfilodra	88. 8	pulsus cōuulsiō 49. 7. 24		purgatio ex malis (ib. 81		ceus	309. 17
pfilodracm⁹ curatio ib.	10	pulsus creber	47. 14	coconcia	418. 4	ramicū tophacē curatio	
pfilium	421. 1	pulsus diuers⁹	48. 34. 17. 17	purgatio quæ constat ca-		ramicū uarico	(ibidē 28
pfilit notæ	206. 16	pulsus durus	46. 35	ryophyllo, ad ducendū		ramicū uarico	(ibidē 18
pfilit notæ	206. 16	pulsus erythmus	47. 28	aquas	417. 10	ramicū uenoso	(ibidē 18
pfilit remedia ibidē	17	pulsus eurythmus ibidē	39	purgatio ex rhodomelice		ibidē	40
piarnice	406. 18						
pelea	407. 1						
pelea	377. 37						



# INDEX.

scandix 411. 31	modo curentur 371. 7	sinapis quibus vicia-	soporis nexti curatio 89.
scapularum cōpressio qui	selache 36. 24	bus sic ibidem 17	sorba 88. 5 (40)
noscat 374. 8	selinon 409. 29	sinciput quatione mei-	sorbus 400. 17
scapularum compressio q̄	seminis profluuium 108. 9	dendron 276. 7	sordicula aurium 308. 24
modo curetur ibidem 11	seminis profluuij causa ib.	singulus unde oriat 74. 6	sordes balnearum 109. 23
scapula tracta quōd nosci-	seminis profluuij cura (10	singulus curatio ibidē 11	sordes palmarū 408. 23
tur, q̄ curetur ibidem 13	tio ibidem 18	sinon 411. 5	et 378. 23
scapularū rupcuram qui di-	semen genitale redundans	sinus quid 336. 10	sordes ex stacua arctis de-
gnoscat ibidem 10	quōd minuat 13. 8	sinuum curatio ibidem 11	tracta 408. 20
scapularum rupcura q̄mo	seminaria uasa 306. 40	sinuum differentia 317. 12	sordes ex uasa in quibus
doe curetur ibidem 11	seminum coctio 434. 16	sinus rhaetodes quomodo	multum olei inhæret, de-
scilla siue scylla 411. 30	semine dimius 307. 18	curentur 337. 9	detrahit ibidem
scillini pastilla confectio	semitaxarios ibidem 15	sion 30. 41 411. 8	137. 261 415. 24
scillini in oxy-	senecio herba 377. 11	siraon 175. 87 414. 84	sori coctio 481. 24
met 478. 23	senectus anguis 368. 41	sirafo 4. 16	sorera, antidotum 440. 21
scilites acetum 428. 10	senem uictus ratio 8. 41	sirafo nocte ibidē 48	sparganium 412. 35
scincos 411. 26	sepia 36. 20	sirafo curatio ibidem 20	spatosa ibidem 37
schinos 415. 11	sepiæ testa 410. 1	siricum 409. 6	spasmus cynicus 100. 41
schirus 157. 18	sepo ibidem 10	sirum 411. 30	et 415. 13
schirus exactus 325. 29	sepi trāfuerit uulnerati no-	sifer ibidem	spathe 450. 40
schirus nō exactus ib. 40	tae 321. 40	silymbrium 411. 14	spectarium 412. 40
schiri curatio 326. 10	serapias 402. 18	sicis unde fiat 78. 23	speculum lapis ibidem
schistos lapis 412. 3	serapionia Melane 475. 38	sicim in febris placen-	sphacelus 216. 18
schzenoschia 415. 19	seriphium 409. 35	tia ibidem 40	spharion, ad ardore 477.
schœnu anthos ibidem 17	seris ibidem 38	smaridia caput 383. 28	sphagideas ue-
schœnoma uteri 180. 26	serisyluestria 385. 9	smectica medicamenta 459.	16
schetophthalmia 106. 1	serpillum 174. 35	smegmata 452. 28 47. 10 (41	sphæterium 418. 41
schetophthalmia curatio	seruua campana 306. 16	smegmata aridum qd Aiele	sphætic 417. 35
scholofia 147. 8 (ib. 3)	serum lactis 367. 31	pion dicitur 451. 8	sphincter 119. 10
scholopēdra marina 411. 22	serumoides 410. 5	smegma peponatū 455. 20	sphlanchon 107. 18
scholopendri siue terrestris	serumum ibidem 7	smegma qd capitis delu-	sphongion malagma 440. 4
siue marinis morbus no-	serumum 456. 23	xiones succit ibidē 34	sphragis Polydis 450. 4
tu 315. 8	sefeli 376. 21 409. 29	smegma ad cicatrices ni-	spica nardi 109. 14
scholopendri terrestris aut	sextarios 306. 26 307. 4	gras 326. 6	spica nardi Indica ibidē 18
marinis morbus remedia	sextarius aridi mētura 307.	smegmata calliblephara	spica nardi Syriaca ibidē
scholopēdri n 411. 26 (ib. 14)	sextarius Italicus ib. 10 (15	smilax 412. 21 (109. 19	spicula eductoria medica-
scholopomachion 284. 31	siason 410. 12	smilacis nocte 308. 23	menta 329. 2
scholymon 411. 28	siccetis curatio 27. 15	smilacis remedia ibidē 24	spina alba 117. 1
schordion 412. 1	siccū in primo ordine 395.	smilhon, ad abscissus 409.	spina Aggypti ibidem 4
schota ibidem 15	siccū in secundo gra- (41	smirny lapis 393. 23 (38	spina Arabica ibidem
schorodon ibidem 5	du 316. 8	smyrna 412. 23	spinae quæ ratione gutturi
schorodopraon ibidem 8	siccū in tercio gradu ib. 4	smyrnum ibidē 38. 4	eximantur 388. 22
schorpioides ibidem 10	siccum in quarto gradu m-	solanum hortense 414. 6	spinae eductoria medica-
schorpius terrestris ibidē 13	halest qd nō urat ib. 5	solani halicacabon ib. 7	camētra 219. 2
schorpioidi cū signa 254. 18	sicyonius simplex 497. 37	solani hypnoleu ibidē 2	spinae dorsi contractæ cu-
schorpium ictus reme-	sicyonius cōpositum ib. 40	solani furiosi nocte 268. 29	ratio 357. 37
dia ibidem 20	et 498. 8	solani furiosi remedia ib. 31	spira di difficilis 100. 18
schorpium periculofortū	sicyos 410. 24	sole exusti quomodo curē	spodiaceon collumū 462. 10
ictibus congruent medi-	sicyos agrios ibidem 29	tur 13. 25	spodium 412. 39
camentum 254. 29	sideratio 316. 20	spare cyphi 300. 20	spondyli 16. 18
schorpius marinus 411. 14	siderationis curatio ibi. 22	solena 340. 8	spondylion, siue spiondy-
schorpioidia marini ictus au-	sideritis 410. 17	sollitium æstiuum 40. 27	lion 415. 6
xilia 350. 13	sideritis Achillea ibidem 18	sollitium hyemale ib. 16	sporgia 415. 4
schorpius 376. 28	sideritis Heraclea ibidem	sollitio hyemali quid faci-	sporgia cremata ibidē 6
schorocum 397. 8	sideros ibidem 20	undum ibidem 18	sporgia ibidem 4
schoti inflammationis no-	sideros 408. 23	somnus quid 37. 21	spuma argenti 392. 16
tae 107. 12	siliquis pondus 306. 23	somni cōmoda ibidem 33	spuma argēti nocte 271. 26
schoti inflammationis cu-	siliquis 86. 17	somni tēpus optimū ib. 33	spuma argēti remedia ib.
rario ibidem 17	silphe 410. 59	somnus per diem non bo-	spuma niri 307. 20 (31
schoti pruritū curatio 103. 3	silphium 411. 3	nus ibidem 36	spuri præstigia 51. 8
scrupulum 306. 22	silius 410. 16	somnus nocturnus opi-	sputum cruentum unde fi-
scryales morbus nocte et	silybon ibidem 35	at 118. 8	118. 8
remedia 217. 24	sinapi 30. 8 399. 12	somni terminus quia 32. 3	spoticruenti curatio ibid.
secundæ 310. 21	sinapismus quōd fiat 492. 25	sonchos 117. 21 412. 22	liquama 301. 16
secundæ educēdi modus	sinapis quibus uicis	sopores quomodo curen-	liquama coctio 48. 16
edii erysipela q̄ (ib. 22	fit 494. 1	tur 88. 26	liquama trita 107. 16



# INDEX.

<i>Squama ferri</i> ibidem 34	<i>Strabium curatio</i> ibide 6	<i>lysiaca</i> 39-40	<i>terrestris crocodil</i> 412-26
<i>Squama helice</i> ibidem 33	<i>Stragularia curatio</i> 127-3	<i>lynacus liquor</i> 401-28	<i>ternana exacta</i> 37-38
<i>Squama stomomati</i> ibid.	<i>Straciosa aquatica</i> 414-2	<i>lyringotomon</i> 301-8	<i>terruia exacta</i> ibide 39
<i>Squamitox</i> 10-36 (34)	<i>Stratocetes terrestris</i> ibidem	<i>lysymachus</i> 39-35	<i>terruia notha</i> 38-18
<i>Squillae</i> ibidem 33	<i>Stratobulus</i> 32-37 350-50	<i>lytlole</i> 45-40	<i>terruia spura</i> ibidem
<i>Stachys</i> 418-35 (482-38)	<i>Struma qd</i> 226-22 230-23		<i>testa olivorum</i> 402-24
<i>Stactico Prolech</i> collyrii	<i>Strumae curatio</i> 226-33		<i>testa lepae</i> 410-1
<i>Stalica collyria</i> qd 107-4	<i>Struma curatio</i> quae ma		<i>testa fornacum</i> 402-30
<i>Staphis</i> 363-30	<i>nu adhibetur</i> 230-30		<i>testiculorum natura</i> 306-35
<i>Staphilaparton</i> 121-22	<i>Strumae incurabiles</i> ib. 32		<i>testiculorum neperatur</i> 301-18
<i>Staphylion</i> 270-23	<i>Struthia mala</i> 397-10		<i>testiculi inflammation</i> (35-23)
<i>Staphilinus</i> 419-11	<i>Struthiocamelus</i> 33-30		<i>tionis notae</i> 107-12
<i>Staphyloma</i> 111-4 262-5	<i>Struthiocamelus</i> oua ib.		<i>testiculi infla tomari</i> 108-10
<i>Staphylomaria curatio</i>	<i>strychnon</i> 414-5 (38)		<i>ratio</i> ibidem 17
<i>Staca</i> 413-18 (282-7)	<i>Stulicia unde fiat</i>		<i>testiculos incensos curan</i>
<i>Steatomati proprietas</i>	<i>Styptem</i> 414-14		<i>tia</i> ibidem 42
<i>Steatomati cura</i> (291-20)	<i>Syrax</i> ibide 12		<i>testiculorum carne excrec</i>
<i>tio</i> ibidem 323-37	<i>Suber</i> 415-30		<i>tem curia</i> 108-2
<i>Stegnosia</i> 7-34	<i>Submissio pulsus</i>		<i>testiculi animalium</i> 34-33
<i>Stellio transmarinus</i> 36-38	<i>Subor</i> 378-21		<i>testiculi arietum</i> ibide 25
<i>Stellionis transmarini mor</i>	<i>Sudore elicientia</i> 16-8		<i>testiculi gallinae</i> 306-16
<i>foi remediū</i> 275-22	<i>Sudori in febribus qd adhi</i>		<i>nae</i> ibidem 24
<i>Stephane</i> 282-28	<i>bendum</i> 69-89		<i>testiculi hircorum</i> ibidem 25
<i>Stercum</i> 306-33	<i>Suffimen rufus</i> 300-3		<i>testiculi taurorum</i> ibidem
<i>Stercus aonii cohorsali</i>	<i>Suffimen cunae</i> ibide 15		<i>testiculi arietum</i> (el 422-2)
<i>um</i> 187-8	<i>Suffimen hilum</i> ibidem		<i>testudinis maris</i> (an-16)
<i>Stercus bubulum</i> ibide 4	<i>Suffimen rosatum</i> ibide 11		<i>gus quod parci</i> 200-10
<i>Stercus canum</i> 186-35	<i>Suffusio oculorum</i> 382-33		<i>teranus quid</i> 103-3
<i>Stercus caprilium</i> 187-2	<i>Suffusio oculorum</i> quod cu		<i>teranus unde nascat</i> 102-28
<i>Stercus ciconiarum</i> ib. 10	<i>rur</i> 114-8 37-28		<i>teranorum notae</i> 109-11
<i>Stercus columbarum syl</i>	<i>Sugillata quod curi</i> 122-4		<i>teranorum curatio</i> ibide 25
<i>vestrium</i> ibidem 6	<i>Sugillata adeps</i> 419-20		<i>terapharmacum basilic</i>
<i>Stercus crocodili</i> 101-12	<i>Suilla caro</i> 84-6		<i>teratiga</i> 416-4 (468-22)
<i>lio</i> 107-16	<i>Suillum lecur</i> ibidem 30		<i>teucrion</i> 416-11 421-30
<i>Stercus crocodili terrestris</i>	<i>Suillum salus</i> 402-22		<i>teucrion</i> 416-8
<i>Stercus ferri</i> 412-10 (ib. 11)	<i>Sulfur</i> 377-26		<i>thaidis ceratum</i> 122-26
<i>Stercus infancium</i> 105-39	<i>Sulfuris coctio</i> 482-25		<i>thaidis ferros collyrii</i> 405-43
<i>Stercus luporum</i> ibide 40	<i>Supercolorum defuuii cu</i>		<i>thaliertum</i> 377-22
<i>Stercus murium</i> 187-11	<i>taquia</i> 109-31		<i>thapsia</i> ibidem 25
<i>Stercus pumibus</i> ibide 7	<i>Sura</i> 339-29		<i>thapsiae coctio</i> 424-3
<i>Stercus turnogae</i> ibidem 13	<i>Sura fractae curatio</i> ibi. 31		<i>thapsiae remedia</i> 272-3
<i>Sterilitas emedella</i> 184-10	<i>Surditatis remedia</i> 112-22		<i>thion</i> 377-26
<i>Sternuramentum ciconia</i>	<i>Susinom</i> 495-35		<i>thelypctris</i> ibidem 37
<i>Sternuramentum</i> (120-3)	<i>Susinom compositū</i> ib. 41		<i>theodoretus dia aonardi</i>
<i>sedancia</i> ibidem 37	<i>Suspiriū unde oriat</i> 330-18		<i>theodoretus fi</i> (on 448-7)
<i>Sternuramenta in febribus</i>	<i>Suspiriū curatio</i> ibidem 81		<i>neanacar dja</i> ibidem 12
<i>quod curenur</i> 71-2	<i>Suspiriū qui</i> ibidem 10		<i>theriacale manus</i> 462-24
<i>Stigmata quod curi</i> 109-3	<i>Syca</i> 414-21		<i>theriacale preparatio</i> 415-19
<i>Stillicidium urinae curan</i>	<i>Sycamina</i> 22-26		<i>theriace quae oculis</i> ib. 40
<i>tin</i> 135-16	<i>Syce</i> 414-20		<i>theriace aduersus uirulen</i>
<i>Stommi</i> 421-21	<i>Sycomorosa</i> 33-18		<i>ta et lethalia uenena</i> 416-10
<i>Stoebe</i> ibidem 34	<i>Sycomorus</i> 414-34		<i>theriac morbus et scorpio</i>
<i>Stoechas</i> ibide 19	<i>Sycosia</i> 108-26		<i>nisictus</i> 230-11
<i>Stomacho inscienda mala</i>	<i>Symphylion magnū</i> 415-4		<i>theriaci passili</i> 415-11
<i>gnata</i> 485-1	<i>Symphylion petraū</i> 414-19		<i>theriaci sales</i> 416-87
<i>Stomachi effectus et cura</i>	<i>Synanche</i> 124-7		<i>thermos</i> 377-81
<i>tio</i> 119-10	<i>Synopsis notae</i> 127-20		<i>thlasia</i> 327-19
<i>Stomacho in febribus que</i>	<i>Synopsis emedatio</i> ib. 37		<i>thlasia duplex est</i> ibide 35
<i>cura adhibenda</i> 66-32	<i>Synopsis in febri ex crudo</i>		<i>thlasid</i> 377-43
<i>Stomachum adurendi mo</i>	<i>humore redondare oria</i>		<i>thlasia auriū curatio</i> 118-19
<i>du</i> 292-34	<i>preffus</i> quid adhibendū		<i>thoracis morbos quae fi</i>
<i>Stomachici</i> 140-28	<i>Syncope ob pra-</i> (65-27)		<i>gna praecadens</i> 39-39
<i>Stomatia medicamenta</i>	<i>tus humores oppres</i>		<i>thoracis morborum signa</i>
<i>stomatocum me-</i> (456-14)	<i>forum curatio</i> ibidem 34		<i>ubi apparuerint quod fa</i>
<i>dicamentorum usus varius</i>	<i>Synopses alia causa</i> 46-5		<i>ciendum</i> ibidem 32
<i>Strabismus</i> 118-1 (ib. 17)	<i>Synopsis rubrica</i> 368-22		<i>thoracis morborum signa</i>





# I N D E X.

ulcera Telephii ibidem 5	unodon 274. 7	ipſius iter obſtructū eſt, curatio 204. 41	modo curentur 120. 12
ulcera caui curatio 270. 20	ungues pulſes 26. 11	unioꝝ incontinencia unde	ulug exulceratio unde ac
ulcera ſimplicia curatio	unguis oculorū qui ptery-	uring uociferentia q. (113. 28	cidat 178. 17
ulcera dolore & m. (123. 38	et 112. 12	modo cureſt ibidem 39	ululux exulceratio cura-
flāmatiō obſeſſa quō	ungues oculorum curan-	unſus adeps 418. 26	io ibidem 27
curentur 229. 16	tia ibide	urica 20. 9	ululux inflatio unde 181.
ulcera inflammata quō ſa-	unguis oculorum quō cu-	ut 296. 31	27
nentur ibidem	tecur manu 281. 21	uteri affectus 172. 18	ululux inſarctio non ib. 20
olcera diſtenta 228. 26	unguim uicia 199. 7	uteri abſceſſus figura 177. 10	ululux inſarctiois cura
ulcerū diſruptorū curati-	unguū pterygiū 282. 6	uteri abſceſſus curatio 178.	io ibidem 22
o ib. 28	unguū conuulſorū cura-	uteri cancerorum notæ (1	ululux inſtāmatiō mulieris
ulcera malefica dolofa	rio ibidem 29	uteri caecotyle (179. 21	de cauſa accidit 176. 20
que 285. 1	unguſ contuſorū curati-	nientia ibide 31 (177. 22	ululux inſtāmatiōis o
ulcerum maleficorū cura-	o ib. 200. 6	uteri declinantis curatio	o 122 ibidem 22
tio ibidem 5	ungues cruentos curatio	uteri exulceratio unde ori-	ululux inſtāmatiōis cura-
ulcera putrida quō ſanen-	ungues ſcabros ſepa (ib. 18	atur 178. 17	ratio ibidem 22
tur 212. 19	ſcia medicamēta ib. 18	uteri exulceratio curatio ib.	ululux prociſio ſuſcipi & ſe-
ulcera ſerpentia quomodo	unguēta quæ proprie di-	uteri inſarctio unde fiat (17	cauſis fit 108. 11
curentur ibidem	cantur 404. 28	uteri inſarctiois no (181. 27	ululux prociſiois cura-
ulcera fordida quomodo	unguentorum, alia ſimpli-	ta ibidem 30	io ibidem 22
purgentur 221. 11	cia alia, compoſita ib. 9	uteri inſarctiois cura 10.	ululux rimæ & ſciſſuræ unde
ulcera qua ratione manē-	unguentorum ſimplicium	uteri inſarctiois mul- (13	181. 27
tur 220. 6	maſteria ibidem 11	ta de cauſis accidit 176.	ululux rimæ & ſciſſuræ
ulcera quæ glutinent me-	unguentia compoſita oia,	uteri inſtāmatiōis no (10	116. 1
dicamēta 229. 9	calefactione 495. 4	ta ibidem 22	ululux ſciſſuræ unde 108. 12
ulceribus ſupercreſceſſe ca-	unguentia cōpoſita uarijs	uteri inſtāmatiōis cura	ululux ſciſſuram curati-
ro quō tollatur 221. 22	modis calefactione ib. 9. 11.	tio ibidem 26	o ibidem 22
ulcerū ani remedia 261. 29	unguentū uinde qua (12	uteri prociſio ſuſcipi ex	ululux ſtranguſcus 122. 5
ulcera articuloꝝ qua ratio	ratione fiat 404. 40	cauſa fit 108. 11	gnæ ibidem 9
ne curentur 221. 27	unguentum Zoſim, ad tre	uteri prociſiois curatio	ululux ſtranguſcus quib-
ulcera capitis manāia un-	mulos celebratio 405. 6	uteri ſciſſuræ unde (ib. 22	uſ ſerit accidit, & q. an-
de ſiant, & quomodo cu-	unguentum coctio 402. 15	de 150. 11	ſi tempore ibidem 22
rentur 21. 20	uocis exercitatio 6. 22	uteri ſciſſuræ cura 12. 22	ululux ſtranguſcus cura-
ulculcula capitis denſa tu-	uolæ manus oſſa fracta q	uteri ſtranguſcus 122. 5	tio ibidem 22
bratū quomodo curen-	modo curetur 228. 22	uteri ſtranguſcus ſigna	
tur ibidem 17	uomitus etiam ſanis utilis	uteri ſtranguſcus q. (ib. 8	
ulcera oculorū 210. 18	uomitiſ curatio (eſt 412. 22	uſ ſere accidit, & q. an-	
ulcerū oculi curatio 17. 20	medicamēta gbus pro	ni tempore ibidem 22	
ulcera ora puerorū quō cu-	ſier, gbus non ibidem 20	utulum ac dulcium porio	
renda 4. 1	uomitiſ curatio ibidem 40	num diſſerentia 428. 3	
ulcus circa os ſacrum un-	uomitus cōmoda 14. 4	uux 22. 18 & 22	
de proveniat 74. 21	uomitiſ ſacilem reddētia	uux paſſus ibidem 21	
ulcus circa os ſacri nati	uomitiſ ſacilem reddētia	et 267. 27	
curatio ibidem 22	uomitiſ ſacilem reddētia	uux 267. 26	
ulcera pudendorum curan-	uomitiſ ſacilem reddētia	uux curatio ibidem 22	
tia 212. 18	uomitiſ ſacilem reddētia	uux inſtāmatiōis tol-	
ulcera fordida plantarū q-	uomitiſ ſacilem reddētia	lentia 122. 20	
modo curetur 198. 19	uomitiſ ſacilem reddētia	uulpea 208. 26	
ulcera ſoſilium quomodo	uraniū 404. 21	uulpius adeps 411. 27	
curentur 115. 2	urini ſi præſigia 14. 18	uulneraria emplaftra 407.	
ulceri q. modo cicatrix no-	urinarum mulieris differen-	ulua animalū 24. 15 (19	
duccenda ſit 211. 21	tia ibidem 19	ulua uniuerſim ablata	
ulcerū nemetis q. modo ar-	urina 402. 19	mulieris ſuperuiſe 181.	
ceantur 221. 25	urina humana ibidem	ululux abſceſſus ſigna 40	
ulmus 409. 1	urina humanā In peſte bi-	ululux abſceſſus (177. 21	
olophoni iudicia 207. 24	bere ſalutaris eſt ibide 41	curatio 178. 2	
olophoni remedia ibide 22	urina caprarū 403. 4	ululux abſceſſus curatio	
umbilicus mulieris modis	urina camelorū ibidem	manu adhibita 214. 15	
prominet 229. 28	urina maiſilium 406. 40	ululux cancerorum no-	
umbilici prominentia ſi-	urina maiſilium 405. 4	ta 179. 21	
gna 206. 2	urina pueri impubis ib. 5	ululux condylomata quo	
umbilici prominentia cu-	urini ſanis mouētia 14. 22	modo curentur 176. 7	
ratio ibidem 12	uring difficiliter curantia	ululux declinantis cura-	
umbilici prociſiois cura	uring ſtillicidiū cu- (122. 25	tio 177. 22	
212 204. 14	ratio 115. 18	ululux hæmorrhoides q.	
uncia 206. 22	urinum non reddentiū, ga		

# ANNOTATIONES IN PRIMUM LIBRUM.

## IN PRÆFATIONE.



**Agisio Orisibisium.** Hanc sententiam ex qua paulo ante capitem enumerationem habetur, ita reddidi. Ad urbem autem fuisse. Quam plures egregios auctores perlegisse magis Orisibisium, qui et ipse universum librum in quo totam sanitatis turba de rationem comprehendimus, ex aliis scriptis excerpti quoniam compertendimus male congruat, quilibet potest ostendere: resti in hunc modum omnia habent exemplaria. Quare si hoc placet sententia, adhibetur in Aethi, hoc est comprehendimus tandem est. atque sic reliqua concordant.

**Pagina 1. linea 3**

**Nausea.** Græci est *νέμεσις*, quod significat aversio, et repulso, hoc est commotio, et turbatio.

**Linea 11**

**Præcordia.** Græci *πνεύματι* proprie appellant præcordia, teste Celsus. Plinius tamen plerumque quæque Græce vocari scribit. Barbari utuntur *interdumque*, hanc et *interdum* et *interdum* dicunt. Paulus hic pericardium superius præcordium portum, quod o ventriculi est, (nam uterque hoc etiam cordium, hoc est, cor vocabatur) intelligit. Læta enim decimeque et hypochondria habet la na contrahi. Galenus certe pericardium, cordis involucrum, fiat membranam qua cor involuitur, appellat.

**Linea 12.**

**Per se.** Græci *κατὰ φύσιν*, hoc est communiter. Solent huiusmodi ser fieri applicari quæque, communi ut dicitur, ariis cum pal malis et uno uteri.

**Pagina 2. linea 18**

**Cibus solidior.** Græci solum *συν* est, quod significat cibum. Verum relatum lectis et melius, qui et ipse cibi sunt, alij nempe caro, panis, similiaque, solidiores recte dicuntur.

**Pagina 3. linea 23**

**Oleo discorsio.** Græci est *διασπορά*, quod posset exponi, crudo, non cotto, quemadmodum et *διασπορά* cruditas, quo modo in tertio li bro fuit interpretatus sum. Verum primitus rem considerans, in aeni *διασπορά* idem esse quod *πυλαιο* *πυλαιο*, *πυλαιο*, ut Latini discorsio, proinde cotto. Sedita eodem modo exponit. Præterea non video, quo pacto cru in oleo nō cotto possit liquefieri, quod Paulus præcipit.

**Pagina 5. linea 29**

**Robescat.** Græci est *κατὰ φύσιν*, quod notat, si co lor fluridus appareat. Fluridus autem hoc loco nihil aliud sibi vult, quam uniuersus, id est, ruber. Non ut pallor mortis, ita rubor viæ in dex est.

**Pagina 6. linea 3**

**Apothetrapia uti.** Excitatio omnis peracta per s ulina est apothetrapia, seu dicas reactiva. Nam corpus expurgat, et lassitudinem arce.

**Pagina 9. linea 40**

**Corpus decoloratum.** Recte Paulus *κατὰ φύσιν*, quod est co lor perarum, pro pallore. Sic etiam Latine dicunt, coloris uni for, pro eo quod est *κατὰ φύσιν*. Celsus libro secundo, capite secundo. Vbi colore decore, existit, pro pallidior existit. Quemadmodum contrarius coloratus dicitur pro eo quod bono colore præditus est, eiusdem auctoris testimonio.

**Pagina 10. linea 3**

**Smegmatis.** In pressis code x habet *σμεγμα*, mens scriptus *σμεγμα*, utrumque abster foria medicamenta significat, eog malis

fumigatus vocabulo uti, quod esset cōmuniis et expurgande cu ti accommodatum.

**Pagina 10. linea 24**

**Vincit.** Locutio hæc Celsi familiaris est, pro conducit, expedit, bonum est, ut libro quarto, ubi de tussi agit. Post eam vincit tam ambulare,

**Pagina 12. linea 31**

**Aut viticis.** Omnia exemplaria habent *αυτ* viticem utrius Ori bati codex Ligobardici *αυτ* viticem scriptum, quæ quæque habet. Quam liquidum confit id medicamentum contra V trerem uidere. Copus legi auli, quæ ratione non videtur.

**Pagina 15. linea 37**

**Melanchio quod facile paratur.** Sic quidem ad urbem tradari, Orisibisium autem habet. Idem etiam erribus est, et facile inueniri v. Melanthio extrin sepe nō sumus, ut facile paratur, ad succum bete refertur.

**Pagina 17. linea 23**

**Prinato.** Videtur hic aliquid desiderari. Nam quoniam superius, nominū relatione usui esset, prinato nihil retulit. Adde igitur et magistratus, si videtur.

**Pagina 18. linea 13**

**Fugaces fructus.** Græci est *φευγόντες*, quod significat omnia po ma per æstatem et autumnum promittentia. Vocantur autē fru ctus fugaces quod citò marcescant, nec dum possint offerri, co gunt se vendideri. Hæc etiam ratione Galenus *επιπλο* videtur vocari recte scribit. Plinius libro decimoquinto, capite duodecimo id vocabuli usurpat, sic scribens: Pomum immecum expiratur æ gris, prænamque singulis tam triciis nō mi fuisse, nullius maiore quod meretur, quia non aliud fugacius longissima namq decer po bidui mora est, cogit se vendideri. Verum opora paulo lati us patet quā huius fructus hoc est, ut Plinius exponit, streps tui aut fugaces fructus. Quæ igitur si manu: Poma affatim assilumere noxiū est.

**Linea 14**

**Facilitate præditus mentum.** *αὐτὸς* utriusque dicitur, cū latentes meatus non oculo sunt, sed recurrentia corporis per eos repurgantur, qui maxime propter aliam firmitatem, ut fiam, At si meatus eiusmodi committant, cor statim incutitur, saluti nohi recurrentia intas remanentibus, unde febri origo est. Hæc sententia epistularum Orisibis: Nam, inquiris, qui ex laboribus non ægruat frequenter, is latentes parus habet apertos, per quas humana natura coarpet.

**Linea 41.**

**Paululum dimoueri prius debent.** Omnia exemplaria Græca habent *αὐτὸς* *αὐτὸς* *αὐτὸς*. Forte legendū *αὐτὸς*, ut sit: Paululum auerere prius debent, non dimoueri, ut habetur. Orisibis enim ex quo Paulus ad urbem hæc transscriptus, de ea dem re præcipitur, ita scribit: Quæ igitur plenioris sunt, habet in gredi fricariq: debent, ut quæque et auerere eos medicum san guinis prius oportet de motu nullum interim mentione faciet.

**Pag. 19. li. 10**

**Simundus sit.** Græca dictio est *σινυδ*, hoc est pinguis, d alia de deesse, quæ olei, adipem, augument. omne Græci signant, Inde etiam *σινυδ* *σινυδ* Celsi lenia dicuntur, libro quinto capite decimoquinto, quibus crura, aut refina, aut oleum, aut adipe, aut plura ex his, aut omnia miscentur.

**Pagina 19. linea 10**

**Et fortiter incedat.** Hoc est cum impetu et ardentia, quæ corpus valide cauetur. Hoc Græci est *πρὸς* *πρὸς*.

**Pagina 20. linea 11**

**Medicamenta vero acriora hæc sunt.** Hoc est utrem tiora et efficaciora, quæ locuto Celsi non infrequens est.

**Pagina 22. linea 21**

**Bene habita, valens.** Ex Tritio sumptum est in Enache. Nam si quæ paulo habitio est, Græci dicunt *κατὰ φύσιν* bene nutri

De his,





# ANNOTATIONES,

Pagina 61. linea 10.  
 Sustinere eos qui. ) Hoc est, nutrire. Græcum est *ἀνατρέφειν*.  
 ita Celsus loquitur.

Linea 19.  
 Humorem refrigeramus. ) Hanc sententiam ita potius legi.  
 Refrigerat aliquod, humorem eius expresso, pilæ cum  
 portula: a infundimus, deinde consensum experimus,  
 cum usus exigui, modico potentæ mixto, totum in a-  
 quam frigidam mersum refrigeramus.

Pagina 62. linea 7.  
 Letæ ipsi inhærentes. ) Plinius usque pat hoc vocabulū  
 pro Latine, ut superius dictum est. Celsus crassorem pituitā in-  
 terpretatur.

Linea 16.  
 Quū uero periclitatur. ) Græci, *ἐν ἀποκρίσει*, ad periculū  
 uenit, pro eo quod Latini dicunt, Metu est, periculum est. Celsus  
 uerbo nititur, libro primo capite tertio sic scribens: Nam siue plus  
 est quā quod concipi possit, periculū in corruptione, non  
 oportet.

Pagina 63. linea 12.  
 Nimis laboriosa uix ratio. ) Græci est *πολύσπορος*, quæ  
 dicitur serena. Idem ualeat ætatem uix uita, quæ plena & la-  
 boriosa & serena existat.

Linea 23.  
 Pyre incendio. ) Græca dictio est *πύρ*, Latini tamen a surpa-  
 ta. Proprie est lignorum fides.

Pagina 64. linea 16.  
 Venter symex in patitur. ) Quid sit symex in superius expli-  
 catum est. Sententia est: Venter laeda, & quæ ex ipsius corpo-  
 ris substantia decesserunt humore undique, in ipsum consue-  
 runt, partem uentris, partem inferius. Ad uentrem Græci est  
 Venter symex: emittit, alius sursum, alius infra. Cui autem sic  
 reddiderit, Orisbus fuit in casu, qui apertus & fatus eadem  
 trahat sententiam.

Pagina 69. linea 23.  
 Fenestris patentibus. ) Hoc quidem in Græco nō est, sed ex  
 Celsi idem ferè scribens hoc trāstū, quod aer frigidior hinc pe-  
 ti solet. Verba Celsi sunt libro tertio capite de consensu, quo mi-  
 nus corpus in sudet, uti uisus de hoc esse contrā, loco nō calido,  
 semestri patentibus, sic, ut perflat quousque aliquis accedat.

Pagina 70. linea 21.  
 Hypoglossia uocant. ) Scribonius Largus glabellam uocat,  
 quæ sub lingua tenetur.

Linea 31.  
 Herbae pituitariæ. ) Pituitaria herba est quæ dicitur etiam pe-  
 dicularis, Græci *σπέρμα αγρία*.

Pagina 72. linea 3.  
 In id uehementer efficax est. ) Celsus peculiaris est hic ser-  
 monus, ut libro tertio capite de morbo: Mente steratam ita in

id efficacius. Eodem sensu usque pat, ad id efficax, ut libro quarto  
 capite de cianis: potius itaque ad id efficax.

Linea 7.  
 Quum minus quā pae est. ) Tabi genus est, quæ a pae  
 Græci dicitur. Plinius exponit, quā cibum corpus non ferat.  
 Celsus eodem ferè modo interpretatur, libro tertio capite de inges-  
 tione sic scribens: Tabi pueri speciei sunt: Una est, quæ cor-  
 pus non alitur, & naturā alter semper aliquando decedit, uel  
 in uero in eorum locum subuenit, summa macies erit, & si  
 occurrerit, tollit: a pae in hanc Græci uocat. Ex de alim ferè de  
 casu incidere conuenit: Aut tunc nimio timore aliquis nimis  
 aut auidius est nimis plus quā debet, assumit: ita uel quod dicit,  
 infirmat: uel quod sapienter, corrumpitur. Hæc tamen Celsus.

Linea 10.  
 Acrimonia sane febrilem. ) Græci est *ὀξύθυμος*, quod signifi-  
 cat acutus. Latini possunt dicere, sanis se habentibus, aut acrimo-  
 nia, aut uerberum transmissa sunt per atriā, ut ad uerbū inter pre-  
 ter.

Linea 21.  
 Vniuersum superaccommodat. ) Senat Græci *πᾶσι*, uer-  
 bum, hoc est, cum sit puer, iure in tam, amplius in casu de  
 turbat ex alia salute.

Pagina 73. linea 1.  
 Pollen potentæ. ) Apud Græcos est *πύρ*, dicitur a pueri  
 tamen alij, antiquior scriptores, pae uocet ex Græco uerba-  
 ter, nihil aliud quā potentiam dixerunt, quā tamen uocabulo pro-  
 prium habet significationē, quæ indicat, quod in farina trans-  
 missum est.

Linea 8.  
 Ex calidis spissamentis. ) Aromata tafa, oleū, admissa ut te-  
 rub acrimonia spissent, consuevit: consusa ipsorum farina in cras-  
 sent spissamenta Latini dicuntur, Græci *σπυγμάτα*. Plinius li-  
 bro de ciuitate capite primo. Ratio facienda de pueris, succis &  
 corpus illi grauius ferè consuevit, hoc idem in hoc spyma-  
 ta uocat, illa debyta.

Pagina 76. linea 17.  
 Atriā perspirat. ) Græci est, *ἀτρί*, dicitur a triu, quod est, ad  
 uentum conueniens. Celsus autem in superiore locutione ait uer-  
 re simili. Qui enim uento exponitur, atriā perspiratum sentit.

Linea 25.  
 Qui subit o animam perdunt. ) Idem est quod animo defici-  
 unt. Cetera in Celsi animæ frequentius usque pat, quoniam animos  
 alij uero indifferenter.

Linea 26.  
 Contra hanc pugnandum est. ) Celsus hanc modum lo-  
 quitur.

Linea 27.  
 Symptomatis. ) Hoc Celsus alij, cū dicit Latine *εἶδος* scri-  
 ptoris exponant, per te quæ perueniant.

# ARGVMENTVM LIBRI SECVNDI.

Hoc secundo totius operis libro, de febribus tractatur. Primum de iis quæ ad no-  
tas rotamq; earum curationem conducunt, sermo habetur: deinde de singula-  
rum febriſpecierum generatione & curatione. poſtremo de iis quæ febribus ſu-  
perueniunt.

## CAPITA SECVNDI LIBRI.

I	De febribus ex Galeni aliorumque pluriū commentarijs	Pag. 41	XXXX	ſerente origo eſt, curatio & agnitio ib.	
II	Quot & quæ principalia in morbis potiſ- ſimum febribus perquirenda ſibi.	ibid.	XXXXI	Hæcticarum febrium agnitio	ibidem
III	Vnde cognoscendū, morbus ne ſit ſanabi- lis an pernicioſus	ibidem	XXXXII	De hæcticarum febrium curatio	68
III	De ſignis longæ ualecudinia	43	XXXXIII	De ſemiterianis	ibidem
V	Quomodo præſciamus an morbus iudici- um ſubiectus, ſolvendus ue ſit	ibid.	XXXXV	De morbus publice graſſantibus	68
VI	De diebus decretorijs	ibidem	XXXXVI	De præſilencijs, ex commentarijs Ruſi	ib.
VII	Decretoria indicia in morborum princi- pio eſſe praua	44	XXXXVII	De ſijs qui ex redundantia crudorum hu- morum ſyncope periclitantur	64
VIII	Quemadmodum futurum iudicium præ- noſcendum ſit	ibidem	XXXXVIII	De ſijs qui ob præterueniens humores ſynco- pe opprimuntur	65
IX	Quomodo inſtans morborum iudicium agnoscatur	ibidem	XXXXIX	De reliquis occaſionibus, quibus ſynco- pe ſuccedunt	66
X	Quemadmodum optimum iudicium per actum agnoſcamus	45	XL	De dolore	ibidem
XI	De pulſibus ex Galeni commentarijs	ib.	XLI	ſi corpus tæbe conſumatur	67
XII	De dieſtioniſibus	51	XLII	De uigilijs in febribus	ibidem
XIII	De urinarum notia	54	XLIII	Curatio ſoporis noxi, qui cataphora Gre- cia dicitur	ibidem
XIII	De ſpitiſ notis	55	XLIV	Curatio doloris capicis in febribus	68
XV	De febribus diarijs dignoſcendis, curan- diſque	ibidem	XLV	Quomodo ſtomachi curam habere con- ueniat	ibidem
XVI	De putridarum febrium agnitione	56	XLVI	De immodico frigore in febribus, & rigo- re.	69
XVII	Curatio febrium putridarum	ibid.	XLVII	De ſudoribus	ibidem
XVIII	De tertianarum agnitione	57	XLVIII	De tuſſi in febribus	70
XIX	Curatio tertianæ	ibidem	XLIX	De ſtremamento	ibidem
XX	Curatio tertianæ nothæ	58	L	De cibi ſaſtidio	71
XXI	Quartanarum cognitio	ibid.	LI	De grandiſſime, quæ Græcia bullimor nū- cupatur	72
XXII	Curatio quartanarum	ibidem	LII	De canino appetitu	ibidem
XXIII	Quotidianæ agnicio	59	LIII	De ſiti	ibidem
XXIII	Curatio quotidianæ	ibidem	LIII	De lingua ſcabrie	73
XXV	De hepato febri & rigore, quæ nullo calo- re poſſunt euſci	ibidem	LIV	De nauſea	ibidem
XXVI	De febribus continetibus	60	LVI	De bilis uomitione	ibidem
XXVII	Agnicio febriſ continetis, & curatio ib.	61	LVI	De ſingulis	74
XXVIII	Ardenſium agnicio	61	LVI	De aluo in febribus aſtricta, & cica	ibid.
XXIX	Ardenſium curatio	ibidem	LVI	De ſanguinis diſtillatione & euſdem ex paribus profluſio	75
XXX	Febrium quibus ex affectu eryſipelatis re-		LIX	ſi anima deficiat	ibidem
			LX	Quomodo ulcus circa os ſacrum proueni- ens curetur	76



# ANNOTATIONES IN LIB. III.



**Pagina 77. linea 14**  
 Ut calami ea dix. Aliquoties dictum calami usum pro arandine, id est circa adiectum aromatici, qui ab illo dursus est.

**Pag. 79. li. 27**  
 Lunci florib. Hoc est lunci rotundi florib. ut apud Celsum nonnulli in legum. nisi arandine fit.

**Pagina 86. linea 14**  
 Scordij drachma quatuor. Impressum ex lapide habet calup. Lunci rotundi. Hoc est lunci rotundi, sed depravati. pro xiv. quod est lenci.

**Pagina 87. linea 20**  
 Venarū puluini rursus eunt. Hoc est ipse urne. Nam puluini nihil aliud sunt quam urinarum exuberantia, quomodo Celsum aliquando urinarum toras dixit.

**Linea 21**  
 Medicamentum ex papavera. Simpliciter hoc diximus, pro ex papavera in capitulo. Latini scriptores sepe faciunt scire: Graeci dicuntur de codicum.

**Linea 41.**  
 Vel rhodomelire vel dulito hydromelite. Affinitas dictum male scriptura occasione probat. Hanc igitur in modum vivatam lecturam refertur, vel rhodomelire vel dulci hydromelire, dulcium possumus erat pro asperso, propter id quod sequitur. Nam uniusmodi hydromeli. Simile est in scriptura libro capite decimo quatuor depravata est lectio, ut pro hydromel et rhodomel, legendum est hydromel et rhodomelium.

**Pagina 90. linea 6**  
 Bombyti orti loricillantes. Bombyti nite Galen & Suidas est poculum angustis oris, cuiusmodi fistula multa fieri solent.

**Linea 12**  
 Formosa & crura exulcerata. Vrentibus scilicet qualis est artica & fenepe. Celsum exasperare pro exacerbare ponit libro tertio capite vigesimo secundo. Prodest iniquis etiam ter penia morbi formam calem exasperasse, vel artica casam, ut in ipso si nati.

**Pagina 91 li. 9**  
 Ac ore ventriculi submisso. Graeci illi oreuū quodvis, loricillantes rui exasperat, hoc est, in systole conservare & aliam exasperare. pato autem aliquid desiderari, atque in hunc modum legendum est: Quibus vomere ex usu est, et flammam ardoris in quibus in quibus feruendi: qui difficulter vomunt, et aliam duci debet.

**Pagina 92. linea 4**  
 Buncus aliaque similia. Quotiescumque simpliciter incertum posuit, putandum intelligi.

**Pag. 92. li. 4**  
 Eorumque iuxta sunt obliuio. Diffusio Graeca est apponit quae etiam familiari significat, atque sic dubium modum posuit intelligi, sed prior sententia omnia complectitur.

**Pagina 96. linea 1**  
 Quando valentiora magis varia. Ita intelligi, quando continuus est humor, tunc valentiora tractare oportet remedia.

**Linea 12**  
 Ex cucumere. Graeci est diafocynia, quod est ex cucurbita sine steri, dicitur alia die collocat.

**Pagina 99. linea 2**  
 Latini incubo est. Nonnulli incuborem Latini dici arguit, scribimus Largum dictione utitur consuevit centesima.

**Pagina 99. linea 20**  
 Attonitum ipsi crura euaserat. Attonitum hoc est apoplexia occupatum.

**Linea 25**  
 Omnes faciei subiectae partes. Hoc est, partes omnes quae a facie usque ad ora habentur.

**Pagina 99. linea 15**  
 Valetudini faciunt. Hoc est presunt. Celsum sepius valetudinem pro sanitate ponit, nullo etiam adueniente.

**Pagina 101. linea 17**  
 Commendatur autem lac. Alterum exemplum scriptum est, utrum, quod est commendatur, utrum dam sententiam penitus inexpressio, utrum habet impressum dicitur, ut sit, Ceterum utrum debet lac, casum, etc.

**Linea 21**  
 Luncinubi. Graeci quidem est xivm quod est lunci rotundi, sed depravati, pro xivm, quod est lenci.

**Pagina 102. linea 20**  
 Sorbitionibus ex chondro & alica. Hoc ex loco manifestissimum est, Paulo dicitur esse chondrum & alicam, quod alibi monemus.

**Pagina 103. linea 29**  
 Vbi refrigerant in memoria habeatur. Peruersa est sententia, sic legi: nec ubi refrigerant, sensus est, si dures lenis oculo madentibus aspergatur, ne nobis imprudentibus refrigerant, in memoria habeatur.

**Linea 25**  
 Instar erui. Soli istantur hic instar ponitur pro magnitudine in quatuor Latinis medicis frequenter.

**Pagina 105. linea 15**  
 Causa carca. Hoc est latente, incognita.

**Pagina 112. linea 19**  
 Pollinem eius accommodare. Pollinem accipimus in hoc opere, pro quocumque tenui pulvere.

**Pagina 117. linea 9**  
 Amygdalarum quibus cortice detraheria. Graeci est amygdalarum, quod est amygdalarum cortex atari: mot, quia cortex detrahitur abesse amygdala, quibus corticem detraheria, pro dicitur.

**Linea 16**  
 Vel marrubi. Impressum exemplum habet opusculum hoc est porri, atque ea lectio magis probatur, quod superius in eadem capitulo posuit ad aurium dolores: Paulus commendauerit.

**Pagina 121. linea 2**  
 Aselli domestici combusti. Corrupta est lectio dictum Graecorum consuetudine, Graeci est isidus quam dicitur nasus reperi, cuius putant legendum in idus pro multipedis. lege igitur in isidus, ut sit, Vel omnibus combusti cinere infundatur vel omni dicitur expressis succum infusato.

**Linea 25**  
 Fuci dra chemetres. Fucum uocant Graeci phycus dicitur, Pliniam hoc in re sequitur.

**Linea 35**  
 Thuris, illyrica. Hoc est isidus illyrica: distinguenda a thure est.

**LI. 40**  
 Erti siliquae. Graeci est isidus quod per se hunc nam significat & siliquae cuiusque, frangit hic autem erui farinam legere malum.

**Pagina 112. linea 19**  
 Quanto calidius. Graeci est quanti arsius, sed quia alii aculeare reddunt calidius, pro modo transiit.

**Pag. 123. li. 17**  
 Ficus pinguis nirdia. Hoc est in impresso exemplum male scriptum aduanda erat, pro et manifestum in suum locum restituitur. Ceterum pro ficus pinguis legendum est, nocia.

**Linea 26**  
 Pondo triena. Pondo hic uocabulum significat, quam ponderis, quomodo modum asperat Largum, quam autem solum ponitur, the libram signat. Porro triens de antiquo tantum dicitur apud medicos, hic autem male positum est in fine, lege igitur hic in modum





# ARGVMENTVM LIBRI TERTII.

In hoc tertio totius operis libro de singularum corporis partium affectibus disputatio est: quæ à summo capite incipiens, in imos pedes definit.

## CAPITA TERTII LIBRI.

I	Depilorum affectibus, de aris, & caluitio	Pag 77	XL	De leuitate intestinorum quæ lenteria dicitur, & coxlico affectu	142
II	Quomodo pilis crispant, & tincturis inciantur, ex Cleopatra libris quos de capillis crispis faciendis prodidit	79	XLII.	De teneimo	144
III	De capitis affectibus cutem infestantibus, furfibus seu porriginem, quæ pityriasis dicitur	80	XLIII.	De torminibus, quæ dicitur dysenteria	145
IIII	De capitis dolore quem Græci <i>cephalalgia</i> vocant	81	XLIV.	De morbo inextinguibiliore quem Græci colicon appellant	147
V	De cephalgia & hemicrania	84	XLV.	De tenuiori intestini morbo, qui ileus dicitur	150
VI	De phlegmide	85	XLVI	De renum & vesicæ affectibus, & primū de calculo	ibidem
VII	De inflammatione cerebri	88	XLVII	De iocimoria affectibus	156
V II	De erysipelate cerebri	ibidem	XLVIII.	De malo corporis habitu qui cachexia dicitur	159
IX	De lethargo	89	XLIX	De aqua inter cutem	ibidem
X	De catoccho aut uigiliis comate	90	L	De lienosis	162
XI	De memoria inactura & rancinationis, item de sopore & fatuitate	91	LI	De morbo regio quæ icteros græce dicitur	165
XII	De striginibus	92	LII	De umbilico procedente	165
XIII	De morbo comicali	ibidem	LIII	Quo impuberes imberbesq; diu maneat, & particula naturales testis ita conseruentur, pilis aboleantur	ibidem
XIIII.	De melancholia	95	LIII	De rancum gnatibus	166
XV	De incubone quæ phialas græce dicitur	97	LIII	De inflammatione criticulæ scrotiq; & alia ipsorum affectibus	167
XVI	De lycæone uel lycanthropia, id est, hominum in lupos conuersione	ibidem	LV	De seminis profusio & ueneris infomnis	168
XVII	De amanibus	ibidem	LVI	De laryngis	ibidem
XVIII	De apoplexia & hemiplexia, uel paralyti	98	LVII	De priapismo	169
XIX	De conuulsionibus	102	LVIII	De pariculis inefficacibus	ibidem
XX	De cetuis morbis nepe tetano eiusq; differentijs	ibidem	LIX	Pudendorum & aut remedia	ibidem
XXI	De tremoribus	104	LX	De uteri affectibus, & primū de mensis purgatione	172
XXII	Ocularia & primū de dolore ex Galeni commentarijs	105	LXI	De mensium suppressione	173
XXIII	Auricularia, & primū de auris dolore	115	LXII	De immoderata purgatione uteri, & sanguinis profusio	174
XXIIII	De narium prolapsu uisij	119	LXIII	De fluore muliebri	175
XXV	Ad faciei uicia, Quomodo facies a rugis afferatur	121	LXIV.	De inflammatione uteri & declinatione	176
XXVI	De oris affectibus, & primū de dentiū dolore	122	LXV	De uuluis abscissu	177
XXVII	De angina, eiusq; speciebus, ubi etiam de stragulatione, uel alio mō suffocatione agitur	126	LXVI	De uteri exulceratione	178
XXVIII	De grauedine, destillatione, tauritate & tussis	127	LXVII	De cancro	179
XXIX	De orthopnoea, suspirio, & spirandi difficultate	130	LXVIII	De scirrho & duritie	180
XXX	De peripneumonia	131	LXIX	De mola	181
XXXI	De cruentis spuris	ibidem	LXX	De inflammatione uulug	ibidem
XXXII	De purulētis, & ta be quæ phthisis dicitur	134	LXXI	De uuluis strangulatu	182
XXXIII	De laterali dolore, qui pleuritis dicitur	135	LXXII.	De uuluis procidentia	183
XXXIIII	De cordis affectibus	137	LXXIII	De emuliebri m locorum clausura, quam phimon appellant	184
XXXV	De mammillarum affectibus	138	LXXIII	Ut stentis mulier concipiat	ibidem
XXXVI	Ad foetū axillaru odore sudationes	139	LXXV	De uuluis scissuris, condylomatia, & hæmorrhoidibus	185
XXXVII	De stomachi, præcordiorum, & uentriculi affectibus	ibidem	LXXVI	De partu difficili	186
XXXVIII	De flatu uentriculi	142	LXXVII	De coarum morbis	187
XXXIX	De cholera	ibidem	LXXVIII	De podagra, & articularia morbis	189
			LXXIX	Ad permones, qui tum pedum plures, cū calceæ infestant	190
			LXXX	Ad clauos callosq;	192
			LXXXI	Ad unguiū uicia, & primū de redouijs	193



# ANNOTATIONES,

trile, in amirgeti id quod e urina reliquū male adherescit.

Linea 27

Græci exanthemata vocant.) Exanthemata pustule sunt exigue, quales ex artice vel sudore fiūt, eodem p̄r ang. quā & ita colore. Et quoniam turgēt in ad florem et numerum in plū modo numeri, quos exanthemata à Græcis dicta fuerunt, quos tūc cum illis figat fuisse. Plinius hoc genus aliquando papulas, aliquando pituita eruptiones, sepe etiam papulā eruptiones & exanthemata vocat.

Pag. 110. li. 10

Splenio illitas impositio.) Hoc est oblongo implastrā, linis modo factū. Plinius. Superiori parti operis spiritui e melle de coctis.

Linea 28

Glisceribus capitis ulceribus.) Hoc est mentibus Græci aecant dīcunt.

Linea 32

Ambusta igne medicamētū.) Plinius sic vocat, quæ nup̄ nauis Græci dicuntur.

Pag. 111. li. 28

Fici pinguis.) Græci est xypin, quāq̄ Latine fici dicitur quā Græci vocant xypin sicut ficatō, nisi quid aliud in uicē huius sit legendum. Porro ficca sicut pinguis putat fuit quātrecentis. Celsus libro quinto ponit fici ficas pinguis simas.

Linea 33

Abrasa & superficiem infestata ulcera.) Revertens in terpretis & nup̄ p̄m̄ veritū de quā data Scribonius Largus ab eā, ut in compositione eī sic scribit. Faci ad tenera, medocriter lasa, & abrasa, quæ a nup̄ p̄m̄ Græci dicunt.

Page 111. line 6

Olei sciquihemina.) Impositum habet sciquihemina, tu autē libet accipe.

Li. 19

Helioetopi magni fructus.) Hoc fructus p̄ semine positus est, Græci sepe confendant xypin & nup̄ p̄m̄.

Page 111. li. 4

Nostri inflammationes, Græci phlegmonas vocant.) Vix hic inflammationem interpretatur, Græcorum quāq̄ p̄m̄, quam hodie phlegmonem Latine effertur: phlegmonem, feruidam inflammationem. atq̄ hoc in uniuersum dictum actum.

Page 114. line 27

Lomentidrachmæ sex.) Fabrum farina est lomentū. Pomar etiam dicitur, fabrum lomentum.

Linea 32

Aqua multa, posca, uino & mulso utendum est.) Mulse Græci dicunt meliorati: Mulsū est aromati.

Page 111. line 1

Tenera calami radix.) Hoc est arundinis.

Linea 29

Ex humorū decubitu proveniunt.) Græci est xypin p̄m̄, dicitur & una dictione circūvenit. Nomen sic dispositionem, quam qui prius unum membrum infestabant humores, eo relicto ad alterum transiunt.

Page 114. line 8

Emmoto medicamine.) Hoc est, limentis carpit excipit. Nū p̄m̄ significat. Scribonius Largus circūlocutiōe nūq̄ ita fieri eo ponit, cipo. dicitur etia trigesima septima. Cū opus est iniqua, cochlearia tria rōja cyathis permiscetur inde lintula carpit contingitur, atq̄ in ulcero superponitur.

Page 117. line 11

Stercoria plumbi trena.) Celsus recte vocatā plumbi vocat, quāq̄ p̄m̄ dicit, Largus. Stercoria plumbi, ut compositione ostēda & quædragima. Ad ulcera in naribus plumbi sterrea, quod scribam dicent.

Linea 36

Seui capilli corati.) Græci est xypin p̄m̄. Hoc Celsus sim pliciter exponit, curatūa scribitur libro quātuor caput 19. nup̄ p̄m̄ Græci appellat, quæ curat & uicē, quā eī suo puta, omnes membra diligenter excipit fuit. Largus similiter ad p̄m̄ curatūa dicit, compositione dicitur etia & nigrescēta fōrūda. Qui precedentes compositiones significantiū & manifesti

in purgatione ad p̄m̄ sūm posuit. Hoc eadem ratione, & eadem curatūa mōtus dicit Celsus, ut libro sexto, caput sexto, in Calyris Clima.

Page 111. line 4

Erysielaag facer ignis Larnadice.) Plinius dicit, nup̄ p̄m̄, erysielaag vocant, facer ignis, Celsus tamen ut dicitur nup̄ p̄m̄ de scribit.

Page 119. line 8

Myrti pondo, unguentū quincuncē.) Hic locū dē uideat intelligendum, Olei myrti pondo, unguentū myrti quincuncē.

Li. 13

Ex cruda polenta.) Græci est xypin p̄m̄, hoc est farina ordi sicut coctione salata.

Ibidem linea 10.

Phyma.) Latini scriptoris, ut Plinius, & Celsus eadem Græci dictione utuntur, quæ madidum & phlegma.

Linea 27

subones qui prolapsi.) Græci est xypin p̄m̄, magis placet, calusa, quāq̄ & sapienter modo nūq̄ modis exponunt.

Linea 35

Viceria io quo id provenit.) Hoc est ulcera in quacūq̄ corporis parte proacnerit, habenda est ratio.

Page 120. lin. 21

Furunculus.) Est ulcus nup̄ p̄m̄ in quacūq̄ parte corporis. Græci dicitur vocatur. Nam dicitur tamen qui phlegmā furunculum exponant.

Li. 25

Triticum commansum & impositum.) Sic lege. Hic enim peculiaris in furunculo tritici usus est. Sic autem utriusq̄ legendum. Prīm dicitur crustas, unde sciatum uicē indicat.

Page 121. line 14

Confectum circuncrībū.) Græci est xypin p̄m̄, Est autem circūscribere scalpelli, idem quod circūscire.

Li. 27

Ad sordium spissitudinem.) Manuscriptū exemplar habet xypin p̄m̄, idem quod est ad mellis crassitudinem.

Linea 33

Animene.) Græci dicitur, quæmadmodum & emmo, sicut fici medicamentum solum. Paterius etiam latini sicut manu lege, ut sit, Cerata cephalica soluta, & in lintulū ista.

Page 122. line 10

Ad carcinode.) Celsus eadem dictione utitur in q̄ ulceribus q̄ cancerum respiciunt, libro quinto capite decimo octavo, Carcinode uerō phymata commodi hū dicitur.

Linea 38

Atq̄ indolens tumor.) Indolens hoc est in quacūq̄ dolens, sic enī intelligi capite trigesimo, magna ex parte indolens.

Page 124. lin. 4

Mollissimum ellychnion.) Ellychnion est quod ex p̄m̄ p̄m̄, sarta, cannula, seti p̄m̄, uertum, ut lucerna uertur.

Linea 38

Visceribus okum tenuius.) Sic uero aliam quod Græci ad nup̄ p̄m̄ dicunt, alij reddunt tritium partium.

Page 125. line 4

Indidem diuortium expetis.) Hoc est segregatū solutū.

Page 126. line 29

Ex petasione colicetum.) Hoc est ex p̄m̄ quod Græci dicit p̄m̄ infestant.

Page 127. li. 21

Olei uetria pondo dua.) Vix p̄m̄ morte dicitur dua pro dua, quomada Scribonius Largus sepe loquitur, ut in compositione quæ dragmaginta s p̄m̄ argenti pondo dua.

Page 130. line 15

Mastiche Atypiaica & hyssopon.) Omnia exempla habent hyssopon deprauatū nimium, pro hyssopū, qui tūc in Græcia etiam plerumq̄ frequens est.

# IN LIBRVM III.

Linea 10

Dictum a cecron. ) In septimo hoc medicamentum aceras à Paulo dicitur , magis autem propriè aceros dicitur , quasi cete experti.

Pagina 131. linea 11

Viridia diluta. ) hoc est, si alio soluta. Forsan remittentia, hoc est, lenia reddita.

Linea 12.

Pastillus nigrouridus. ) Is est, qui Melancholicus Graeci dicitur.

Pagina 132. linea 19.

Hæc & meliorum nominis proficiunt. ) Est autem meliorum diminutivum Meliter e dicti medicamenti, cuius Paulus ca pite quadragesimo meminit.

Pagina 134. linea 33.

Resinæ pityinæ. ) hoc est, resinæ piceæ, teste Scribonio in cõ positione ducentisima prima.

Pagina 135. linea 14.

Nisi emillarium quoddam. ) Graeci sonat ἐμπίλινον. Largus vocat ἐμπίλινον, compositione ducentisima sexta.

Linea 31.

Rubra appellata. ) Graeci dicuntur ῥύβινος.

Pagina 137. linea 33.

Radix seruefacta. ) Magis placet correpta, ut habet exim-

plet manuscriptum.

Pagina 138. linea 4.

Finguntur collyria. ) Non solum medicamenta oculorum, sed aliarum quoque corporis partium collyria dicuntur. Celsus de oculi fistula libro septimo, capite quarto, sic scribit. Si intus aliqua pro cedit, quæ ferrem tantò peruenire non poterit, collyrium demittendum erit.

Pagina 141. linea 28.

Ceræ unguentaria. ) hoc est odorata, quæ unguentarij utuntur, Linea 34.

Ancyba & ancylofa. ) Celsus ita interpretatur, libro quinto capite decimo octavo: Recenti cicatrice contrahit articulos, quas ἀγκυβας Graeci nominant. Largus autem sic: Ογκυβας τριφυλον & contrahitorem nervorum & ligamentorum, ἀγκυβας Graeci vocant.

Pagina 144. linea 16.

Ex alto in partem deturbatus. ) Sic expulsi artrum aggraviant, quod est, solum superne adhibere.

Pagina 145. linea 9.

Tum præcipue quom inanihi fuerint. ) Graeci est, ἵκνω ἐν ὑποστυπῶνι ὕδατι, id est, quæ alimento nidum destituti fuerint.

Linea 35.

Cutem linamento penetrabam. ) Hoc est linamentum cuti inferri in curationem abscessus: Nam ἀμυγδαλῶν signat linamenta in finem seu inferre.

## ERRATA.

Pagina 70. linea 35. lege: Vetus herbe pedicularie genere vel sylvestri vel satia comman-  
ducato cum mastiche. Summa &c.

105.	2.	OCULARIA.
205.	7.	Vne, & una e posse.
309.	12.	Piperis drachme duæ, iute drachme quatuor.
310.	9.	Antanas passas.
315.	15.	& quod alijs constat.
369.	4.	INTestina.
Ibidem	20.	GLEGHON.

# ARGVMENTVM LIBRI QVARTI.

In hoc quarto totius operis libro, affectus explicantur qui non certis assignati sedibus, sparsim exteriora potissimum corporis infestant.

## CAPITA LIBRI QVARTI.

I.	De elephantia	201	XXXII	De scirrhia	ibidem
II	De lepra & scabie, quæ pfora dicitur	204	XXXIII	De strumis	226
III	De impetiginibus	205	XXXIII	De steatomate, atheromate, & meliceride	227
IV	De pruritu	206			
V	De leuca	207	XXXV	De scaila	228
VI	De alba albo & nigro	ibid.	XXXVI	De simplici ulcere	ibid.
VII	Ad strigata, ex commentarijs Archigenis	209	XXXVII	Quæ ulcera glucinare possint	229
			XXXVIII	Si dolor & inflammatio ulcera exerceat	ibid.
VIII	De pustulæ eruptionibus, quæ exanthemata uocantur	ibid.	XXXIX	Si maturari & ad suppurationem perducere ulcera nequeant	230
IX	De epiphyctidas	210	XL	De causis ulceribus	ibid.
X	De pustulis quæ græcè phlyctenæ dicuntur	ibid.	XLI	Quæ sordida ulcera purgant	231
			XLII	Ad ulcerum uermes	ibid.
XI	Ad ambusta igni	ibid.	XLIII	Quomodo caro ulceribus supercreta excidatur	ibidem
XII	Ad eos qui flagris caesi sunt	211			
XIII	Quomodo pilæ adusti renascantur	ibid.	XLIII	De ulceribus serpentibus, & putridis, & phagedæna	232
	Ad abrafa, quæ apofymata Græci dicunt	ibid.	XLV	Quomodo cicatrix ulceri inducenda sit	233
XV	De formica & uerruca	212	XLVI	De maleficiis ulceribus, dolosisq. caecothæ Græci uocant, alijs Chironia & Thelephia	235
XVI	De ganglio	ibid.			
XVII	De inflammatione	213	XLVII	Ad cicatrices nigricantes	ibid.
XVIII	De exterioribus corporis abscessibus	214	XLVIII	De sinibus	236
XIX	De gangrana & sphacelo	216	XLIX	De fistula	237
XX	De herpete	217			
XXI	De erysipelate, sacrum ignem dicunt	218	L	De ulceribus diruptis	238
XXII	De phymate, bubone, & phygethlo	219	LI	De articularum ulceribus	ibid.
XXIII	De furculo qui dothien appellatur	220	LII	Quæ spicula, furculos, spinas, & confimilia educunt	239
XXIV	De terebintho	ibid.			
XXV	De carbunculo	221	LIII	Si ex uena, arteria, uel, & naribus sanguis profluat	ibidem
XXVI	De cancro	222			
XXVII	De molli & laxo tumore, quæ de ma Græcis dicitur	223	LIII	De neruis conuulteratis	241
			LV	De articularum contractione, seu ligatione, quæ ancale dicitur	242
XXVIII	De inflatione	224			
XXIX	De luxatio & contusio	ibid.	LVI	De articulis relaxatis	244
XXX	De carne contusa, & sanguinis subiectum coitu, quod græcè ecchymoma dicitur	225	LVII	De lumbricis	ibid.
			LVIII	De ascaridibus	247
XXXI	De rupia & conuulsis	ibidem	LIX	De dracunculis	248

# ANNOTATIONES IN LIBRUM V.

Pag. 349. li. 9



**E** uirulentis bestijs præcipientes. ) Graecis uocantur *infectio*, hoc est atrum tucalantes, facili-  
ter, sunt morsu.

Linea 31

**Melastich**, sylvestris cumini. ) Graecis est *an-  
thriscus*, uelut *melastich*, quod ad uirum sic sonat, melastich  
sylvestris & cumini sunt. Verum quoniam melastich sylvestris nec  
a Dioscoride nec Galeno, alijs uel scriptoribus qui de simplici me-  
dicina tractant, ulla sunt mentione, utant legendum, Melastich  
& cumini sylvestris scilicet.

Linea 28

**Præteritum pino aut picea.** ) Magna inter doctos concerta-  
tio est, de pino & picea, qui Graecis appellari debent. Alium  
nomen pinum uocat *pinus*, alium uero piceam uero hic uirum ille  
uolunt. Nos autem Theophrastum cum Plinio confiterentur, prius  
piceam dictam esse inuicem, uolunt tamen. Verba Theophras-  
ti haec sunt, *πικρὴν ὄντι τὸν κλητὸν πικρὸν ἀνὰ πικρὸν ὄντι τὸν κλητὸν  
πικρὸν*, hoc est, Colligitur pro capite picea ex pinguis-  
simo uel quæ præterit & picea, quæ omnia Plinius prius indica-  
uit, libro decimo sexto, capite decimo, et undecimo, capite primum re-  
ferunt & liquidi picea fieri ex uide & picea testatur. Adde quod  
Scribonium Largum composuit de crassissima prima resina pini-  
um interpretatur resina est picea. uero, pinum dici multorum  
testimoniorum corroborare possum. Hoc uero, ut uirum sum dictum ut-  
lim, semper in cum me uirum modum, præterit hoc in luce, ubi uo-  
lum pinum interpretatum sum, Dioscoridum interpretes sequatur.

Linea 38

**Homo adhibendus** est qui uulnus exugatur. ) Graecis est  
*ἀνὴρ ἰσχυρὸς*, hoc est, qui ad uirum fortis & expressit, libro gen-  
te, capite uigesimo septimo. Si inquiri, ut id quidem est, homo  
adhibendus est qui uulnus exugat.

Pag. 350. li. 1

**Partes scalpello exasperentur.** ) Graecis est *ἀνὴρ ἰσχυρὸς*, al-  
ter, quod est scarificari quod Cellum uicem causæ exasperant, uicem  
cum incidere dixit, ad libro sexto capite quarto. Quidam hoc ge-  
nera, arærum scalpello exasperant.

Linea 19

**Lixiua.** ) Sic interpretati sumus uerba *πικρὸν*. Rationem in  
annotationibus in libro secundum reddidimus.

Linea 37

**Defudationes.** ) Hoc est sudor provocatus, de quibus libro  
primo capite quadragesimo octavo.

Pagina 351. linea 13

**Hydrophobiam Graeci appellant.** ) Celsus hoc genus  
morbi miserum, aqua timore appellat libro quinto, capite uige-  
simosimo. Sicut inquit, pro eo uolunt, ubi parum occursum est,  
aque timore uelut, *ἡδρόφοβος* Graeci appellant. Miserum ge-  
nus morbum, qui simul aeger & sitis & aque metu cruciatur. Scri-  
bonium Largum quid sit, modo interpretari compositione circums-  
pecta septimo prima, aque hoc est liquoris uirtutem interpretatur.

Linea 14

**Sui fastidio.** ) Graecis est *πῶς ἀνὴρ*, quod alij interpretant,  
cum suum ignorat, grammaticis Graecis ciuitatem, qui aere  
pinæ caput & uirum. Non male autem dicam alij diffinitione.

Pagina 351. linea 9

**Prius fomētis a diuina.** ) Hoc heuor uolunt Celsus libro qua-  
rto, capite quarto. Thorax fomētis cataplasmati, calido, aut sic  
cit, aut etiam humidum ad uandum est.

Pagina 351. linea 9

**Lata manu morsum teritis.** ) Celsus libro 5 capite uigesimo  
septimo eandem sententiam fassus caput. Si manu uulnere im-  
ponitur, superius id duobus digitis urberetur. Li. 35

**Ad feruorem aut morbum.** ) Graecis est *πῶς ἂν* & *ἀνὴρ*  
pinæ uelut, hoc est ad morbum quod inflammationem la-

ferre idem uolunt.

Li. 35

**Lac ficulneum.** ) Hoc est liquor ficulneus, sicut lac *populeus*,  
lac *stipiti*, aliorumque consimilis, pro liquore aut lacryma.

Linea 31

**Lingua sermone manifeste non explicat.** ) Graecis est  
*ἡ γλῶττις ἀνὴρ ἰσχυρὸς*, quod dicit lingua obstricta, Celsus libro qua-  
rto, capite secundo. Si lingua resoluta est, quod interdum per se, in-  
terdum ex morbo aliquo fit, sicut sermo hominis non ex placuit.

Pagina 354. linea 4

**Peticulo subtrahere.** ) Id est succurrere. Celsus libro secundo,  
capite septimo. Via ulla medicina peticulo subtrahit.

Linea 17

**Particula intenditur.** ) Hic particula pro *pen* penitit, Graecis  
est *πῶς*.

Pagina 355. linea 10

**Mali punicis dulcis corium.** ) Mali corii dicit testis Plinius li-  
bro uigesimo tertio, capite sexto, quod ad coria persicienda eo at-  
tatur. Graecis est *πῶς*, Scribonium Largum uocat etiam mali grana-  
torum caposum decursus trigesima quarta. Si inquiri,  
maior tumor erit, mali granati corium ex aqua coctum & tri-  
bularia pari pondere admiscere oportet.

Pagina 356. linea 21

**Depassio ipsam inoadit.** ) Hoc est altera quæ depassit, No-  
me Graecis appellatur, quod serpens depassendos; corpora ho-  
minum in seferunt. Plinius etiam Graeca ditione attat.

Pagina 357. linea 15

**Similiter cum faringe polline.** ) Nemo uideat farina pol-  
line, quem Graecis dicitur uocari *πῶς*, pro ipsa po-  
line, far farina uideat.

Li. 28

**De amphibiaena.** ) Hoc animal *κῆρυξ*, &, auctore Galeno,  
& utroque parte ingreditur, unde nomen illi indam est.

Linea 22

**Dryinus in quercuum radicibus.** ) uocet *κῆρυξ* a quercubus  
nomen sortus est, quod in radicibus earum uiuat in Helleponto po-  
dere trito, qui & tam prodit.

Li. 36

**Tormina.** ) Graecis est *πῶς*. Nos tormina interpretati su-  
mus, significantes ea ditione quædammodi & Celsus graues qui  
dē, ut tamē omnia, nec in quolibet hominum parte dolores, sed eos  
ducat qui circa umbilicum, omnesque id spatium quod in interi-  
ore homine ab hepato stomacho ad umbilicum pertinet, homi-  
nē torquent, non morbi genus aliquod constituit, sed aliter  
morbi comites & symptomata, ut Graeci uocant. Tormina inte-  
riorum autem huius torminum diuersa sunt, eadem tamen ratione a-  
pu d Latinos nomen inuenerunt, Graeci uocant dysenteriam.

Pag. 358. li. 1

**Qui hemorroidi scitum fenserunt.** ) Hemorroidi & hemor-  
hoi a sanguinis effluuio nominantur, qui toto corpore percussis  
effluuio ma, hoc forma est. Verum color arctatus, maxime  
do palmeri trās, crassitudine per calum in tenui aut descendente,  
incesso tardo & directo ferunt, rursus, aut quidam scribunt, pedu-  
lin: macula per totas multas, partem atque, partem elidit, sicut  
ma asper, ob id in graduati strepitum se producit. Formis in  
alium iacti serpsit, maximeque ueris eandem inferiore situ  
tinet: mas autem ueris alium habet, uerumque serpsit porri-  
gi. Formis percussio, ut ex cuius illa dentes, gingiue uo-  
guet, decidit.

Linea 39

**Natrix morfus uolnus factum.** ) Natrix primum in ter-  
ra uiuat, & chrysdos appellatur, deinde in aqua. Similis est affi-  
di pusillo, præterit quod uerum letum non habet ad affides.

Linea 41

**Inexpugnabili dormiendi necessitate premitur.** ) Graecis  
est *πῶς* uolui phorax, quod sonat *Arboreus* sunt.

Pagina 359. linea 1

**Refectus siquidem ipsa.** ) Hoc est diffusus ipsi & diuisi.

Linea 17

Et Quam





# ARGVMENTVM LIBRI QVINTI.

Hoc quinto totius operis libro de theriacis & alexipharmacis tractatur, ut infra scriptum habes.

## CAPITA QVINTI LIBRI.

I.	Quomodo quis ab omnibus communiter uirulentis bestis se tueatur	Page 249	XXXIII	De picearum erucis	ibidem
II	Communis omnium qui d uirulento quopiam morfi uel icti sunt, curatio	ibide	XXXV	De marino lepore	ibidem
III	De rabio si canis morfo, & metu aquæ, q hydrophobia dicitur	250	XXXVI	De rana rubra & palustri	265
III	Ad morfus canis non rabiosi	252	XXXVII	De hirudinibus	ibidem
V	De uespis & apibus	ibidem	XXXVIII	De chamaeleonte	ibidem
VI	De phalangeis	ibidem	XXXIX	De alterco	ibidem
VII	De araneæ ictu	254	XL	De coriandro	266
VIII	De scorpionis ictu	ibidem	XLI	De psyllio	ibidem
IX	De scolopendra terrestris & marina	255	XLII	De cicuta	ibidem
X	Ad bellionis transmarini ictum	ibidem	XLIII	De papaueris liquore, quod opion uocant	ibidem
XI	De scie	ibidem	XLIV	De carpefæ liquore	267
XII	De more aranco.	ibidem	XLV	De mandragora	ibidem
XIII	De uipera tum mare tum femina	266	XLVI	De aconito.	ibidem
XIII	De amphibiaena & scytale	257	XLVII	De ixia	ibidem
XV	De dryino	ibidem	XLVIII	De ephemero	268
XVI	De hæmorrhoo & prestere, hoc est, diptide.	ibidem	XLIX	De smilace	ibidem
XVII	De natrice, quæ Græci hydron dicunt	258	L	De solano furioso, quod dorycnion à nō nullis dicitur	ibidem
XVIII	De cenchro	ibidem	LI	De fardonia	ibidem
XIX	De ceraste & aspidæ	259	LII	De papauere cornuto	269
XX	De basilisco	ibidem	LIII	De pharico	ibidem
XXI	De pastinaca marina & muræna	ibidem	LIII	De toxico	ibidem
XXII	De dracone marino.	260	LV	De fungis	ibi.
XXIII	De scorpione marino	ibidem	LVI	De sanguine taurino	270
XXIII	Quomodo testudinis maris sanguis præparetur	ibidem	LVII	De lacte coagulato gelatoq	ibi.
XXV	De crocodili morfu	ibidem	LVIII	De melle quod in Heracia nascitur	ib.
XXVI	De hominis morfu	ibidem	LIX	De gypso	ibidem
XXVII	De uenenis	261	LX	De cerussa	271
XXVIII	De uenenorum præcautione	ibidem	LXI	De calce, sandaracha, & auripigmento ib.	
XXIX	Communis uenenorum quomodocunq assumptorum curatio.	262	LXII	De argenti spuma	ibidem
XXX	Enumeratio simplicium uentorum	263	LXIII	De plumbo	ibidem
XXXI	De cantharide	ibidem	LXIII	De argento uiuo	ibidem
XXXII	De buprestis	264	LXV	De ueratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syluestri, nigella, & papais	272
XXXIII	De salamandra	ibidem	LXVI	De familiaribus ac domesticis, nempe uiu & aqua frigida	ibidem

Ec

## ANNOTATIONES IN LIB. VI.

Page 273. linea 10.

Am in fractura. Græci est uerid, aut. Hoc ferè omnes fracturas attriunt, nonnulli tamen rugiunt, quæ Paulus ipse fracturam interpretatur, ut patet xxviii. in, inquit, in amipar. i. in l. i. p. 2. d. 2. m. 2. 6.

Linea 21.

Ferramentis mucronatis. Sic interpretor xxi. v. p. 2. m. 2. 6. inquit, non uel in mucronem signat scapellum, interum specillum: ut sit ferramenta specilli modo facta.

Linea 22.

Perpiratu dissipentur. A nulla Græci dicunt perpiratū latenter, per quæ sapientia dissipantur.

Linea 27.

Vitium propter hydrocephalon appellatur. Celsus libro quarto capite secundo: Vbi humor calens inflat, ead. intumescit, & premitur digito celsu, illi inquit in Græci appellant. Ad arrium autem sonat, aquæ humor capiti.

Page 274. linea 6.

Turgidus puluino sublimi. Græci est uerid, aut. Hoc est, in saltem incuruatus, quemadmodum puluini in superstitio tument, gubero extant, à quoq. tumor hoc capiti.

Linea 22.

Quibus utemur lineis. Hoc est, duas diuisiones meliorum. Celsus ubiq. sic loquitur, ut libro septimo caput sept. mo de pinia ta oculorum: Reperti in Græcia sunt, qui inueniunt lineas ceterum capiti incidunt. Iterum: Reperti sunt qui à capite recedunt lineas ad tempora diducunt. Græci est. Alii inquit pinia diuisionem.

Page 275. linea 14.

Per hamulū retulsum. Græci appellant uerid, aut. Hoc est, dicat, eadem hamulam, cui acutis sit adempta. Celsus in elaterio gæ semper retulsum uocat.

Eadem linea.

Membrana detrahemus. Exemplaria nostra habent, inquit, inquit aisan est uerid, aut. Quid sibi uerid prior scriptura, inquit, inquit aisan est uerid, aut. Quid sibi uerid prior scriptura, inquit, inquit aisan est uerid, aut.

Page 266. li. 2.

Ec



# ANNOTATIONES,

Ex ceteris.) De ceteris, hoc est, scilicet 4. tractatum est.

Li. 17

Caulis modo porrectus.) Græce est ἀνέκτατον, hoc no-

tatur, caulis modo transmissus fractus. Pag. 321. li. 34

Tellus extrahenda.) Telluris varia est significatio, nunc pro

ferro quod imponitur, nunc quoque missi caput.

Linea 30.

Ea quæ imponuntur, dicitur Græce dicuntur.) Nemo po-

tuit, quælibet artem in arboribus, hoc quid significaret in-

venire, deinde incidit in excessum in Hippocrate, non habetur, dicitur

non in libro de arboribus, sed in Hippocrate, dicitur non in libro de arboribus, hoc est, Arcton non solum ad sacrificium utilem, sed etiam sagi-

te lignum significat. Pag. 324. linea 24

Belucum Græci vocant.) Hoc instrumentum etiam Celsus di-

citur. Li. 17. linea 24

Femina propulsores instrumenti.) Instrumentum hoc du-

plex est, mas et femina. Mas habet penam modo prominentiam;

femina, pudendi mulieris modo finis: atque inde sic appellantur.

Pagina 326. linea 12

Quæ gastrostaphia dicitur.) Celsus compositione 205, ita

exponit: Quæ intestina prolapsa et reposita sunt, atque ferri uti-

lium, quod à Græcis dicitur gastrostaphia. Li. 41

Ruptura ossis est.) Hoc Græce usurpatur in ossi, quod ali-

quis vitæ et fibræ lacessitio dicitur: ita videtur non per se, pri-

mo videtur caput, rupturæ dicitur, ut Græce erat γαστροστυψή.

Pagina 330. linea 2.

Modiolo quem chemonion.) Celsus chemonion sic exponit,

libro octavo capite tertio, ut modiolum sic describit: Modiolum

ferramentum in cicatricem terens est, immixtum ferratum, per quod me-

dus in cicatricem ipse quoque interiore orbe cicatricem demittit ut.

Pagina 332. linea 7

Iugulum.) Celsus iugulum reddit, quod Galenus iugulum, hoc

est claviculæ vocat, utique eadem de scriptis huius parvi usus.

Linea 19

Arundinis modo.) Græce est ἄνθη, quæ aut fractura

fit, in capite de fracturis dicitur. Li. 32

Orbiculum bonæ magnitudinis.) Propriè orbiculam circa-

lum ut figurat. Celsus id invenit libro octavo ca. 30. Rotandum, ut

erat, aliqd super iugum poneretur. Li. 38

Reuocet.) Hoc est, retrahat, revolvatur. Pag. 338. li. 8

Cubitus radii.) Non hoc est, scilicet, hoc est cubiti flexus, qui in-

terdam voce cubitus significatur, ut patet dicitur, Sanguis ex ca-

lote mittitur dicitur: sed id tantum quod à manu incipit: inferum ad

brachium usque tendit. Radii, qui alius dicitur, super rursus cubito

est, periturus: barberi forte vocant. Li. 27

Acies digitorum.) Græci vocant δακτύλους. Celsus li. 2. ca. 11.

manus acies dicit. Pag. 339. lin. 10

Parilla.) Or est parui, molle et cartilagineum, quod commissura

cervi arguit. Pag. 341. lin. 12

Aegn maxillas committit.) Hippocrates adiecit habet in

feriores, quod in omnibus exemplaribus desideratur, ut sit, Ac-

gri maxillas inferiores diffucile committit ut.

Eadem linea.

Talis autem repositio.) Visus est plaria corrupta, ita sen-

tentiam recte non potui reddere, quam verba expresserim: hanc

in modum in Hippocrate legimus: Quæ autem re-

positio ipsa congruat, manifestè loquit.

Linea 17

Diducat et concedat.) Hanc in modum habet Hippocrates: Si

mal diducat et concedat, à maxime, deinde subito hies tribus pari-

ter figuræ mentis adhibet. Li. 19

Item maxillas.) Hippocrates postit maxillas cum mit-

tere. Li. 21

Committere aut.) Græce erat ἵκεν, male, pro huius, ut sit,

Committere autem huius minus os possunt.

Linea 17

Secundum ordinem.) Græci habet Pauli codices, pro igitur

ita, hoc est, ad hunc usque et restituitur, ut adhibet primorum de-

ter in utraq. maxilla primorum, canini canini, molares molari-

bis respondentes. Li. 28

Si autem periculum.) Præsertim si sentiat, ita lege: Si au-

tem non uiderint loco suo maxillas, periculum vitæ

instat ex febris continuæ et torpido caro: Nam ca-

roides musculi alterantur et c. Pag. 345. li. 2

Ve reliquum ægri corpus.) Mirificè hic de præputa facta ex

emplaria, ita ut ibidem imperiosum possit saltem Græce est ἵκεν, ut

de huiusmodi in igitur imperiosum de huiusmodi in igitur imperiosum

per huiusmodi in igitur imperiosum de huiusmodi in igitur imperiosum

per huiusmodi in igitur imperiosum de huiusmodi in igitur imperiosum

per huiusmodi in igitur imperiosum de huiusmodi in igitur imperiosum

per huiusmodi in igitur imperiosum de huiusmodi in igitur imperiosum

per huiusmodi in igitur imperiosum de huiusmodi in igitur imperiosum

per huiusmodi in igitur imperiosum de huiusmodi in igitur imperiosum

per huiusmodi in igitur imperiosum de huiusmodi in igitur imperiosum

## ARGUMENTVM LIBRI VI.

Hoc Sexto totius operis libro de Chirurgica agitur, tum quæ ad carnem, tum quæ ad ossa pertinet, quæ in sermonem de fracturis & luxationibus finitur.

### CAPITA LIBRI VI.

I.	Procedulum chirurgicæ. Pag. 373	X.	Si oculus cute non obtegatur, lagophthalmum dicitur. ibidem
II.	Quomodo caput aduratur in lippientibus, ægæ spiraculis, & elephandicia ib	XI	De inferioris palpebræ sutura, & unctione per medicamentum 279
III.	Quomodo humor capitis cuti instat, catgut in tumescit et præmeti digito credit, hydrocephalon dicitur. ibidem	XII	De ectropio ibidem
III	Quomodo arteriæ diuidantur, arteriotomia dicitur 374	XIII	Quæ palpebrarum oculi irritantia velant, & ostio per foramen adhibeant. ibid.
V	Quomodo latera capitis ossa diuidantur, quæ angiologia dicitur, eorum igitur aditus fit administranda. 375	XIII	De hydatide 280
VI	Quomodo frons incidatur, hypospasmi sumum vocant ibidem	XV	De palpebris commissis 281
VII	Quid agendum in facie secundo, perithecium appellat Græci. 276	XVI	De chalazis ibidem
VIII	De superioris palpebræ sutura alia ut mo dia. ibidem	XVII	De verrucis & encanthis ib.
IX	Quæ palpebræ medicamento urant 278	XVIII	De ungue oculorum, quod pterygion à Græcis vocatur ibi
		XIX	De staphylomate 282
		XX	De oculi purulenti, quæ hypopyi dicuntur ib.
		XXI	De suffusa ibidem
		XXII	De glauco 283
		XXIII	Si meatus auditorius non perforatus sit. 284

Ec 3

XXIII	Ad ea quæ in matrem auditorium inciderunt, extrahenda	ibidē	LXX.	Quomodo nymphea excidenda sit, & ceteros emendanda	ibidem
XXV	De polypos.	285	LXXI	De muliebrium locorum thymia, cōdylomatis, & hyemorrhoidibus	ibidem
XXVI	Curtia in auribus & labris quæ faciri possunt, Græci uocant colobomata	ib.	LXXII.	De non perforatis, & phymo	ibidem
XXVII	De epulibus & parulis, quæ sunt in ginguarum tubercula	286	LXXIII	De abicellu uulue	214
XXVIII	Quomodo de nea eximantur.	ibidē	LXXIII	Qua ratio de partus ex utero excutatur excidatur	ibidem
XXIX	De ligatione linguæ, quod ancylion dicitur.	ibidem	LXXV	Si secundæ fuerint reliquæ	216
XXX	De confilia.	287	LXXVI	Quomodo coxendices adurantur	ibidem
XXXI	De uua	ibidem	LXXVII	De fistula & cerni	217
XXXII	Quomodo spina gutturi eximantur.	288	LXXVIII	De an fistula	218
XXXIII	Quomodo gutturi incidi debeat.	ib.	LXXIX	De hæmorrhoidibus	220
XXXIII	De abcessu	289	LXXX	De condylomatibus, tuberculis, & rimis	ib.
XXXV	De sirumis	290	LXXXI	De ano non perforato	ibidē
XXXVI	De steatomatibus, atheromatibus, & melicentibus	291	LXXXII	Quomodo urices excidantur	ibidē
XXXVII	De aneurysmate	ibidē	LXXXIII	De dracunculo	222
XXXVIII	De ceruicia tumore, qui bronchocele dicitur.	292	LXXXIV	De extremitatum partium uiciorum, acroerismon appellata	ibidem
XXXIX	De glanglia.	ib.	LXXXV	De unguium pietygia	223
XL	De sanguinis detractione per uenas	293	LXXXVI	De ungue conuulso	ibidem
XLI	De sanguinis detractione per cucurbitulas.	295	LXXXVII	De clauis, myrmecia, & oterucia	223
XLII	Quomodo alæ adurantur.	296	LXXXVIII	De telia & corpore extrahendis	ibidē
XLIII	De adnatis digiti, & sexto digito.	ib.	LXXXIX	De fracturis, & quæ ipsarum sunt differentiæ	226
XLIII	Quomodo purulentis adutis adhibenda.	297	XCI	De fracturæ capitis	227
XLV	De cancro	ib.	XCI	De naribus fractis conuulsis	229
XLVI	De his quibus mammae feminarum morbo inurgescunt.	298	XCI	De iostherie & maxilla contracta, & aure cōtrita	232
XLVII	Quomodo iecur aduratur	ib.	XCI	De iugulo contracto	233
XLVIII	Quomodo lien aduratur	ibidē	XCI	De sca pulis	234
XLIX	Quomodo stomachus aduratur	ibid.	XCI	De pectore	ibidem
L	Quomodo aqua hydropicia emittitur	299	XCI	De costis	ibidem
LI	De umbilico prominente	ibidē	XCI	De coxarum & pectinis ossibus	235
LII	De interiore abdominis membrana cōuulnata, nē de intestinis aut omenti proci dentia. ubi etiam tractat quæ uenteria uulnata faciant, ex cōmentarijs Galeni	300	XCI	De uertebis, spina dorsii, & sacro osse	ib.
LIII	Ad legendā glandē colicæ, si uida est.	302	XCI	De brachio	236
LIII	Quomodo glans penis contracta, aperiri possit, utrum dicatur hypospadias	303	XCI	De cubito & radio	238
LV	De phymo	ibidem	XCI	De summa manu & ipsius digitis	ib.
LVI	Si præputium glandi adhærescit	304	XCI	De femore	ibidem
LVI	De circuncis	ibidem	XCI	De parcella	239
LVI	De thymia naturalium	ibidem	XCI	De tibia	ibidem
LIX	De recto sphone qui catheter dicitur, & clystere uelice	ibidem	XCI	De pede summo	ibidem
LX	Quæ curatio calculosa adhibeatur	305	XCI	Quomodo crus reponi debeat	240
LXI	De testiculorum partibus	306	XCI	De fracturis quæ cōuulnere incidunt	ib.
LXI	De aquoso ramice, hydrocele dicitur	307	XCI	Si præter modum fracturis callus obducatur	241
LXII	De carnofo ramice & trophaceo	308	XCI	Si distortum membrum callu firmari	242
LXIII	De uaricofo ramice & uentoso	309	XCI	Si fracturæ calli non firmantur	ib.
LXIV	De testinorum ramice	310	XCI	De ossibus luxatis	ibidem
LXVI	De inguinū ramice, bubonocoele uocant	311	XCI	De maxilla inferiore	ibidem
LXVII	Quomodo scrotum atroxia uestimentorum fragmenis similiter attenuatur	312	XCI	De clauicula & summo humero	242
LXVIII	Quomodo fiant cunuchi	ibidem	XCI	De humero luxato	244
LXIX	De hermaphroditis	312	XCI	De cubiti gibbero	246
			XCI	De brachiali & digiti luxatis	ibidem
			XCI	De uertebis spinæ	247
			XCI	De cona luxata	248
			XCI	De geno articulo	248
			XCI	De malleoli articulo, ubi etiam de pedis digito agitur	ibidem
			XCI	De luxata cum ulcere	248
			XCI	De luxatione cum fractura facta	ib.



# ANNOTATIONES.

Theodoretus altera dia anacardi. ) Graeci est, *anacardi*.  
 1. & *ixidia* a magis dicitur. Quod *ixidia* sit non satis constet, sed  
 legendum patet utrum sit *ixidia*, ut sit *ixidia*. Theodoretus quae sunt  
 anacardi composuit. Nā anacardi in compositione nulla sit  
 mentio, nisi in fine, ubi dicitur, nonnullis addere dia anacardi.

Pagina 444. linea 11

Quod uena inceptum maturefcere. ) Graeci est, *anacardi*.  
 quod proprie significat nigrescere, et hoc proprie maturefcere  
 uae indicium est. Vult igitur Paulus significare autem non in-  
 cedere.

Pagina 445. linea 17

Alari, piperis albi & nigri. ) Graeci quid non est piperis,  
 sed quia alarum non describitur alium & nigrum à Dioscoride  
 aliqui; qui de simplicibus uelutina scriptum putant adhibendum,  
 quam frequenter in superioribus compositionibus eius fiat mentio.

Pagina 451. linea 1

Pastilli, ceræ. ) Graeci erat *algiu*, nullo frusto, cuius nos sup-  
 legendi diximus, quoniam in superioribus compositionibus in eam me-  
 dia habetur.

Linea 11

Rhus coriarij. ) Graeci et *exipia* habebant adiectū *eripia*,  
 hoc est *alumi*, nos quia superius in hac eadem compositione  
 animum *aluminum* generum facta est mentio, non sine ratione hic  
 reliquimus.

Linea 40

Finguntur pastilli. ) Graeci erat, *anacardi*, ubi *algiu* uenit.  
 3. hoc est, *algiu* in lignis dicitur homine diuidit nullo casu. Quae  
 et nos simpliciter, & finguntur pastilli reddidimus.

Pagina 454. linea 14

Squa max aris, mali punia. ) Graeci est *algiu* in à dicitur  
 simpliciter hic, quod est malum punia; id est sic interpretatum sum.  
 Nam & *rhodia* & *rhodia* dicitur, ut *Hermolani* & *anacardi*  
 dicitur.

Pagina 455. linea 9

Stille armoniacae. ) Idem est quod gutta aut suffumigium, aut  
 thymianum, ut *Celsus*. Graeco uocabulo utitur.

Linea 10

Herbae laetiae. ) Scribimus *Largu* compositione decima, 7. ad  
 eam *laetiam* uocat, quod Graeci *laetiam* dicunt. Latini ab u-  
 su *laetiam* radicum & herbarum, atq. ab eam praeterea & uiliore  
 parte, radicalem dixerunt.

Pagina 457. linea 7

Aluminis scilli. ) Graeci est *algiu* pro *algiu*. Nam *lapi* scilicet  
 hoc non facit, praeterea. Nō semper habet adiectum *alumen* scilicet  
 sic sepi per adiectum tantum *algiu*, significatur.

Pagina 460. linea 4

Hypocisthia. ) Scribimus *Largu* compositione octogesima  
 quinta *hypocisthem* uocat succum rose *syriacae*, quam *canina*  
 quidem uocat.

Linea 10

Alia xerocollyria, alia hygrocollyria uocantur. ) Haec  
 Latine sonant, arida collyria, & liquida collyria.

Linea 14

Liquore non copiose affuso. ) Graeci est *algiu* pro *algiu*, quod  
 signat, non puro affuso. Qui sensum cum sequenti dicitur *algiu*  
 id est sic modice & paulatim, non clarescere uidetur. Puto igitur  
 Graeci fuisse eia *algiu* pro *algiu* uenit.

Linea 40

Monohemerum appellatum. ) Ad uerbum hoc sonat, quod  
 uno die perueniat. Scribimus compositione uigesima de eisdem

collyrijs *algiu* uidetur id expressisse, ut inquirat. Fortem am-  
 die tolli epiphoram & praeterea incipit.

Pagina 464. linea 4

Dia ceratodictum. ) In tertio libro citat Paulus hoc collyriū  
 dia ceratodictum, quoniam à Celso etiam simpliciter quomodo  
 dū hic dia ceratodictum dicit collyriū quod ex ceratodictum constat

Pagina 466. linea 4

Har mation. ) Scribimus *Largu* medicamentū eisdem & sim-  
 plicibus et eorum ponderibus conficitur herma uocat, quod ex qua  
 tuor rebus, ut quidam equum conficitur, & celere habeat effe-  
 ctus. Hoc autem de *sermone* uidetur, quod Paulus addit *algiu*  
 ginum, praeter nomina rationem.

Pagina 467. linea 16

Alia sunt oleamenta. ) Haec dicitur quoniam aliqui putant esse  
 herbarum, ut ait Scribimus *Largu* compositione ducentesima  
 uigesima secunda: quomodo modum et oleum uocabulo idem au-  
 thor utitur compositione ducentesima sexagesima.

Pagina 469. linea 14

Lapachij, thepeli. ) Quid thepeli sit nō quoniam comperi,  
 nisi forte perueniat legendum sit pro *sermone* olei, quoniam autem à  
 Latine uocant.

Pagina 471. linea 10

Hyssopi medicamentum. ) Haec prius anacardi hyssopum corru-  
 ptum a pelegi, pro *algiu*, a hoc quoniam compositione medicamentū  
 male habet Graeca exemplaria hyssopum pro *algiu*. *Hermolani*  
 utroque modo possit legi, dicit.

Pagina 472. linea 1

Hyssopi liquidi. ) Haec quoniam *algiu* pro *algiu* legendū est.

Pagina 473. linea 11

Olei ricinij aut ueteris. ) Galenus quidem ex quo hoc com-  
 positum suum est, habet olei ricinij: ueteris, sed non mali Paulus  
 posuit olei ricinij aut ueteris, & supra nō pag. 469 uidetur *algiu*  
 linea uigesima secunda, dicitur est, ricinum oleum aquae  
 ueteris ueris obtinere.

Pagina 479. linea 29

Hyssopi cetati. ) Et hoc hyssopum deprauatū est pro *algiu*.

Linea 11

Dicitur Pampelichis. ) Graeci est *pampelichis* quod ad omnes  
 herbas modis effectum conueniunt *Hermolani* *Pampelichis* legi.

Pagina 486. linea 14

Embole prima. ) Haec est inestio prima. Nam ea medicamen-  
 ta diuersa uicibus cauta componi solent ut ex sequentibus patet.

Pagina 489. linea 10

Palmetum magnae dūe. ) Graeci uicibus numeros addunt:  
 Nos ex cōstituta dūe apponimus, quod si nō placet, aliud quod  
 piam salutat.

Pagina 490. linea 11

Alia emolliendi. ) Exemplaria Graeca habebant *algiu*,  
 hoc est non mixta, alio die plantae fructu, quod nos *pampelichis* legi  
 debere ex sequenti sententia, & ratione indicamus.

Pagina 498. linea 9

Aristolochiae rotundae. ) Graeci quidem non est rotunda;  
 sed particula *algiu* solum indicat aliquid deferrari.

Pagina 499. linea 11

E domo una in alteram. ) Hic deprauatū exemplar existima,  
 quomodo modum pauli, ubi numerus uicibus non addunt.

Pagina 507. linea 9

Drach. 16. ) Scribit drach. 6. ut ex quibus qui praecesserant liqui-  
 do patet.



## DE PONDERIBVS ET mensuris.

Quoniam multos ponderum et mensurarum difficultas à medicamentorum lectione deceret, usum est nobis planius rudiusq; Græcorum scriptorum monumencie seu in tabulæ modû quid singula ualcant, sublicere.

### SILIQUA.

Siliqua, Græci *μπαρμ* dicti: capâ ardeas duas et s partem.

### OBOLVS.

Obolus et Leuon et Græci dicunt: siliquas duas ualeat sextans denarij seu drachma.

### SCRYPULVM.

Scrupulus et scrypulum, Græci *σπαρμ* dictum, duas obolos prebet.

### DENARIVS.

Denarius qui Græci drachma uocatur, ualeat scrupula tria. Vnde patet autem Latini scriptores saepe Græcam distinem, ut Plinius Celsus nunquam.

### UNCIA.

Uncia uel *uncia* Græci appellatur; Secundum Græcos octo ualeat drachmæ seu drachmæ: Celsus septem. Omnes tamen, et Plinius et Largus alijs, octoginta quatuor drachmas in libra numerant.

### LIBRA.

Libram pondus triam Latini dicunt: duodecim autem continet uncias.

### MINA.

Mina uariet pro nationum diuersitate: Romana prebet uncias argenti: Attica et Aegyptia sedecim: secundum alios, duodecim.

## MENSURAE LIQVIDORVM.

Cochlear elementum est mensurarum, prebet drachmas 2.

Mystrum paruum continet cochlearia tria, prebet drachmas 4.

Cyathus caput mystræ parua duo, prebet uncias 1, et drachmas 4.

Aretululum continet cyathum unum et dimidium, prebet uncias 2, et drachmas 2.

Hemina caput aretulæ quatuor, prebet uncias 9.

Sextertius continet heminas duas, prebet librâ 1, et uncias 6.

Chonix caput sextertiarum unam et dimidium, prebet libras duas et uncias tres.

Caugium continet chonices quatuor, prebet libras nouem.

## DE PONDERVM NOMINIBVS,

quibus in toto opere offusimus.

Duodecima pars assis.

Uncia.

Sextans.

Uncia dua.

Quadrans.

Uncia tres.

Triens.

Uncia quatuor.

Quincunx.

Uncia quinque.

Semis, quæ et siliqua dicitur.

Uncia sex.

Septunx.

Uncia septem.

Bes.

Uncia octo.

Dodrant.

Uncia nouem.

Dextans.

Uncia decem.

Dreux.

Uncia undecim.

As, libra.

Uncia duodecim.

Dupondo.

Libra dua.

Trepondo.

Libra tres.

Stefancia.

Uncia una et semis.

Erancia.

Uncia semis.

Denarius.

Drachma.

## ARGVMENTVM LI- bri septimi

In hoc septimo & ultimo totius operis libro de medicamentorum tum simplicium tum compositorum omnium, quorum potissimum per integros sex libros præcedentes fit mentio, uiribus, disputatur, atq; infra posito ordine ponitur.

## CAPITA LIBRI SEPTIMI.

I	De temperamentis, quæ per gustatus qualitates deprehenduntur	113
II	De ordine et intervallo temperamentorum	ibidem
III	De particularium simplicium medicamentorum facultatibus	114
III	De medicamentis simplicibus quæ siccæ sunt	114
IV	De purgantibus medicamentis purgantibus	117
VI	Quomodo eos qui purgantur tueri conueniat, quidq; faciendû ubi medicamentum purgans nihil profecerit	119
VII	Si purgatio modum excedat	120
VIII	De hieris antidotis	121
IX	Quæ sedis et umbilico illita purgant	121
X	Quæ medicamenta uomitû ceteris, et quomodo helleborum exhibetur	121
XI	De differentia antidotorum	124
XII	De pastillis	127
XIII	De medicamentis quibus aridis utimur, xeria dicuntur, et semegmata	128
XIII	De medicamentis liquidis quæ illiuntur, ad oris uitia, unde stomatica dicuntur, ac guttur accommodatis	128
XV	Dulces utilesq; pociones	128
XVI	De collyrijs et agglutinantibus	129
XVII	De emplastris, et medicamentorum quæ in illa mittuntur coctione, tum qui ceteri modus cum oleo esse debeat, ex commentarijs Antylli	129
XVIII	De malagmacis et epistematibus	129
XIX	De acopis, inunctionibus dropacibus et stupasimis	129
XX	Quomodo diuersa olei et unguentorum genera conficiantur	129
XXI	De cerantharijs	129
XXII	De suffimentis et cyphal	129
XXIII	Coctio masfuchæ, quod nonnullis masfaphon oca tur	129
XXIII	Ex commentarijs Antylli, de pessis	129
XXV	De medicamentis in uice in alterantibus, ex commentarijs Galeni	129
XXVI	De ponderibus et mensuris	129

# PAVLI AEGI.

NETAE PERIODEVTI IN SVVM

de re medica opus, præfatio.

PAVLI LABOREM NOSCE ME QVI PLVRIMAS  
INVISIT ORBIS TERRAS, AEGINA SATVS.



On equidem opus hoc, quasi ueteres aliqua arti necessaria prætermiserint, componere sum aggressus, sed totam ut disciplinā in cōpendium redigerem. Ecōtrario enim illi recte quidem omnia & integre elaborauerunt: recētiores autē præterquā quòd illos ne legere quidē curār, etiā loquacitatis adhuc coarguūt. Qua ratione impulsus uolūmen istud elucubraui. quod illis sane qui ipsum, ut uerisimile est, habere uelint, eorumquæ legerunt commentarius, mihi uerò exercitii loco erit. Absurdum nāq; fuerit rhetoras uti compendiosis iudicialibus libellis, & ad cūcunferendū accōmodis, in quibus legū capita continentur, ut dū usus postular, in prōptu habeant, nos, nullam eorum habere rationem: quum illis nō pauco rantum, sed iam longo etiam tempore, ipsorum inspectione superfedere liceat: nobis neutiq; aut certe rarò ea facultas cōcedatur. Etenim usus in quibuldā morbis frequēter nullā ferens dilationē certamē inducit. ob quod rectē Hippocrates occasionē dixit præcipitē. Illos præterea in solis fere urbibus rerū utilitas incitat, ubi & libri nequaquā desiderātur: medicis autē nō tantū in urbibus, aur agris, aur etiā locis desertis, uerū iā quoq; per mare frequēter in ipsis nauibus subita morborū necessitas ingruit: in quibus dilatio mortē, aut omnino extremū adfert discrimen. Quoniā igitur uniuersas medendi rationes, aut particularem omnē materiā memoriter tenere uel difficillimē uel nequaquā aliquis possit, cōpendiū hoc ex ueteribus collegi. Nulla enim de meo inserui, nisi paucula quæ dā in artis operibus mihi & uisa & cōperta. Nā quū plureis egregios authores, magisq; Oribasiū ipsum, unde primū librū, quo totā de tuenda ualitudine rationem cōprehendi, sum mutuatus, quòd ille ex iis qui ætate Galenū sequuri sunt, adeoq; recentior adhuc extiterit, perlegissem, optima quæq; ex ipsis seligi, nihil quatenus licuit, ex morbis prætergressus. Etenim Oribasii ipsius uolūmen, à septuaginta libris quos continet Hebdomē contabiblon appellatū, quod totā in se artis materiā cōplectitur, nō omnes, quòd grādius sit, cōparare sibi possunt. In huius autē Epitome ad Eustathiū filiū scripta, præterquam quòd pleriq; morbi nō attingātur, etiā imperfectā reliquorū speculationem uideas, partim causarū, partim signorū: nonnunq; & curatio integra desidera

PAVLI AEGINETAE PRAEFATIO.

tur,ceu alia in memoriam uenerint.

PRAESENS commentarius notas, causas, curationem, omnium morborū continet, similariū, instrumentariorū, & eorū quæ ad unitatis diuortiū pertinent: idq; non summarim, sed quatenus licet ample & diffusè. Antehæc autē omnē uictus rationē quæ sanitati tuendæ facit, exposuimus. Postremū autē librum de simplicibus cōpositisq; medicamentis conscripsimus.

QVID SINGVLI SEPTEM TOTIVS OPERIS LIBRI,

nam totidem habentur, contineant.

PRIMVS omnem sanitatis tuendæ rationē tradit: itē quomodo morbi peculiare ætatibus, anni temporibus, temperaturis, aliisq; nonnullis, caueantur commendenturq;. Præterea ciborum omnium uires & usus habet, ut in capitibus comprehensum est.

SECUNDVS febres uniuerfas enumerat, ita ut præponatur ipsis, quæ eò cōferunt, exempli gratia, notæ ex rectemētis, diebus decretoriis, & id genus alię. Subiunguntur autem casus qui febribus superueniunt.

TERTVS affectus declarat, qui singulis corporis partibus obueniunt, sic ut à summo capite ad imos pedes, adeoq; ungueis descendat.

QVARTVS agit de exterioribus & ueluti in aperto cōtractis uititiis, quorū nō certę sedes assignari possunt, sed plureis particulas infestāt. In quo & de lūbricis, & dracunculis tractatur.

QVINTVS de animalibus ictu morsu' ue uenenū relinquētibz differit, ubi & de rabiosi canis morsu & metu aquæ, adhæc de non rabidi canis morsu hominisq; agitur. Inibi de uenenis eorumq; remediis disputatur.

SEXTVS chirurgicam omnem exponit, tum quæ carnis uitia curat, ubi & teli extrahendi ratio comprehenditur, tum quæ ossium fracturas, luxationesq; artuum completitur.

SEPTIMVS omniū medicamētorum uireis continet, primū quidem simplicium, deinde & cōpositorum, eorumq; potius quæ in sex aliorū librorum discursu commemorari, præsertim maiorum & nominatarum compositionum. Scio enim illic non omneis diffusè explicari, ne disciplina tædium afferat: tū, ut quærens aliquis unam, aut etiā plureis nobileis cōfecturas, facile inueniat. In hinc addūtur nōnulla ad medicamentorū cōpositiones utilia. itē de alternantibus inuicē remediis agitur, ut totus liber in disciplinā de ponderibus & mensuris desinat. Incipiemus itaq; primum uolumen.

# ARGVMENTVM LIBRÍ PRIMÍ.

PRIMVS totius operis hic liber est, in quo omnia sanitatis tuendæ præcepta tradidimus, quemadmodum iam in præfatione dictum est. diciturq; iterum per capita, ubi tantum hoc prælibauerimus, quod in primo & secundo uolumine plurima ex Oribasio mutuati sumus. Nō enim peculiarē uolumus constituere opinionem, sed ex omnibus utilitatem indipisci. In reliquis quinque libris paucissima tantum ex illius cōmentariis huc transtuli.

## CAPITA LIBRÍ PRIMÍ.

I.	Quæ grauidis superueolū, & quæ uictus rano eis conducit	I	LI	De aquis	ibidē
II.	De nutrice	ibidem	LII	De lauacris	ibidē
III.	De lacte nutricia	2	LIII	De lauacris naturalibus	ibidē
III.	Quomodo lac uitiatum corrigatur	ibidē	LIII	Quæ uictus ratio quolibet anni tempore sit utilis	18
V.	Educatio pueri	ibid.	LIII	Victus laboriosæ uitæ agentium	ibid.
VI	De pustulis puero obortis, exanthemata dicuntur	3	LV	Proficiscens uictus ratio	19
VII	De tussi & grauedine pueri	ibidem	LVI	Nauigantium uictus	ibidem
VIII	De gingiuarum pruitu	ibidem	LVII	Quomodo extenuetur corpus	20
IX	De dentium ortu	ibidem	LVIII	Quomodo teores impleantur	ibid.
X.	De oris ulceribus q̄ aphthæ dicunt	4	LIX	De partium attenuatarum curatione	ibi.
XI	Ad femorum inerrigines	ibidem	LX	Optimi temperamenti notæ	21
XII	Ad aores humentes	ibidem	LXI	Intemperatorum corporum notæ	ibid.
XIII	De sitiasi	ibidem	LXII	De capitis formatione	22
XIII	Ratio uictus infantium aspreliquo rum deinceps gradum, ad usq; declinatē	ibid.	LXIII	Temperaturæ cerebri notæ	ibi.
XV	De frictione præparata oris, quæ parasce-oastice dicitur	5	LXIII	Ventriculi temperaturæ notæ	23
XVI	De exercitatione	ibidem	LXV	Pulmonis notæ	24
XVII	De exercitationum generibus	ibidem	LXVI	Cordis notæ	ibid.
XVIII	De generibus frictionum	6	LXVII	Locomotorum temperaturæ notæ	ibid.
XIX	De uocis exercitatione	ibidem	LXVIII	Testiculorum temperaturæ notæ	25
XX	De lassitudinibus ob exercitationē	7	LXX	Quæ prætermissa sunt	26
XXI	De cute astricta	ibidem	LXX	Quomodo calida intemperies corrigatur	ibid.
XXII	De spontaneis lassitudinibus	8	LXXI	Quomodo frigida intemperies emendatur	ibid.
XXIII	Victus senum ratio	ibidem	LXXII	Quomodo sicca tēperies in oëtriculo, ueluti exēplo, deinde & aliæ corrigant	27
XXIII	De rugoso corpore	9	LXXIII	De alimentorum facultatibus	28
XXV	Quomodo corpus suauiter oleat	ibidem	LXXIII	De oleis	29
XXVI	Quomodo halitus incalascit	ibidē	LXXV	De asparagis	30
XXVII	Quomodo color malus emendetur	ibidē	LXXVI	De radicibus quæ cibi rationē obtinent	ibi.
XXVIII	Ad liuores	10	LXXVII	De tuberculis & fungis	31
XXIX	Quomodo dentes ab iniuria afferant	ibi.	LXXVIII	De frumenta cecis	ibid.
XXX	Quomodo grauis a uictus corrigatur	ibi.	LXXIX	De leguminibus	ibi.
XXXI	Ad oculorum caliginē	ibidem	LXXX	De fugacibus fructibus	32
XXXII	De repletionē	11	LXXXI	De arborum fructibus	ibid.
XXXIII	De ebrietate	ibidem	LXXXII	De animalibus, & primo de uolatilibus	33
XXXIII	Quibus cibi contempuntur	ibi.	LXXXIII	De ouis	ibid.
XXXV	De uenere	ibi.	LXXXIII	De terrestribus animalibus	34
XXXVI	Ad eos qui uenerē exercere nequeūt	12	LXXXV	De partibus animalium	ibi.
XXXVII	De ijs qui immodice coierint	ibidem	LXXXVI	De lacte & terrestrum sanguine	ibidē
XXXVIII	Si semen genitale redundet	13	LXXXVII	De lactis portione	35
XXXIX	Si perfrictio nocuit	ibidē	LXXXVIII	De lacte scilliti	ibi.
XL	Si uisulatus adussit	ibidem	LXXXIX	De caseo	ibid.
XLI	De pituita in superiore uentriculo redundante	ibid.	XC	De piscibus	ibid.
XLII	Quomodo facile quis uomat	14	XC	De testaceis	36
XLIII	Quæ sanis aluum subducant, & quæ urinam mouent	ibidē	XCII	De malis crispis	ibid.
XLIII	De clysteribus	15	XCIII	De cartilaginosis	ibid.
XLV	De glandibus	ibidem	XCIII	De cetaceis	ibid.
XLVI	De ijs quæ per os caput purgant, Apophlegmatismi uocantur, & quæ per naris, Quæ mensis ducunt	16 (unguentisq; lib.)	XCV	De uini uiribus	ibid.
XLVII	Quæ sudorem mouent	ibidem	XCVI	De melle & mulsa	37
XLIX	De aere	ibidē	XCVII	De somno	ibidem
XLVII	Quæ sudorem mouent	ibidem	XCVIII	De uigilia	38
XLIX	De aere	ibidē	XCIX.	De sopore	ibidem
			C	Dioclis epistola ad ualitudinem tuendam conscripta	ibidem

# PAULI AEGII

NETAE LIBER PRIMVS, IOAN-

NE GVINTERIO ANDERNA-

co medico interprete.

QVAE GRAVIDIS SVPERVENIANT, ET  
quæ uictus ratio eis conducat.

Cap. I.



**Q**VANDO QV IDEM INTER EA QVAE  
superueniūt, hæc potissimū infestare solent, nausea,  
continuz uomitiones, spura, stomachi erosio, & ci-  
bi fastidium: non alienum fuerit remedia quibus ab  
eis uindicentur, perscribere. Profunt itaq; obambu-  
lationes, cibi non nimium dulces, uina uermicula, o-  
dora, maxime quinquennia, & moderata potio. Hæc enim omnia ne mu-  
lier nauseet uomatq; impediunt. At medicamenti loco uineit polygonū  
herbā aqua elixā bibere. item anethū & ponticā radieē, quæ indigeti uoca-  
bulo rha nūcupatur. hæc tū ante, tū post cibū licet assumere. Extrinsecus  
præcordia adiuuari debēt cataplasmate ex labruscæ & pumicæ syluestris  
flore, cytisi smyrniūq; coma, & fœniculi semine, siue per se, siue quomodo-  
cunq; uoles miscere, eū palmulis & uino ueteri. Aduersus stomachi rosio-  
nes cōfert, calidā aquā bibere, quiete inambulare, præcordia cōtegere lana  
molli. At eas quæ cibū respuūt, uariis & ad uoluptatē quæ sitis eibus amylo  
q; sieco sollicitabis, magis aut hoc obtuleris iis quæ terrā edere cōcupiscūt,  
ut in uitio quod Græcis Citta dicit, accidere cōsueuit. id tertio à conceptu  
mēse potissimū cōtrahitur. Nam tūc factus omne quod ratione alimenti  
ad ipsum ferf, tanq̃ imbecillior, neq; cōsumere, unde fit, ut quū uaria ex eo  
recremēta in stomacho grauidæ redūdent, uaria & naturæ aliena appetat,  
exēpli gratia, carbones extinctos, cretā Cimoliā, aliāq; cōplura. Hæc enim  
ob causam appellationē huiusmodi affectus accepit, uel à picæ auis uarie  
tate, uel quod eadem subinde hoc malo corripiat. Cibi facit appetentiam  
labor, & longior peregrinatio. Quæ uero mulier citra labores agere cōsue-  
uit, haud cōmode repētinas subibit motiones. Verum acris quandoq; gu-  
stare, præfertimq; sinapi, cibum fastidienti non fuerit alienum. Caterum  
eximios pedum tumores quos œdemata Græci dicūt, anthyllis quæ in ace-  
to maduerit super deligata, discutit: itē folia brassicæ latioris atq; Cimolia  
cretæ ex aceto illita. similiter alumnē cum aceto profiecit. Recte etiam mala  
medica, quæ citria aliās dicuntur, aquæ in cocta pedibus admouentur.

DE NVTRICE.

Cap. II.



**D**Eligi nutrix debet, nulli morbo obnoxia, ætate mediocris, ita ut  
iunior quinq; & uiginti annos cōpleuerit, grandior quinq; & tri-  
ginta non excedat: pectore sit amplo, mammis magnis, papillis neq; con-

niuentibus neq; auerfis: reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili. Præterea magnū est infanti commodū, si nutritrix non multo ante pepererit, maiusq; si masculū. Vitanda ei sunt, admodum siccantia, salsa, acrida, acerbata, acida, amara, & ualide calefacientia. Item odores tum fœdi, tum suauis præter modum, cōdimenta, aliaq; acrida nocent. Ad hæc uenere nutritrix abstineat, manus humerosq; molendo texendoq; exerceat: puerū uulnis gestet, ubi treis iam menses quatuor uel excesserit.

## DE LACTE NUTRICIS.

## Cap. III.

**L**audatissimū lac est, moderatū spissitudini, copia, colore, odore, & gustu. Cōmendatur & quod in unguē pollicis instillatū, eo inclinato ad lucem, neq; subito neq; tarde uidetur defluere. Iam uero in hunc modū probari potest: infuso lacti in uas uitreum, coaguli exiguum admisceat, digitisq; agitur. in quo postq; cōcreuerit, inspicies, num casei porio minor q̄ serum fuerit. hoc enim lac inutile est: contrariū huic, concoctū contumax: probatissimum quod utraq; habet mediocritia.

## QUOMODO LAC VITIATVM CORRIGATUR. Cap. IIII.

**L**ac uitiatū hoc mō corrigi debet, si crassius fuerit, pituita uomitu elicies, q̄ optime oxymelire epoto citat: laboribus cibū præcedentibus eadē extenuabis. Tunc nimirū in cibo conduci, origanū, hyssopū, satureia, scādix & thymus, item radicularia exigua, uetusq; balsamentū cum oxymelite. At si acius tenuiusq; lac euaserit, multis quidē tunc laboribus nutriticē leuare, sorbitiōibus aut & carnibus suillis, sepiq; & uini dulcis potu, reficere cōuenit. Si lac fuerit immixtum, sorbitionibus & pleniori modo sustentanda est, uinū dulce potui dabitur: pectus & mamillas perfricare oportet. quibusdā cucurbitula quoq; defixa abūde præstitit. Medicamēta uero et si lacti generādo proficere quidem aliquid sciā, non tamē frequenter ipsis uti præceperim, ut quæ uolētius cōsumant. est aut sceniculi radix, & semen, prisanæ incōcta: item cythi folia ex uino nigro aut prisanā: melanthiū dulce & anethū, pastinacæ radix atq; semen. quæ calida prius irrorata admouēda sunt. Omne uero lac uitiosum, siue crassum, siue acre fuerit & fœtidū, puerq; qui prius fluxerit, eadem qualitate inficit. Lac autē acre nunq̄ ieiuno exhiberi debet. scrorem eius uinum odoratū & cibi dulces emendare possunt. Porro de caseato lacte tertio uolumine in capite de mamillis tractabimus.

## EDUCATIO PVERI.

## Cap. V.

**P**rimū infans recens natus melle nutrirī debet: mox lacte, idq; bis die, aut plurimū ter. quū autē prompte & alacriter puer assumit, ac spes est eum posse quod oblatū est cōcoquere, tūc iam & cibus solior recte dat qui nō ipsum repleat. At si forte imprudētibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior autē statim & torpidus magis euadat, uenter intumescat inflaturq; & urinæ aquosiores reddantur, quæ repletionis

notæ sunt, nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos cõsumpserit. Abũde aut̃ fuerit duobus annis lacte puerũ enutrire, inde ad cibos solidio-

DE PVSTVLIS PVERO OBORTIS,

(res trãsgredi.

exanthemata dicuntur.

Cap. VI.



Vstulis quæ pueri per cutem etuperint, primũ sane nullũ fa-  
cessere negotiũ oportet. ubi uero probe decreuerint, tũ iam  
curare tẽtabimur, balneis, quibus iniiciant myrti aut lẽtisei fo-  
lia, aut rosã. deinde rosã eo aut lẽtisei nõ utendũ: eeratoq; cum cerussa, ad  
hæc nitro abstergere lenius expedit: nã ualentiora nõ sustinebit. Optimũ  
uero est nutritiẽ dulciori uictu uti. laudat itẽ maxime si puer ipse neq; ple-  
niore, neq; nimis tenui cibo alat. At si ueter ipsius nõ respõdeat, tũ mel ci-  
bo infusum simul eoquere oportet: si ne sic quidẽ descẽderit, terebinthinẽ  
instar ciceris iniicies. Humectata aluo, miliũ potissimũ offerre cõducit.

DE TVSSI ET GRAVEDINE PVERI.

Cap. VII.



Võd si quãdoque tussicula aut grauedo puerum affligat, lin-  
ctus ex melle, quos Græci melitismos uocãt, adhibentur. Cõ-  
uenit igitur pueri liberaliore aqua calida loro caput ipsius  
melle copioso illinere, deinde digito linguam leniter preme-  
re: multum enim hoc pacto pituitz uomitu egeret.

DE GINGIVARVM PRVRITV.

Cap. VIII.



Rurientibus gingiuis fomẽto utẽdum est, & liberali unctiõne ex  
oleo diseocto, in quo eetẽ momentũ eliquatum sit.

DE DENTIVM ORTV.

Cap. IX.



Entiunt septimo mense pueri: quando inflammationes gingiua-  
rum, maxillarum, & tendinũ, aliquando cõuulsiones etiã eueni-  
unt. Tunc igitur pueri nihil dandũ, quod mãdi postulet. digito  
autẽ in lauacro gingiuẽ continenter contrẽctari, & gallinaceo adipe uel le-  
poris cerebello emolliri debẽt. Vbi iam dentes prodierint, ceruix, caput, &  
maxillæ delicatis lanis puris cõregentur, oleoq; dulci & calido fouebunt:  
idemq; meatibus auditoriis instillabit. Cæterũ plenius infantẽ tũc alere,  
& calida lauare oportet: & si alui profluium experiat, tẽtabimur eam opi-  
thematis quæ præcipue sistũt, contrahere, inspergendo lanæ cuminũ, aut  
anethum, aut apiũ. Salutare est etiã semen rosarũ admiscere, & summatim  
calidis deficcare. At si ueter nihil reddit, melle in glãdis figurã coactõ, in-  
ferius leniter irritabit. aut nepita detrita cum melle illinetur. Porro cõuul-  
sionibus puerorũ optime uidetur auxiliari heliotropiũ in aqua elixũ, si pu-  
er in hac lauef. cõfert & irino aut cyprino & lycionio perungere, & uniuersum  
calefacere. Quum autẽ exortis dentibus digitos mordet uulneratq;  
benefaciet radicem iridis derafam, nec admodum siccam, ote continere.  
Hoc remediũ ulecribus quoq; opitulatur: butyrumq; cum melle illitum  
adiuuat. Gingiuarum autem pruritus, ueteris fassamenti caro lenit.





Boritur puero etiã ulcus quod aphtha uocatur, nũc subalbidũ, nunc subrubrũ, aliàs crustæ modo nigrescẽs, quod omnium periculosissimũ & lethale est. Remedio erit, iris cum melle, & sicca inspirata. Item rosarũ folia cõrusa, earumq; flos, crocũ, myrrhæ exiguum, galla, lachryma thuris & cortex eiusdẽ, & simul, & priuatim singula melle tincta: ad hæc mulsæ, & malũ Punicũ dulcis succus proficit.

AD FEMORVM INTERTRIGINES. Cap. XI.



Emorum intertrigines myrtus arida, iuncus angulosus, & rosæ inspersæ iuuant.

AD AVRES HVMENTES Cap. XII.



Vrium humiditates lana ex alumine imposita, aut mulsũ, aut uinum uetus instillatum, aut crocum ex uino detritum, desiccant.

DE SIRIASI. Cap. XIII.



Iriasis, quæ Latinis adustio infantĩu dicif, est inflãmatio paratiũ circa cerebrũ, eiusq; mēbranas. concauũ in ea sit sinciput, cõcaui itidẽ cum pallore oculi, accedit & corporis totius siccitas. Succurrit huic malo uitellus oui sincipiti cum rosaceo linamenti impliciti modo impositus, sic tamen, ut continue renouetur.

ALIVD AD SIRIASIN.

Oportet eidem loco imponere folia herbæ quam Græci heliotropion, Latini solarem nuncupant, cucurbitæ tamenta, cucumeris, quem peponem dicunt, cutem carni adiacentem, aut hortẽsis solani succum cum rosaceo.

RATIO VICTVS INFANTIVM ATQVE RELIQA

rum deinceps ætatum, ad usq; declinantes. Cap. XIII.



Osteaq; lacte nutriri infantes desierint, liberiore eis mō & suo ingenio hilariter uiuere permittemus: exercitia autẽ & alimentata leuiora præscribent. Ab anno sexto & septimo, tũ pueri, tũ puellæ, literatoribus blãdis humanisq; tradent. tales enim cũ animi remissioẽ & gratia docet. Animi autẽ remissio ad probã corporis educationẽ plurimũ adfert momẽti. Duodecimũ annũ egressi, ad grãmaticos iã & geometras mittẽdi sunt, corpusq; corũ exercere oportet. A quãrtodecimo usq; ad primũ & uigesimalũ, mathematicis disciplinis & sapientiẽ studio incũbent: exercitiis plurib; propter corporis robur credẽt, ut & aĩo & corpore laborãtes, à libidinis impetu cõerceant. his etiã uinũ circũcidendũ est. Aetate florẽtibus educatio absoluta tũ animi, tũ corporis cõgruit. eorũq; exercitiis omnibus, præsertim quibus quisq; assueuit utendũ, cibo pleniore & ualẽti. Declinãtibus autẽ moderata cõpetit & animi & corporis educatio. Exercitia enim qualia cunq; fuerint pro horum ratione imminue-

re oportet: alimento detrahendū, ut quorū habitus iam frigescere incipiat,

DE FRICTIONE PRAEPARATORIA, QVAE

paraescuastice dicitur.

Cap. XV.



Nte exercitationem corpus mediocriter calefacere oportet, frictione linteis adhibita, deinde nudis manibus oleo intin-  
dis perfricare: usque dum bene in calefeat emolliaturq; colo-  
re uiuido rubescat, & in tumorem attollatur.

DE EXERCITATIONE.

Cap. XVI.



Exercitatio motus est uehemēs. uehementiæ aut finis est, re-  
spiratio crebra. Id uero cōmodi præstat, quod parteis instru-  
mētarias morbis nō opportunas efficit, & functiōibus obeū-  
dis ualidas: præterea ut alimēta forti⁹ attrahāt, prōptius im-  
mutēt, & liberalius reficiāt, caloris beneficio quē illa excitaui. adde quod  
meatus expurget, recremēta, propter ualidā spiritus motionem, expellat.

Quoniā igitur alimentorū per corpus mēbratim digestiōē adiuuat, con-  
uenit ut neq; copiosi neq; crudi, siue cibi siue humores, in uētriculo, aut in-  
testinis contineātur. periculū enim est, ne priusq̃ probe fuerint concocti,  
in uniuersas animātis particulas distrahāt. Vnde manifesto liquet exerci-  
tatiōem cibum præcedere oportere. Notæ aut quæ opportunitatem labo-  
ris subeundi ostendant, ex urinarū colore petūtur. etenim aquosæ nōdum  
coctum humorem qui ex uentriculo distributus est, significant: rusæ au-  
tem & biliosæ, iam pridem elaboratum esse notant: quæ leuiter pallefcūt,  
initium concoctionis quæ adhuc fit, signant. Tunc igitur ad exercitia ue-  
niendum est, ita ut uesica prius & alius recrementis leuentur.

DE EXERCITATIONVM GENERIBVS.

Cap. XVII.



Mnis exercitationis cōmune est, quod animali ex ipso calo-  
ris augmentū excitat. Ex singulis aut exercitationū generi-  
bus alia ualida, hoc est, uiolenta est, musculis & neruis robur  
præparās, cuius generis est quū quis fodit, & maximo onero

sublato, aut eodē loco manet, aut paululū procedit: item quū quis quantū  
maxime poterit inambulat: præterea per funē manibus apprehēsum scan-  
dit, aliaq; plurima in eundē modū obit. Alia celeris exercitatio est, quæ ci-  
tra robur uiolentiāq; peragitur. id genus sunt, cursus, umbratilis armorū  
meditatio, aut quū duo summis manibus cōcertant, tum quæ per corycū  
& paruā pilam fit exercitatio. Alia cōposita est ex ualida & celeri, quando  
quas ualidas diximus iis omnibus ut uehementibus uti licet, motus modō  
celeritatē adiiciās. Præterea per alias exercitationes lūbi magis q̃ brachia  
crura ue laborāt: per alias spina tota, aut thorax tantū, aut pulmo. Exerce-  
ri uero oportet quousq; corpus in tumore attollat & rubescat, motus prō-  
pte, æquabiliter & cōcinne edat. Inter hæc autē sudorē cum calido uapore  
mixtum cernes. Pausandū uero ab exercitatione tunc primū est, quū ali-

quod horum fuerit immutatū, nempe si contractior corporis moles uidebitur, ilico desistendū est: similiter quū coloris gratia deperit, cessare oportet. Quinetiā quū motus remittere quippiā cernitur, protinus desinere cōueniet. Itidē si in sudore ulla qualitatis eius, aut quantitatis mutatio accidat: quū enim is aut minor, aut frigidior factus intelligitur, tūc desistendum scias. oleo mox corpori superfuso, apothera pia uti deinceps oportebit, inde frictiōe apothera pēuticā adhibere, ut p̄dorribꝫ factitare solēt.

## DE GENERIBVS FRITIONVM.

Cap. XVIII.



Nter frictiōes, dura ligare corpus potest: mollis, soluere. quapropter quā supra modū resoluta sunt, duriter perfricare oportet: quā autē astricta, molliter. At si mediocri quis corpore p̄ditus sit, neq; molliter neq; duriter fricandū id esse constat, sed quatenus licet uterq; excessus uitari debet. Siquidē multa & dura frictio, corporis molē deprimit: modica uero & mollis, ecōtrario implet. Porro tres quātitatis frictiōnū differentias, si tribus quā à qualitate ducūtur, iūxeris, nouem cōiugationes effeceris, ut subiectū est. Etenim una iuxta quātitatē, nempe multa, si tribus quā à qualitate sumūtur, durā dico, molli & mediocri, adiūgatur, treis secundū duritiē differētiās efficit. modica rursus si eisdē tribus addat, treis alias procreat. At mediocris qualitate, eisdē tribus iūcta, alias treis progignit, ut in formula subiecta uidere licet.

## QVANTITAS.

## QVALITAS.

Multa	}	o	{	Dura
Multa				Mollis
Multa				Mediocris
Pauca	}	o	{	Dura
Pauca				Mollis
Pauca				Mediocris
Mediocris	}	o	{	Dura
Mediocris				Mollis
Mediocris				Mediocris

## DE VOCIS EXERCITATIONE.

Cap. XIX.



Nter uocis exercitatiōes suauis a p̄tāq; modulatio nihil ad sanitatem tuendā proficit: grauioris autē uocis sonus utilis habet, eoq; exercere eū oportet. Ita enim aer copiosissimus inspiratu in corpus attractus, thoracē, uētriculū & meatus totius corporis deducit, dilatat, aperitq;. Quapropter ipsa lectiōe humores qui redundāt, excernit. fortius igitur legētibꝫ, magis & per sudores: lenius autē, per latentem totius corporis perspiratū. Accidit enim propter extenuatiōē multa & cremēta, nempe sputa, mucos & pituitam, per s̄creatum excerni cōsumi. q; uero qui propter frigiditatē exalſcieri desiderant, quodnam aliud p̄tā

sentius remediū esse poruerit, q̄ functio quę respiratione peragit. Consiliū igitur est, hos frequenter legere, ut toto corpore relaxato, fusaq; carne, arteriam & alios spiritus transitus studiose rarefacientes, per grauiiores uocis actiones modulentur. Vti autē oportet uocis officio neq; temere neq;  
 5 inconsideratē. sed quum nec uitiosis corruptisq; humoribus repleti sunt, neq; magnæ & euidentes stomachi cruditates apparent, ad uocis exercitationē accedendū est, ne corrupti uapores per corpus largius distribuātur.

## DE LASSITVDINIBVS OB EXERCITA-

tionem.

Cap. XX.

10 **V**lcerosa lassitudo ab excrementorū tenuiū simul & acriū copia contrahitur. Tensoria nullū quidem excrementū, cuius ratio aliqua sit habēda, in corpore cōtineri indicat, sed in museu  
 15 lis neruisq; affectus quidā quo tendi uidentur, residet. Ea uerō quę inflāmationis speciē præ se fert, in qua nimirū ceu contusas, aut inflā  
 20 matione obfessas parteis sentimus, tunc solet incidere, quū musculi impēdio excalcati, aliquid ex circumfusus sibi recrementis attraxerūt. Est & alia quz dā præter has quarta affectio quæ oritur, quū musculi suprà q̄ par est, siccātur, ita ut squalens corpus contractūq; appareat, atq; ad motus pigriū. Remediū ulcerosæ lassitudinis est, si quæ redundāt, euapores frictiōe mul  
 25 ta molliq; cum oleo copiosiore, quod omnis astrictiōis sit expers. Altera lassitudo in qua tensio sentitur, hoc pro curatione desiderat, ut relaxet, sanè relaxat quod distētū est, pauca & molli frictiōe, eaq; ex oleo dulci atq; egelido: itē intermissiōe omnino, gete, balneis tēperatis, atq; in calida mo  
 30 ra lōgiori: adeo si bis ter uel ipsum laues, plus profeceris. Tertiæ lassitudi  
 35 nis inflāmatoriz curatiōis consiliū, ad tria dirigig, nēpe, superuacanei euacuationē, extenti remissionē, & inflāmationis refrigeriū. itaq; & oleū copiosum tepidūq; & frictiōes mollissimæ, & lenta in tēperatis aquis mora, eiusmodi lassitudines perlanant. pari modo & multa quies, \* maximè con  
 40 tinua. Quarta affectio nihil sanè à priori cōsuetudine immutari postulat, nisi calidiorē aquam, quæ sensim contrahat: altero die, apothepiaz exerci  
 45 tationem. adhæc soliū similiter calidum, sic, ut ægri protinus in frigidā exiliant. Statim uerō omnes qui lassitudinibus laborāt, cibo refici debent.

## DE CVTE ASTRICTA.

Cap. XXI.

35 **A**strictio quā Græci stegnosin uocāt, accidit, aut obstruētis, aut defatis meatibus. obstructio quidē, ex copiosis crassisq; humoribus erudis concoctionēq; non expertis, oritur: densatio autē, ab iis quæ refrigerāt, aut astringunt, aut desiccant. Ac deprehendit sanè iā dictus affectus, statim ubi se exuerint, ex colore albo, & cutis tum duritie, tum densitate: tū quod in ipsa exercitatione uix incallescāt. Succurrit huic  
 40 affectioni calefactio, quæ ualentiori exercitio, balneis quæ calidioribus petenda est. Mora uerō in frigido solio diuturna non sit. imò nec ipsa aqua

\* Galenus  
infratō con  
tinua.

nimiū sit frigida. Vbi uesteīs sunt induturi, ungēt aliquo quod mediocriter calfaciat oleo, dulci ac tenui. Cutis autē densitatē abūde etiā sanat oleū anethinū, præsertim si uiride fuerit a nethū: oleūq; ex populo nigra confectū.

DE SPONTANEIS LASSITVDINIBVS. Cap. XXII.



Voniā ulceroſa laſſitudo ex acriū recrementorū uitio contra hitur, ſi quidē paucus omnino uitioſus humor fuerit, apotheciæ exercitatio ſuffecerit: ſi copioſior, & altius in corpore reſidat, cuiusmodi malo obnoxiiſ nec exercitacionē nec ullū omnino morū iniūgemus, ſed quiete ſomnoq; recreatos abſtinere cibo totū diē cogemus, deinde ueſperi pinguiter unctis, temperatoq; balneo lauat, cibū boni ſucci & ſorbile exiguum dabimus, non tamen à uino eos arcētes. hoc enim ſemicrudos humores, ſi aliquid aliud concoquit. Si ergo hiſ peractis malū conqueuerit, ad priſtinā conſuetudinē pro ratioe reducēdi ſunt: ſin in poſterū etiā diē remaneat, de ualentiore iam remedio conſiderandū eſt. Si enim uireſ conſtent, duorum alterum, aut ſanguis mittendus eſt, aut purgatio exhibenda, ſed ita ut diſcernamus, utrum magis expediat. Quod ſi uires inualidæ ſint, ſanguinem dimittere haud quaquam oportet, ſed deiectionem mediocrem tentare. At ſi crudi humores omnino fuerint, neque ſanguinis detractio, neque purgatio, neq; exercitium ex uſu eſt, imō ne mouere quidem in totum, aut lauare expedit. Tales igitur in quiete omni ſeruādi ſunt, cibis potiōibusq; & medicamētis quæ extenuent incidant que ſine manifeſto calore, reſciendi. Pro cibo igitur oxymel, modicum priſanæ, nonnunquam & mulſæ exhibebitur. Quoniā uero præcordia cuiusmodi omnibus turgida inflataq; ſunt, ac facile quicquid aſſumpſerint in ſtatu cōuertitur, ſatius fuerit cum cibo pipetis aliquid offerre. Vtilius autē erit, & medicamēto quod diſpolites dicit, uti: itē dia trion pereon, ſimplici: utiliſſimūq; iſtis eſt oxymel. Porui ſument a pomel, præſertim ubi coacuit, uinaq; leuiter aceſcentia. cibi erunt qui ſine calore attenuent, cuiusmodi eſt capparis ſi ex oxymelite, aut oxelao aſſumant. Porro tenſionis laſſitudo quæ ſine exercitiis oboritur, copiā innuit ſolidas corporis parteis diſtendentem. Conſtat autem omnibus, optimum eſſe præſidium quum ſanguinis copia ſubeſt, aut uenam incidere, aut malloſos ſcarificatu ſauciare. Quæ uerò inflammationem repræſentat laſſitudo ſpontanea, ea ne paucis quidem horis, nedum duobus tribus uel diebus eodem tenore conſiſtit, ſed protinus febrem accendit uehementiſſimam, niſi ſanguinis detractioe malo prius occurreris. Præſtiterit autem, ſi fieri queat, bis eodem die ſanguinem detrudere: ac primum quidem ita mittere conuenit, ne a animi defectu homo periclitetur: ſecūdo autem, ne defectio quidem ipſa formidari debet. At qui ſic affecti ſanguinem non dimiſerint, hi ut periculum euadant ſcruenturq; bonæ fortunæ beneficio opus habent.

VICTVS SENVM RATIO.

Cap. XXIII.



- Eneſtus quū ſicca frigidaq; exiſtat, per calefaciētia humeſtan-  
tiaq; corrigi debet. Friſtio itaq; adhibēda eſt, citta laſſitudinē:  
imbecilliores ter die cibo reſci debēt: ad terriā quidē horam,  
panis exiguo cū melle attico: ſeprima uero hora ubi friſtionē  
1 exercitationeſq; ipſiſ congruas & balneū ſuerint experti, primū ſanē quæ  
alium emolliunt, aſſument. deinde piſces, aut auiculas, hinc poſt cœnā ea  
quæ oprimi ſucci ſunt & ægrē corrumpūtur. Non prohibeo item uinis ex  
melle præparariſ uti, præcipue quibus de calculo in renibus creato, aut etiā  
podagra ſuſpicio eſt, quādo perroſelinū uino recte iniicit. At ſi quādo pi-  
2 tuita in uētriculo cōtracta, neceſſitas eſt aliqua quæ eam incidāt, deligete,  
protinus ad humeſtārē uictus rationē digrediēdū eſt: cōtra quod ſci ma-  
turę ante aliū cibū ipſiſ exhibent: per hyemē uero caricę, ſi nullū in dextra  
præcordiorū parte uitiū accidere ſentiāt. At quia ſeroſa pituitoſa q; in ſeni-  
li corpore excremēta colliguntur, urinā quotidie promouere conſiliū eſt,  
3 & aluū ſubducere, præfertim oleo ante cibū epoto. Clarū uerō eſt, omnia  
olera ante cibū ex oleo, garoq; ſumi oportere: item oliuſ muria ſeruatas,  
quas halmadas dicūt, & damaſcena. Quōd ſi uēter magis aſtriſtus nihil de  
iecerit, & mercurialis herba, & cnicū abunde ſunt. benefaciteriā reſina tere-  
binthina, inrerim uniuſ auellanę, interim duarū triū ue magnitudine ſum-  
4 pra. lam oleū quibus aluiſ contracta eſt, per clyſterē utiliſſimē inſundit.



## DE RVGOSO CORPORE. Cap. XXIII.

Rugat corpus erui farina, uiti alba miſta.

ALIVD SMEGMA QVOD CONTINVE illinetur.

Fici pingueſ ſimul cū bryonia contuſæ, farina erui uſta, aut

- 5 ſepix teſta eum mellis momento trita.

## QVOMODO CORPVS SVAVITER OLEAT. Cap. XXV.



- 6 T corpus bene oleat, eidem unctioni cupreſſi comam aridam  
conruſam admifcero, aut picę corticem. Meminiſſe uerō de-  
beſ, ut mane poſtq; corpus ueſtimentis munieris, pauxillum  
caſſiæ aut ſabinę herbæ deguſtes.



## QVOMODO HABITVS INCALESCAT. Cap. XXVI.

- 7 D habitudinē calfaciēdam in balneo utendū eſt hoc puluere,  
qui recipit, nepitā, ſampſuchum, hyſſopū, baccas lauri, rorem  
marinū, lapidem pyritē, ſalem, ſcēcem combuſtā, nitrum, pumi-  
8 cem, pro cuiuſq; ratioē: item ſinapiſ, herbæ pediculariæ & cocci gnidii mo-  
menrū. à balneo, acopi uſus erit quod calefaciat: uinū uermiculū, uetus, pō-  
tui dabit. itē potio medica ex mulſo, pipere, ruta, & cōſimilibuſ, utiliſ eſt.



## QVOMODO COLOR MALVS EMEN-

detur.

## Cap. XXVII.

- 9 Orpus decoloratū pallidū ue uita iucunda & cibuiſ boni ſucci  
emēdat. miſcetur autem huic radícula, porrum, & uiride cicer.

lam mali punici dulcis succus sorbitionis modo sumptus, bonum colorem efficit. Proficit etiam oleum cui bryoniae radix diutius sit incocta. idē & corporis cutem intendit erugatq; . smegmatis autem miscere oportet glutinancia quae fiunt ex quopiam astringentium, farina, bulbo, narcisso & bryoniae radice. bene colorant, si copia datur, tum radix tum semē amaræ amygdalæ in aqua elixa, & in balneo adhibita.

## AD LIVORES.

## Cap. XXVIII.



luescere senum corpora prohibemus, si cutem ipsorum crassam, ita ut minus iniuriis pateat, & habitum calidiore reddiderimus. Vt autem celerius id assequamur, sale in balneis, super partem quae nigraverit uti conveniet, eandemq; fomentis per spongas decocto radiculae aut absinthii immerfas, adiuuare.

QVOMODO DENTES AB INIVRIA ASSE-  
rantur.

## Cap. XXIX.



Dentes ab iniuria vindicabis, si primum caueas ne cibi quos ingesseris corruptionem experiantur, mox continuam uomitionem deuites: deinde escas dentibus incommodas, nempe ficus aridas, mel coctum & satis durum factum, palmulas uix fragiles, adhuc omnia glutinosa, quaeq; adeo frangi contumacia sunt, ut deteis commoueant. insuper uitare oportet, quae dentibus stupefaciunt, perfrigida cuncta & putrida. Conducit itidem secundum cibum dentibus purgare.

QVOMODO GRAVIS AUDITVS  
corrigitur.

## Cap. XXX.



Da graue auditum corrigendū, uincit primū meatus per quos audiendi facultas est, sordibus expurgare: per interualla autem interum dropaci intinctum ipsis demittere, atq; expressum retrahere. summē enim meatus purgat, & simul auditū auribus reddit. Deinde aliquo erui instar inserto, meatū ad diē obturabis: postea ipso excepto, quotidie oleo amygdalino, aut nardino, aut chani melino, aut pinui anserino, cū exiguo fellis bubuli perūges. Rursus diebus aliquot interpositis sinapi & ficis contritis factū penicillū ad horas duas imponis, inde hoc exempto infundis oleū, quod in asphodeli radice succo deferbuerit.

## AD OCVLORVM CALIGINES.

## Cap. XXXI.



Ne caligine oculi corpiatur, quū in aquā frigidā te mergis, illos diu in eadē apertos esse cōueniet. hinc enim robur uisui adiciet. Lectiōe uerō nō te fatigabis, uino crasso & dulci abstinebis. similiter cibus qui in superiore uētriculo diu remorant, cōcoctu difficiles, & qui humores lētos crassosq; generāt: cuiusmodi sunt eruca, porrū, & omnia quorū acrimonia sursum efferet. Vitare itē oportet spinum incubitum diuturnū, frigus, uentos contrarios, fumū & puluerem. lam uero aquā oculis instillare quotidie ad mensem totum, iuuat. quae in



hunc modū pr̄paraf, f̄eniculū uiride f̄icili uafi extrinsecus picato, cum aqua c̄leſti demittit, deinde ex̄pt̄o f̄eniculo quod reliquū eſt repones.

## DE REPLETIONE.

## Cap. XXXII.

**R**urū nox̄ ciborū repletio cōciliat, quāuis probā in uētri-  
culo concoctionē ſortiti ſunt. Nā quū uenā nimīū repletā la-  
borāt, diſcēdunt, rūpuntur, obſtruunt & ſtatu implenſ, credi-  
bile admodū eſt, grauiffimas ex hac cauſa ægritudines procreari. Quum  
igit uētris urget repletio, interim uomitu quod redūdāt, interim per aluū  
excernit: in totū inualidior h̄c, ea eſt quā uenis accidit, nō tamē & ipſa ad  
mitti debet, ſed ſi quis impēdiō plura aſſumpſerit, ſtatim eū uomere oportet.  
periculū etenim eſt, ne obita cōcoctiōe uenę repleant: magiſq; ſi intē-  
perātius cibi cōtinuē aſſumptis, nullā deinde uacuationē experiat. uomī-  
tu igit ſolicitari debet prius q̄ cibi corrūpanſ. At ſi aliquid eū impediāt, al-  
uus ſoluta frequēter ſuccurrit. ſin minus illa fluxerit, certē diuī dormire &  
portui aquā calidā frequēter ſumere, conſiliū eſt. Vbi iā abunde cōcoxerit,  
pr̄ſertim aluo largiter fuſa, lauacris fomētisq; adiuuare, ſalſamētī parū ac-  
portionē dilutā exhibere oportet. At ſi neq; deſcēderit aluus neq; celeriter  
obita eſt cōcoctio, ſed corpus uniuerſum graue, ad motus pigrū, & ſomno  
lentū fuerit, mens pr̄ter rationē quodāmodo torpeſcat, uenarū repletio  
nē eſſe cognoſcas. Qui uerō pr̄ter h̄c laſſitudine premuntur, eos cōqui-  
eſcere dū uētriculo ingeſta concoquat, deinde laboribus inanire expedit.

## DE EBRIETATE.

## Cap. XXXIII.

**E**brietatem uomitus repente obortus diſcutit: item aquam &  
mulſam liberalius ſuperbibere uincit, atq; ſic uomere, uſque  
dum plurima reiecerint, ac ſtomachi uellicatus obrūdatur.  
à uomitu ſolum ingreſſi copioſe ungentur, reliquo tēpore conquieſcent,  
& accurate cooperti diutiſſime dormient, quouſq; temulēria diſcutiatur.

## QVIBVS CIBI CORRUMPVNTVR.

## Cap. XXXIII.

**I**bis in uētriculo uitiat, ſi quā corrupta ſunt deiiciunt, maxi-  
mū ad ſanitatē eſt compēdiū: ſin minus, iis q̄ leniter ſubducūt  
aluus irritāda eſt. Huiuſmodi aut̄ malo affectis uomitus ante  
cibū, uini paſſiq; potu excitatus, cōducit. Nihil pr̄terea uel ni-  
dorofum, uel graueolēs, uel in totū cibū corruptiōi opportunū aſſume-  
re ipſos cōſuluerim, ſed ea quā boni ſucci ſunt deligere. Iā per interualla tē-  
poris medioeria aluū ſubducere, ex iis quā mediocriter purgāt, ita affectis  
confert.

## DE VENERE.

## Cap. XXXV.

**V**eneris h̄c ſunt commoda: humores ſuperuacuos inanit, cor-  
pus agile pr̄ſtat, in augmentū promouet, & uirile magis ef-  
ficat. Quantum uerō ad animū ſpectat, impeditam intelligen-  
tiā uim diſſoluit, iratos mitigat, eoq; melancholicis coitus, ſi  
quid aliud, remediū eſt accommodatiſſimū: item alio modo inſaniētibus

integritatē sensuū restituit. Iā pituita redūdātibus uenus est utilissima: alii enim cibum respuētes, eius cupiditatē hinc recuperarūt: alii, continuis per somnū ueneris imaginibus liberati sūnt. Ceterū natura ueneri idonea est calida & humida, ut quæ reliquis salacior sit. Minimè uerò coitū excitat uictus qui siccāt refrigeratq; ætas senilis, tēpus autūnale. Quapropter uictus ratio humida calidaq; adhiberi debet, mediocritas & laborū & ciborū. Quemadmodū uerò moderari labores, ita etiā concubitus ipse medicis cōuenit. Nā & ad opus incitat, & facilitatē quandā cōsuetudini prębet. Requirit autē libido, si quid aliud, alimēti exuberantiā, eoq; cibi potissimū ualētis materiæ utiles sunt: ex piscibus autē polypodes, etenim præcipue ad uenerē incitare credūtur. his addūtur, molli cute præditi: ex oleribus autē, orminū, erysimū, eruca, & napi, quæ in medicamentorū uicē dātur: ex leguminib; p̄sunt, faba, cicer, erulia silique, & pisē, q̄ præter quod largiter corp⁹ alūt, flatibus replēt. Ruta igit quia flatus discutit abolerq; ideo etiā ueneris ardorē obrūdit. magnifice autē probo uuas ut quæ humectēt, & spiritu sanguinē repleāt, qui in uenerē proritat. Quū igitur cōcubiturus es, nimīā satietatē, cruditatē, lassitudinē, cauebis: itē ne uomitus, aut purgatio præcesserit similiter repentinū alui profluuiū, licet nonnunq̄ uenus diuturnū fluorē deficcat. At uehementis cōeundi cupiditates nō laudo, sed potius resistere eis consulo, præsertim iis quos morbus aliquis infestat. Saluberrimū igitur post exercitacionē, balneum moderatūq; cibū, uenerē exercere. ita enim uiribus conducit, & frigus obortū minus offender. Tempus autē concumbendi opportunum est, secūdum eibum, ut suprà dixi, antequām somnus inuadat. lassitudo siquidē ex coitu contracta obdormienti statim remittitur. Id uero tempus etiam liberis procreandis accommodum est, tum aliis de causis, tum quod mulier consopita, genituram facilius retinet.

AD EOS QVI VENEREM EXERCERE NE-  
queunt.

Cap. XXXVI.



Aturalia continue pingui ungentur, cui adiectum sit narcissi radices momentum, aut cocci gnidii, aut pyrethri, aut herba pediculariē, aut seminis urticę, aut uiticis. Portiones congruūt, ex pipere, aut satyrio, aut eruca, aut cnico, aut simul omnibus. elite contert ante cibū bulbos tostos, rubentes ac exiguos, cum sale & oleo, aut scillæ tabesactæ modicum: item compositis aduersus hoc uitium inscriptis remediis utendum est: item subinde lasciuia legere competit.

DE IIS QVI IMMODICE COIERINT. Cap. XXXVII.



Voniā ex immoderata uenere corpus rarius, frigidius, siccius, & imbecillius euadit, ratio est admouere quæ desent, calefaciant, humectent, cōfirmētq;. Qui igitur immodico concubitu exhausti sunt, uestimentis calidis operti conquiescent, somnoq; longiore, donec corporis contentio subfidat, reficiētur: atq; sic ab

ab imbecillitate sese uindicabunt.

SI SEMEN GENITALE REDVNDET. Cap. XXXVIII.

**N**onnulli semine copioso & calido collecto, in uenerē, prouēt: quod cū egresserint, corpus inualidū, stomachū resolutū oblenent, extenuant siccaturq; ob quā causam si rursus à cōcubitu abstinerint, capite grauatur, & ueluti ex repletioe cibum fastidiunt, deinde statim ueneris imaginibus obnoxii eodē modo afficiunt. Nihil igitur his quod semini augendo efficax est, sed potius & cibi & medicamenta quae id corrūpant, offerri debēt. à balneo renes oleo rosaceo, melino, & omphacino petūgere oportet. Satius autē est oleū eera addita, ne defluat, crassius efficere, miscereq; succū aliquem refrigerantē, nempe semperuiui, solani, cotyledonis & psyllii: ac horū quidē per astatē, reliquis autē anni temporibus, tum aliorum, tum lactucae succū: item lini semen quod aqua fuerit incoctū. nam hoc quoq; refrigerantē succum exhibet. Ad hęc lamina plumbea lumbis subiecta, ueneris insomnia cohibet. Iam herbe refrigerante ui prædita si cum ruta substernantur, & teneris uiticis surculis, idem præstant. Præterea semen + lini & rutæ in cibo sumptum. Cauendū uero est, ne lumbis uehementer refrigeratis, renes offendantur.

\* Orisafius  
uiticis.

SI PERFRICTIO NOCVIT. Cap. XXXIX.

**Q**ui frigori nimio patuerunt, locis calidioribus decumbēt, cyprino aut irino peruncti. postea ubi modice incaluerint, piper, myrrham cum uino dulci odorato & ueteri assumēt, aut liquorē cyreniacum cum uino uel aceto, aut pyrethrum castorium uel ex aceto: cibo autem calidiore recreandi sunt.

**S**i insolatus aduēssit. Cap. XL.  
Iqui uero exusti in sole sunt, his locis aëri expositis decubendum est, perfundēdaq; frigida, facies, manus & crura: si siti cōficiuntur, frigida aquam qui assuerūt, bibēt. atq; hæc pro ratione, & non uniuersim facere expedit. cibum assumēt exiguum, qui facile in membra distribuatur, humidiores potius quā densiores.

DE PITUITA IN SUPERIORE VENTRICULO REDUNDANTE.

Cap. XLI.

**Q**uod si in aliquem interdum incidas qui cibos ualētis materiæ aqueretur fastidiatq; admodū, & si assumere compellas, nausea afficiatur, sola uero acria appetat, neq; iis quidē oblectetur, sed uētris inflationē nauseamq; sentiat, ac paululum ructibus solis leuetur, interim uero & ipsi cibi quos assumpsit, præsertim in acorem conuersi, uidentur, omnino intelligendum tibi uenit summam curationis existere, ut pituitam à uentriculo abstergas. Ego quandoq; ita affectum noui, qui radiculis ex oxymelite sumptis, incredibili crassioris pituitæ copia uomitu egesta, integræ statim sanitati restitutus sit.

videt 66.7. pag. 426.  
quod uenit p. 66.7.



QUOMODO FACILE QVIS VOMAT. Cap. XLII:

Voniam laboriose uomētibus multa solent absurda superuenire commodū fuerit quomodo quis facile uomat, exponere. Etenim uomitus pituitā inanit, caput leuat, & ne qui auidius nonnunq̃ cibū ingesserint cruditate laborēt, uinoq̃: liberalius sumptus offendant, prohibet. At quæ offerētur, neq; acerba neq; sicca erūt, sed partim dulciora quodāmodo humidioraq̃, partim aciora. Cōmendatur ad hanc radícula, eruca, salfamētum uetus, origanū uiride, cepæ momentū & porri. Promouet uomitus etiā ex leguminibus ptisana cui mel additū sit, lomentū, carniū pinguiā. uerū nō solū iura ipsarū, sed ipsas quoq; integras deglutire oportet, eoq; uomiturus non diu mādēdis ipsis immorabit. oīa uero per coctionē mollia flaccidaq̃: erūt. lā cōstat, uina dulciora deligē oportere, ut quæ in stomacho magis supernatēt, atq; eā potionē egelidā assumi. Cōfert etiā amygdalas melli intinctas comedere, ac placētus gustare: itē peponis & cucumeris semē maceratū detritumq̃: cū melle assumere, radicemq; cucumeris contritā ex melle. At qui ualētoribus uti uolunt, narcissi bulbo aquæ incocto, uinū tēperant. Mouet autē uomitiones irinum quoq; unguentū, si digitis eo perunctis, irrites. Porro uomētis interest, ne cesset uel intermittat, usq; dum oīa eiecerit: à uomitu os colluat, faciemq; posca aut aqua abstergat. id nanq; dentibus conducit, & caput releuat.

QVAE SANIS ALVVM SVBDVCANT, ET

quæ urinam moueant.

Cap. XLIII.



Eterum nōnullis satis esse ad secundā uoletudinē tuendā uisum est, si alius quotidie & urina pro ingestorū copia, sine uirio & abūde responderet, ac quū uacuatio iuxta proportionē accidebat, cōmendabāt: sin minus, promouebāt urinā quidē scādice, apio, asparago, petroselino, aniso, nepita, origano, absinthio, graminis carduiq; radice, cytiso, adiantho, omnibus in aqua elixis, quorū decoctū cū uino potui exhibebāt. hęc enim per urinā sanguinē repurgāt, unde nō parū utilitatis percipit. Aluū adiuuabāt terebinthina, ex qua oliuæ magnitudinē dormituris deglutiendā offerebāt. At quū acrius subducere eam cogitamus, rheu momentū admiscebimus. Accōmodata deiectioni sunt, oua forbilis: ex oleribus, beta, malua: itē cochlearū ius. atq; hanc forte abūde erūt. Efficacior est herba Mercurialis, in aqua cū sale elixa comestaq̃: eiusq; decoctū potui datū: similiter folia sambuci. idē pręstat polypodii radix duobus denariis salfamēto inspersa, aut etiā in ptisana sorpta. ad hanc serum lactis cū sale aut melle, ad treis heminas quatuor uel assumptū: ueteris quoq; gallinacei ius, tū per se, tū cū cnici denariis duobus. nonnunq̃ & aloē triū cicerū instar secundū cœnā recte assumit. Pręstantissimū uero est epithymum in uino post mediocrem cœnam potum: qui acrius uacuare desideret, mane epithymi drachmam ex oxymelite, uerno tempore ebibat.

## DE CLYSTERIBVS.

## Cap. XLIII.



N quibus ueter ægre descendit, & stomachus imbecillis medicamēta ad subducendū efficacia nō sustinet, clysteribus utendum est, quū pituita quidē in intestino residet, iis quæ fuit decocto caricarū, betæ, nitri, syluestris cucumeris radice, melle, oleo chamæmelino, aut anethino: quū siccitas magis urget, iis quæ cōstāt althæa, scēnugræco, chamæmelis, oleo, mellis exiguō. interim etiā oleū per se dimidiæ hemina mēsurā iniectum, abunde proficit. nō tamē continue id faciendū est, ne natura his irritata, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

## DE GLANDIBVS.

## Cap. XLV.



Timur etiā glandibus subinde stercoris excernēdi gratia, & in quibus id quod per clysterē indirū est, nō egeritur. Finguntur autē glandes ex sale tosto, melle, & nitro: itē thymus discocto melli additur. Fiunt etiā ex resina terebinthina, & nitro: interdū & cocco gndio modico. Sed quia uellicatus mouet, parteis ipsas oleo delinere conuenit. præterea pyrethrum aut piper admiscetur, conuenitq; resolutionem expertis, & iis qui ex perfrictione inflationes cōtraxerunt. Insuper centaurium pici & ceræ admiscetur, ac naturaliū resolutionibus aptum est præsidium. Infantibus autem etiam salis grumus imponitur. Fit quoq; glans ex ficibus cum nitro ꝛ aut ex uua passa, nitro & cumino. ꝛ

*L. infra-  
tum ex Ori-  
basio.*

DE IIS QVÆ PER OS CAPVT PURGANT, APOPHLEGMATISMI uocantur, & quæ per nareis, unguentisq;.

## Cap. XLVI.



Vmores in capite residētes per sputa uacuamus, quod si leuiter facere uouerimus, piper cum mastiche temperabimus: si acrius uacuare libet, pyrethrū aut herbā pediculariam mādi præcipiemus. Item anemonæ utriusq; radix māsa pituitā pro uocat, capparidisq; radice cortex atq; huiusmodi remedia serosum extremērum uacuāt: crassam uero lentamq; pituitam, sinapi cum oxymelite gargarizatum, aut sapa in qua organū, aut hyssopū sit incoctū. Ego autē eam sinapi ex oxymelite admisceo. At si cerebrū mucō purgari desideret, acribus eum remediis, quorū nonnulla etiā sternutamenta mouent, euocabimus. Itaq; anagallidis utriusq; & anemonæ cuiusuis, & betæ, succus per nareis purgat: item cucumeris syluestris foliorū succus naribus ipse & per se & cum betarū decocto succo ue infunditur. sternutamētum uero crudis humoribus qui in thorace, pulmone & capite cōtinentur, non expedit. os autē eiusmodi illineſ unguento, quod recipit sinapi cum betæ succo: eoq; palatum & columellam illinito. idē etiā per nareis purgat. Iam melā thio quod facile paratur, ad narium illitionem subinde usus sum, interim aceto acri pridie macerās, deinde post die cum aceto rursus læuigans infundensq; naribus. Nonnunquam oleo ueteri idē melanthiū detritum, similiter illeui. Ita & Archigenes eo usus est, quum narium foramina ob-

struerentur: priori autem ex aceto, Criton in morbo regio uti solebat.

QVAE MENSEIS DVCVNT. Cap. XLVII.



Væcunq; urinæ ciēdæ sunt, eadē oīa mēseis dicūt, nēpe brassicæ radicis decoctū potum, Perficæ radix, ruta, chrysanthemum, dictamnū & erucę semen: itē quę ori uulvę apponunt, mēseis cōmouent, ut ruta cū melle trita, aut porri succus, aut alliū tritū appositū, aut myrrha cū uino lēuigata, aut leporis coagulum.

QVAE SVDOREM MOVENT. Cap. XLVIII.



Vdorem eliciunt chamæmelū aridū tritumq; & oleo inspersum, si summæ cuti ualide infricet: fefeli, pyrethrū, cachry, anisum, similiter oleo inspersa. itē nitrū tostū nō nimis tenue, cū oleo efficax est: ad hæc salis flos oleo tēperatus, & liquor cyrenaicus aqua dilutus corpori infricatus epotusq; ciceris magnitudine. Pari mō nepita & pota cū mulsa, & extrinsecus cū oleo infricata proficit.

DE AERE. Cap. XLIX.



Audatissimus aer est, qui exacte purus: is autē nimirū erit qui nō ex stagnorū, aut paludū uapore exurgit, neq; ex barathro quodam pestilentē auram exhalante provenit: ita qui ex cloaca magnam ciuitatē purgante eructat, uitiosus est. Quinetiā nebulosus si militer sanitati nō facit, quemadmodū etiā qui in cōualli altis undiq; montibus contentus, nullā auram recipit. Hoc igitur modo uitiosus aer omni ex æquo ætati nocet, omniq; tēperaturę: sicut optimus prodest. At qua lita te uarians aer, calore dico, frigiditate, siccitate, & humiditate non similiter uniuersos afficit. Etenim temperatis corporibus aer temperatus utilis: in temperatis, qui contrariam temperiem habuerit confert.

DE AQVIS. Cap. L.



Quarum præterea & uirtutes & uitia cognita habere expedit, ut quæ in omnē ferē usum magisq; ad quālibet uictus rationē requiratur. Ea igitur prima aqua cēsenda est, quæ nullā aut gustu, aut odore qualitātē repræsentat, sed protin<sup>9</sup> bibēti suauius est, & uisu pura limpidaq; quū etiā à præcordiis statim descēdit, melior alia quærēda nō est. Nā quæ in præcordiis residet diutius, uentriculū ferit, inflat, grauaturq; uitiosa censebit, huiusmodi aqua neq; cito calefit neq; refrigerat, sed quæ in ipsa elixatur, tardissime peiusq; decoquunt. Præstat itaq; talē aquā experimēto discernete. Qui uero notis quoq; eā uolet agnosce-  
re, iis quæ dicent attendat. quæ enim ad septentrionē spectat, à sole auersa, tarde permeat, & indormita late calefit & refrigerat, quæ aut ad orientem per uenas quasdā terræ prorūpens, citissime calefit, iterūq; refrigerat protinus, hæc optimā esse sperandū est. Probat itē quæ æstate frigidior, hyeme calidior est. Nōnulli & pōdere aquā examināt, leuē præstare credētes, hoc igitur si aliis à me cōmemoratis accedit, cōmendatur, uerum sola hæc bonæ

aquæ nota non sufficit, quæ imbrü aqua auctore Hippocrate leuissima sit, dulcissima, limpidissima, tenuissimaque, eò quòd sol leuissimum & tenuissimū attahat, ac id nō ex alia aqua solū, uerū ex mari quoque & corporibus: quapropter etiā omniū promptissime cōputrescit, ceu diuersis ex qualitatibus conflata. Nemo autē aquam putrefactioni opportunā deterrimam esse existimet. nam mutationis facilitas uirtuti potius, quā uitio tribuit. **Que** igitur aqua optimæ notas habet, si prompte etiā putrescat, ea cēsebitur saluberrima, et si quū mutari incipit, occasione rauedinis, rufficulæ, & graui 5 ratis uocis, præbeat. At inter imbrü aquas, æstiuæ quæ tonitru decidit, præstantior est, quæ nimbis demissa est. Ex glacie & niuibz aqua, insaluberrima est. Nam ea congelascente, tota pars tenuior exprimit. Porro limosam fœdiq; odoris & absurdas respicientem qualitates, recte decoques, atque ita meliorē redditā potui dabis uino tēperatam: si astringit, dulciori: aliā uero, acetbiori. Nōnullas percolare expedit, nempe limosas, salvas, & bitu 10 men referētes. Cæterū frigida uehementer aqua à cibo assumi debet, nō tamen uniueris emulatiq; Non desunt qui cibos & potiones aduersus aquatū uitia inuenerint: ac alii eicrū decoctiones præbunt, uel eadē quoque edūt: alii caualidē similiter cū pisciculo quodā elixā, itē fœniculū: reliqui betā & cueurbitā sale conspersam cum uino dilutiore præsumunt.

Wid. T. com. 4<sup>ta</sup> cap. 11. 12.  
2<sup>da</sup> Anim. pag. 318.

## DE LAVACRIS.

## Cap. LI.



Quæ frigida lauationem ita quidē laudo, ut non iis qui nullo uictus defectu agunt, ex usu esse dicā, uerum solis illis qui eodē accurato, laboribus, & cibis sicut expedit, utunt. Porro uulgaribus qui amplius interdū refrigerari desiderāt, abunde est 15 natare per æstatē, si iuuenes sint, carnosi & frictiōibus ante excelsati. Sint autē qui aquam ingrediuntur, neque uenere, neque alio quodā modo lassī, neque cruditatē sentiant, neque uomitu, aut aluo inaniti, neque uigiliis defatigati. Periculosum enim si quis ita affectus frigide lauacro utatur. Calidū uero balneū & optimū & tutissimū est: lassitudinē soluit, humorū repletionem per halitum digerit: item excalfacit, mitigat, emollit, flatu ubicunq; decu 30 buerint diffundit, somnum conciliat, carne replet. Est autem aptissimum omnibus, & uiro & mulieri, & puero & seni, & priuato.



## DE LAVACRIS NATURALIBVS. Cap. LII.

15 **N**aturalium balnearū alia nitrū, alia salē, alia alumen, alia sulfur, alia bitumē, alia æs, alia ferrū repræsentant: nōnulla composita ex his omnibus repertiuntur. Itaque aquarū sponte prouenientium uis est quæ desiccet & calefaciat ampliter, ac humidis frigidisq; maxime conducunt. Iam uero quæ nitrū & salem obtinēt, capiti, thoraci fluxione tētato, stomacho humentiori, aquæ inter cutē, tumoribus laxis 40 qui ex morbis proueniūt, & pituitosis sunt accommodatæ. Alumina fan-  
guinis reiectioni, stomacho uomitioni opportuno, immoderatis mulierum



purgatiōibus, cōtinuisq; abortibus, utiles existūt. Sulfurosa neruos emolliūt, calefaciūtq; & dolores mitigāt, stomachū uero eneruāt euertūtq;. Bituminosa caput replēt, instrumēta sensibus distribuēdis dicata, offendūt: si autē quis diu immoret, calefaciūt, & temporis processu emolliunt. Quae aeris naturā occupāt, ori, tōsillis, uux & oculis praecipue cōferūt. Ferri uirtutē sortit̃, stomacho & lieni sunt utiles. Oporteret autē in aquā sine tumultu & lentē descendere, quō uirtus corpori relaxato accedēs immergatur.

QVAE VICTVS RATIO QVOLIBET ANNI

tempore sit utilis.

Cap. LIII.



On alienū est, pro singulis quoq; anni tēporibus uictū instituer. Ac hyeme quidē pluribus uti laboribus, plus esse cōuenit, praesertim diebus aquiloniis. Nā austrinis laborare quidē similiter, sed minus cibi & potus assumere oportet. Sūmatim humido tepore corpus omnino siccū reddere, quemadmodū in frigido, calidius: carnes calidas comedere & olera, largius bibere oportet. Ac uere iam incūte, alius uomitu, alius per aluū euacuari debet, alius sanguinis de missione, prout cuiusq; cōsuetudo & uolūtas fuerit. Per aestatē à laboribus cōquiescendū, ciboq; demendū est, qui recte frigidioris erit naturae: portione largiore urendū, ac oīa fieri debēt, quae ad refrigerationē humiditatēq; conferunt. At in autūno, quoniā prorsus inaequalis inordinatusq; est, & omnigenos morbos inuehit, magna uictus habēda sollicitudo est: frigus uitare, cōcubitu & frigida potu abstinere expedit. itē frigidus aurorae aer, meridianusq; ardor recte cauebit. fugaces fructus affatim assumere noxium est, ut qui nō copia tantū ob sint, uerumetiā uitiosos procreēt humores, & inflationes. Etenim praestātissimi inter ipsos, nēpe ficus & uux, status pariūt corrūpūtq; cibos, nisi ante alios praesumant: ita uero neq; inflāt neq; corrūpūt. Vbi aer frigidior euadit, corpus pro frigoris ratione calefacere, oīaq; peragere oportet, ceu hyeme aduentāte. Nihil mali autem fuerit post æquinoctiū uacuationē ex commemoratorum aliquo tentare, ne ali quid superfluum in corpore retentum, hyeme facessat negotium.

VICTVS LABORIOSAM VITAM AGENTIVM. Cap. LIIII.



I quis in laboribus uitā trāfigit, considerandū est, prius ne is exerceri cōsueuerit, an minus: nūc autē exercitio se cōmittēs, mediocriter ferat, ita ut nō morbo implicet cōtinue, facilitate praeditus meatuū, per quos humores noxii euaporāt. eiusmodi enim corporis naturā ad aliā consuetudinē traducere nō oportet. imō nec eius quod ex lōgiore tēporis interuallo ægrotat. At si assidue quis morbo cōflictari uideat, idq; ex humorū redundātia, eō per totā salubrem uictus rationem, cōsiliū diriges, ut humorū mediocris sit copia: sin ob eorum uitia, ut optimos efficias. Qui igitur succis ex æquo redundantibus scatent, in balneum deduci, deinde frictionē adhibere, & paululum dimo-

ueri prius debent. Qui uerò eiusmodi facere antea sunt aggressi, iis hæc paululum augere, cibo detrahere, cumq; imbecillis materiæ ingerere consulemus. At qui prauos humores colligunt, non uno consilio tractantur, quoniam neq; una uitiosi humoris species est. Nonnulli siquidem frigidiorem magisq; pituitosam colligunt, alii calidiorem biliosioremq; quæ admodum alii atræ bilis congeriem magis accumulunt. Quapropter singuli, cibo potuq; abstinebunt, quæ collectam ipsis humorum coluuiæ solent generare. In omnibus aut his commune est præsidium alui subductio.

PROFICISCENTIVM VICTVS RATIO. Cap. LV.

**A** cillimè quis fatigationē ex itinere uitabit, si inuētus sit, & nō fortiter incedat. Præterea ad proficiscēdi facultatē conducit per æstatē fascia mollis digitos sex, aut septē lata, quinq; autē eubitos nō minus oblōga, lūbos ad ilia usq; cōplexa. Itē baculus ad iter utilis habet. etenim per decliuiā præmissus, corpus quod præceps ruit, ceu cōto cuidā innixū retinet. quū ascendendū est, ipsi innitentes facilius in accliuiā corpus promouemus. Porro cū in itinere cessamus, unctio & pauxillū cibi ex fructibus qui æstate proueniūt, portioq; modica eotēpore cōuenit: à prædio anteq̃ iter arripiamus, cōquiescendū est. Si uerò necessitas abeūdi fuerit, & sitis urgeat, tenuis polēta ex aqua cū salis momēto bibet. æstus ardorq; solis cauēri debet, cui nec corpus nudū exponere sed contactū esse oportet, ne ex itinere siccescēs indurescat. Hac enim ratioe, & minus lassat, & nullū ex prædictis affectibus similiter percipit. Hyeme quū frigus urit, anteq̃ itineri te accingas, uētre subducto & unctioe adhibita hycmaleis cibos eopiose assumes, portionē modicā. Cæterū faseia lōgio re nō solū lūbos sed spinā quoq; & pectus recte inuolues. Requiescēti aut, si interea uehemēs frigus urat, neq; ungi, neq; cibū potū ue assumere præstat. neq; alio quodā modo refici debes, si inibi mansurus es. At secundū lōgas profectiōes, aliosq; ualidos labores, et si lassitudinem quis non sentiat, non aliter q̃ lassus curabitur. minus enim sic periculis erit opportunus.

NAVIGANTIVM VICTVS. Cap. LVI.

**V**omitionibus quibus nauigantes premuntur, primum oborietibus nec facile, nec utiliter suecurrimus: ut quæ omnino magna ex parte præsidio esse soleant. A uomitu autē cibi non copiosi, nec quilibet offeri debent, sed aut lenticula uti sicca, decocta q; cui pulegii modicū sit adiectum, aut panē ex uino dilutiore & odoro maceratū ingerere oportet: portio utilis est modica, ea q; uel ex uino prorsus aquoso, uel aceto mulso. Lenticulā incoqui dum emollefeat, cōueniet, mox in tenuem puluerē redigere, inde siccare, postea in uas fictile cōdere. At si diutius crebriusq; uomitus urgeat, cibo uehementiore, quod superimatur utendū est, eademq; portione modica, uel aceto mulso cū aqua, in quo thymum aut pulegium commaduerit: item aqua cum polēta, aut

uino odorato cū polēta diluta similiter recreatio tentabit. Ad graueis aut nauīū odores, aut mala cotonea naribus admouent, aut thymus, aut pulegiū. Mare nequaquā aspiciendum est, usq; dum in nauibus uersari assuescas. Aquis porrō cura adhibenda est, ne turbida, fœdi odoris, ac falsæ existant.

QVOMODO EXTENVETVR CORPVS. Cap. LVII.

**Q**Vū immodice corpus plenū est, extenuare id atq; imminuere oportet. Quia ergo calidior tēperatura gracile corpus reddere demonstrata est, crassius eā, si mediocres reddere uouerimus, inducemus. Didicisti aut uehementēs exercitatiōes, uictū extenuantē, similiaq; medicamēta, & animi curas, temperamentū siccius, eoq; corpus gracilius efficere. Quæ igit uictus ratio extenuet, nulli nō cognita est: medicamēta uerō acriora hæc sunt, rutæ semē, p̄sertim syluestris, cū ipsis corymbis, aristolochia rotūda, tenue cētauriū, gētiana, poliū quēq; ad urinā ciendā ualētiora sunt, nēpe petroselinū: singula nāq; hæc & per se & cū aliis omnia, humores abūde extenuāt, inaniūtq; corpus. Quinctiā sales ex crematis uiperis largiter extenuare solēt: ipsaq; theriace digerit extenuatq;. Itē oleū cui radix tyuatīci cucumeris, hibisci, gētianæ, panacis, & aristolochiæ sit incocta si illinat, idē p̄stat: sic poliū & cētauriū. At cib⁹ nō statim à balneo dari debet, sed prius somnus est incidēdus. Præstaret etiā aquā balnei ex iis esse quæ digerāt, modo spōre sua scaturientē habeamus, qualis est Mirylenæ: sin minus, salis florē aquæ marinæ cōmiscēbimus. uino utemur tenui & albo. Cæterū frictio sicca linteis crassioribus durisq; adhibita, idē abūde efficit. Adhæc oportet cibo magis q̄ exercitia requirunt, derrahere. Iuuat itidē plenos sol inurēs: nec minus prodest, sine potiōe semel dūtatar die cibū assumere. itē corp⁹ nitro & sale asperiore infricare. In balneis copiosum nitrū extenuat, paucū, probā corporis nutritionē excitat. Postremò extenuat & medicamentum, quod recipit, piperis & petroselini duas portiones, asari & anisi dimidiam. Hoc & urinæ & aluo promouendæ efficax est.

QVOMODO TENVES IMPLEANTVR. Cap. LVIII.



Vū tennes implere uolumus uinū crassum, cibis crassi succi, exercitatio modica ac lēta, frictio mediocris, & ut summatim dicam, omnia prædictis contraria expediunt. Commodū est iisdem & pice, diebus tribus quatuor uel interpositis, oblini. Si ieiunus aliquis lauetur, ante balneum linteis corpus donec rubescat, infricari debet, tum frictione dura non tamen multa cutem obstruere, quò dēsa duraq; euadat. Expedi igitur iis qui pallido sunt colore præditi, nec alimentum sentiunt, ab iracundia abstinere, & animi commotionibus.



DE PARTIVM ATTENVTARUM CURATIōE. Ca. LIX.  
Xtenuantur plerumq; partes, uel diuturna ipsarum quiere, uel deligaturæ modo qua contracta fasciant. Itaq; uirtus partibus extenuatæ firmari, sanguisq; ad eas elici debet copiosus,

frictione moderata, aptoq; motu, & calentis aquæ mediocris superfusiōe. Hæc sanè tantisper faciendæ sunt, dum rubescens corpus attollatur. cessan-  
dum uerò prius quàm collabatur. Iam & picationem tali parti, ut dictum  
est, adhibere congruit. Quum autem frigidiorē partē senseris, linteis  
5 ipsam confricare, ac calefacienti quodam medicamine oportet. Vtusum  
aliquando & thapsia, nunc cum melle, nunc cum ceraro illinens.

## OPTIMI TEMPERAMENTI NOTAE. Cap. LX.

**P** Emperatissimus homo est, cuius corporis compositio omni-  
um extremorū exacte mediū occupat, nempe gracilitatis, cras-  
situdinis, mollitudinis, duritiæ, caloris, frigiditatis, humiditatis, &  
siccitatis: in uniuersum naturæ ac animi functiones habet in-  
culpata: mediū quoq; est glabri & hirsuti, nigri & albi: pilos in puericia ru-  
fos magis quàm nigros habet: in uigore, e contrario.

## INTEMPERATORVM CORPORVM NOTAE. Cap. LXI.

**C** Orpora moderato calidiora citius dentiūt, in crescūt similiter:  
rangētibz autem calidiora, minusq; pingua apparēt: colore  
sunt rubido, pilis nigris, mediocriter hispidis, & latis uenis. At  
si quis simul & pinguis & crassus latiores uenas habeat, is ob  
consuetudinē, nō natura pinguis euasit. Frigidioris tēperaturæ nota est, si  
ad tactū frigidius apparet corpus, glabrūq; sit & pingue, color unā cū ca-  
pillis rufus, si multa inest frigiditas, liuēs quodāmodo & plūbeus, uenæ an-  
gustiores: si gracilis est eo tēperamento præditus, neq; is necessario talis,  
sed ex consuetudine factus est. Arida aut tēperies durior est graciliorq; tē-  
perata, atq; hirsuta. durities igit à sicca tēperie omnino separari nequit, gra-  
cilitas aut nō modo naturalis tēperaturas, sed etiā ex lōga cōsuetudine ac-  
quisitas comitat. Indiciū siccitatis est, si corpus ægte mouet, siccū, & squa-  
lidū à siccantibus euadat. Humida intēperies cætera quidē temperatæ si-  
milis est, sed mollior corpulentiorq; ac huius nota inseparabilis est, mol-  
lities, quemadmodū & crassitudo, quæ nō in sitū modō temperamenrū, sed  
ex longa quadā consuetudine abortū quoq; comitatur. Peculiare uerò hu-  
miditatis signū est, corpus ex humidioribus grauati. Calidam siccāmq; tē-  
periem testantur, corpus maxime hirsutū facilis pilorum capitis prouen-  
tus, iūq; nigri, & per iuuentutem copiosi: processu temporis caluitium se-  
quitur, uenæ latæ sunt, sicuti & arteriæ grandes, simulq; uehementissime  
pulsant. præterea totum corpus ualidum, articulatū, musculosum, pin-  
guedinis expers apparet, cutis dura & nigrior. Frigidam humidāmq; tem-  
peraturam testatur thorax angustus, totūq; corpus strictum & glabrū,  
cutis tenera & alba, capilli subrubi, præsertim in iuuentute, hæc præditi nō  
caluescunt, uerum statim timidi, pusillanimes, pigri, uenis latentibus, cras-  
si pinguesque, & femoribus & musculis indistincti, inarticulati, bleſiq; ma-  
gna pate fiunt. At si humiditas frigiditasque magis fuerit adaucta, color



unà cū pilis rufus uidet: si plurimū increuerit, liuefcit. Porro calidū ac humidū tēperamentū mollius carnosiusq; optima tēperie exiftit: auctū ampliffime, putridis affectibus opportunū est. Quum aut paulo humidius, multo calidius est, eo donati molliores paulo corpulētioreſq; tēperatis exiftunt, hispidiores multo, ad tactū calidiores apparent. At si frigiditas pariter cū liccitate ex æquo augefcit, corpus erit durū, gracile, albū, nō muculoſum nec articulātū, pilisq; uacuū, tangentibus frigidū deprehēditur: pinguedo tamen, graciles licet eiufmodi exiftant, carni inſperſa est, color aut capilloꝝ frigiditati reſpondet. Quod ad animi mores pertinet, puſillanimes, timidos & triſtes eiufmodi tēperamentū efficit. Ac, ut ſemel expēdiam, in coniugaris temperaturis ſemper euincentis qualitatibus notari ſolent.

DE CAPITIS FORMATIONE. Cap. LXII.




Xiguum ſanè caput prauam cerebri ſtructurā proprie notat: magnum uerò non neceſſario bonam teſtatur. Si nanq; tale inſit uirtutis materiā probam multamq; ſuppeditātis robore factum eſt, bonū indicium: ſin ex ſolius materiæ copia, non item. Verum diſtinguere ea conuenit figura, & iis quæ inde prouenerint. Figura quidem, ſi omnibus numeris abſoluta, hæc enim ſemper bona eſt conſtructio: iis quæ inde proueniunt, num optimè ſint affecta, ac ſi neruea ipſi pars integra, bene habita, ualens, ſiq; oculi acriter cernūt. In acutum ſaſtigiata capita, deficientem in fronte uel occipite habent eminētiā, aut magis quā decens eſt, auctam. Quemadmodum igitur paruī tatem, ita has quoq; uiruperamus figuras, quarum nonnullæ, quamuis raro, bonæ ſunt, quum formans ſcilicet uis haud inualida fuerit.

TEMPERATVRÆ CEREBRI NOTAE. Cap. LXIII.



Erebrū temperatū mediocritate animi functionū & recremētorū conſtat, minimeq; ab omnibus exteris offendi. Taliū pilī capitis in infantia ſubrui, pueritia ſubſtāui apparēt: ubi adoleuerint ſtāueſcūt, atq; mediū exacte inter criſpos ac ſimplices habent, nec facile calueſcūt. Si uero calidius tēperato exiterit, omnia quæ circa caput exiſtūt, & calidiora, & rubicūdiora apparēt, oculorū uenæ prominēt, capilli his in lucē æditis protinus oriunt. His aut qui multo ſunt calidiores, nigri, ualidi, & criſpi: qui nō multo, iis ſtāui primū, deinde nigri proueniūt, procedēte ætate calueſcūt, interim his recremēta ſunt exigua & inculparata fruunt ualitudine: capite uero à calefaciētibus cibis, potu, odoribus & foris antecedētibus implētur grauāturq; modicus formus in huiusmodi tēperaturis ſufficit, neq; iſ profundus admodū. Frigidius ac conuenit cerebrū fatent, excremēta copioſiora per meatus ei peculiareis manantia, capilli recti, rui, firmi, & facile à frigidioribus cauſis lædunt, deſtillatiōibus & grauēdinibus cōtinuè inſeſtant, oculorū uenæ latent, ſomno maxi-

mè premūtur. Siccioris cerebri nota est, si nihil extremēti emanat, sensuū  
 acrimonia, uigilia, capilli sunt robustissimi, statim ab ortu, ac iis crispi ma  
 gis, uerū ex facili caluēt. Humidioris aut, capilli simplices plani q̄; & nequa  
 q̄ caluitiū experiunt, sensus turbulēti, extremētorū copia, somnus multus  
 5 & profundus. Calido & sicco cerebro præditi, recemētis carēt, exactos sen  
 sus obrinēt, uigilātissimi sunt, facile caluēt, primū uerō capilli celerrime i  
 psis proueniūt. & plenissimi, nigri, calidi ad tactū capitis, rubri q̄; usq; ad uī  
 gorē apparēt. At si calori humiditas accesserit, ita ut utraq; paululū exce  
 dāt mediocritatē, colorati calidi q̄; sunt, uenē oculos, grādes, extremēta ple  
 10 niora, mediocriter cōcocta, capilli recti, subflauī, caluitiū haud facile expe  
 riunt, uerū caput calefacientibus humectantibus q̄; impletur grauatur q̄;  
 Vbi uero utraq; increuerit qualitas, caput morbidum euadit, facile que ex  
 calidis & humectantibus noxam contrahit. eiusmodi temperamēto præ  
 15 diti, uigilare diu nequeunt, dormientes aut imaginibus per insomnia tor  
 quentur, oculi caligant, non exacte sentiunt. Frigida uero simul & sicca tē  
 peramenta cerebri, frigidum pallidū q̄; caput efficiunt, oculorū uenē non  
 extant, à frigidis cibis similiter offenduntur, eo q̄; inæquali uoletudine fru  
 untur, sensibus per adolescentiam exactis inculpatis q̄; processu temporis  
 subito contabescunt: summatim omnes capitis partes cito consenescent,  
 20 capilli à natali die uix erumpunt, exorti non aluntur, rufescunt q̄; Humi  
 dum frigidum q̄; temperamentum cerebri, reddit soporosos, somnolen  
 tos, sensibus uiciosos, excrementicios, frigori opportunos, capitis repletio  
 ni, destillationi, grauedini obnoxios, non tamen hi caluitiū experiuntur.  
 VENTRICULI TEMPERATURAE NOTAE. Cap. LXIII.

25  Entriculi natura siccioris indicium est, si confestim eo donati si  
 tiant, modico contenti potu, largiore grauentur, fluctuatiōibus  
 affligantur, eo quod redundat in uentriculo supernatāre, cibus q̄;  
 delectentur siccioribus. Humidiorē norant, si nulla sitis urget, & largior hu  
 mor non molestat, cibi q̄; placent humidiores. Calidior natura uentriculi  
 30 melius sane cōcoquit q̄; appetat, & dura potius, quæ q̄; difficulter possint im  
 mutari, copia ciborū potus q̄; oblectatur, neq; à frigidis, modice usa, quicq̄  
 incommodi percipit. Frigidior, appetendo quidem ualeat, cōcoquendo mi  
 nus, præsertim si contumacia frigida q̄; alimenta assumpserit, quæ facile in  
 eo accescunt, frigidis quidem gaudet, sed immoderatus assumptis proptē  
 35 offenditur. At intēperies ex morbo contracta hac ratione ab insitis diffe  
 runt, quod contraria sibi non similia appetant. Si igitur uenter probe con  
 coctionē obit, temperatus: si non concoquit, intemperatus est. Item si ni  
 dorosos adat rufus, immodicum etiam feruorem igneum fatetur: si aci  
 dos contrariū. Rursus si rebelles concoctioni cibos conficiat, immodicū: si  
 40 pisces concoquat, illos minus imbecillē. quod num ex humore quodā ali  
 unde influente accadat, considerare oportet. Etenim pituitosi, acidū: bilio

si nidrorosum, graueolēs, aliasq; extraneas qualitates ructāt. Cōmunitcr aut utriq; nausea superuenit. uerum si uirioī humores in cōcauo uētriculi spatio supernatent, uomitu reiciūtur. qui aut corpore uētriculi contēti, tunicis eius adhārescūt, frustra ob inanē ad uomitū nausēā conturbant.

## PVL MONIS NOTAE.

Cap. LXV.

**N**on modo uētricus sitim, uel adfert, uel ardet, ac frigida calidāq; pononis appetentiā, sed etiā quā in thorace continent uiscera, cor, pulmo, & iecur. Itaq; calida pulmonū tēperatura prēditi si bibent, nō statim sitire desinūt, ac frigida potio magis q̄ calida admodū sitim ipsorū restinguit: frigidus aut aer inspiratus refocillat, quū nihil uētriculi uitio sitibūdos solet. Hac ratiōe qui ecōtrario affectū sunt, à frigido inspiratu sensibīlē molestiā percipiunt, quod maximū pulmonū frigiditatis indicium est, adeoq; pituitā sercatu cū tussi reiciūt. Sicci aut pulmones excrementis carent, & pituita, quemadmodū humidi, excrementiū obscuram raucamq; uocem efficiunt: ac inde multa recrementa per os egeruntur, ubi aut uehementius, aut acutius quis loqui studuerit.

## CORDIS NOTAE.

Cap. LXVI.

**C**ordis calidioris notae sunt, respiratio magna, pulsus uelox & creber, interim audacia, furiosaq; ferocitas: thorax tali prēditis hirsutus, praesertim ad pectus existit, ac ea quae praecordia diis propinqua sunt: magna ex parte totū quoq; corp⁹ calidū, nisi iecur ualide renitat. Etenim thoracis latitudo calorē notat, praeterq; si & hic cerebrū ualde resistat. Porro cor frigidius, pulsus mediocri minor ostēdit, ac qui tale habēt, timidi natura sunt & pusillanimes, praecipue si pectus ipsis sit glabrū. Cor siccius pulsus edit duos, irā excitat nō procliue, sed ferā & quae nō facile queat placari, uniuersumq; corpus reddit aridius, nisi iecur repugnet. Humidius cor testant, pulsus molles, mores ad irā proni, sed quae facile pacari possit, ac totum corpus humidius, nisi iecur resistat. Calidū & siccū cor ostendūt pulsus duri, magni, ueloces & crebri, itō respiratio magna, citata & frequēs. hoc donati corde, maxime hirsutū pectus, nec nō praecordia obtinent, impigri tractandis negotiis, furibūdi, feroces, moribus tyrannicis, ad irā procliues, quae nō facile cōquiescat. Si aut humiditas cum calore superauerit, tales minus hirsuti sunt q̄ commemorati, prompti functionibus obeūdis, neq; tamen fero animo, sed ad irā pronoduntaxat existunt, pulsus in eis magni, molles, citati & crebri. Humidioris frigidiorisq; pulsus quidē molles, mores autē pusillanimes, timidi, & pigri: taliū pectora pilis uacāt, ac nequaquā furūt quemadmodū neq; ad irā procliues sunt. Frigidū & siccum cor, pulsus duriores & exiguos efficit. huiusmodi corde donati minime omnium irā sunt obnoxii, sed ubi semel eā conceperint, diu retinent: pectora ipsorum, omniū minime sunt hirsuta.

## IOGINORIS TEMPERATURAE NOTAE. Cap. LXVII.





Ecoris calidi notæ, uenarū latitudo, flauæ bilis copia, per ætatē uigorē, etiā atræ, sanguis calidior, eoq; totū corpus existit, nisi cor obstiterit: præcordia & ueter pilis obsita sunt. Frigidioris indicium, uenæ angustæ, pituita copiosior, sanguis totusq;

- corporis habitus frigidior, nisi à corde incalcescat: præcordia & uenter pilis uacat. Siccius iecur testat, sanguis crassior minusq; redūdās, uenæ siccæ, ac uniuersa corporis habitudo aridior. Humidioris notæ sunt, sanguis copiosus & humidus, uenæ molliores: sic etiā totū corpus, nisi cor restiterit. Calidi simul & siccæ indicia sunt, præcordia maxime hirsuta, sanguis crassior simul & paucior, amara bilis copiosissima, ac in ætatis uigore, atra, uenarū latitudo duritiesq; pari modo & totū corpus calidū siccumq;. Siquidē calor à corde procedens, frigiditatē à iocinore prouenientē potest euincere, siccitatē uero nō potest cor humidius ad contrariū perducere. Cōstat aut quod si in idē utriusq; principii tēperamenta cōcurrerint, totum omnino corpus illorū ratione affici. At humidū simul & calidū iecur, minus q̄ calidum & siccum præcordia efficit hirsuta, plurimum uero sanguinis, uenas grandes, habitū humidū & calidum, nisi cor obsistat. Quod si utraq; qualitas longius à naturæ modo recesserit, morbis qui ex putredine uitioq; humorum habent originē, corripuntur: idq; magis, si plurimū humiditas, parum calor increuerit, ac humoribus uitiosi fiunt. Cæterū humidius frigidiusq; glabra reddit præcordia, sanguinē magis pituitosum, uenas angustas, totumq; corpus similiter afficit, nisi cor ad contrariū deducat. Frigidum simul & aridum iecur, exiguum sanguinis creat, uenas arctiores, corpus frigidius efficit, præcordia glabra, nisi & hic cor superauerit.

25 TESTICVLORVM TEMPERATURAE NOTAE Cap. LXVIII.



Alida testiculorum temperatura, ad libidinē procliuis est, fecunda, & masculos procreat, parteis genitales celeriter hispidas efficit, ac uicinas etiam attingit. Frigida, contrā. Humida, copioso ac humecto semine abundat. Sicca, pauci & crassi seminis efficax est.

- Calida & sicca temperies mediocriter crassum semen progignit, estq; fecundissima, ac celerrime ad libidinē iam inde ab initio animal incitat. Tales itaq; testiculi hispida statim genitalia, eorumq; uiciniā efficiunt, sursum, usq; ad umbilici regionem: infra, usq; ad media femora. ac eiusmodi temperamentū abunde uenerem cōmouet, sed celerrime fatiatur, & si compellas, offenditur. Porro si humiditas calori fuerit cōiuncta, hispidos reddit: qui copioso licet semine magis abundant, non tamen magis q̄ alii appetunt, minus autē frequentiori concubitu læduntur: si autem utraq; & humidum & calidum impense creuerint, non sine noxa à uenere abstinēt. At humidi frigidiq; temperamento testiculi, uicinas parteis glabras reddunt, ac tarde concumbere incipiunt, neq; ad actionē expediti sunt, dilutum, tenue, & inualidū semen, ac fæminæ efficax proiciunt.

Siccum frigidumq; temperamētum, alia quidē similia prędicto, crassius autem semen & plane exiguum progignit.



QVAE PRAETERMISSA SVNT. Cap. LXIX.

Inguļæ corporis nostri partes peculiarē quandā & tēperaturam & uim sortitæ sunt: omnium uero notas hoc loco exponere necessarium non esse ducō, quū infinitæ propemodū sint, & nos cōpendiū scribere proposuerimus. Porro de iis egim⁹, quæ potissimū totū corpus cōfortiū quadā lege afficiūt, de relijs eadē ratione & uia cōsiderare præcipimus, tēperamēta ipsorū tū ab extremētis, tū ex relijs functionibus, tū iis quæ superueniūt agnoscētes. Tempestiuū igitur est, ut oratio ne cōuersa, doceamus quomodo totius corporis intēperies corrigi debeat.

QVOMODO CALIDA INTEMPE-

ries corrigatur.

Cap. LXX.



Vum itaq; in calida intēperie bilis superet, si per inferiora descēdit, notū est oībus, nullū oportere negotiū facessere: si ad superiorem uentriculū tendit, uomitu, qui post exercitationem ante cibum factam aquæ potu cietur, euacuare. Vtilius autē exercitium ipsis est, quod nō uehemēs ualidumq; est, sed remissius leniusq;. Nōnulli uehemēter calidi nequaquā exercitationem requirunt, uerū obambulatio balneumq; ipsis sufficit, iidē lauacris quoq; secundū cibū oblectantur. Quibus adiuncta est siccitas, hi ratione uictus humectāre indigent, ex cibis humectis, balneis, & exercitiorū ualentium & multorū abstinentia. Quate petēt statē citius lauare, & à cibo rursus debēt. frigida hos potio iuuat. Verum siccis tēperamentis uenus maxime est inimica: cauetur ipsis recte lassitudo, æstus, sollicitudo & uigilia. Humida intēperies in pueritia morbis patet, qui defluxionibus, plenitudini & præteeta putredini feruntur accepti. Itaq; ex usu est multa exercitatio, proba in uentre concoctio, excretioq; per urinas. quapropter si uel ante cibum bis ter uel ex aquis natura calidis lauētur, magnū sentiunt præsidium. Porro ne defluxionibus tētentur, prospiciendum est, lauacris, multa exetcitatione, urina ante cibum aluoq; inanita. Nihil autē prohibet, etiam apophlegmatismis nonnunq; uti, & purgationibus, cibis boni succi, & uino quod urinam moueat.

QVOMODO FRIGIDA INTEMPERIES

emendetur.

Cap. LXXI.



Inter frigidas intēperies, tres numerantur differentia, ex quibus sicca est deterrima. quod enim processu temporis senescentibus obuenit, id statim ab initio hos affligit. Itaq; humectare eos & calefacere oportet, quod commode fiet exercitiis mediocribus, cibo humido & calido, uini calidioris potu, somno pleniore, ita ut curā adhibeamus, ut quæ in corpore recremēta quotidie proctean, omnia euacuentur. Cæterum uenus omnes sicciore, & præfertim qui ad

hoc frigidi sunt, offendit: solis autē calidis humidisq; tura. Porro uitiosa quoq; frigida temperamēta sunt, quæ humiditatē habent coniunctam, ut quæ fluidis morbis maxime implicētur. his prodest balneo abstinere, largius exerceri, uiuere tenuiter, unguenta mediocriter calida adhibere. Qui autē frigidiore natura, mediocriter sicci humidisq; sunt, horū calor *L. ex citationibus J. suscitari firmariq; debet. quantū ad totius uictus rationem attinet, eam quæ inter humidum siccumq; media est, deligere oportet.*

*L. instauratum ex Orisio.*

QVOMODO SICCA TEMPERIES IN VENTRICULO, VEL UTI exemplo, deinde & aliz corrigantur. Cap. LXXII.



*I*ntemperies sicca, nūc est, ubi solida similariū partiū substantia reddita est siccior, quando nihil in medicina spei est: nunc quum propria humiditas unde partes nutriūtur omnino est absumpta: quæ continet in omnibus animalis partibus, roris modo eis inspersa. hāc igitur particulis sine nutrimento inferere, nulla ratione queas, ideoque difficillima est omnium eiusmodi affectuū curatio. At quæ in propriis cuiusq; particulæ exilib' arteriis uenisq; cōsistit siccitas, curationē recipit, si singulas similariū partiū propria humiditate, humectatis alimēti auxilio repleas. Balneum igitur temperatum cōuenit, in quo longissime uersari hominē expedit: inde statim lac exhibere a sininū, quod recēs multū fuerit, & pauxillū mellis repidi adiectū habeat. postea cōquiescere ad secundā usq; lauatiōē permittes, tū modice fricabis simul & pinguiter, utiq; si lac quod sumpsit, iam omnino cōfecit, id quod tū ex ruetu tū uentris mole licet cōiicere. modicū uero tēporis inter primā & secundā lauatiōē, interuallū erit, ut quatuor, aut quinque æquinoctialiū horarū spatiū intersit, scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, pluriū. Quinetiā post unāquamque lauatiōē, hominē, priusq; se uestiat, oleo perungemus: ac si quidē late oblectat, post secundā quoq; lauatiōē id exhibebis: sin aliter, prisanā diligēter incoctā, aut chondrū prisanæ modo preparatū. hinc ubi rursus cōquierit ad tertiā reducendus est lauatiōē, aut ilico ad cenā. Sit autē panis preparatus illi purus, & qui curiose in furno sit coctus. obsoniū quoq; ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure a sellus, & ut paucis alimēti summā cōplectar, cōcoctū sit facile, nutriēs, minimeq; glutinosum & excrementitium. potus, uinū aquosum & albū, purū, & quod minimā, si diluit, aquæ mitionem sustinet, oligophoron Græci nomināt, modice astrictiōis parti ceps: atq; hæc maximæ siccitatis curatio est. Modica uero non tā exacto uictu indiget, & pleniorē cibū admittit. Proponat autē & nūc siccitas priori similis, copuleturq; ei frigiditas medioeris: ergo calefaciētis materiæ tantum iam dictis admiscendū est, quātum particula ad frigidius inclinauit: lacti quidē mel copiosius adiciet: uinū aut minus aquosum priore dabimus. Quinetiā esculēta omnia calidiora, idq; nō naturalibus modo ipsorum temperamētis, uerū recētibus ex igni qualitatibus, exhiberi debēt. Nardi

no præterea unguento ungendus assidue ueter est, aut mastichino. At uero si cū siccitatis intemperie multa sit frigiditas, primū ipsam difficillimam & uix emendabilē cēseto: eis dē uero medicamētis utere, & melle per se discocto dispumatoq; uinū aut eliges semper antiquius. Optimū sane medicamentū talibus omnibus est, quo picatores quoridic utūtur. Ergo illinere eo totū uentrē cōueniet, ac post auellere etiam nū calidū. Cæterum ex iis quæ uētri extrinsecus applicātur, boni habitus puellus unā sic accubans, ut semper abdomē eius cōtingat. Huic siccitati iūcta caliditas esto medio cris. In eiusmodi intemperie primū curationis modū seruabimus, ita ut mel prorsus nō degustet, uinū uero exhibeat quod minime sit uetustū. Iam ci-  
 10 bos egelidos & lacteos offeremus, & uētriculū oleo tum crudo tū melino perūgemus. Verū hos uehementer admodū refrigerare periculosum est, quandoquidē hęc affectio, febris quodāmodo naturā, ubi calor superarit, imitat. Fingamus itaq; rursus calidā intemperie præpollere, huic autē adiunctā esse modo humiditatē, modo siccitatē, frigide ipsam aque potu cu-  
 15 rabimus. huc optime facit esus ciborū astringentiū, sed q̄ citra calorē sint austeri. Quū humida sola intepries est, siccātes cibi, ita ut non calefaciāt refrigerētq; ualide auxiliātur. ad hęc cōsuetæ potionis penuria. Si cū frigiditate humida urget intepries, optima remedia sunt, oīa acria. misceri autem his debēt, quæ sine manifesto frigore astringūt. optima simul his est  
 20 tatum curātur. Quoniā uero sæpe in ipso uētriculi sinu cōtentus humor, interim aut in ipsas uētriculi tunicas impactus, intemperie procreat, non alienū est de his differere. Prior itaq; affectio si semel radices egerit, purgatione per uomitū facile cōquiescit, si aut rursus ex alia quapiā aliis ue par-  
 25 ticulis cōfluxerit, exactam requirit dignotionē, curatio uero statim subsequetur. Etenim uniuersam eā parti affectz oportet accommodare, cura adhibita, iis quæ recipiūt, ne facile quæ cōfluūt admittāt. Fiet aut hoc astringentibus & iis quæ totū corpus ad bonā habitudinē perducūt. At uitiosos in uētriculi tunica humores medioeriter purgātibus educemus, cuiusmo-  
 30 di est aloē & ex ea confectū medicamentū amarū quod hiera picra dicif. Verū q̄bus lēta pituita uētriculo impacta est, iis prius exhibēda sunt quæcunq; hāc dissecēt. deinde purgatio tentāda. Quod si ad uomitū sunt idonei, cōmodū est per radiculā ex oxymelite uomere. Sin nec lētus humor sit nec crassius, utiq; abūde est à prisanæ solius cremore uomuisse, itē à mul-  
 35 sa. proficit & si mulsā in qua absinthiū incoctū sit, bibat. Cæterū reliquarū partiū intepries haud absimiliter curare oportet, ita ut humores ad idoneos meatus deducas. At si particula sensibīlē meatū per quē humores effluāt, desideret, redūdantē in ea uel sanie uel humores, quēadmodū si spūs id quod continet, flatulētus sit, euaporatu discutere ac uacuare cōuenit.

**Q**Uum de alimentorū facultatibus sermo, pars sit operis quod de  
sanitate tuēda præcipit, proximū est ut iā dictis eū subnectamus,  
ubi prius q̄ particulatim ipsa persequamur, pauca quædā  
prælibauerimus. Quippe alimentorū uireis, si quid aliud, percepras habere  
cōuenit. Quæ igit attenuādī uirtutē obtinēt, meatus aperiūt, uiscosa ad-  
hærescētia abstergūt, crassa incidūt extenuātq̄. Quod si diutius ea in cibo  
adhibeas, serosa biliosaq̄; cōtra hec recremēta ac si uberius ingeras, sanguis  
atra bile uiciosus reddit. Quare cōtinuus ipsorū usus, præsertim biliolis tē  
peramēto uitari debet. conueniūt autē solis iis, qui pituitā, humorēq̄; cru-  
dum, lentū, & crassum collegerūt. Porro quæ incrassandi uiribus cōstant,  
ualētis admodū materiæ sunt, & si in uētriculo ac iocinore decēter fuerint  
cōcocta, boni succi sanguinē producūt, sed lienē & iecur obstruūt. Ex his  
alia sunt crassi dūtaxat succi, ut lētacula: alia uiscosa, sicuti malux: quibus-  
dam utraq̄ contingunt, nēpe ut & crassi sint succi, & glutinosa, ut testaceo  
tegmine prædita. Itaq; uictus extenuās ad sanitatē tuendam tutior, q̄ qui  
incrassat, existit. Quū uero imbecillis sit materiæ nō robur ac uireis cor-  
poribus suppeditat, ac oportet nonnunq̄ ualētis materiæ cibū, quū ine dia  
quædā prestit, mediocriter exhibere. præsertim uero citra periculum assu-  
mūt, qui sese exercēt, & quantū libet dormiūt. omnes aut quibus ante cibū  
exercitari nō licet, crassi succi alimēta cuitabūt. Imò neq; in otio degentes  
eiusmodi cibos assumēt. Porro quemadmodū summū otium maxime ua-  
letudini tuēdz obest, ita mediocris motus summū adfert præfidiū. Cæte-  
rum mediæ materiæ cibi omnium sunt laudatissimi, ut qui mediocrē con-  
sistentia sanguinem procreent. Talis itaq; cibus corporibus nostris con-  
gruit: qui uiriosos humores gignit, noxius est, eoq̄; semper caueri debet.  
Iam & uaria ciborū genera assumere, cautio est, præsertim si ex diuersis cō-  
stent facultatibus. Non enim ingesta concoctionem, ut par est, fortiunt.

## DE OLERIBVS.

## Cap. LXXIII.

**L**ACTUCA manifesto & refrigerat & humectat, eoq̄; somnum ac-  
cercit. ut aut inter olera ualētē nutrit, ita boni succi sanguinis  
efficax est. Intybū frigidi humidiq̄; tēperamenti, sed minus q̄  
lactuca existit. Malua refrigerat quidē, sed nō euicēter, magis aut hume-  
ctat: unde etiā aluum subducit, idq̄; propter genuinā eius uiscositatē. Beta  
absterforia ui uentrē subducit, eoq̄; stomachū largius comesta erodit, ie-  
coris lienisq̄; meatus obstruit. Brassica bis cocta si edat, aluum cohibet: se-  
mel aut non tamē uehementer cocta, cum oleo & garo, uel sale comesta,  
magis subducit, quemadmodū succus ipsius & lēticulæ efficacius purgat.  
Hac magis adhuc marina brassica aluum manifesto emollit, salsa, & suba-  
mara: idem præstat halimon ut quod acriorem qualitatē salisam repræsen-  
tet, brassica uero magis stomacho cōducit, ceu astrictionis modicæ com-  
pos, lac aut & semē producit. Blitū & atriplex humida quidē uentrē soluūt,

humoresq; discutit. Sūt aut porris sicciore ampeloprasa, utpote sylvestria. In totū omnia cruda olera, si edātur, peiores q̄ cocta succos procreant, ac plus humoris excrementitii cōtinent. Verū quā cōdita uel muria uel oxalme reponūtur, stomacho profunt & appetentiā excitāt, crudos humores

5 incidūt, sed ægre cōcoquantur: & si aburare, uitiosos succos gignunt.

DE TVBERIBVS ET FVNGIS.

Cap. LXXVII.



10 **P**uber humorē de se reddit qualitatis expertē, sed frigidiorē & crassū succi. Fungi uero frigidi pituitosi & malī succi sunt: in his ipsis minus nocentes boleti sunt, qualitatis expertes, si probe coquantur. Qui uero ammanitæ dicuntur, secundū ab his ordine obrinēt: aliis fungis abstinendū, pleriq; siquidē ipsoꝝ leiuales. Ac ipsi boleti nisi exactius decocti edātur, periculi occasione præbent.



DE FRUMENTACEIS.

Cap. LXXVIII.

15 **P**orum quæ frumētacea nominant, chōdrus egregie nutrit, & glutinosos parit humores, uerū puls ex eo cōfecta nocet, quoniā q̄ primum crassescēs incocta permanet. probat magis succ⁹ ipsius ex integro chōdro h̄ne decocto expressus, ptisanæ similis, Alica in cæteris chōdro quidē respōdet: sed aluū magis astringit. Triticū, elixū sane, coctū difficile est & inflationes creat: ubi uero concoctionē expertū est, alimentū præbet ualentissimū. In panē aut coactū, minus inflat, minusq; ægre concoquit, utpote fermēti & salis particeps. Inter panes firmissimus est siligineus, deinde ex simila, tertius, à quo cribro nihil excusum est, Græci lyncomiston appellāt. cibarius panis minus nutrit, sed magis per aluū deiciit. Amylū parū alimēti præstat, quēadmodū & panis elotus. Ordeū frigide facultatis est & absterforiæ: ptisanæ mō incoctū, hume-  
20 ctat: torrefactū, quēadmodū in polētis fit, desiccatur. Polēta per æstatē ante balneū cū aqua pota, siti medet. Panis ordeaceus fragilior est, & parū nutrit. Maza difficilior cōcoquit q̄ panis ordeaceus, inflationesq; gignit: melle aut adiecto aluū citat. Avena & calida est, & imbecillis mareris. Miliū  
25 & panicū refrigerāt, siccāt, paucillū nutriūt & aluū cohibēt. Omnino autē miliū panico est præstātius. Oryza uix cōcoquit, parū nutrit & uentrē retinet. Porro ptisana in hunc modū coquit: uni eius parti aquæ quindecim & olei momētum adiiciūtur, ubi ebullierint acetū quoq; addes. quum iam exacte cocta fuerit, sal tenuis superiniicit. Nonnulli porrū & anethū ei mi-  
30 scent. Cæterum auena chondrusq; in ptisanæ modum decoquantur.

DE LEGVMINIBVS.

Cap. LXXIX.

40 **E**X leguminibus, lenticula uitiosi succi est, & atrē bilē producit, imō etiā, præsertim bis cocta, aluū cohibet. decoctū uero ipsius cū oleo & garo potū aluū proritat. at q̄a inflationes mouet, satureia uel pulegiū admiscēdū est, Fabæ leues sunt, inflāt & abstergūt. Aegyptia aut faba humidior nostra est, & excrementitia. Pisum laxū quidē, nō tamen adeo flatuo-

sum est. Cicet inflat, abstergit, genitale semen auget, libidinē incitat, & cal-  
culos cōstringit: frictū, minus quidē inflat, sed ægre cōcoquit. Lupinū con-  
coctiōi rebelle, haud facile trāsmittit, crudi humoris efficax. Fœnugræcū  
si ante cibū sumat, calefacit, & aluum mouet, Erulīa & phascolū macetata  
donec radices succreuerint, ex garo ante cibū sumpta, aluū subducunt, ac  
plus q̄ fœnugræcū alimēti exhibent. At phascolū quod & dolichon appel-  
larut, integrū cum siliquis uiride comestū, excrementorū est efficacius.



DE FVGACIBVS FRVCTIBVS Cap. LXXX.

Vcurbita refrigerat humectatq; & uentrē subducit, sed parū  
alit. Pepon in totum uitiosi succi est, frigidus, humidus, & uo-  
mitioni dicatus: nō coctus, bilē generat. semē eius urinam ci-  
tat & calculos in tenibus cōstringit, ac in torū, abstergit uehemēter. Melo-  
pepon omnia quæ de pepone dicta sunt, inualidius efficit. Cucumer mi-  
nus pepone frigidus humidusq; est, sed acius cit urinā, difficilis cōcoctu  
& uitiosi succi, etiam si coctus fuerit. Summatim omnia poma refrigerāt  
humectantq; imbecilliter alunt, & uitiosum humorem progignunt.



DE ARBORVM FRVCTIBVS Cap. LXXXI.

Icus & uua inter oīa poma principatū obtinet, ut quæ minus  
uitiosos humores generēt, & magis nutriāt. Inter hæc ipsa fi-  
cus probioris succi sunt, ualentiorisq; materiæ, aluo & urinæ  
ducēda, renibus purgādis, idoneæ, præsertim admodū maturæ. Idem præ-  
stant caricæ, q̄q̄ inflationes & sanguinem nō probū pariāt: eoq; frequētius  
usurpatæ, pediculos procteāt. Vua si nō descendit, nullā cōcoctiōnē ex-  
periūtur, imō etiā crudū humorē generāt: si ueto deliciunt, moderatiores  
sunt. Vua passæ aliis calidiotes sunt, stomacho grariotes, ualētius alūt, sed  
minus subducūt aluū. Mora quæ aliàs sycamina Græce appellātur, impē-  
se humectāt, mediocriter refrigerāt, ac ante alios cibos præsumpta, uentrē  
soluunt, nō admodum ingrata stomacho, sed exigui alimenti. Ex cerasiis,  
dulciora quidē aluū subducūt, uetū stomacho inimica: quibus inest astri-  
ctio minus stomachū laxāt, sed nō uentrē citāt. Atq; hæc ratio tū in uuis  
& moris, tū in aliis cōpluribus seruāt. In uniuersum, astringētia si prius an-  
te aliū cibū aut edūtur aut bibūtur, aluū cōprimunt. quibus aut ob imbe-  
cillitatem uēter nō respōdet, si molliēdi uirtute prædita, nē pe olera aut pi-  
sces, aut id genus aliud præsumēt: deinde astringētia, quæ dū ipsum firmāt,  
deorsum propellūt, & ad excretionē incitāt. Pini nucleus, qui & strobilus  
dicur, boni quidē succi est crassiq; & ad nutriendū ualēs, nō tamē ex faci-  
li cōcoquitur. Persica prauī succi, acidīq; sunt, & facile corūpūntur, eoq;  
primū exhiberi debēt, quò potius deliciātur, nullamq; in uētriculo diu-  
tius immorata, corruptionē sentiāt, Præcocia, doracia & atmenia, Persicis  
præstant, neq; enim acescunt, neq; similiter uitiantur, ac sunt etiam gustu  
gratiora. Malorū, dulcia sane aliis calidiota sunt, & facile in corpus distri-



buuntur, præcipue uel assa uel elixa: acida, magis refrigerat, & humores uet-  
triculo impactos incidunt: austeram stomachum firman & uentrem repri-  
munt, atque his magis cotonea. Idem præstât præ grãdia maturaq; sed ualentius  
nutriunt. Mala Punica frigefaciunt, & paru alimentum præbent. Mespila  
forbaq; uehementius astringunt, eoq; aluo fulit accommodantur. Palmulae,  
nisi admodum sint pingues, stomacho profunt, uentre retinet, crassos, glutin-  
ososq; humores gignunt, capiti faciunt dolores. Ex oliuis, druppæ stoma-  
cho aduersant, crassi humoris efficaces: mutia cõditæ & colymbades si an-  
te cibum sumantur, appetentiã faciunt, & aluū subducunt, ac magis quæ ex ace-  
to & oxymelite præparant. Inter nuces, iuglãs, auellana minus nutrit, sto-  
macho gratior. Nux uiridis humidior est, & uentre citat: arida, si ubi in aqua  
cõmaduerit mēbrana ipsius interior adimat, consimile uiridi potestatem ob-  
rinet. Amygdala incidendi extenuandiq; uitibus pollēt, ideoq; uiscera & tho-  
racē expurgat, idq; efficacius amara. Similiter & pistacia, uerū iecur effica-  
cius obstructione liberat. Damascena ante cibum sumpta & cruda & in mul-  
sa elixa uentre soluunt. Syriaca ægre coquuntur, stomacho noxia, modiciq;  
alimentum. Siliquæ ægre conficiunt, aluū cohibent, & humores creant uitio-  
sos. Sycomota manifestò frigefaciunt & humectant. Citrei mali pars exte-  
rior acris & concoctioni rebellis est: caro ualenter alit, & ipsa ad concoque-  
dam contumax: interior pars siue acida siue aquosa fuerit, abunde refrige-  
rat. Glandes non minus quàm frumenta cœa alunt, sed concocti in diffici-  
les, crassi succi, & tarde permeant. Castaneæ omni ex parte his præcellunt.

## DE ANIMALIBVS, ET PRIMO DE uolatilibus. Cap. LXXXII.

Nimalia quæ uolatu nituntur, minus quidē quæ pedibus si-  
dunt, & præcipue sues, alunt, sed proprius concoquunt, magis  
q; perdix, attagena, pullus colubinus, gallina & phasianus. At  
turdi, merulae, & exigui passeris, inter quos sunt etiã à turribus  
ubi nidificat, pyrgitæ appellati, solidius alimentum præstāt atque his magis ad  
huc, turtur, palubus, & anas: sed multo duri, concoctum difficilius, magisq;  
fibrosum pauo exhibet. Anserum uerò & struthiocameli caro excremēticia,  
ægrius quæ oīa cõmemorata cõcoquit, si alæ excipiant, quæ nō min⁹ quæ aliarum  
auium probi succi existunt. Porro gruū cato fibrosum solidūq; præber alimē-  
tum. In totum iuniora ueteribus humidiora sunt, proprius cõcoctiōi parēt, ua-  
lentiorē cibum præstāt, atque per aluū facile descēdūt. Similiter elixa ab assis,  
& in sartagine frixis differunt. Iam quæ in siccis locis & mōtosis proueniunt, citius  
cõcoquunt, minusq; excremēticia sunt, quæ quæ in paludibus nascunt.

## DE OVIS.

## Cap. LXXXIII.

Va gallinarum, phasianorumq; omnibus præstāt. Anserum & struthio-  
camelorum praua habentur. Ex omnibus autem recentia ueteri-  
bus multo sunt præstantiora, ac tremula plus alimentum habet: forbilia ma-  
gis descendunt, ac faucibus asperitates lauiunt. Reliqua omnia ad concoque-

dū rebellia, tarde transeūt, & succū gignunt crassiorē, præter ea quæ pniēta dicunt, hæc autē fiunt si cruda immergant in aquā calidā cum garo, uino & oleo & in uasa mediocriter coagulentur. Huiusmodi enim coqui facilia & boni succi habentur. Omnia uero quæ sartagine friguntur deteriora sunt.

DE PEDESTRIBVS ANIMALIBVS. Cap. LXXXIII. 5



Nter animalū quæ pedibus fidunt, carnes, suilla maius q̄ alii cibialimentū præbet, eo quod gustu & odore familiaritatē cū humanis corporib⁹ fortita est, ut nōnulli qui imprudēter humanas carnes gustarūt, cognouerūt. Alimētū uerò quod ex illis cōtrahit, uiscosum est, & nō facile in mēbra potest detrahi. Ouilla excre- 10 mēticia prauiq; succi est. Caprilla acris est malūq; succū efficit. Deterrima hircina, siue succi bonitatē, siue cōcoctiōnē respicias. Bubula atræ bilis effi- cax. Leporina crassi succi est, sed min⁹ q̄ ouilla & bubula. Ceruina dura est, & cōcoctiōi rebellis. In rotū, noua uetustis humidiora, mollioraq; & ad cō- coctiōnē facilia sunt. Itē castrata non castratis, pingua macris præstāt. 15



DE PARTIBVS ANIMALIVM ET SANGVINE. Ca. LXXXV. 20  
Vmmq; corporis particulę neruosa sunt, citra pinguedinē & excarnes, eoq; glutinosa, exigui alimēti, ac ad aluū mouendā efficaces, si excipias quę uolatu nitunt, ob nimīā siccitatē. Ro- stra & aures cartilaginosa, & ad cōcoctiōnē sunt pertinaces. 25  
Lingua, laxa, exāguis, parū alimēti habet. Glādulæ suauē sunt & flaccidę, sed māmas; præcipue suū, quū lacte scatēt, pulciores habēt, hę autē nō min⁹ q̄ carnes alūt. Renes & testiculi gustu insuaues & cōcoqui diffici- les. At sa- ginatorū gallinaceorū testiculi & suauē sunt, & probū corpori alimentū præstāt: quæadmodū taurorū, hircorū & arietū cōcoctiōni resistūt, & uitio- 30 sos creāt humores. Cerebrū pituicosum, crassi uitiosiq; succi, lēte trāsit, cō- coctiōia duersat, stomachū lædit, & nausēā excitat: si autē probe coquat, plu- rimū exhibet alimēti. Medulla pinguis & cerebro suauior est, in cæteris ei respondet. Pinguedo & adeps pauci alimēti sunt, & stomacho nocēt. Cor & iecur crassi succi, ægre concoquunt & lente transeūt. At suillū iecur aliis 35 præstāt. Lien tum prauos humores, tum atram bilē efficit. Pulmo facilius quidē, utpote fungosus, concoquitur, sed leuiorem cibum præbet, pituitæ generandæ efficax. Ventriculus, uulua, intestinaq; dura, cōcoctiōni aduer- santur, pituitæ efficacia. Summatim fera animalia sicciora, q̄ domestica ali- mentum exhibent, minusq; excremēticiū. Sanguis quilibet, uix conco- 40 quitur, præsertim crassus & melancholicus, qualis nimirū est bubulus. Leporinus utpote suauissimus cōmendatur. Ac multi ipsū cū icore solēt incoquere, quidā uerò & cū aliis uisceribus. nōnulli & iuuenis porcelli san- guinē edunt. Caprillū uerò nonnullos comedisse, etiā Homerus testatur.

DE LACTE.

Cap. LXXXVI. 40

**L**Ac coctum probe nutrit, gingiuis autem & dētibus nocet, quapro-

pter ubi assumptū est, primū mulsā, deinde uino astringētī os colluere oportet. Itē caput tētat, pręcordia uentēq; inflat, calculos in renibus gignit. Ac dilutior ipsius pars, minus quidē alimētī prębet, sed magis aluū prori-  
 5 tat: crassior autem e contrario, magis alit, minus descendit. At caprillum  
 lac, mediocre consistentia est, sicut bouillū, crassius: & quod statim à par-  
 tur redditur tenuius est, procedente tempore crassius detetiusq; efficitur.



## DE LACTIS POTIONE. Cap. LXXXVII.

Vi lac potare uoluerit, ab aliis abstinerē cibis debet, donec cō-  
 coctū fuerit, & inferius descēderit. Satiū itaq; est de mane re-  
 10 cēs multū bibere, ac post id nihil assumere, nec nō labores ni-  
 mios deuitare, nā laborātibus, accēdit, pręstatq; interea uigiles cōquiesce-  
 re, hoc enim pacto q̄ primū per aluū descēdit. Vbi deiectū fuerit, aliud bibē-  
 dū est: ac si hoc quoq; descēdat, aliud. Initio itaq; purgat utiliter, nō quidē  
 copiosum ex reliqua corporis mole, sed quę in uētriculo cōtinent: mox, ue-  
 15 nas ingredit, ac oprime nutrit, atq; nō amplius deiicit. Porro in biliosis flu-  
 xiōibus, & quū tabida coporis ad uentriculū concurrūt, coctū lac exhiberi  
 debet. Coquetur autē p̄timum lentā paulatimq; ut pars descēdat, pars cō-  
 sumatur, deinde magis ac magis incoquetur, cura adhibita, ne adurat, aut  
 in caseū coalefcat. quod optimē fiet, si leniter ipsum coquamus, & agitādo  
 20 id quod recesserit undiq; detrahāmus. Agitabitur autē ferula concisa & te-  
 nuī: & si quid oris ollę inferuefcat, hoc quoq; spongia adimere oportet, id  
 enim subinde etiā reliquū lac corrumpit. Eo igit modo quo dixi, lac coquē-  
 dum est, usq; dum æquabiliter crassius dulciusq; crudo euaserit. Quod in  
 co tenue est & serosum, calculis marinis ignitis in id demissis, ebibitur con-  
 25 sumiturq;. Atq; hoc alui fluxionibus, pręsertim biliosis est accōmodatū.

## DE LACTE SCISSILI. Cap. LXXXVIII.

Serosa lactis portio à caseo discernit, si uehemētius ad ignē latiorē  
 citra fumū excoquat, deinde colo aut pāniculo exacte traticiat. Por-  
 30 rò misceat seto mellis momētū, aut oxy melitis aliorū ue, daturq; sub-  
 ducēdi uētris gr̄atia, ætate quidē florētibus ad duos sextarios: iuniorib⁹, nō  
 minus sextario. Quōd uero marinis calculis ignitis aut ferro candenti de-  
 missio lac incrassatū est, intestinorū torminibus & alui profluuiis rectē ex-  
 hibetur.

## DE CASEO. Cap. LXXXIX.

Mnis caseus acris est, sitim facit, ægre concoquit, uirtuosos succos,  
 35 calculosq; generat. Laudatior est recens, fungosus, mollis, suauis,  
 & modici salis particeps: qui secus habet, pessimus est.



## DE PISCIBVS. Cap. XC.

Mnes pisces frigidioris, humidiorisq; tēperamenti esse, nulli  
 non constat. Omnīū uero optimi sunt, saxatiles, ad concoquē-  
 40 dum prompti, boniq; succi, modice humectant, ubi non du-  
 ram carnem occupauerint. Verū ex non saxatilibus, qui in pelago degūr,

multū ab iis uariāt qui in limo sunt æditi, uel ubi flumina irruūt, sed omni  
um deterrimi qui uel in stagnis uel paludibus uiuūt. Particularim uerò ca  
piro, si ex pelago fuerit, mediocriter suauis est, minus cōcoctioni rebellis,  
& boni succi, sanguinē uerò gignit tenuiorē imbecilliorēq;. Similia & lup⁹  
præstat. Mullus qui & ipse in pelago edit, aliis piscibus durior est, fragilis, ⁊  
cōcoctu facilis, ualidæ ad alendum materiz, suauis & pinguedinis expert.

## DE TESTACEIS.

Cap. XCI.

**G**eneratim pisces qui testa conteguntur, Græci uocāt ostraco-  
derma, salum crudūq; humorē producūt. Ex his ostrea mol-  
lissimā carnē obtinēt, facilius descendūt, Chamæ uerò, purpu  
re, ungues, spōdyli, buccina, cochleæ, atq; huiusmodi alia dura,  
ac quæ crustata quoq; nominant, nempe gāmari, paguri, cancri, locustæ, &  
squillæ cōcoctioni repugnāt, sed alimentū præbent & uentrē cōprimunt,  
si in aqua dulci sæpius decoquant. Omnibus uero crustatis inest succus, al  
uo subducendæ utilis, eoq; etiā terrestribus cochleis. Ac quū hæc durā car  
nem, concoctu difficilē, ualētis materiz & succis uitiosam fortiantur, non  
nulli ius iporum cum oleo & garo conditum, ad aluum subducendā adhi  
bent. Echini modice frigefaciunt, exigui alimēti, & urinæ ciendæ efficaces.

## DE MOLLIBVS QVÆ MALACIA DICVNTVR. Cap. XCII.

**M**olles pisces, utpote polypi, scipiz, loligines duri & coqui cōtuma  
ces sunt, præcipue polypi, salum humorem modicum obtinēt;  
cocti autem non parum alimenti, corpori exhibent.

## DE CARTILAGINEIS.

Cap. XCIII.

**A**rtilagineorū, quæ selache Græci dicūt, torpedines, pastinacæ,  
mollē suauēq; carnē occupant, quæ celeriter descēdit, facile cō  
coquitur, & probe alit. Raia, leuiraia, squatina, atq; eius gene  
ris reliqua, duriora sunt, cōcoctioni renitunt, & ualētius nutri  
unt. In summa quibus dura caro est, & ægre concoquūtur, & plenius alunt:  
ubi uerò concocta fuerint, copiosum solidumq; alimentum præbent.

## DE CETACEIS.

Cap. XCIII.

**E**tacea, utpote, balenæ, uituli marini, libellæ, delphini & præ  
grādes thynni durā, concoctu difficilē & crassi succi carnē ha  
bēt. Sale cōdita eiusmodi moderatiora efficiunt, aliisq; pisci  
bus humidiora, magis ex cōtemētitiis, perturbatiōi uētris magisq; sunt accō  
moda. Salsamentorū uerò differētiæ pisciū unde constāt, naturā imitātur.

## DE VINI VIRIBVS.

Cap. CXV.

**V**i sanitatis tuendæ curā susceperit, eū quoq; uini facultates co  
gnitas habere expedit. In uniuersum itaq; uinū omne nutrit,  
uerū rubēs, & crassum, magis: boni aut succi nō est efficax. Itē  
dulce & ipsum quidē impense nutrit, sed stomacho nocet. Au  
sterū stomacho quidē amicū est, uerū ægre in corpus distribuitur leuiusq;

alit: hoc aut magis, albū. Præstantissimū est colore uermiculū. Porro uer-  
stius nouo magis & calefacit & desiccatur. hę igit uini sunt facultates, ueluti  
summatim exposiit. Cęterū calorē in nobis refocillat, unde cōcoctio meli-  
or, & sanguis probus euadit, cibū per oīa corporis mēbra, ut quod facile pe-  
netret, deducit. Quāobrē ex morbo emaciatus reficit, corpusq; ipsorū au-  
get. Etenim cibi cupiditatē facit, pituitā extenuat, bilē per urinā educit, &  
bonū colorē cōciliat: animo lētitiā uoluptatēq; parit, & robur aditcit. Ha-  
rū itaq; commoditatū moderata uini potio, contrariorū immoderata oc-  
casionē prębet, coq; temulēti animo turbant, desipiūt, & graui somno pre-  
muntur. qua de causa immodica uini potio diligenter uitanda est, quanq;  
longiore tēporis interuallo liberaliter bibere cōducatur. ita nanq; urina lar-  
gi\* & sudores promouent. Vincit aut mox pręsumpra mulsa uomere, quō  
ne paululū quidē ab eo noxę percipiat. Qui igit potatiōi indulgebis, alio  
cibo non admodū repleri debet, sed inter potandū brassicam elixā esse, &  
bellaria pręsertim amygdala assumere, ut quę capitis dolores leuent, & uo-  
mentibus nihil adferant molestię. Præstaret aut absinthii dilutū ante po-  
tionē ingerere, ut quod omniū maxime crapulę discutiendę sit efficax. At si  
aliquis rosionē à uino sentiat, frigidā: insequenti die, absinthii dilutū bibet  
utiliter, obābulatione itidem, frictiōibus, balneo, & exiguo cibo reficietur.

## DE MELLE ET MULSA.

## Cap. XCVI.

**M**EL coctū ualentius nutrit, q̄ subducatur aluū: non coctū, contra-  
rio, ac frigidis humidisq; tēperaturis conducit: calidis, in bilē uer-  
titur. Mulsa uerō non admodū biliosis utilis est, ut quę in bilē de-  
generet. Itaq; in eiusmodi naturis dilutior mulsa recte dabit: iis qui uiscera  
habēt affectibus opportuna, incōmoda est. Cęterū hoc modo pręparari  
mulsa debet. Octupla aquę portio mellis admisceat, incoquitq; donec spu-  
mare desinat. spumam uerō continenter ab ea tollere, simul atq; orta est,  
oportet.

## DE SOMNO.

## Cap. XCVII.

**O**stea quā omnia quę ad uictus rationem spectant, sumus  
executi, superest ut de somno, eò quod omniū postremus ma-  
gna ex parte inis, differamus. Itaq; somnus uiriū animaliū (ut  
ita dicā) requies est, utili humiditate cerebrū madefaciēte pro-  
ueniēs. Qui si recte ineatur, multa pręstat cōmoda, cibū elaborat, humo-  
res excoquit, dolorē lenit, lassitudinē solatur, intēta laxat, animi uerō agri-  
tudines obliterat, rationē uitiatam corrigit. Porro tempus somni optimū  
est à cibo. sed interdiu captus haud omnibus est idoneus. Tēpus enim quo  
obdormiscunt ad absolutā ciborum concoctionē non sufficit. interrupta  
enim ante horam suam concoctione, à meridie resurgētes, subinde acidos  
ructus ædunt, crebro etiam flatibus replētur. Nonnulli fluctuatione uen-  
tris infestantur, nisi uel ex consuetudine, uel sufficienti somno usi, eiusmo-  
di mala effugiant. Cęterum optimus somnus est nocturnus, quoniā nox

naturali humiditate, silētioq; somnū accersens, absolutā molit concoctio nem. Item post illum plurima parte ad excretionē recrementorū instigamur. Terminus aut somni esse debet perfecta ciborū cōcoctio, quā tū rutibus, tum uētris contractiōe deprehēditur, secundū quam uigilantia nō inutilis, ut quā recrementorum ex concoctione deiectionem moliat. 5

## DE VIGILIIS.

## Cap. XCVIII.



Igilias quā laborātes iā affligūt, ex dolore, aut febris, aut acutiore quodā casu oboriētes, secūdo libro de febribus persequemur: quē aut sanos infestāt, hoc loco nobis exponendz sunt. Si igit aliquis ob mōrorē, aut curam, aut quandā animi aegritudinē uigilauerit, primū id quod molestat, quatenus licet protinus amputabimus, deinde suauū sonorū auditu mēs à sollicitudinibus abducēda est, id quod nonnulli leni aque murmure machinantur. qui enim sic permulcentur somno facile capiuntur. Præterea balneis præsertimq; uespertinis quū bene cōcoxerint utent, ciboq; humectari ut pore lactuca & id genus aliis. nonnunq; nigri papaueris folia uiridia obsoniis admiscebunt. Piscibus ad concoctionē prōptis, uino largiore tenui & nō uetusto recreari debēt. Dormituri rosaceo caput pungēt, aut oleo in quo papaueris capira, aut mādragoraz sint incocta. itē anethinū nō uetus somnū accersit. Noui aut q post lassitudinē quiete subito permessa, somno caperet. Adhuc uen⁹ moderata id ipsum præstat. Alii caput aut pedes refrigerātes, facile somno corripunt. At si ex cibi copia uirio uē stomacho grauato uigilauerint (nā hoc etiā accidere nouimus) quē admodum rursus alii præter consuetudinē inedia pressi, aut modico cibo sumpto, uigiliis sunt infestati, cōsiderare id, ac causam succidere, oportet. 10

## DE SOPORE.

## Cap. XCIX.



T si e contrario alti grauesq; somni, quā cataphora dicitur, urgeant, ab assiduis lauacris & refrigerante unctiōe abstinebimus, medicamentis piritam per os elicientibus utemur, atq; in rotum ad calidiorem uisus rationem, sicciorē imbecilliorēq; ipsos traducemus, quandoquidem huiusmodi affectio à frigidiorē, ut plurimum & humidiorē materia cerebrum irrorante accidit. 15

DIOCLIS EPISTOLA AD VALETVDINEM TV-  
endam conscripta.

## Cap. C.

## DIOCLES ANTIGONO REGI.



Voniā tibi omniū regū literarissimo esse contigit, & multū iā ætate profecto, omnis philosophiæ disciplinazq; mathematicarū peritia excellere, existimaui eā philosophiæ partē quē ualitudinis ruēdz præcepta tradit, haud alienā à regia maiestatem fore: eōq; tibi perscripsi unde morbi hominibus oriant, & quibus signis præcedētibus quomodoq; ipsis succurrere cōueniat. Quēadmodū enim in cælo nunq; tēpestas ingruit, quā nō indicia quādz præcedāt, quibus nautę 40

ceteriq; probe periti homines certiores reddantur, ita humanam natu-  
 ram nullus inuadit morbus, quem non signum aliquod denuntiarit. Tu  
 itaque si iis, quæ à nobis dicentur, animum attendas, exactam illorum co-  
 gnitionem indispiceris. Hominis corpus in quatuor parteis diducimus;  
 5 caput scilicet, thoracem, uentrem & uelicam. Igitur ubi caput morbo con-  
 flictaturum est, hæ plurimum notæ solent præcedere, uertigo, capitis do-  
 lor, superciliorum grauitas: aures sonant, tempora saluunt, oculi mane il-  
 lachrymât, caligantq; nares oppletæ odorem non sentiunt, dentium gin-  
 giuæ attolluntur. Quum ergo ex his aliquid accidit, caput purgari opor-  
 10 tet, nullo quidem medicamento, sed uel hyssopi uel origani capitibus tri-  
 tis, quæ in ollula cū musto deferbuerint, aut sapæ heminæ dimidio ieiunus  
 os colluet, & gargarizando humores ex alto deducet, eaq; capitis affectuū  
 curatione, nulla leuior est alia. Optime facit etiā, si sinapi mulsæ calida di-  
 lutum, ieiunus absorbens gargarizet, pituitamq; ex capite eliciat. Cæterū  
 15 caput operimentis prius calefacere oportet, quo pituita liquefacta, prom-  
 pte effluxioni pareat. Si quis hæc signa neglexerit, huiusmodi ægritudines  
 solet experiri, lippitudinē, glaucomata, parotidas, in ceruice strumas, cere-  
 bri tabē, grauedinē, anginā noctu, teredines, uuā, capillorū defluxus, capis-  
 tis ulcera, & dentiū dolorē. Quū autē à thorace morbus nascet, torū corpus  
 20 incipit sudare, thoraxq; lingua fit crassior, sputū salsum aut amarū aut bi-  
 liosum existit, dolor costas aut scapulas sine occasiōe inuadit, oscitatio fre-  
 quens, sine somno & quiete, suffocatio, sitis ex somno, animus tristior: pe-  
 ctus frigidū, brachia & manus tremiscūt. Succurrendū est prudenter hoc  
 modo, uomitus q̄ optime fieri potest, post cœnā sine repletionē, sineq; me-  
 25 dicamēto citari debet. utiles sunt & uomitiones ante cibū, quas Græci syr-  
 maismos appellāt. Oportet autē eū qui sic uomet, radículas tenuis præsu-  
 mere, nasturtiū, erucā, sinapi, & portulacā, mox aqua tepida superbibita,  
 uomere. At si huiusmodi indicia contemnātur, hi morbi solēt obuēnire,  
 pleuritis, peripneumonia, melācholia, febres acutæ, phrenitis, lethargus, fe-  
 30 bris ardēs cū singultu. Quod si à uentre morbus oriet, hæc erūt signa, uen-  
 ter prius cruciat, turbaturq; cibis & portio amara uidentur, genua grauan-  
 tur: lūbi nequeūt flecti, totumq; corpus etiā sine occasione laborat, crura  
 torpēt, febriculæ exiguæ affligūt. His itaq; cognitis, uentrē emollire opor-  
 tet, nō medicamētis, sed uictu. Tutius enim est uti iis, quibus nullus error  
 35 committi potest, utpote betis mulsæ incoctis, aliis elixis, maluis, lapatho,  
 Mercuriali herba, & ex melle cōfectionibus. Omnia siquidē a luo subducē-  
 dz sunt. Si aliquod ē signis intēdatur, enici succū omnibus decoctis admi-  
 scere oportet, ut quæ suauiora & sine periculo sint. Iam & laxis brassica in  
 aqua largiore cocta, eiusque succus ad heminas quatuor portus cū melle &  
 40 sale, utilis est: uel ciceris aut erui decocti aquā eodē modo ieiunus utiliter  
 bibet. Qui nullā eiusmodi signorum rationē habet, tū his morbis tentari



solent,alui profluuiio, intestinorū torminibus, eorumq; leuitate, ilio, coxē  
dice, febre tertia, podagra, apoplexia, hæmorrhoidibus, morbo articula  
ri. A uesica qui nascunt morbi, hæc dabūt signa: pleni ex cibo modico esse  
uidetur, inflationes uētris urgēt, ructus, pallor totius corporis, somni gra  
ues, urina liuida & uix erūpens, naturalia tumēt. Quū itaq; huiusmodi no  
ta apparuerint, odoratis urinā ciētibus tutissime occurrere malo oportet.  
Itaq; sceniculi apiiq; radices, uino albo odorato madefacito, atq; huius di  
luti cyathos duos, mane ieiuno singulis diebus propinabis cū aqua: itē dau  
ci \* myrti, helenii, quodcūq; horū habueris (nam oīa proficiūt) aquā exhi  
bebis: ad hæc aqua ciceris macerati cū uino, idē efficit. Qui hæc signa negli  
gūt, hos morbos expectēt, aquā inter cutē, lienem magnū, iecoris dolores,  
calculos, renū cruciatus, urinę stillicidiū & uētris tumorē. In omnibus hu  
iusmodi indiciiis infantes sane, leuiori: adultos, ac riote curatione tractabi  
mus. Cæterū anni solstitia in quibus hæc solēt ingruere, silētio prætermi  
tēda nō sunt. sed quæ in singulis alimēta cōueniant, paucis exequemur, au  
spicati ab hyemali.

## SOLSTITIVM HYEMALE.

Solstitiū itaq; hyemale usq; ad uernū æquinoctiū, auget in hominibus de  
stillatiōes humiditatesq; ac propterea calidiorib<sup>o</sup> uti cibis, pleniori potu  
ac meraciore, atq; ex origano bibere oportet, necnō ueneri indulgere. Nu  
merat dies ad æquinoctiū, nonaginta. AEQVINOCTIVM VERNVM.  
Hoc tēpore pituita in hominibus crescit, & dulcis sanies sanguinis usq; ad  
uergiliarū ortū, eoq; tūc maxime sucofa acriaq; assumi debēt, corpus ex  
erceri, uenus tutissima est. Sunt autē ad usq; uergiliarū ortū dies sex & qua  
draginta.

## VERGILIARVM EXORTVS.

Hoc tēpore bilis atra auget, amaraq; sanies, usq; ad æstiuū solstitiū, dulcia  
tūc quæ aluū moueāt, cōueniūt, uenus inutilis est, hinc ad solstitiū æstiuū  
dies quinq; & quadraginta existūt.

## SOLSTITIVM AESTIVVM.

Hoc anni tēpus atrā bilē ad usq; æquinoctiū autūnale promouet, qua pro  
pter aqua frigida atq; odoratis omnibus utendū est: uenus perniciofa: aut  
innocētius saltē q̄ de ea p̄scripsimus adhibeto. Porro sunt ad æquinoctiū au  
tūnale, dies tres & nonaginta. AEQVINOCTIVM AUTVMNALE.

Hæc anni pars pituitæ copiā generat, renuesq; defluxiones, donec uergilię  
occidant. Cōuenit igitur tūc humores ex capite elicere, atq; acerrima, ma  
ximeq; sucofa assumere, uomitu nō sollicitari, exerceri, atq; cōcubitu uitā  
re. Numerantur ad uergiliarum occasum dies sex & quadraginta.

## VERGILIARVM OCCASVS.

Hoc tēpore pituita ad usq; brumā in hominibus redūdat, quam ob rem a  
cerbissima quæq; uinum suauissimū, assumere oportet, pinguibsq; uti &  
exercitari. Sunt autē ad solstitiū hyemale dies quinq; & quadraginta.

# PAULI AEGII

NETAE LIBER SECVNDVS DE FE-

BRIEVS, IOANNE GVINTERIO

Andernaco interprete.

Cap. I.



BSOLETIS DE VALETVDINE TVEN-  
da praeceptis, exequi aggrediemur, quomodo eos, qui  
morbis iam cōficiantur, ad meliorem statum perduce  
re oporteat: à similaribus utpote simplicioribus mor  
bis exorsi. quales nimirū sunt, quos febriles appellār.  
Rursus igitur nos Oribasii compendii, quod ex Ga  
leni commentariis est excerptum, aliorumq; complurium breviori disci  
plinæ uia urentes, pauca quoq; ab illis omiſſa adiungemus.

QVOT ET QVAE PRINCIPALIA IN MORBIS PO

tiſſimum febrilibus perquirenda. Cap. II.



Rimum quidē perquirere conuenit, morbus salutis ne spem  
promittat, an desperationē mineſ. Alrerū, si uitæ securitatē  
pollicet, urrū acutus ſit, an lōgus. Hæc ſane in aliis quoq; ma  
gnis affectibus cōmode quærantur. Tertium, nunquid una uice iudiciū  
ſubeat, quod febribus potiſſimū peculiare eſt, an particulatim ſoluatur.

EX GALENI COMMENTARIIS, QVALE

morbi principium dicamus.

Siquidem capitis dolores & febris haud eadē exiſtunt, quemadmodū neq;  
uigilia, & cibi faſtidiū, toriusq; corporis grauitas, & ſenſus laſſitudinis. Ve  
rum unumquodq; licet à febris ſit diuerſum, ipſam tamen denūtiat. porrō  
febris inuadēs, præſertim acuta, neq; nos poteſt, neq; imperitū quenq; la  
re. Sed ſinge, ſi placet, etiā latere, miraculū tamē iudicauerim, ſi hora am  
plius ægrum ſubterfugerit. Quamobrem illud tempus morbi eſſe princi  
pium dicemus, quo manifeſta primum febris correptus decubuerit.

VNDE COGNOSCENDVM, MORBVS NE SIT

ſanabilis, an pernicioſus.

Cap. III.



Erales notæ ſunt, facies cadaueroſa, nares acuræ, oculi cōcaui,  
reliquaq; ab Hippocrate cōmemorata: mulroq; magis ſi hæc  
ita ſunt, ut neq; uigilia præceſſerit, neq; uētris reſolutio, neq;  
inedia. Itē in propinquo mors eſt, ſi oculi lumē refugiūt, & citra exteriorē  
quandā cauſam illachrymāt, idq; nullo peculiari uitio affecti. Ad hæc ſi al  
ter ipſorū minor appareat: quæq; in iis alba eſſe debēt, ruſceſcāt, aut liuēāt,  
aut nigricēt. Aut ſi pituita craſſior ipſis inhæreſcat, perq; ſomnū alba ocu  
lorū appareār palpebris extrinſecus nō commiſſis, niſi ea uehemēter fluēs  
alius expreſſerit, aut ex conſuetudine ipſis hoc acciderit. Iam illa mortis  
ſunt iudicia, dentibus ſtridere, aut deſipere, aut in ueſte floccos legere, aut

simbras deducere ac festucas carpere. Attendendumque est, si aeger supinus cubat, & ueluti membrum laxatis, uel si deorsum à lecto ad pedes delabatur, quod extremam imbecillitatem fatetur. Multo peius est, frigidum spiritum ex naribus & ore elidere, pulsum languidum crebrumque sentire. Qui si deficiat, aegerque ad animi deliquium sudore digeratur, perniciem praefagit. Si igitur omnia, quae retulimus in dicia, aut plura his appareant, aut etiam pauciora, sed ualida, nullumque salutis argumentum affullerit, periculum mortis inuitabile signat. Contra spirandi facilitas, pulsus uegetior, mens sibi constans, ad hanc facies iacentisque habitus, sani similis, cibi appetentia, nihil mali, sed securitatem portendit. In uniuersumque à naturali habitu maxime abhorrent, pestifera sunt. quae ipsi respondent, salutaria. Ceterum praesagia ex urinis, deiectione, & spuro, paulo post exequemur.

## DE SIGNIS LONGAE VALETUDINIS.

Cap. IIII.



Vatuor notis morbi dignoscuntur: ipsorum motu, aegrotantis habitu, pulsu, februm specie. Motu quidem in eum modum: si quatuor particularis accessionis tempora, ocyus & breuissimo spatio inuaserint, peracutus erit affectus, cuius extremus terminus est, septimana. magna uero ex parte quarto die crisis experitur. At si longius quidem quam hic affligerit, sed duodecim horarum spatium non excedat, acutus praedicatur, qui intra quartumdecimum diem soluetur. Qui pluribus horis protendit, ut initium duntaxat & incrementum longiore tum diei tum noctis tempore absoluat, eiusmodi longus morbus existit. Sin autem partiales accessiones morbus non habeat, sed inde ab initio ad usque sine continuet, tanquam una sit accessio, ueluti in continuis, etiam hunc nimirum acutis adscribes. Aegrotantis habitu hoc pacto deprehenduntur. Si quidem facies est medioeriter habita, licet totum corpus collabatur, acutum morbum praesagire est. Si prorsus nihil emacrescit, longus erit, quippe copia materiei longiore spatio concoquenda signatur. Ex artierum motu ita diuinaris: Magnus pulsus, uehemens, citatus, creber, acutum morbum indicabit. contrarius, longum. A februm specie hunc in modum: quatenus calidae & ureres, acutum signant morbum, mitiores & ueluti elanguescentes, diuturnum.

## QUOMODO PRAESCIAMUS AN MORBUS

iudicium subiturus soluendusue sit.

Cap. V.



Oc quoque praescire licet ex iis, quae modo sunt nobis dicta, nempe ex februm specie, & tempore. Foran autem totum ex februm specie. Si quidem calidae, & peruerentes, breui finiuntur, & excretionibus solui solent. Mitiores, languidioresque proroantur diutius, & in abscessus magna ex parte erumpunt. Hinc liquido constat, non solum quando morbus soluetur, sed etiam quo pacto. Nam acuti per excreta iudicantur: per abscessus, longi.

## DE DIEBUS DECRETORIIS.

Cap. VI.



lerum de rectoriorū alii de ægris frequēter, cum fide, salubriter, perfecte, manifesto, & insigniter iudicāt. alii cōtrario his modo. Tertiūdecimus mediū quendā inter utrunq; dierū genus ordinē habere mōstratus est. Ac sunt ex ipsis, qui uel exi

- guum naturæ impetū nacti, de morbo possunt decernere: quemadmodū septimus, quartūdecimus: pleriq; uero, nisi in uehementibus naturæ motibus, morbos neutiq; possunt soluere. Verū nec uniuersi boni, simili inter se modo boni sunt: nec omnes mali, pari ratione sunt mali. item nec certo ordine bonitatē malignitatem uel obtinēt. Qui igitur primi sunt ordinis, nempe bonorū numero cōprehenſi, hūc in modū se habēt. Præstātissimi omniū sunt, septimus & quartūdecimus: mox nonus, undecimus & uigesimus: deinde decimusseptimus & quintus. hos sequit̃ quartus. post hunc tertius & decimus octauus. His cōtrarii, ad secundū ordinē referūtur: pessimus, quiq; cū periculo, nec clare de morbis iudicat, ac ueluti ex aduerso se primo diei opponit, sextus est. Huic cōsimiles, octauus & decimus: secundum quos duodecimus, sextūdecimus & decimusnonus habent. Medius horū est tertiūdecimus, nec ita repudiā dus, sicut ordini secundo ascripti: nec tam feliciter morbū potest soluere, q̃ qui ad primā classem pertinent. Atq; hoc dignitatis ordine Galenus est usus. Numerorū uero ordine boni sunt: tertius, quartus, quintus, undecim\*, quartūdecimus, decimus octauus, uigesimus. Mali autē: sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextūdecimus, decimusnonus. inter hos medius cōsistit, tertiūdecimus. Porro ex his de rectoriis nōnulli quoq; aliorū sunt indices, quos Hippocrates appellauit speculatórios, eō quōd iudicia alio die futura prænūtient, cōtēplandāq; exhibeāt: exēpli gratia, quartus, iudiciū septimo die futurū præmonstrat: dū uidelicet sudores quosdā, aut madores, aut eiusmodi particulares uacuationes molit, aut significationes prius nō factas, aut cōcoctionis notas repræsentat. Iam uero Galenus etiā sexti, licet nō boni, quartum esse indicē asserit. Vndecimus quartidecimi index est: septimusdecimus autē, uigesimi. Itaq; ad quadagesimū usq; diē ualentissima de morbis sūt iudicia. proxime succedūt, qui usq; ad uigesimū habentur. Qui post hunc ad usq; quadagesimū porrigūtur, paulatim uehementiā remittūt. Primæ dignitatis sunt, uigesimusseptimus, trigessimusquartus & quadagesimus. Hos sequūtur, uigesimusquartus, trigessimusprimus, trigessimusseptimus. Qui uero dies à uigesimo quartumdecimū usq; intercedunt, omnes iudicii sunt expertes. Sicut qui post quadagesimū habentur, omnes prorsus clanguescunt, cōcoctione potius & abcessu, q̃ crisi morbū finientes. Atq; alios quidē à quadagesimo die Hippocrates omnino negligere uidetur, sexagesimi uero, octogesi & centesimi rationem habet. Ab his deinde alios morbos septem mensibus, alios septem annis, alios, ut uerisimile est, duabus annorum hebdomadis, alios ternis iudicio solui tradit.

## DECRETORIA INDICIA IN MORBORVM

principio esse praua.

Cap. VII.



Concoctionis signa nunq̃ sinistrae apparent. quippe omnis cōcoctio, naturæ uincētis opus est, eoq; semper securitatē pollicet. Decretoria uero signa interim in cōmode apparent, propterea quod crisis ipsa ambigat, nunc bona, nunc mala contingat, ut prius in decretoriis diebus est comprehensum. Neq; igitur per initia, neq; in augmento ipsa commode apparent, sed ubi morbus inclinat uerit, quo tempore natura ipso ualentior est.

## QVEMADMODVM FUTVRVM IVDICIUM

prænoscendum sit.

Cap. VIII.



Accessiones intendant, præueniantq; tēpus consuetū & multo fiant uehementiores, ac tertio quoq; die significationem sui præbeāt, tū cōcoctionis signa in urinis, aut deiectionibus, aut sputis cernantur, sine mora plane morbus iudicabit. Sin accessiones lente moueantur, eademq; hora inuadāt, ac quotidie affligant, longiore tēporis spatio interposito, morbi solutionē expectabis. Item iis qui rigore uehementē febricitāt, fieri nō potest, ut morbus ante soluiatur, q̃ ille fuerit lenitus. Nisi enim rigor momentū remittat, haudquāq; morbus ad statum peruenerit, multoq; minus inclinatio ipsius speranda est.

## QVOMODO INSTANS MORBŌRV M IVDICIUM

agnoscatur.

Cap. IX.



Nte quamlibet iudicationē ægrotus male excruciat. Atq; si interdiu illa cōtinget, nox superior inquieta est. Si noctu futura est, dies antecedit tristior. Ac superueniūt symptomata, ut tempore capitis dolor, quē prius nō sensit, præterea collū dolet, præcordia sursum conuellantur, spirandi quædā difficultas repentina oritur, aliaq; grauias symptomata, quæ superiori tēpore non percipiebantur, apparent. Atq; his ita obuientiis, si pulsus nō concidant, sed elatius attollantur, uehementioresq; fiant, ad hæc dies decretorius indicet, isq; potissimū ex illorū ordine, qui probe decernūt, non iudiciū modo futurū, uerum salutiferum quoq; expectato. Neq; deterere in his re debet, si ægrū delirantem, exiliētē uē cōspicias. Etenim & hæc succorū ad superiora tendentiū notæ sunt: sicut ediuerso inferiora petentiū, alia, puta in uentris rosio, circa umbilicū tormina, lumborum dolor, uentris murmuratio. Est cum alia quoq; indicia similia deprehenduntur. Ad hæc si per hæc morrhoidas uacuari laborās cōsuevit, etiā huius uacuationis circuitus unā incidit repetitq;. Pari modo in mēstruis, si mulier est quæ laborat, nō absurdū fuerit per talem uacuationē morbi fieri iudiciū. Iam sudores tū ex corporis madore qui præcessit, ut uerisimile est, & præsertim in die contemplatorio erumpentes, tum ex meatuū reclusionē prænoscēdi sunt. Ac quæ per superna uacuatio

nes futuræ sint, ex his maxime intelligas licet. Nam præter ea quæ iam nobis sunt exposita, etiã ægrotantis facies intuenda est. Item si qua partium ipsius palpitet, aut uenæ in tēporibus pulsent, aut gena, aut nasus, aut oculus rubicundior appareat, maior spes uacuationis per superiora futuræ subest. Quod si etiã sine uolūtate illachrymēt, aut splēdiores oculis obduci imaginent, ac naribus ueluti scabēdi studio manus admoveāt: tūc quidē nō amplius morari, sed iam adesse fluorē sanguinis uidebis. Vbi enim semel ac iterū scaberint, erūpit. Rosio uerō stomachi, & labri inferioris tremor, crīsim per uomitiones futurā subinde nuntiarūt. Atq; de his abunde est. Accedit ipsis, ægrotātis ætas & natura, q̄ spem nostrā cōfirmēt. Præterea anni tempus, & præsens constitutio. Nam si æger adolescens est, aut alioquin naturæ calidæ, aut sanguinis copiosi cōpos, multo magis sperandū est. Quod si etiã antea, uel æger, uel sanus, ut supra dictū est, uacuationem sanguinis expertus fuerit, hoc uel solū ad profundendi sanguinis spē exhibendam satis est. Iam uero si anni tēpus æstas est, aut si nō æstas, certe calidus aëris status, ac sæpe illo tēpore per sanguinis profluuiū crīsim fusti nuerunt, corpusq; sanguine redundet, quod *πληθυσμός* nominār, & consueta rum excretionū sit retētio, hæc quoq; spem tibi auxerint. Similis porrō & in reliquis uacuationibus ratio habēda est. At si horū nihil apparuerit, sed æger in aliquo decretoriorū, qui post uigēsimū maxime sunt, dierū cōflatus sit, idq; dum morbus cōsistit, ac dolores quidā in articulos aliquos decūbant, aut secundū aures, alias ue particulas hæreāt, aut dolores quidē minime, uerū sudores cōtinui ex particula aliqua mēbratim erūpant, abscessu morbū finiēdum expectabis. Ac in illa potissimū particula abscessus se promet, quamcunq; uel sudores, uel dolores, uel tumores exerceāt.

QVEMADMODVM OPTIMVM IVDICIVM

peractum agnoscamus.

Cap. X.

**S**I uacuatō cōpetens secūdum concoctionē acciderit, & febris æger leuatus, aliisq; accidētibus, coloratior euaserit pro uacuationis ratione, pulsusq; uegetiorē acceperit, ac tum insurgēdo, tum sese erigendo fortior sit redditus, quodq; omnīū securissimum est, si ad morbum ferendum facilitas subsecuta sit, ea sane laudatissima iudicatio habetur. Quod si horum aliquo deficit, tantū ab optima abest, quantum id ualeat, quo deficit.

DE PVLIBVS EX GALENI COMMENTARIIS. Cap. XI.

**V**lſus motus est, quo cor & arteriæ attollūtur, submittūturq;. Vlſus ipsius duplex est. Etenim eleuatione, Græci *πνεύματι* appellant, qua arteria ueluti explicat quodāmodo, ac pateſcit, frigidus aër ingredit, uirale robur accendens, recreansq; ex quo etiã animalis spiritus habet originē. Submissione, *συστολή* Græcis uocat, qua arteriæ extrema ad mediū sui cōcidunt, cōnuiētq;, fuliginosa recremēta

d iii

expelluntur. Cæterū hæ arteriæ, oblōga sunt uasā, uenarū modo cōcaua, sed duplici tunica muniūtut, tū prædicti motus gratia, tū quod sanguinē spiritūq; contriñt. Originē trahūt ex corde, sed per totū corpus nichilatim distribuūtur. Omnes igitur, pulsus modo & sibi inuicē, & cordi respōdent. Quamobrē ex una ipsarū, omniū rationē queas colligere, nō itē uniuerſarum ex æquo motū percipere. Sed earū quæ excarnes corporis partes perreptāt, prōptius quæ carnosus subsunt, obscur\*. Porro iis quæ per brachiale excurrūt omisſis, nullā aut cōgruentius, aut usu commodius attigeris.

PRIMUM pulsū genus ex motus tēpore sumit, ut quod eleuatione arteriarū, atq; submissione examineſ. Differētiz ipsius sunt, citatus pulsus, tardus, & mediocris: quoniā omne quod motui est accōmodatum, aut celeriter, aut lente, aut mediocriter pro tēporis ratione moueſ. Citatus est, q̄ exiguō tēpore multū spatii motu emetiſ. Tardus, qui lōgo tēpore, parū inretuallū perficit. Mediocris, qui mediū quēdā motū inter citatū & tardū, peragit.

ALTERVM genus submissione, quātitate cōstat. Nam quodlibet corpus tria fortit̄ intetualla, longū, latū, p̄fundū. Quare etiā arteriæ corpus tribus cōstate intetuallis, neceſſum est. Verū in naturali animātis habitu, mediocriter ipsam unde quaq; eleuatā reperiēs. Cōtrā, cū animal præter naturā habuerit, nonnunq̄ in aliqua horū distātia deficit, aliquādo excedit. In quo statu meminisse cōuenit, qualis pulsus naturalis fuerit. si latitudine maior inueniat, latū uocabis. si lōgitudine, longū. si profunditate, altum. Liquet aut cōtrarios quoq; ipsi, & naturali minores, ad eū esse modū appellādōs, atctū, breuē & humilē. Qui uero omni distātia æqualiter in statu naturæ contrariū uertuntur, ex iis aliis hac ratione imminutus, paruus: alius auctus, magnus nominat.

TERTIVM genus pulsū, ad uirtutis robur exigif. Differētiz ipsius tres sunt, uehemēs, languidus & mediocris. Vehemens quidē est, qui tangentis manū ualide percutit. Languidus, qui inualide & imbecillitet. Mediocris, horū medio cōsistit, quem nōnulli naturalē esse putauerūt. Nam ira & exercitiis uehementiorē fieri pulsū asserūt, qui à naturæ habitu recedit, quorū dictis Galenus uenit obuiam, non firmiter inquiēs, sed prompte mutari eum pulsū, qui ex causis non naturalibus uehementior euadit. Pulsus igitur uehementior, qui nō expedite muratur, is nimirū naturalis & moderatus fuerit.

QUARTVM genus, instrumētī constitutione cōstat: dico aut arteriæ corporis statu. differentiz huius quoq; tres sunt. Vel enim instrumentū durius est, q̄ natura exigit, ac pulsus uocat̄ durus. Vel mollius, ac nominat̄ mollis. Vel mediocriter habet, ac moderatus inde nūcupatur.

QVINTVM genus, ex quātitate infusionis arteriæ pendet. Hæc habet discrimina. Plenus est, uacuuus & mediocris: quoniā totū uas, aut plenū est, aut uacuū, aut mediocriter repletū. Plenus itaq; est pulsus, ut Archigenes definit, qui arteriā pleniorē repræſentat, & submissione succo impeditā, uacuuus qui undæ modo arteriā exci-



5 tat, ut digitorū impressione loci inanitas confidat. Hæc igitur quinque pul-  
 suum genera, uno arteriæ motu cōstant. quoniā uero caloris, qui in corde  
 habetur qualitas, ex arteria quodāmodo magis euidenter apparet, dignati  
 sunt etiā hoc pulsū genus SEX TVM, cōmemoratis an numerare. Ad re-  
 10 liqua uero genera, tum quæ uno, tum quæ multis pulsibus cōprehendun-  
 tur, pertinet quod quietis tēpore cōstat, & quod numero, & quod æquali-  
 tate & inæqualitate, insupet quod ordine & inordinatiōe cōstituitur. Quod  
 itaq; quietis tēpus spectat, SEPTIMVM à primō numeratū, diuidit in fre-  
 15 quentē & rarū & moderatū. Nam cū arteria duplici agitef motu, qui con-  
 trariis absoluitur motibus, necesse est ut duplicia interualla cum ipso inci-  
 dāt. Alterū quod post eleuationē, ante submissiōē est: alterū quod secū-  
 dum submissiōē, eleuationē præcedit, quæ etiā plerisq; imperceptibilis  
 esse uidet, ut inter duos motus quies aliqua media existat. Cui iam longū  
 20 quietis tēpus est, is rarus dicit: cui breue, creber: cui medium, moderatus.  
 OCTAVVM genus pulsū ad rhythmū pertinet. Est autē rhythmus sum-  
 matim quidē habitus, aut tēporis ad tēpus proportio. In pulsu autē, iuxta  
 quædā tēpora motus, ad quietis tēpus, utpote eleuationis & submissiōis,  
 ad nonnullā quietē intercedentē. Secundū alia uero tēpora, ad motus quie-  
 25 tis ad quietē, puta interioris ad exteriorē proportio. Differētiæ numeri seu  
 rhythmī principes sunt duæ, pulsus boni rhythmī, & nullius rhythmī. Por-  
 rō uocat pulsus nullius rhythmī, nō qui nullū rhythmū obtinet, id enim  
 fieri nō potuit, sed malo rhythmō præditus, quemadmodū nullā habere  
 uocē, nullā ceruicē cum dicimus, qui malā ceruicē malamq; uocē sortitus  
 30 est. Cæterum pulsus cui nullus rhythmus adest, triplex differētia existit.  
 Alius siquidē est pararhythmus, medioerē boni rhythmī peruersiōē ob-  
 tinēs. Alius heterorhythmus, id est, altetius rhythmī, q̄ lōgius à bono re-  
 cessit. Alius ecrhythmus, q̄ omnino bonitatē rhythmī corrūpit. Veluti cū  
 35 pueri significas, peculiaris quidē puerili ætati iuxta rhythmū pulsus eurhy-  
 thmus appellat: q̄ ad uigentē ætatē pertinet, heterorhythm⁹: q̄ nihil huius  
 seruat, ecrhythmus dicit. NONVM pulsuum genus est, quod in omnibus  
 prædictis inuenitur iuxta æqualitatē & inæqualitatē generatū, quod uel in  
 uno pulsu, uel in pluribus spectat, systematicū quoq; uocāt. de quo prius  
 tanq̄ manifestiore dicēdū erit. Aequalis itaq; pulsus est, qui ordine par est  
 40 siue magnitudine, siue robore, aut uelocitate, aut reliquorū aliquo, aut etiā  
 omnibus. Inæqualis, qui ordine impar est. Si enim subsequētes uniuersi pa-  
 res magnitudine qualicūq; inciderint, eiusmodi pulsus æqualis uocat. At  
 si primus, secūdus & tertius pares fuerint, quartus autē impar: talis nimirū  
 ceu in magnitudine inæqualis dicit. Huius generis sunt, & deficientes & coinci-  
 45 dēs. Nō solū enim in uno, aut etiā pluribus magnis unus minor apparet,  
 sed nōnunq̄ totus quoq; motus omnino abolef, & pulsus deficientes appellat,

sicut alter huic cōtrarius coincidēs, cū expectata quiete in medio tanq̃ superuacaneus aliq̃s pulsus inciderit. Sin aut̃ secūdo primo paulo minor factus sit, tertius secūdo, & quartus tertio paritate, idq̃; deinceps lōgius, illiusmodi pulsus myurizōtas & myuros nuncupāt, nomē à figuris, quā in mucronē desinūt transferētes. Qui quidē perpetuo ex ipsis imminuuntur, ac nunq̃ decrescere cessant, in absolutā motus defectionē finiūt, ac uocamus ipsos myuros deficiētes. Qui uero cessant, duplici cōtinent differētia. Nō nulli siquidē ipso in qua primū defierāt paruitate, hāc perpetuo conseruāt. Quidā uero augescūt rursus, uel in parē priori magnitudinē redeunt, uel ad minorē, uel ad maiorē, ii myuri recurrētes dicūtur. Iam uero & in unius pulsus inæqualitate myuri pulsus fiūt, de quibus illis paulo post tractabim̃. Huiusmodi sane quādam est pulsū inæqualitas, quā sistematica appellat̃, atq̃; uno in pulsu deprehēditur, uel in una arteriæ particula, uel in diuersis accidit. quēadmodū in motu, exēpli gratia, in una quidē particula arteriæ inæqualitas dicif, cū aliter ineeperit, ac aliter desierit moueri circa unū digitū arteria, incipiēs quidē citior, desinēs aut̃ tardior, uel cōtrario. Atq̃; hoc triplici modo accidit, uel motus cōtinue manet, uel intercidit, uel repetit, & ueluti bis percutit. Si igitur manēs cōtinuus & nō intercisus, à celeritate ad tarditatē trāsierit, aut ecōtrario, impar citatus Græce *ἡνωτάτης* eiusmodi pulsus, & est & dicif. Quod si quiete intercisus cætera uelocior appareat, captifans appellat̃, ex capra animatē sumpta trāslationē, quā saliendo sublimis in aëre cōsistit, & secundū quēdam motū inopinatū priore citiorē molit̃. Porro si ab eleuatione recurrerit & ante submissione absolutā, secūdo manū ferierit, dirotus huiusmodi pulsus appellat̃. simile quippiā in incudibus fieri cernas licet, q̃ppe mallei simulatq̃; semel per manū in ipsas illati petuissent, seuibrātes, incudū renixu & secundū rursus, uel etiā tertiū feriūt. Atqui nō solū in motū tēpore inæqualitas quā uno ictu in eadēq̃; arteriæ particula accidit, potest fieri, uerū & illa quā uirtutis robore cōstar: nō aut̃ ea, quē distantiarū quātitate cōprehendit. Nullo enim in idē pulsus eadē in particula magn⁹ & paruus queat effici. neq̃; in alio genere, sed in diuersis particulis. porro in uariis arteriæ particulis unoq̃; impulsu duplex fit inæqualitas. nūc quidē cū motus manet cōtinuus, & arteria iuxta quosdā digitos citius mouet̃, iuxta quosdā uero tardior. nūc aut̃ eū motus quoq̃; intercidit, ut nōnulli quidē digiti motū apprehēdant, nōnulli uero nō. Ac iuxta eleuationis quantitatē in pluribus quidem particulis inæqualitas manifesta est. Ex quo genere sunt myuri uno in ictu inelinātes, quos Græci uocāt *ὑπονωτάτης*, & *παρανωτάτης*. Sinanq̃; in digitis interioribus magn⁹ subincidit pulsus, curuatus inde iuxta rationē minuat̃, ut exterior ad agrotātis pollicē minima arteriæ pars appareat, myur⁹ uocat̃ ad muris caudæ similitudinē, uel meiurus quod caudæ modo imminuat̃. At si iuxta medios digitos magn⁹ incidēs, curuat⁹q̃; utrobiq̃; minuat̃,

minor apparēs, hunc Archigenes *μυυρά*, quasi dicas Latine inclinantē, & *μυυρά* appellauit, manifestò significare uolēs eleuationis breuitatē cū extremorū utrorūq; ueluti in inclinatiōe. Nō enim ut abscissis protinus utrinq; partibus, sed ueluti inflexis in arcū cōtractus est, cū sit myurus magnitudine utrisq; in partibus. Ac cū iuxta magnitudinē inæqualitatē partim maturius, partim tardius assumpserit, tū fluctuātes, tū uermiculātes, pulsus oriunt. quòd si eā quæ in situ est receperint, cōuulsorii & turbulēti, ut uocāt, cōstitūtur. exordiendū igit est à fluctuosus, in quibus nō simul apparet in tali inæqualitate arteria oīs eleuari, sed pars illius alia primum, mox alia, dein alia, postremo quarta, ut motus cōtinuus maneāt in modū undarū sese eleuantīū. ac nōnulli undā in rectū tendentē obtinent, quidā in obliquū inclinarūt, & alii in breui lōgitudinis distātia, altitudinem magnā habēt, alii cōtrā, aliqui latitudinē, aliqui angustia. Similiter etiā celeritate & robore inæquales sunt. Fluctuosus totus in paruitatē cessans, uermiculās appellat, uermis gressui assimilatus. Quēadmodū uero fluctuosum pulsum minorē factū uermiculās excipit, ita uermiculantē formicās, ubi motibus multis abolitis in unū eundēq; perq̃ exiguū desierit. Vocat<sup>r</sup> hic quoq; est à formicæ animātis similitudine, tū ob paruitatē, tū ob mor<sup>i</sup> speciei. Est enim formicās admodū exiguus, ut quo minor alius nō extet. Parimō lāguidissimus omniū, creberrimus, nedū citatus, ut Archigenes existimauit. Huic cōfinis est Hecticus. quēadmodū enim febris, sic etiā pulsus Hectic<sup>us</sup> est, qui nullā magnā mutationē subit, sed perpetuo cōsimilis manet, trahitq; ut ab initio incepit, & nunq̃ soluit, toto habitu in motū conuerso. Porro cōuulsorii pulsus utrinq; ab extremis retrahere, tēdere, & cōuellere uidētur, cū chordæ cuiusdā tēstis sensum præbeāt: at in turbulentis nihil tale reperit. Sed maior in his eleuatio est, ut arteriæ particulæ quædā sursum ferāt, uno eodēq; tēpore, ac morū ipsarū spiculis rectissime assimilaues: quæ ualidius emissa, celeriter ferūt cōquassanda. Serratus pulsus est, cū alia pars arteriæ elata, alia minus, ob duriē nimirū ipsius esse uidet. Ceterū pulsus hic etiā turbulēti quippiā possidet, ac citatus quidē est, creberq; nō semper aut magnus. Decimū genus pulsū ex inæqualitate perfectū cōmemoratis succedit, quod ordine, & inordinatione cōplectimur. Nam ordinatus & inordinatus inæquali in parē, iuxta circuitus rationē, & in imparē prorsus diuiso ex utraq; sectione originē trahūt. Ex circuituum paritate ordinatus, ex absoluta uero imparitate inordinatus. Siquidē pulsus æqualis ex toto est etiā ordinatus, quia ordine parē ipsum dicebamus: inæqualis aut nō omnino inordinatus est. Si nāq; paritatē corrūpat, circuitū uero seruet aliquē, ut in eleuatiōis quāritate, uerbi gratia, si duo magni, & unus paruus sit: deinde rursus duo parui, & unus magn<sup>us</sup>, atq; sic deinceps, uocabit inæqualis quidē, sed ordinatus. At si ad hoc paritatē corrūpat, neq; ordinem quēpiā inæqualitatis cōseruet, præter inæqualitatē, & inordina

tus talis est: similiter in aliis quoque generibus horum se habet. Inordinatorum  
 quidem, alii sunt ex toto inordinati, ne uel exiguum quendam circuitum confer-  
 uantes, alii uero secundum circuitus ordinati, quatenus enim continuam ordi-  
 nationem non habent, inordinati uocabuntur: quatenus autem diu circuitum  
 quendam tuentur, secundum circuitus ordinati sunt. Exempli gratia, si contin-  
 gat duos magnos fieri, duos item paruos, deinde tres magnos, & tres exi-  
 guos: quatuor magnos, & pares exiguos, & e contrario tanquam reflectentes duos  
 magnos, & duos exiguos: tres magnos, & totidem exiguos: & deinceps simili-  
 ter. scire uero conuenit, inter alios quidem contrarios singulos, quendam esse  
 medium. Aequalis autem & inæqualis medium nullum: neque ordinati, neque inor-  
 dinati: nisi uoles secundum circuitus ordinatum medium dicere ordinati & inor-  
 dinati. Ceterum aliorum omnium medii, secundum naturam sunt, præterque uehemē-  
 tis & languidi, ut à nobis ostensum est. Inter hos autem æqualis solus secun-  
 dum naturam est, reliqui præter naturam, inæqualis ordinatus & inordinatus.  
 Hæc pulsuum genera uniuersa sunt, & generales ipsorum differentiarum. Nonnul-  
 li uero his etiam alia duo annumerarunt. Primum à situ arteriarum sumitur, qua-  
 tenus sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrorsum deducta esse uideat. Al-  
 terum quo maturius, aut tardius: ex quorum numero fluctuosos turbulen-  
 tosque pulsus esse diximus, ac nos compendii gratia simplices solum differen-  
 tias prodidimus. ex dictis autem si coniungamus has, facile erit etiam compositas  
 inuenire. Porro opportunum erit deinceps, causas quoque pulsibus conueniē-  
 tes exponere, quas comitatur etiam præfagiū ab ipsis desumptum, ac initium à ma-  
 gnitudine capiemus, quoniam hæc aliis est manifestior. Magnus igitur pulsus  
 redditus, uel propter usum urgentem, qui calor est in corde exuperans, externæ  
 appetus refrigerationis, & ueluti euertilationis, aut propter corporis subtili-  
 tatem, ut posterius ostendetur. Porro augetur calor, aut ex causis naturali-  
 bus, utpote ætate florida, aut puerili, aut simpliciter calida, anni tempore, re-  
 gione & temperamento calidiore. Aut causis non naturalibus, ueluti aëre qui nos  
 ambit calidiore, balneis calidis, exercitiis, cibis, uino, medicamentis calfacien-  
 tibus. Aut causis naturæ contrariis, puta intemperie calida, aut humorum putre-  
 dine, aut ira, aut similibus. Discernes uniuscuiusque pulsus hoc discrimine,  
 quod causas naturales magnitudinem ipsius faciunt stabilem, & quæ difficulter  
 mutari queat. Reliquæ uero, ex facili mutabilem, ut etiam manu adhuc admo-  
 ta frequenter, aut certe paulo post subsidat. Iam uero pulsibus, qui sane ob ba-  
 lineas calentes magni sunt, mollities quoque accedit, quemadmodum iis, qui  
 ob calidam & præsertim cum siccitate intemperiem magni existunt,  
 durities. Exercitatis uero mediocriter, aut perfrictis, nec duri, nec mol-  
 les sunt, medio statu præditi. Pectoris autem regio, multo calidior est,  
 quod iam & iratis accidit. Ex cibo autem magnis, aut uini usu, aut ira, præ-  
 ter magnitudinem etiam uehementia inest. Qui uero occultare iram  
 student, aut aliud quid præter medici permissionem factum, uerbi gratia,

medicamen calidū sumptum, eundem medicū simul atq; manū attingat,  
 interrogantē celare uolētes, iis prāter magnitudinē manifesta quoq; obo-  
 ritur inæqualitas. Ad hæc ægrotātis mores & cōsuetudo nō mediocriter  
 ad pulsus dignotionē faciunt. Consuetudo quidē, si medicaminū appetēs  
 5 sit. mores, si opinionis eximēdz peritus & callidus sit. Ex humorū putredī-  
 ne magnus, ad magnitudinē adhuc submissiōnē magis citatā habet. Verū  
 ad magnū pulsū efficiendū, non solū usus abūde est, sed etiā uirtutis mi-  
 nisteriū deliderat, instrumentiq; cōmoderatio inter siccitatē & mollitiē.  
 aucto igitur cordis calore propter quālibet causam ex cōmemoratis, pri-  
 10 mum quidē magnus pulsus efficitur: ubi uero magnitudo usui nō suffice-  
 rit, statim etiam celeritas ipsi accedit. At si ne sic quidē satis fuerit, mox fre-  
 quentiam assumit, parui autē, tardi & rari pulsus, itidem à cōtrariis fiunt.  
 Sed quādocunq; à magno citato & crebro ad cōtrarios sit mutatio, usu ni-  
 mirum postulāte, nō amplius id quod in pulsu primū est, id etiā primum  
 15 cessat, uerū quod postea acquisiuit, id primū abiicit, statim quidem rarus  
 euadens, deinde tardus, postea quoq; exiguus. Sin autē tarditas paruitasq;  
 accreuerit, rursus raritas in erebritudinē transmutatur, ut per eam utcunq;  
 usui fiat abunde. Hæ igitur magnitudinis, celeritatis, frequētiz, & contra-  
 riorum ipsis pulsum causę habētur. At iungetur ipsis ea quoq; pulsus cō-  
 20 uersio, quæ una solū distantia cōstat. Itaq; latitudo sola augetur, dum hu-  
 miditas potissimū, uel secundū naturā, uel etiam ab exterioribus causis re-  
 dundat, quemadmodū altitudo dum uirtus ob instrumenti mollitiem si-  
 mul augetur, longitudo à siccitate, & carniū circumpositarū emaciato pa-  
 lām innotescit, reliquis distātiis collapsis. Non enim arteria longior, q̄ po-  
 25 stulat natura, fieri potest, ac proprie magis pulsū huiusmodi gracile ap-  
 pellaueris, quemadmodū ipsi contrariū secundū latitudinē solam, & pro-  
 funditatem ad auctū, amplū. Cōtrariis autē horum affectibus pulsus non  
 nunq̄ incidit, & in aliqua, aut aliquibus distātiis prohibetur humilis, aut ar-  
 ctus aut brevis, cum talis non sit, sed ob pinguedinis cuiusdā, aut carniū,  
 30 aut membranarū oppositarū crassitiē apparēs. interim etiā totus paruus  
 uidetur, cum reuera paruus nō sit, & obscurus & languidus similiter. Quid  
 opus est uerbis: sæpe absoluta pulsus defectio quibusdā esse putat in omni-  
 bus arteriis, cum uere nō sit, & maxime iis qui negligētius ipsum tangunt,  
 uerum motus ob carniū copiam delitescat, reuera languidus. nō enim ex-  
 35 tremā pulsus defectio homini potest accidere, quoad uita fruatur. quēad-  
 modum igitur ecōtrario in locis ex cāmibus, etiā parui pulsus, magni esse  
 uidētur, corpore scilicet uehementē emaciato, arteria spinā perreptans, sæ-  
 pe tangētibus abdomen, motum repræsentat, ac nonnulli etiā ex his, quæ  
 prius in artubus nō erant cōspicię. Quamobrem omnibus causis diligent-  
 40 ter attendendū censeo, ne dignotio ipsorū nos lateat. Pulsus autem uehe-  
 mēs uirtutis robore efficit, si nulla ex causis reliquis renitatur, utpote usus

dissolutus, aut instrumēti durities. Languidus aut pulsus, imbecillā uirtu-  
 ris & solius soboles est, aliud licet nullū adfuerit. Si quid uel uel uel uel uel uel  
 bus causis ad sui generationē indiget, languidū etiā sola imbecillitas effi-  
 cit. Qui igit per initia uehēmēs est, ætates, anni tēpora, regiones, & tēpera-  
 menta moderata comitat, languidus immoderata. Porro qui à lāguore in  
 uehementiā incidit, uirtute uindicta ab imbecillitate prius occupante effi-  
 citur. Vindicatur uero, aut ex his quæ in ipso corpore cōtinentur, ueluti  
 humorū cōcoctione, uel excretionē, uel ira: aut ab exterioribus, nempe ui-  
 no, cibo, exercitiis, ac aliis quæ intemperie diuuant. Vires dissoluunt, ine-  
 dia, uigilia, uacuationes immodicæ, tristitia, curæ & dolores, maxime ani-  
 mæ defectionē inferētes, ac id genus quæ intemperie faciunt. Quidā uero  
 ex rudibus ac inexercitatis, durū pulsum uehementē esse putauerūt, quod  
 discrimē exercitātū, tum ratione, tum tactu, nunq̃ latuerit. Nam uehēmēs  
 magna ex parte cū magnitudine in sublimitatē attollit, tactū ualide per-  
 cutit: durus magnitudinē non recipit propter arteriæ contumaciā. Sic igit  
 durus, ob instrumēti duritiem, quam refrigeratio immodica, aut siccitas,  
 aut tētio ab inflāmatione profecta, aut cōuulsio generat. Statim uero duri-  
 tiem etiā paruitas, & celeritas nonnunq̃, & frequentia magnitudinis loco  
 propter usum sequit. Mollis pulsus, arteriæ humiditatis comes est, quam  
 humidiorē reddūt ex iis quæ secundū naturam sunt, humectiores cibi, bal-  
 nea frequentia, somnus multus, uictus ratio & copiosior & delectabilis. ex  
 his quæ præter naturā sunt, sopores, lethargi, aquæ subter cutē, & reliqua pi-  
 tuitæ uicia. Plenus pulsus, aut humorū copiā, aut ciborū, aut uini potio-  
 nis abundantia indicat, quemadmodū uacuis contraria, aut enim inedia,  
 aut uacuationē. Vbi calidius arteriæ corpus occurrit, multā in corde cali-  
 ditatem, reliquo corpore refrigeratē, aut conuulsoriā quampiā arteriarū  
 uiolēto motu incalcentiū, dispositionē fatetur. Archigenes uero tradit  
 arteriæ locū proprie in catochis calidiorē deprehēdi, quemadmodū in iis,  
 qui grauē animi in somnū delationē patiūtur. At rhythmus, de quo dispu-  
 tatum est, si par sit motu & quiete, probā totius corporis temperie præ se  
 fert, quantū ad se pertinet, uel nō magnā à bona declinationē, sicut in æta-  
 te puerili, & corporibus alioquin tēperatis. Ac si longius quietis tēpus fue-  
 rit eo quo motus peragitur, calorē præ pollere notat, quēadmodū in æta-  
 te florētibus, & his proximis, ueluti in corporibus senilibus æquabiliter fri-  
 gidis, diuturnius motionis tēpus est q̃ quietis. Notare aut oportet rhy-  
 thmi inæqualitatē mēsurā esse motus q̃ celeritate & frequentia cōsistit. hāc  
 aut ueluti materiæ rationē & rhythmū obtinere. Iam uero deficientes, coin-  
 cidentesq̃ pulsus sūt, uiribus oppressis, & ueluti aggrauatis, sed coinciden-  
 tes minorē offensam, deficientes maiorē significāt, ac in uniuersum uirtus  
 oppressa grauataq̃ pulsus mutat ad inæqualitatē inordinationemq̃, tum  
 aliam quamlibet, tum eam quæ uehementia & magnitudine constat. Ac ex

myuris pulsibus genere duplicibus demonstratis (uel enim in systematica, ut uocant, inæqualitate, uel in ea quæ uno fit ictu, deprehenduntur) deficientes quidem extremam uirtutis internicionem notant, repentes autem recurrentesq; & ipsi quidē imbecillē, sed repugnantē adhuc resistentēq; & renuentem indicant. in uno autem ictu myuri & inclinantes, quos *uermiculas* uel *magnumdrag* appellamus, maxime iis fiunt, qui paulatim contrahuerūt. itē inflammationibus nō solutis, præterea plurimis quomodocūq; tabescentibus, dū partes quæ circa arterias habentur, emarcescunt. Porro inæqualiter citati & caprillantes, febriles potissimum calotes comitantur: uerum si pulsus eleuationis principia dissoluens, extremū ipsius acceleret, & submissionis initium, putredinē exuperantem notat, natura fuliginosiscrementis excernendis incubente. Sin autē e contrario submissionis initium dissoluerit, ad eleuationē uero magis instet, calorē præpollere scias, qui refrigerationē desideret. Comitatur hæc in feбри etiā crebritudo plurima ex parte, interdū magnitudo quoq; nisi uirtutem instrumenti duritia impediatur. Cū autē hæc in arteria intenditur, & uirtus non sit inualida, pulsus fit qui à his feriendo dictotus appellatur. Porro fluctuosus humidiores potissimū affectus sequitur, atq; his magis aquæ subter cutem genus, quod Anasarca uocat, item lethargos, & peripneumoniā. At cum uirtus dissolui inceperit, sed paululū adhuc resistat, fluctuosus in uermiculatē decidit: ubi extreme collapsa fuerit, etiā hunc formicās excipit. Hecticus autē proprie contabescētes & alioqui emarcescētes sequitur. Conuulsorius fit, quum neruorum origo inflammata quadam affectione cōsistatur, sicut in phreniticis, & acuta epilepsia correptis, quando etiam moriuntur adhuc calentes, qui hoc uitio sunt occupati, contrario his modo quos syncope inuadit. illi namq; uehementer etiā frigidi, adhuc uiuunt. Turbulentus autem pulsus efficitur, cum usus magnā eleuationē requirit, ac uitale robur eam potest creare, solū uero arteriæ corpus præ duritiæ, in magnam attolli diastolē, ut in magnis inflammationibus, obstructionibusq; diuturnis, impotens refragatur. Pulsus serratus in totū index est inflammationis, & præsertim partium quarundā neruofarū: quinetiam pleuritidi peculiaris est: remittens quidē, mollis & ex facili concoquendæ: intensus autē difficilis, & concoctu peruicacis: quæ cum imbecilla quidem uirtute, subito in periculum præcipitat: cum ualida, longo tempore cōcoquetur. Vel enim in uomicā transiit subinde, uel marcida tabes ipsam exceperit. Iam uero sciendū uenit, in ordinationem comitari inæqualitates. raro siquidem inuenire est inæqualē pulsus, ordinatum. Minotes offensæ, inæquales pulsus & ordinatos: maiores, inæquales & inordinatos procreant. Hæ igitur simplices pulsuum causæ sunt & præfagia. Ex his etiā compositas, ut in sermone de differentiis ipsorum dicebamus, haud negotiosum est inuenire.





Luus optima est, mollis, cohaerēs & eodē tēpore quo in secunda ualitudine assuevit, reddita. Talis nimis est, quē in rufum elāguēse it, simul & cōuenienter spissa, nō nimis foetida: quē talis nō est, mala censet. Quē igit colore similis cibo ingesto cernitur tenuis, nō liquida, & celeriter descendēs, cruda est. Rufa & intēperata initio quidē biliosiorē morbū indicabit: sin aut in declinatione talis excernatur, corpus probe expurgari denuntiat. uiridis æruginosā bilis nota est. nigra, uel atra bilis, uel sanguinis cuiusdā indidē adusti. liuida, refrigerare quodāmodo, & emori penitus interiora significat. oleosa pinguisq; corporis pinguitudinē cōsumi innuit: quemadmodū eadē uiscosa, pingui cū sit deterior, animantis particulatū tabē prae se fert. Nimis foetida haud exigua fatet putrefactionē. Porro in omnib<sup>9</sup> hisce, si alius cibo assumpto qualitate nō respondeat, eodē modo iam dispositio quoq; considerabitur. Omniū deterrima & pestifera, erit nigra, liuida, oleosa, celeriter transiēs.

## DE VRINARVM NOTIS.

## Cap. XIII.

Quemadmodum in deiectionibus, ita in urinis quoq; regula, quae sanos arguit, usi, ægrorū notas exequemur. Vrina igit præstātissima est, quae sanis simillima. Talis nimirum est subrufa simul & subflaua. statim uero hæc & crassitiē moderatā habet. At cū triplex turbidarum urinarū sit differētia, (uel enim redditæ tales, paulo post subsidūt, uel cōsimiles perpetuo manēt: uel puræ excernūtur, deinde uero turbantur) uitiosa quidē existit tertia ordine dicta, proba uero benigna q; prima: medio utriusq; cōsistit secūda, summe cruda est, adamussim diluta, ueluti desperatē cōcoctiōis uenosi generis accidēs. Quādo aut celeriter descēderit diabetes, ut Græci appellāt, efficit. Verū hæc inter urinas crudas deterrima est, succedit ipsis, tenuis admodū & a quæ modo exalbida. His uicina est alia urina, quæ multis in morbis apparet: ut uideat mixtā habere speciē uini tenuis & albi. Suppallida uero hāc sequit: quæ pallida quidem modo erit, & subrufa, cōcoquitur aut iam quantū ad colorē ipsius attinet. Tantū uero crassitiē ipsam a diluta recessisse oportet, si probe concoqui debeat, quantū etiam colore. Quo secundū naturā adamussim seruato, si subsidēs album, leuc, æquale, & copiosum reddit, exactē nimirū concoctiōis nota fuerit: plus aut erudi humoris expurgari signat. Non tamē si crassa modice fuerit, habeatq; subsidēs aliquod exiguū, nō cōcocta iam ex toto erit. Si enim subsidencia parti farinæ crassiori, aut laminis similia, aut fursuri, aut nigra, aut liuida, aut uiridia, aut fædi odoris habeat, pter quod quis huiusmodi in cruditate est, etiā mortis periculū ostēdit. Porro boni coloris urina, quæq; simul, uel subsidētia alba, leuia, & æqualia representet, uel nebulas quidā similes, uel suspēsa oim urinarū ē laudatissima. & p̄cipue, si qd in eis deſidet, tale exiterit. Deinde cōmendat cui<sup>9</sup> suspēsa huiusmodi cernūt. Tertiū bonitatis locū habet, cui<sup>9</sup> nebulæ tales apparēt. Ac, ut uno uerbo expediā,

quæ urinis probe innatât, quâto inferius subsidetûr, tâto magis laudâtur.

DE SPVTI NOTIS.

Cap. XIII.



Putum subflauû, subrufum, leniter spumâs, & tenue, solâ cruditatē, malû uero nullû insignius denûtiat. At syncere flauû, rufum, spumosum, uiride, glutinosum, rotundû, atq; his adhuc magis nigrû, prauû est. Etenim præter sanguinem, alterius humoris cuiuscûq; intēperati prauâ ostēdit dispositionē, caloris inflāmati sobolē. Cruenta igit sputa mediocria sunt, flauæ aut nigræ bilis, difficilia. Cæterû quomodo ipsa edâtur, inspicere simul expedit. Nam si prōpte excreent, li-  
 10 quido cōstat talia quidē esse salubria, cōtraria uero periculû testari. absolutâ itaq; concoctionē fatetur sputû leue, albû, æquale: cōsistentia neq; liquidû neq; crassum. Sûmæ uero cruditatis nota est, si nequicq; expuit. At si nō atrû, sed tenue sputû fuerit, lēguidæ cōcoctionis argumentû est. Sin autem syncere rufum prodierit, aut flauum, nihil boni pollicetur. Si liui-  
 15 dum, aut eruginosum, aut atrum, summam perniciem portendit.

DE FEBRIBVS DIARIIS DIGNO-

scendis curandisq;.

Cap. XV.

**F**arias febres, urinarû in primo die concoctio, calorisq; suauitas ceu propriæ ipsarû & inseparabiles notæ testant. Verû à  
 20 prima febrî solutione, certiorē habiturus es earû cognitio- nem. Quippe artierarû in hac motus ei qui in secûda ualitudine fuit, ex toto respōdet, cû nulla ex aliis febribus in naturalē statû reuertat. iam uero quod facile morbû fert æger, maximû & id indicî est. Opportuni sunt, id  
 25 genus febribus, in quorû corpore quod trāspirat, halituosum non est, sed mordax & acre, fumo fuliginî ue nō absimile. Hi aut sunt calidi & sicci tēperamēto: breuiter biliosi, quos *πυροφλογοί* Græci uocât, qui igit ob lassitudinem febricitarût, pinguiter simul ac molliter fricâdi sunt, in balneumq; ducēdi. Quibus siccitas febrē intulit, fricandi hi quidē minus, sed lauandi sunt liberalius. Quos curæ, mærores, uigiliæ & ira exercuerût: lauare qui-  
 30 dem non subinde oportet, uerû oleo copiosiore tepido, cui minima astrin- gēs uis insit, tum paululû fricare, tû ex cōsuetudine lauare cōuenit. Ab insolatuusti, protinus ab initio refrigerationē desiderât, tum crebriorē laua- tionē: minime uero aut oleû largû, aut crebrâ frictionē. Sint aut quæ refri- gerēt & rosaceû & omphacinû, quod nihil in se salis habeat: eadē uero sinci  
 35 piti uehemēter superfundere oportet, & ubi febris inclinauerit, in balneû æger ducēdus est. Si quis ex frigoris iniuria febrē cōcipit, etiâ is in remissio- ne lauādus est. At si eû grauedine & destillatione febrat, priusq; hæ cōco- quantur, lauationi nō committet. Porro qui æstus iniuriis patuerût, ii, uel cû hæc adfunt, cōmode lauant. Post lauacrû uero caput perfundendû est:  
 40 corû quidē qui ex uisione febricitarût, refrigerâtibus: qui aut ex frigore, ca-  
 • lesfacientibus mediocriter, cuiusmodi irinû est, & nardinû unguentû. Vea

rum in quibus meatuū constipatio febrē excitat, his cōuenit ex aqua dulci, & tēperata lautio, cum frictio, quā rarefaciat, & exercitationes modicę, uictusq; dulcib<sup>9</sup> procreādis succis idone<sup>9</sup>. At cui propter inediā febris cōtracta fuerit, ei opus est statim, ubi prima accessio temiserit, in balneū per duci, & tēpēte oleo largissime perfundi, tū molli manu perfricari, lēte in ca-  
 lidi solii aqua immorari. Simulatq; exierit, ac sese recollegerit, denuo bal-  
 neum ingredi, postea aquā calidā potare, mox ptisanę cremorem, deinde  
 lactucā assumere, & aliquid piseiū eorū qui molli sunt carne, ex albo iure.  
 Omniū uero cōmunis esto uictus species, quę & boni sit succi, & cōcoctu  
 facilis, & quę nusquā exiguis cutis meatibus inhæreat. Vinū propinetur &  
 aspectu, & uirib<sup>9</sup> aquosum. Oportet autē in primo febrīū insultu nōnunq;  
 primę accessionis horū aliqua mutare, in quibus corporis intemperies ad  
 calidius, sicciorq; transiens, febres accendit. Qui ex inguinū inflāmatione  
 febrim conceperunt, ne medicum quidē interrogant quid sit faciundum,  
 sed ulceri, quod in inguinibus, excitatum est, prospicientes, lauant, ubi ac-  
 cesso declinauerit. Ceterum a uino ipsi sunt arcendi, priusquam inflām-  
 mationes inguinum fuerint solutz, & tenuiore uictu enutriendi.

## DE PVTRIDARVM FEBRIVM AGNITIONE. Cap. XVI.

**P**utridę febres dignoscunt his notis: nulla ipsas exterior causa præ-  
 cedit: neq; a rigore incipiunt, neq; aestu, neq; frigore uehementi:  
 quod & ipsum est peculiare febrīū putridarum indicium, sicut &  
 pulsū depressio. Nomināt sic, cum incipiēte accessione perexiguos qui-  
 dem ipsos & inæquales obtinēt: ut qui singulariter illiusmodi febribus sunt  
 peculiāres. iam & caloris qualitas maxima putridarū febrīū nota est, qui su-  
 liginosus adeo existit, ut manū erodat. Similiter ad ipsas ptoprie spectat  
 etiā urinarū cruditas, & obscura cōcoctio. Magnū uero & notabile conco-  
 ctionis indicīū, in primis urinis nunq; eiusmodi febres representant.

## CVRATIO FEBRIVM PVTRIDARVM. Cap. XVII.

**S**i uires sint ualidę ei qui ex putredine febricitat, sanguinem di-  
 mittes protinus, modo cruditas uentriculū nō infestat. At si  
 uires imbecillę, aut ætas prohibeat, sanguinem nō detrahet,  
 cuius uacuatione, putrida per urinas, aluū & sudores expurgare cōuenit.  
 Sin aut spōte sua nonnunq; impetū ad os uentriculi capessant, etiā per uo-  
 mitum: alioqui non oportet ea præter naturā irritare: uerū deligi materię  
 debent, quę sine calefaciendo siccandoq; ualenter, prædictas uacuationes  
 moliri possunt, ueluti ptisanę cremor, aqua mulsā, oxymeli, & apomeli,  
 apiiq; radix in aqua potabili incocta. Cum aluus nihil deiicit, ex aqua mul-  
 sa cum oleo clystere ducēda est. uerum totum corpus rarefacere prius nō  
 expedit, q̄ uacuatum fuerit: ubi uacuaueris, rarefacias utique licet, oleo te-  
 pide calido, quale est, quod ex chamęmelo conficitur. in hoc tempore ui-  
 num aquosum potui datum, uniuerſas promouet uacuationes: eiusdem

A uino cauēda  
 & ephemeram quibuscumque

aplogismos  
 quosdam  
 duo pib

ide a de de  
 aplogismos  
 quosdam

40



cōcoquat, ex toto circūcidendū est. simul atq; cōcoqui inceperit, tenuia quoq; modicū, primo die exhibēdū. Cibi humectātes refrigerātesq; utili ter assumuntur. A melle abstinendū, sinapi, falsis & acribus omnib<sup>9</sup>. uinis autē admodū uetustus, & natura calidis. Cāterū nihil miri est, si in homi nibus primum exercitis, in ediamq; expertis, nunc autem ordine cōuerso otiosis ciboq; usis pleniorē, bilis maxima ex parte mixta pituita reperiā. Cuius rei gratia cōplures tertianę, aut citra tot<sup>9</sup> corporis cōcussionē hūit: aut perexigua ipsis oboritur, unde etiā animaduersionē propriā deside rant. Neq; enim balneum, neq; cibus aliquis liberalior tertianis spuris an te concoctionē conuenit: quoniā ne panis quidē micæ, oua, & consimilia.

CVRATIO TERTIANAE NOTAE. Cap. XX.

**L**Auare in tertianis spuris per initia salubre nō est, sed quando iam cōcoctionis notę apparent: neq; cibū quotidie exhibere, sed alternis diebus abūde est. Quies autē, & pręcordiorū for tus ipsis cōducit, tum sorbitiōes cōcocti faciles, & clysteres aluo inditi nō admodum molles. Atq; si sanguinē detrahēre opus est, neq; hoc omittēre oportet. Tota uero uictus ratio erit, nō quæ refrigeret uniuersum corpus, humectetq; uerum etiā modus aliquis qui magis incidat, ac calefaciat, adhibeat. Maxime uero cōduxerit ipsis ptisanę cremor pipere iniecto, uel hyssopū quoq; nonnunquā, uel origanū, uel spica nardi, aque mullę admi sta incocta q; potui exhibetur, & alia, quę urinę ciendę sunt, pręterquā ea, quę uehēmēter calefaciūt, exiccātq;. Maxime uero absinthii coma, post septimū diē cōtinuē porrigit. Iā & oxymel epotum, multis fuit auxilio. ad hęc nōnulla ex his quę molliter uentrē subducūt. Porro uomitus secūdū ci bū, iis quibus hęc febris in uetustatem incidit, utilissimus est.

QVARTANARVM COGNITIO. Cap. XXI.

**Q**uartana inuadit multa cū perfrictione, ut quę ex frigido hu more, atra bile originē trahat. Calorē uero feruoremq; febri lem tertianę modo nō obtinet, imo nec bilis uomitus eā comitat. Adhęc si urinę tenues, albę, & dilutę fuerint, quartana erit febris. Eximia uero ipsius nota est, pulsus exiguus, & rarus. Cāterum in autumno potissimum incipit, erraticis superueniens febribus, ac nonnunquā in forma eius potissimū subsistit quę quarto die reuertit: aliquando etiā plurium dierum interuallo, iuxta quosdam circuitus accessionem habet.

CVRATIO QVARTANARVM. Cap. XXII.

**Q**uartana laborātes leniter tractandi sunt, neq; medica mēto ullo forti sollicitādi, neq; uacuatione, nisi forte sanguis uehēmēter exuperare uideat, cum uenā dissecare cōuenit. Victus eis offeret optimus, qui nō inflet, & uentrē his quibus uti cōsuevit, emolliri debet. Quod si hęc nihil proficiāt, clysteribus per initia mollibus, deinde acribus utendū est. A suilla carne prohibeātur egri, atq; ab omnibus cibis qui glutinosi, ad exi

tum tardi sunt, tum qui refrigerant corpus humectantq̃. Vinū utile est tene, album & modice calidū. Item salsa & sinapi ex usu sunt, tum triduo assumptum medicamentū dia trion pipereon, id est, quod triplici cōstat pipere, uel quod diospoliticon appellāt. Iam & piper solū recte ex aqua quotidie sumitur. In morbi statu uictus ægro tenuissimus præcipitur, statim uero etiā ut diu cōquiescat, iniungendū est, tum uisceribus prospiciendū per ea quæ emolliūt, relaxantq̃. Insecutis diebus medicamēta cōferūt, quæ urinā ciēt. atq; si cōcoctionis notæ apparuerint, cū fidutiā tūc quoq; iis uri expedit, quæ atros humores uacuāt, idq; nō semel dūtaxat, uerū etiā sapius. Porro secundū ualidā purgationē & medicamentū quod uiperis cōstat, exhibetur, & alia quæ ad eiuſmodi febres commendantur, inter quæ est & nobis familiare, omnium probatissimū, quod succum cyrenaicū recipit.

## QVOTIDIANAE AGNITIO.

Cap. XXIII.

**Q**uotidiana haudquaquam cum rigore primo statim die inuadit, sed temporis spatio perfrictio magis quā rigor oritur. Aegre uero incalescit, & diurnum habet incrementum, non tamē adurit ægros, neq; multum, & crebro spirare compellit, ac ueluti flammam ex ore elidere, uel frigidam bibere. pituito si autem uomitus hic accidūt, & quæ per aluū uacuantur, frigidiora, crudiora, dilutiora \* & pituitosiora cer  
nuntur: totum corpus crudis humoribus redundat: sudores minime primis diebus erumpunt, neq; ad integritatē uenitur, cutis ægrotantibus albi cat, urinæ uel tenues sunt & exalbidæ, uel crassæ, turbidæ & rubræ.

## CVRATIO QVOTIDIANAE.

Cap. XXIII.

**Q**uotidianam curantes, oxymelite primis diebus utimur, tum iis quæ urinam probe eliciunt, ac uniuersa uictus species inçisoria esto, circa statū uerō uentris habēda est ratio, præsertim ipsius orificii, deinde ægris iubendū est, ut à radícula & cibis assumptis uomant. Itidem urantur iis quæ pituitam subducunt, idq; tam diu, q̃ febris cessauerit.

## DE HEPIALO FEBRI ET RIGORE, QVAE NVLLO

calore possunt euinci.

Cap. XXV.

**S**icut itea pituita, quæ omniū aliarū frigidissima est, nondū putrefacta toto in corpore exūdauit, inexpugnabiles, & qui nullo euinci calore possunt, rigores, sine febre excitat. In febribus enim quæ humoris uitio accēdunt, putrefactio maxime febri  
lē calorē suscitāt. At si tota hæc pituita putruerit, quod tamē raro fit, ob im  
mēsam O putrefactionē quotianæ febris causa redditur. Quādo uerō non tota equaliter, sed ex dimidio ipsius putrida fuerit, aut aliquæ ipsius partes, non nullæ uerō non putruerint, Hepialū febrē hanc facit: in qua simul & rigor & febris caliditas est. Particulæ quidē humoris eius necdū putredinē expertæ, omnib⁹ uenis, uel etiā reliquo corpori cōmunicatæ & sparſæ tigo  
rē creant: putrefactæ uero febrē accēdūt. Dicta est autē Hepialos per trās-

○ Exemplar  
imulgatum  
+ 210 male  
pro 214  
habet.

latione à sale: dico aut mari, quod à principio tranquillū apparet, cū turbat  
 difficillimum euadit. Vel ab Hepios, quod est molliter & alexnin, quod si-  
 gnat calefacere, quasi dicas, quoniā blande & leniter calefacit. Atq; hæc fe-  
 bris cū ex quotidianay genere existat, ut pote ex pituita nascēs illay curati-  
 onis subiicit specialī, nisi quod tāto cōmēorata quotidiana calidiorib⁹ magis  
 q; incidentibus prædiis indiget, quāto etiā pituita frigidior illa existat.  
 Hepiali uerò rigor multo magis calefaciētia requirit. Itaq; medicamētū ex  
 triplici confectum pipere, ex calaminthe, præterea & quod liquore cyre-  
 naico cōstat, his sunt accōmoda. Itē ex castoreo, similibusq; præparata re-  
 media conueniunt. Latus autem diffusiusq; explicatā curationē horū er-  
 peries in capite XLV. de perfrictione. Insuper Lypyriæ & Tiphodes, quæ  
 q; præter commemoratas febres dicuntur, cum sint ex relatarum nume-  
 ro, etiam curationes, tum in illis expositas, tum exponendas postulant.

DE FEBRIBVS CONTINENTIBVS. Cap. XXVI.

**C**ontinētes finitimæ sunt, singulis intermittētib⁹: tertianæ quidē  
 exactæ ardens, quæ caulos dicit: quotidianæ, ea quæ singulis die-  
 bus accessiōnē habet, non aut ad integritatē desinit. Sic etiā quar-  
 tanæ ea quæ quarto die accedit. Exactus nāq; caulos, cū omnes alias exqui-  
 sitæ tertianæ notas setuet, hoc solo discrimine uariet, quod nō cū totius cor-  
 poris cōcussiōe, ἥνος appellat, inuadat, neq; ad integritatē ueniat. Qui sin-  
 gulis dieb⁹ accessiōnē obtinet caulos, omnes similiter exactis quotidianis  
 notas præ se fert: quod aut ad integritatē nō peruenit, hac re à quotidiana  
 specie cōsimili differt: ea ratiōe & quæ quarto quoq; die accessiōnē habet,  
 uerū ad integritatē nō cessat, finitima est quartanæ. Cōtinēs itaq; febris est,  
 quæ nō ante ad integritatē terminat. ἢ ex toto fuerit soluta, et si inclinatio  
 aliqua sensibilis appareat. Quū aut nulla accidit, quæ sensibus queat perci-  
 pi, hæc quoq; ex ardentium genere habetur, sed acrimonia ab ipsis uariet.

AGNITIO FEBRIVM CONTINENTIVM,

& curatio.

Cap. XXVII.

**C**ontinentiū febrīū origo ex sanguine est, qui nūc efferverescē;  
 tantū nūc putrefactus obstruit. Quapropter accessio ipsis ad  
 usq; finē una est. Indicia uero sunt, pulsus maximi, uehemen-  
 tes, citati, crebri, æquabiles, nō mordaces. Vrinæ nō multū a-  
 deo à sanis recedūt. Curatio est, sanguinis quousq; deficiat anima, d. missio.  
 Qui si nō fuerit detractus, febricitātes in summū ueniūt discriminē. At si qd  
 per uenę sectionē uacuare prohibuerit, aliis uti remediis oportet, quæ mea-  
 tus tecludūt, copiā materiz uacuāt, & febrīū feruorē leniūt. Cū aut euidē  
 tes humorū cōcoctiōis notas in ipsis uideris, neq; in principe particula in-  
 flāmatio quædā, aut tumor œdematis specię repræsentans, aut scirrhus fue-  
 rit, neq; particula aliqua tēperamento adeo frigido, ut in hanc noxa procū-  
 bar, cū fidutia frigidā propinato: maxime si æger eius potioni assueuerit.



## ARDENTIVM AGNITIO. Cap. XXVIII.



Rdentibus hæc superueniunt, arida lingua, crassa & nigra, uentriculi rosio, deiectiones pallidæ, sitis uehemens, uigilia, nonnunquam etiam delirium.

## ARDENTIVM CVRATIO. Cap. XXIX.



Orū alterutrū fieri necessariū est, si perfecte morbus solui debet: aut biliosos excemi humores, aut eosdē extingui. Excernūtur itaq; per sudores, uomitiones, & imū uentrē. Extinguūtur aut frigide potu: quo nos ardētissimas febres, causos appellār, ex roto curauimus. Sustinere eos qui his cruciātur, nō aqua sola cōuenit: neq; mulsa dūtaxat, uet ū diluta mulsa exhibita. Nam qui huiusmodi morbis cōsistantur, sola porione sustērandi sunt. Porro balneū illis solū usui est, qui citra tumorē inflāmationi, aut erysipelati consimilē, ardenti febre laborant. Quod si uero concoctionis notæ percipiātur, multo magis ipsis conducet. Qui ex falso humore: febrim ardentē conceperunt, his est inuti-  
le. Verum iisdem prisanæ etiam eremorem cibi loco offerre conuenit.

FEBRIVM QVIBVS EX AFFECTV ERYSIPELAS RE-  
uerente origo est curatio & agnitio. Cap. XXX.

Ebres quæ ex affectu uiscerū erysipelas referēte procreant, his notis agnosces. interna feruent immodece, dolor urget uehēmēs, præterea sitis exerceat, & æstus immoderatus. Summatim ex indicitiis æcerrimæ bilis cū pauco sanguine putrescētis deprehēdes. Hūc in modū curabit: A balneo in torū abstinere decet. Aqua frigida per morbi statū uehēmēti, hoc est frigidissima utendū est: per initia nō itē. Extrinsecus uero refrigeratiā imponunt. Et si nihil hæc promouerint, etiā intro sumere cogent. Maxime ipsis conueniūt lactucæ, & quæ parē his facultatē obtinēt. a foris & ipse lactucæ succus idoneus est, adeoq; intybi & semperuiui, & reliqua refrigerādi uirtute prædita. sed præstātissimo parte plurima urimur. Nam humorē refrigerātis alicuius expressum pilæ cū portulacæ iniicimus, deinde cōtusum exprimimus. cū usus exigir, modico polentæ mixto & in aqua frigida merso, partē refrigeramus. Linteū uero duplicatū in ea intinctū extrinsecus, aut ubi calor sentit, præcordiis obtendimus, non diu adherere sinentes, uerū aliud frigidū eius loco applicantes. Iam uero & oleum omphacinum medicamini nonnunquā miscemus.

## HECTICARVM FEBRIVM AGNITIO. Cap. XXXI.

Hæctica febris non in humoribus, & spiritu solum, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc dolorem nescit, & qui ea detinētur, nequaquam febricitare se existimant: neq; enim calorem percipiunt, cum uniuerse ipsis particulæ equaliter sint excalescē. Duplex hæcticarū febrium species est, prima ardentibus magna ex parte superuenit, quæ prorogantur adeo ut tempore corporis ipsius cordis madorem absūmāt,

idem Gab. 5. & 4. ubi  
3. de ratione uic. dicit  
canis est. habet  
5. p. 4. cap. de canone  
infinitis, a per habet  
Gab. 1. ubi. corrupta.

uel etiā si copiosus adhuc subsistat: alia manēte etiā nū humiditate cordis corpus occupās, inde potissimū accendit. Vnā sane ipsius generationē prodidimus, reliqua est cū statim ab initio inuadit, primā originē diariis simillē, ex mœrore, ira, lassitudine maiore, una cū exustiōe sortita. Hęc igit non difficulter cedit remedijs. Quæ uero ex ipsis in marcorē qui Græcis dicitur *μακρὸς πυλὸς* deuenit, oēm respuit curationē. Atq; hæc sanē cognitu est facillima: oculi siquidē præter modū cōcaui testant, & lemē ipsis inhærescētes aridz, tū dispositio quz dā squalida, uiuidi ipsoꝝ coloris flos emarcuit, frōs sicca est & intēta. Quineriā cōnuēt plurimū, hac occupati, quē admodū dormituriētes. uerū affectio, somnus nō est, sed uigilādi impotētia: tēpora colapsa sunt. & quid enim aliud præter ossa & cutē solā habēt? Nā si denudatū uētrē inspexeris, neq; intestinū, neq; uiscus ullū superesse tibi uidebis: p̄cordia sursum cōuellūt, & cutis ipsis extrema resiccata est, pulsus gracilis, creber & durus. Caliditas aut̄ primo occurso lāguida, paulopost acris & rodēs erūpit, quousq; igit humiditatis aliqd reliquū est, hectica solū febris dicit. Cū uerō periclitat̄, ne nihil amplius humoris supsit, absolut' iā marcor constituit. **HECTICARVM FEBRIVM CVRATIO.** Ca. XXXII.



**H**ectica febre laborātes, statim ab initio nutriri desiderāt, humorū rodentiū gratia. Maximū uerō remedium huius est, uiscus humectās. Conuenit igit q̄ maxime p̄sana cremoris halicæ q; sorbitionibus, & pane præterea adiecto ægrum nutritū, moderato trigidz potu curare: si neq; inflammatio quzdam, neq; humorum putrefactio subest. at si magnam inde offensam fore coniectura ueris, frigida abstinere oportet, extrinsecus autem impositis, quæ refrigerant auxiliis, uti. Balnea uerō hoc morbo obnoxiiis, quolibet tempore sunt idonea.

## DE SEMITERTIANIS.

## Cap. XXXIII.



**Q**vandoquidē tertiana cū rigore, quotidiana uerō citra illū inuadit: quæ ambarū mistura cōstat, horrorē inducit, qui minor quidē res est rigore, maior aut̄ perfrictione. Quapropter cum horror equali ab utrisq; extremis interuallo, mediū amboꝝ rigoris nimirum & frigoris occupet, quod contemperatis inuicem extremis accidit, non abs re nomen huiusmodi febris semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur: uel enim duæ accessiones in idem tempus concurrunt, uel statim ab initio ambę inuicē iunguntur. Quādo igit tertiana præpollēt, magis horifica febris efficitur, & rigoris etiam non nihil per accessionē assumit. Protinus aut̄ talis calidior est & ardērior, tum uomitionem quandā bilis, aut deiectionē, aut madorē adfert. Quando altera pituitosa superat, perfrictiones quidē summa exercēt, pauci uerō horrores: neq; tamē sitis, neq; ardor in his affligit. Cum pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana cōtinua, insultus quidem accessionis cum horrore accidit. At cū ex pituita proueniēs febris præcelluerit, submissio-

nes pulsuū fiūt, & horrores. Si uerò calidior præualeat, subito incallescūt. Talis sanē est exacta semitertiana, ex æquivalente duarū febrīū, puta tertianę intermittētis & quotidianę continuę tēperatura proficiscēs. Non exquisita uerò uel bilē largiorē, uel pituitā caulatur, quæ iam magis etiā curatiōi renitiť, cū paucus humor ā copiosioris excellentia artisq; auxilio expedite uinci possit. Si autem pituita sit superior, præsidiis maxime utemur quę in quotidiana exposuimus. Sin autē flaua bilis, iis quę in tertiana cōprehensa sunt, in totū ei quod urget incūbētes, sed ita, ne alterū prorsus negligamus.

## DE MORBIS PVBLICE GRASSANTIBVS. Cap. XXXIII.



Vblice grassantes cōmunesq; morbos nomināt, qui multis simul obueniūt, quorū ut generatio, sic etiā causa cōmunis est.

Cibi igit cōmunes prauī, illiusmodi morbos pariūt. Item cōmunis aquę uitiatę potio, nimis laboriosa uitę ratio, labores quibus quisq; assueuerat omīssi, inedia, repletio, idq; dū fames grassatur, aut

secūdus annonę prouētus est. Itē regionū naturę, cōmunes subinde morbos intulerūt, quę nonnunq; palustres, aliquando barathrū uicinū habentes uaporem exitiosum prauumq; exhalant. \* Hęc igitur continue accide

re consueuerunt. Aēr uero nos ambiens, tēperamēta corporū commutat, uel calidior impendio, uel frigidior, uel humidior euadens. siquidē in alias

causas neq; omnes simul incidimus, neque eis toto die immoramur. At quoniam aēr qui omnibus circumfusus est, & per inspiratū attrahitur, ut

animaliū corpora pro tēperamēti ipsius immutatiōibus afficiant, necesse est. Qui igit hęc intelligit, nō solū morbos ex unoquoq; aēris statu futuros præfagiet, sed etiā ne fiat prohibebit, cōtrariū immoderatis circūflui aēris

tēperaturis uictū indicēs. Itaq; corpora morbo alicui ex propria intēperie uicina, hęc ā simili circūdātis nos aēris tēperamēto deprehendunt. Quę

cōtrariam celo temperiē obtinēt, præter quòd nullā offensam experiunt, etiā meliora fiūt, dū repugnās aēris immoderatio tēperamenti immoderationē punit. ac qui hoc nouit, secūdā ualetudinē tuebitur, contraria cor

poribus inducens, nūc refrigerātia scilicet, nunc calida: aqua quidem super infusa refrigerās, itidē otio, ciborū inedia, & potu largiore: calefaciēs autē,

operimēto, laboribus, cibo liberaliore, & interdū parciore. Præterea pyrę incendio haud mediocriter aērem ad calidum & siccum mutaueris, si tunc

humidus fuerit, quo modo Acronem acragantinum factitasse ferunt.

DE PESTILENTIA EX COMMENTARIIS RVFI. Cap. XXXV.



Estilentię grauissima quęque superueniunt: nihilq; in hac sicut in aliis morbis singulis definitum. Etenim delirium accidit, & bilis uomitio, præcordia intenduntur, labores afficiunt, sudores largi erumpunt, extrema algent, alui profluvia urgent biliosa, tenuia & fla

tulenta, urina cernuntur dilutę, tenues, biliosę, nigrę, mala habent subsidētia, quę superinnatant, pessima, nāres sanguinem destillant, pectus

\* Orbis  
habet illuc  
ergo omnia  
que dixim,  
nō frequēter  
solent esse  
nir.

ardet, lingua torrida est, siticulosa tristitia oboritur, torquet uigilia, cōuulsi-  
 ones uiolētā, aliāq; multa praua. At si quis pestē uenturā p̄nosceret ex ma-  
 lignorū anni tēporū, & uitē studiorū ad sanitatē haud cōducentiū animad-  
 uersioe, aliorūq; animalīū p̄cedēte interitu, his apud se cōsideratis, & il-  
 lud p̄terea p̄p̄dito cuiusmodi sit p̄sens anni tēpus, qualisq; uniuersus  
 annus. Inde liquidē qualis uictus ratio esse debeat, optime deprehēdes:  
 utpotē cū anni tēpus, si quidē rite ortū est, ex sicco humidū nūc euaserit, ne-  
 cessum est uictus ratioe deficcare, ut humor superfluous absumat. Ceterū  
 uētris habēda est ratio. Quibus superior uētriculus pituitā cōtinet, uomiti-  
 ōibus sollicitare, quibus sanguis inūdauerit, secare uenā oportet. Itē per  
 urinas, & ex toto corpore facta purgatio, aliāq; hoc in casu sunt utiles.  
 Quod si etiā eger ardore est uet, & flāma usq; ad pectus pertineat, haud abs-  
 re fuerit refrigeria pectori applicare, & potionē frigidā offerre, idq; nō pau-  
 latim, nā magis hoc pacto incēdit, uerū uniuersim ut flāmā extinguat. In  
 quibus autē ardor interiora occupat, summa uerō in algefcūt, cutis in super  
 ficie frigida percipit, p̄cordia contendūtur, uenter syntexim patitur, aut  
 uomitu, aut infra reiectiōes fiūt, uigiliae urgēt, mens desipit, lingua est aspe-  
 ra, hi calefacientia requirunt remedia, ut calor per totum corpus distraha-  
 tur, ac si alio quopiā modo ab internis foras poterit elici. Iā uerō & hęc po-  
 tio utiliter p̄sumitur: Aloēs partes duz, guttz ammoniaci partes duz,  
 myrrhē pars una. Hęc in uino odorato contrita instar dimidiē cyathi ex-  
 hibentur, nimirū quotidie. Haud noui, inquit Rufus, qui post hūc potum  
 pestē non superauerit. Hęc quidē Rufus memoriē prodidit. Galenus autē  
 tradit ad pestilēntiales putredines, bolum armeniacū salubriter potari. Si-  
 mili felicitate etiam Theriacen ex uiperis magnam prodesse. Etenim in  
 pestilētia quē Romam internecino morbi genere depopulara est, omnes  
 quos nullum ex his medicamentis adiuuat, interiisse scriptum reliquit.

DE IIS QUI EX REDVNDANTIA CRVDORVM HUMORVM SYNCOPÉ PERICLITANTUR. Cap. XXXVI.



Nonnulli febriticare incipiūt, ubi magnā crudorū humorū co-  
 piā ore uētriculi simul offenso, uel ex cruditatibus, uel alia qua-  
 piā occasiōe cōgesserūt. His & p̄cordia inflant, & os uētri-  
 culi uastiore mole, q̄ pro naturā modo cernit: adhęc color i-  
 pis ad albidius, aquosiusq; q̄ naturaliter esse debet, & eorū speciem quos  
 aqua inter cutē male habet, magis est mutatus. quibusdā ad nigrius liuidi-  
 usq;. Nulli taliū sanguis mirti sine maximo dispendio solet, etsi uacuatio-  
 nē desiderēt. Verū nec sanguinis dimissionē, nec purgationē sustinēt, utpo-  
 te quos etiā sine his syncopé subito adoriat. Ratio igit medēdi talibus est,  
 quā frictiōne molimur. Incipere uero per initia statim morbi oportet, ac  
 primū à superiore crurū parte deorsum, idq; linteis nō admodū mollibus,  
 sed modicē asperis. Deinde tota brachia ab humeris usq; & superiore par-

Galenus in  
 p̄cordio, to-  
 tum corpus  
 habet.

te deorsum simili modo sunt fricāda. Vbi uero artus omnes abūde calidi uidētur, & metus est, ne q̄s ex ampla frictiōe lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxare uteris, quale est Sabinū: ab astringēte uero abstinebis, cuiusmodi Hispanū est, Histricūq̄: & quod unā cū germinibus uel ex oliua adhuc immatura cōficitur. per hyemē uero digerentiū usus erit, quod genus est Sicyoniū & chamæmelinū. Cū iam artus plurimū perfriueris, postea oleū deterges, inde ad spinā dorsi trāsitus est: hæc q̄; tota perfrieabis si militer, ab hac rursus ad crura te cōferes: & hinc ad brachia. exinde rursus ad spinā: ita toto die facies. Porro mulsā, in qua eo ētū hyssopū fuit, his est apriissima. cauendūq̄, ne uel cibū, uel sorbitionē, uel aquam exhibeas, uel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsam tribus primis diebus dūtaxat, tuis ipse manibus, quas dixi partes ordine perfrias. Sin pulsus robore medioctri sit, ac magnitudine, cōsidera quæ ad aluū spectāt, ac si sua sponte cōmode nō deiiciat, cū fiduria aliquid in aluū ab inferioribus partibus infundes. Quod si maiori usto recrementorū impetus ad aluū eiret, principio quidē pereoque mulsam amplius oportebit: minus enim ea subducit, magis nutrit: eruda uero minus nutrit, magis subducit. At si plenius super uacua descēdant, ne sic quidē sistēda aluus, sed exhibēdus pro aqua mulsā prifana cremor est. Si uero fluere pergāt, chondri sorbitione nutries. Si ex pulsus imbecillitate uires quoq̄; collapsas didicerimus, panē ex uino diluto exhibere cōueniet. utiq̄; si nec uēter, nec iecur inflāmatioē laboret: quādo si hac infestent iā corpore crudis succis referto, nulla plane medicina periculo subtrahit. Atqui si quādoq̄; crassi abūde humores deprehēdant, oxymeli pro mulsā cōtinue exhibebis. Ergo si æstas sit, & æger frigida portioni assuetus, frigidū huic oxymeli dabis: sin hyems sit, calidū omnibus. Sane balneū his est aduersissimū, tū aēr ambiēs uel nimiū calidus uel frigidus. Porro iis quos syncope iā premit, si partes modo cōmemoratae inflāmatione uacent, panis exhibebis modicus, isq̄; ex uino quod celerē in corpus digestiōnē adiuuet, statimq̄; ad frictiōnē ueniendū est, q̄ pro tradito quoq̄; iam mō administrabis: uerū q̄bus ex flaua bili, quæ os uētrieuli infestet, syncope incidit, iis frigida offerēda potio est. uinū tñ tenue, rubens &

DE HIS QVI OB PRAETENNES HUMORES (uetus) res syncope opprimuntur. Cap. XXXVII.

**Q**ui tenuiū humorū uitio syncope premunt, diuersam à supradictis curādī rationē desiderāt, ut quos dignoscēdi notæ illis cōtrariæ testētur. Nutrire hos oportet paulatim & cōtinue. Porro ad exitiū spectare existimādi sunt, si uel iecur ipsorū, uel uentriculum inflāmatio obsecit, uiribus iam languētibus. In eiusmodi affectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sane nutrire quicquid horū inciderit, est necesse: sicut etiā corporis summa dēfate, non secus q̄ priorum rarefacere, & frigidum ipsis aērem accersire. Vngēdi sunt præterea astrictoriis unguētis.

tum cibi iis dandi, qui non admodū promptē diffuant, non aqua mulsā, non prifana cremor, sed panis & sorbitio ex chondro, & fugaces fructus austeri, qui non facile corrumpantur, tum ipsi per se, tum uero & cum pane. Vinū iis aquosum necessariū inter initia est, sumptū post cibum.

DE RELIQUIS OCCASIONIBVS QVIBVS SYNCOPÆ succedunt.

Cap. XXXVIII.



Elīq; occasiones, quē syncopas cōcītāt, quatuor sunt numero: dolor uehemēs, uigilię, immodica uētris inanitio, ac in iis qui aliena loquūtur, aliquando motus. Sed & quintā, si placet, addas, nēpe principiorum intemperie. Celerrimē igitur cor affectū in perniciem pręcipitatur, mox cerebrum, deinde breui e cur.

DE DOLORE.

Cap. XXXIX.



Taq; dolor, qui stuporē inducit ex frigida oritur dispositione. Pulsatilis labor magnę inflammationis comes est. Sin autē tanquā ab aculeo impacto, aut ueluti à terebro forari putes, crassius intestini species doloris est, pulsatilis, circa mēbranas cōstituit. per tūdēs uehemētissimis nō heterocrāiis solū, sed cephalais quoq; accidit. Interim hic à parte primariō affecta, ceu à radice subito in uicinas perferit. Porto distendentes utrinq; neruorū dolores sunt, cū & laborant, & ad utraq; extrema tendūtur. minime uero in latitudinē porrecti nerui dolores percipiunt, mēbrana uero sub cute porrecte tēsuos, stupefaciētesq; dolores inducit, quē inter carnē hęrescit, tanquā dilaniantē cruciatum excitat. multę siquidē & inæqualiter inhęrescūt, & ipsam carnē amplectūtur. Quē uero mēbranę ossibus circūdātur, profundę sunt, ipsorūq; ossium tanquam dolentiu imaginē repręsentant. Quādo igitur nulla extrinsecus doloris occasio fieri apparet, pręcedēs uictus ratio uenit inspiciēda, fuerit ne pręter cōsuetudinē otiosa, aut cibus homo usus sit largioribus, iisq; ex ualenti materia, uel solita excretio sit retēta. Nā si ex his aliquod, uel omnia quoq; appareāt doloris causa est repletio: ac quācitissime homo uacuari debet. Sic enim licebit tibi maxima cū securitate iis uti remediis, quē fluxiōes dolentibus particulis incūbentes repellāt. Si igitur sanguinis sit copia, quod distēdit, ueluti in inflammatione oriri solet, protinus si uires patiuntur, sanguis dimittēdus est. Sed si æger sanguinis missione timent, uel imbecillis sit uiribus, tū auertendus in diuersum sanguis est, tum per magnam uenam patienti particulę propinquā deriuādus. Vbi uero uitiōsus humor dūtaxat affligit, purgādus est. Si utraq; cōcāt, ambabus utere uacuationibus, sanguine prius emissio. Quod si his peractis dolor etiam remanet, cōstat profecto in ægrotātē particula impactum esse, quod afficit. Patet uero non minus & curationē ipsam per digerentia medicamenta esse moliendam. Pari ratione & qui ex flatuoso spiritu dolores cōtrahūtur, curabimus: sed simul in his potius tū extenuātibus cibis, tū portione, tum per se-

dolor q. repletio

curatio

dem iniectionibus, tum cataplasmatibus auxiliantes, tum irrorationibus atque fomentis ambiens ipsum corpus rarefacientes. Sin moles aliqua grauando, contundendo uel dolore excitet, moli eidem est medendum. Sin rodens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quae extenuant & calefaciunt. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, & somniferum est: & uiride sicco magis.

SI CORPVS TABE CONSUMATVR. Cap. XL.

**Q**Uum per uentre aliquid non ex esculentis poculentisque, uerum ex ipsius corporis substantia excernit, humore in aluum ipsam confluyente: qui quidem flauus bili continue per uomitum, & infra erumpenti consilius est, odoris autem foeditate, tum quod deiectus flauior & crassior glutinosus, interim oleosus appareat, ab ipsa differt, tunc nimirum caro pinguis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eliquescit. Malo inueterante, non nihil etiam ex ipsis solidis partibus absumitur. In hac perniciosissima febre frigide potio utilis est, quae ex terra frigidissima petitur. Huiusmodi quoque esse conuenit cataplasmata, & epithemata, quae refrigerent, thoraci & praecordiis imposita. Item cibi refrigerantes, recte offeruntur.

DE VIGILIIS IN FEBRIBVS. Cap. XLI.

**A**T uero eorum, qui immodice torquentur uigiliis, crura & manus uincire, quo tempore somnum captare solent, iubemus & excitari. nonnunquam palpebras aperire, uel conuiuere compellimus, donec abunde fatigent. Inde subito uincula soluimus, lucernamque tollimus, & altam esse quietem iniungimus. si nihilominus uigiliae pertinaciter urgent, ubi accessio remiserit, frons nigri papaueris capitum decocto illuitur, naribusque offertur papaueris albi cortex torrefactus detritusque, & mandragorae radicis leuigatae tantundem cum uino. Item rosacei malagmate facies illinit, serpilloque cum meliloto in passo decocto. Hoc etiam in accessionibus est utendum, uel trita papaueris capita excipientes pane cum rosaceo, uel eiusdem cerato illinimus. Cibus quodammodo sit plenior, exquisitiorque. Adiciatur autem sorbitionibus capitum papaueris albi seminis cochlearium trium instar. oleribus commisceatur papaueris nigri, si quidem folia fuerint uiridia, quantum tribus digitis potest comprehendere: sin minus, tria quatuor uel papaueris capita sicca, simul incocta deligantur. Si ne sic quidem somnus accesserit, papaueris lachryma, aut succo mandragorae circumlinentur. Iam eclergma ex papaueris capitibus compositum, & praesertim ex decocto, mensura cochlearii, uel unius, uel dimidii potum, somnum frequenter accersit. In quibus autem caput non est repletum, & uigiliae infestant, utere in declinationibus etiam tali suffitu. folii amomi, costi, amabo, singulorum uncia. carpobalsami libra, styracis, amomi, ammoniaci, bdellii scythici, mandragorae radices, lachryma papaueris, singulorum drachmis quatuor. Ex lignis cupressi accensus suffitus.

CVRATIO SOPORIS NOXII, QUI CATA-

phora Graecis dicitur.

Cap. XLII.

f ii





Rons posca, cui lactis aliquid sit adiectū, abstergitur, & summa ualide ligamētis excipiūtur. naribus admouētur quę incisorīā facultatē obtinēt. In remissionibus etiā cucurbitulæ ualētē dorso, & spinæ defigūtur. Si morbo his nō cedit remediis, etiā quę sternutamēta excitāt, obiciūtur. Ciborū materia sit quę incidat diuidatq; , ueluti in p̄ceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

CVRATIO DOLORIS CAPITIS IN FEBRIBUS.

bribus.

Cap. XLIII.



Si capitis dolor in febribus affligit, post cōuenientē febrīū uacuationem in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, uel rosaceo, cui etiam acetī pauxillum sit admixtum: si æstas sit, & febris ardēs, frigidus: sin hyems, neque febris ardens, calido, aut tepido. Incoquatur nonnunquā oleo & serpilli polygoni & succus. per æstatem etiam papaueris capita, uel ipsum papauer: quemadmodum hyeme peucedani momentum. Quod si uero dolor in fronte perseueret, sinciputq; pilis careat, hoc quoq; oblinendum est ueteri polenta & polygonio: uel pane similiter & rosis, uel modica myrro, uel serpillio. Quosdam & pulegium applicatum magis leuauit. Nonnullis etiam cum ignis sensus inest, psyllium polenta temperatum profuit, uel ipsum per se in uiscū coctione redactum, & continue mutatū. Item corianum similiter cū polenta, & aloē cum aceto illinitur, myrrhaq; & ammoniacū pari modo, necnō crocomagma. Pulsatiles dolores ruta, mētaq; cum pane diffiat, rosaceo quoq; superaddiro. Atqui si dolor cōmemoratis auxiliis nō eliditur, primum caput ad cutē adtendere oportet. deinde pinguionibus asperginibus torū ipsum foueri, mox cucurbitulæ occipitio agglutinari, & summæ partes deligari debent, permulceriq; lā uero hircines recte affiguntur. Cæterū si defluxio quædam à capite, uel grauedo oborta capitis dolorē suscitauerit, iis utendū est auxiliis, quæ aduersus hæc suo loco perscribentur. Sin autē à stomachi regionibus uapores sursum tendentes caput offenderint, etiam horum ratio habenda est, ueluti p̄ceptum à nobis est.

QVOMODO STOMACHI CVRAM

habere conueniat.

Cap. XLIIII.

Si stomachus imbecillis fuerit, corroborantibus oblinetur, quod genus palmulæ sunt, uinum, farinæ, crocus, mastiche, & aloē. aspergique debet medicamentis ex absinthio, melino, mastichino, nardo, & uino confectis. At si ardorem experiatur, miscendum aliquod ex refrigerantibus, puta cucurbitæ succus, lactuca, portulacæ, solani, sereos, & uix immaturæ. Sin autem inflammatio quædam in uisceribus appareat, etiam relaxantia quædam adiungenda sunt: aspersioibus, oleum chamæmelinum, cyprinum, adipēs gallinæ, aut anseris, bdellium, uel ammoniacum.

cum, & similia. cataplasmatibus autē, apii semen, scenugra cum, althēa, chamæmelorum flos, & ut uno uerbo expediā, cōpositam habeant facultatē, tum relaxantem subtilium partium amaramq; tum astringentem.

## DE IMMODICO FRIGORE IN FE-

bribus &amp; rigore.

Cap. XLV.

**R**igori, qui crisis ratione obuenit, remediis occurrere nō oportet: nec uehementiam eius dissoluere. Quod ex sudore frigus prouenit, prompte remittit, ac nihil adfert molestiæ. In solo autē rigore, aut algore, ex frigidissima copiosaq; potissimum  
 10 pituita nato, primū quidem artus plurimis in locis cōstringēdi sunt, mox oleo delinendi chamæmelino, aut eyprino, aut irino. Sin aut maiore auxilio tibi opus sit, etiā piper oleo admiscebis, uel cachry, uel adareen, uel castoreum, molliterq; totū corpus infricabis. Porro ne facile oleosum istud præsidium defluat, haud fuerit absurdū & ceræ momentū colliquefacere. At  
 15 si per hæc rigor nō possit exalferi, ualentioribus quoq; ex his factis acopis necnon dropacibus & sinapismis uti cōsiliū est, aliaq; fomenta rite admolari. Item acriora ex iis quæ admouetur naribus, eōmode faciunt, calaminthe, pulegium & hisopum. Potui dabitur ante accessiōem mulsā, in qua piper, & ruta sit incocta. ad hæc liquoris cyrenaici cocto melle forma  
 20 ti instar milii duabus horis ante accessiōem præstabimus. Similiter & liquoris sylphii. Ad hæc quod in quartanis ex liquore cyrenaico componitur, multus fuit auxilio. Iam uero in oleum largius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores pertinacissimos absterferūt, ut Archigenes memoriz prodidit. Galenus autem ante accessiōem, eutem abrotano infri  
 25 candum præcipit, uel calamintha arida, uel eunilæ tum foliis, tum floribus, uel costo, uel pyrethro, utroque horum cum oleo, unde fiet, ut uel nequaquam, uel certe minus rigeant.

## DE SVDORIBVS.

Cap. XLVI.

**S**vdores, quibus morbus soluit, excipere oportet, quādiu satis uacuatū fuerit. adiutareq; fotu mediocri, & quiete. quamobrē  
 30 non abstergēdus est. nam alius quoq; alii elicit, & calido clystere in aluum dato, & sorbitione, & somno. At sudores in remissionibus morborum erumpētes, simile iis qui morbū finiunt, κερτανοῦς appellant, ad ministeriū capient. Itaq; præsidia quibus sudores euocātur, libro superio  
 35 re capite quadragesimo octauo abunde sunt cōprehensa. Cum enim sudores largius eruperint, abstergēdo, leuandoq; operimēta refrigerare conuenit. Etenim lassant supra modum excidentes, ut in syncopen frequenter ægros perduxerint. Leui ueste madidaq; debent esse contacti, fenestris patentibus, ut perflatus aëris frigidior accedat. his somnus adiungat, & euen  
 40 tilatio. Insuper myrtus nigra in pollinē coacta, corpori inspergatur. Similiter galla, pieæ cortex, electrum & polenta cum uino astringēte, particu-

lis sudores recipientibus imponantur, faciesq; posca per spōgiam aspergatur. Archigenes etiam calcē non restinctam, & floces uini cōbustas, tum in his, tum in rigore, quem nullus euincit calor, assumit. Ambo siquidem, inquit, per foras calidos siccescūt. Media uerō corporis loca delinenda succo arnōglossā, uel coriani, uel portulacā, uel brassicā prācipit, ut confricta, sudores reprimāt. Idē prēstat reprimēdo creta cimolia aqua dissoluta, dorso per somnū, & thoraci subiecta. Totum uerō corpus rosaceo perungitur, uel melino, uel myrteo, uel lentiscino, uel ceraris quā ex his confrictū. Nam magis sunt his idoneā reuēctiōnes, quē latentēs meatus obstruēdo, humoris exitum prohibeant. Patet autem omnibus, quōd cibus quoq; sūcior his conuenit, & uina mediocriter astringentia. Cāterum largiore potu, & prāsertim humidiorē, tum crebris iniectionibus abstineant. Si autē fieri potest, gestatione corpus agitādum, in frigidiorē & dificio, ut summā his partes q̄ maxime refrigerescant. Qui porrō per elisum sudores fiunt, (hi autem uel ob dolores excitantur, uel conuulsiones) & retentione, forūq; extremorum, & refrigerio per panniculos laneos accersito, leuiter curantur.

## DE TVSSI IN FEBRIBVS. Cap. XLVII.



Vssi in febribus, prāsertim cum rigore obuēnientibus occurrere conuenit. Nam tussis intentiōe, febris quā inclinabat erigitur recolligiturq;. Aduersus hāc formulā medicamēti ex mele cocto coactōq;, hypoglottia uocāt, offerūtur. Lingūz autē supposita, unde nomē habēt, eliquescunt: & quod spirandi impedit facilitatē, discutiunt: tempus ipsarū est in accessionū statu, & spatio quod paulum accessionē prācedit. datur etiā hydromeli discoctū. Quibus autē de neruo so genere metus non est, temporis processu exhibebis cum fidutiā & oxy-meli. sin minus, hyssopi decoctum, quod etiam rigentibus auxiliatur. Itē castoreum cum febris ardens non est, neruoso quoq; generi commiscetur. Adhāc eclegma ex piceā, fructu, nucleis pineis, iride, semine lini, amygdalis amaris, & urticę semine plurima uerō ex parte cibus quoq; hęc simul adiungentur. Ac resina quoq; & terebinthina in ouo exhibet. Extrinsecus autem thoraci, & locis arteriz uicinis, lana sulfure infecta imponatur, ac pingue, oleum ue rutaceum esto, uel irinū, uel anethinum. Prāterea deligatura ualida in longū exacte porrecta, tussim cohibet: dico autem per medias partes extremasq;. Nō ratiōe caret, & apophlegmatismis tussis gratia uti, utroq; herbā pituitariā genere, & syluestri, & satiuo cōmanducato. uel cū mastiche summa debēt infricari, contrectari, & ligaturis intercipi. deinde rursus soluēda est retractio. At si propter febris acrimoniā tussis concitat, utendū est gargarizationibus ex aqua tepida, necnon frigida subinde profuit, & ex posca, & palmularum decocto, uel rosarum, uel dulcis radiculā. Visceribus autem, uel etiam cordi ipsi iniiciuntur quā modicē refrigerāt.

## DE STERNVTAMENTO.

## Cap. XLVIII.



Ternutamenta dum febribus incidūt, subinde molestāt. Etenim caput replēt, & uirtutē atguūt. Nōnullis sanguinē quoque eliciūt, & alia huiusmodi inferūt incommoda. Quare aduersus ipsa remediis pugnandū est. Cohibet itaq; sternutamē

- rum inuadens, nasi perfrictio, frontis & oculorū apertio, studiosa palari frictio, ructus, ilium intētio, capitis in altū eleuatio, inclinatioq; ad latus, summorū musculorū contrectatio, maxillæ musculorum perunctio, calentis olei in aures infusio, ligamentū calidū mento impositum. Caueri debet repentina ex somno excitatio, fumus, puluis, acrior odoratus piperis, castorei, sinapis, mentē, suauitas malorum, & farinæ odor. obrundunt enim sternutamēti elisum, & spongiæ ex mari inanes. Vbi uero cupiditas sternutādi oborta fuerit: nō autē sternutamentū erumpat, labii quies idonea est. cum acriorum odorum experientia, & animi remissio.

## DE CIBI FASTIDIO.

## Cap. XLIX.



- Vibus uitiosi humores fastidium proctearint, si cibus & poculentis solietādi sunt, qui huiusmodi succos uel per uomitiones, uel per aluū excernere soleant, uel contēperati, meliores reddant, quorum materiam libro superiore, qui totius operis primus est, comprehendimus. At si ob uirtutis imbecillitatem, cibū respuant, quoniam am omnis facultas ex particularū intēperie infirmatur: cōuenit intēperamēti speciē, cōtariis medicari. Plura de fastidio, in stomachi uitii, libro tertio pertractabimus. In febricitantibus autē, statim per initia cibi cupiditas, iis quæ odorē mouent, recuperāda est. Potissimum uero polenta in aquam mersa, uel poscā, uel dilutam uini portionē, uel cuiusdam odorati, & fructuum fugaciū qui astringant decoctum, item perunctione blanda, & moderata totius corporis frictione, eliditur cibi fastidium, ac cōtrectatione tum frontis collutione, aquæ sorbitione modicæ. Cæterum stomachus digito immisso turbatus, ad cibum assumendū quodammodo solieitatur, idq; potissimū bilioso quodā humore, aut acido sursum educito. Secundum primos dies, cataplasmatibus quoq; a foris stomachus ad cibū conuertitur, ex palmulis, malis, ænanthe, absinthio & aloē confectis. Cibi autem præparētur plures simplicesq; & frumentaeci. Insuper alterius generis uarietate quandā sortiti, qui tamen nō ab iis abhorrent, qui in febribus dantur, in quibus & fructus fugaces conueniunt, qui non ex facili acescūt, neq; nimium dulces sunt, sed maturi, neq; ad satietatem exhibendi, uerum quantum ad aliorum ciborum cupiditatem excitandam sufficit. Præsto autem sint reficiendis familiarissimi, qui tum corriperere egros, tum adhortari queant. Porro febribus solutis, si in uirium recreatione perduret fastidium, etiam sifarum cum oxymelite coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis, fassamentū, bulbi & quicquid ad bonitatem stomachi facit, accommodetur. Necnon & illud ipsum in memoriam reducatur, quibus cibus

per sanitatē maxime usi sunt. itē ambulatiōes, gestatiōes, clamosores, deo pacisimi, frictiōes & exercitia abhibeant. Præterea absinthii succi portio, uel aloës, acetiq; scillitis instat mistri absorptum, in id uehemēter efficax est.

DE GRANDI FAME, QUAE GRAECIS BULIMOS DICITUR.

Cap. L.



I uerò in grandē famē, quā bulimon appellant Græci ( dico aut cū minus q̄ par est, cibos corpora sentiūt ) fastidiū inclinauerit, hisce reficiemus, tum aliis, quæ naribus admouentur, suillisq; carnibus assis, & hœdinis. In summa omnibus, quæ nidorosum odorē repræsentant. Acrimonia sanē febrium lenita, & extremæ partes deligari, ipsiq; excitari debent, maxillas pungendo & crines, uel aurículas uellicando. refeētis, panis ex diluta uini portione, uel aliud quippiam distribui facile exhibetur.

DE CANINO APPETITU.

Cap. LI.



T si hoc symptoma febribus non adeo superueniat, sed nonnunq; secundū ipsas, præsertim gratia cognationis, quā cū fastidio cōtraxit, nil tamē fuerit mali, etiā de immodico appetitu, quū ambo naturæ modū excedāt, sermonē instituere. Quoniā igitur à pituita potissimū acida cōstituit affectus, iis utendū est, quæ hanc incidāt tepurgētq; Talia aut sunt maxime, dulcia, falsa, & alioquin abstergētia calida. Vinū igitur ipsis rectē datur copiosum, ex eorū numero quæ impenſe calefaciūt, cuiusmodi habētur colore uermicula, aut rubra, astrictio nis expertia. Verū dulciora porius propinant, uel non sitientibus. At cū oprimē habuerint, primū ipsis pingua, mox alia omnia ex oleo largiore præparata, quibus nihil austerū, aut astringēs sit adiectū, offerrentur. Hæc etenim, licet aduersus ipsam causam manifeste nō pugnēt, attamē impotentem ad cibos animi impetum dissoluant. Horum autem penuria consistētiam pituitæ stomacho inhærentis absomit, minuitq; . Iam fassamenta ipsis commode exhibentur, ab his uina commemorata liberaliter assumpta profunt, quod ubi longiori tēpore fecerint, caninus appetitus finitur.

DE SITI.

Cap. LII.

S itim admodū longā fieri existimabis ex siccitate, aut caliditate, particularū per quas humor ex ore in uentriculū defert. & siccitatis quidē remediū est somnus, caliditatis aut uigiliz. Nonnulli uerò sitibū di ex uino ciborūq; caliditate fiunt, quibus medetur frigida portio. Prauas aut qualitates desiderant, quemadmodū & cibos, præpollenti humorū uitio respondentes. Ceterū siti pressos inextinguibili, unde etiam mortē optetierunt, noui qui uiperas dipsadas aliquādo uorassent, item qui uino ueteri sese inebriassent, item nauigantes, qui ob aque porabilis defectum, marinā bibere ausi, interierunt. Verū sitim in febribus placare solet, fotus capitis ex oleo frigidissimo, uel rosaceo, uniuersim superaccōmodatus. Opti

mè facit ad sitim nigræ lactuæ semē commanducatū. item glycyrriza ap-  
pellata. adhæc cucumeris semen in ore retentū. Datur etiam ad sitim hoc  
catapotiū. cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthi drachmæ qua-  
tuor. tragacanthū soluitur ouorum crudorū recentium albumine. & cum  
fuerit dissolutum contritumq; cucumeris semini prius leuigato adiungi-  
tur. Postq̃ emollieris, pilulæ formantur, in umbraq; siccantur, ex his una  
sub lingua tenenda exhibetur: humor paulatim salua solutus deglutitur.  
Iam dilutum malorum cydoniorum, uel pirorum, uel mespilorum, uel  
pampinorum uitis. uel mali granati succus sorbitioni datur.

*Ad sitim catapotiū.*

## DE LINGVÆ SCABRITIE.

## Cap. LIII.



Vmestāda est linguæ scabrities, lini seminis decocto ægris in  
os dato: melius aut facit myxa cum lini semine incocta, ac di-  
gito in hunc succū demerso lingua infricata, aqua puriore ab-  
luitur. uel spongia abstergitur, deinde rosaceo illinitur, iam il-  
lum rosacū melle contēpetatum, in id ualde efficax est. & portulacæ suc-  
cus in ore retentus. item rhu obsoniorū mulæ admistū bene facit. insuper  
Damasceua, & mysclion (hoc aut est myxa) ore retenta & linguæ circun-  
data. His adde etiā lactuæ cauliculū. Archigenes aut tradit etiam salē in-  
dicum, colore quidem & substantia communi similem, gustu aut mellitū,  
lenticulæ instar, uel plurimum ad fabæ magnitudinem deuoratum, uehe-  
menter posse humectare. Ceterum in latus decumbere prodest, nam su-  
pinus cubitus exiccat. item os conuiete. hiatus enim madorem absumit.  
Sternutamenta porro accersita, linguas quouis alio plenius humectant.

## DE NAVSEA.

## Cap. LIIII.



VM sine cibo assumpto nauseabundus æget efficitur, cuius li-  
cet, arbitror ratiocinari prauos humores uentriculū obside-  
re. Nonnulli uerò turbant, sed nihil euomūt, humore ipsis tu-  
nicis imbutis. Pituitosos itaq; succos concoquere oportet, ser-  
uando ægrū in quiete, inedia, & somno. tenuiores uomitus eiicit, qui non-  
nunq̃ ex pituitate et timore, uel multa excitat. glutinosi humores & crassi, at  
tenuantia desiderant. quod genus est oxymel, & similia. Humiditate autē  
praua tunicis impacta, picta ex aloë utilis est. uerum quæ astringūt, haud  
mediocrem noxam conciliant, quemadmodum rursus, cum humiditas  
multa citra malitiam inest, astringentia quidem q̃ utilissima sunt: medica-  
mentum uero ex aloë in marcorem perducit. Cum uerò frigiditas humo-  
ri adest, astringentibus misceri etiam debent calefacientia. Nota est frigi-  
di affectus, quod neq; sitim, neq; ardorem eo detenti expēiantur.

## DE BILIS VOMITIONE.

## Cap. LV.



Illem uomentibus cataplasma applicandum est ex palmulis,  
malicorio, galla uino incoctis, uel posca, pane simul cōtrito.  
Item acacia, hypocyttis, balaustium, & rhu cataplasmati adiū.

gantur. Præter hæc cucurbitula admora magnifice auxiliatur, cū largiore flamma. Cibum uerò frequenter paulatim dabimus. In his autē qui atrabilem uomunt, & inflationes stomachi experiuntur, spongas aceto quæc rimo calente madidas imposito, uel hederæ folia uino incocta illinito.



## DE SINGVLTVS.

Cap. LVI.

Ingultus oritur uel ex repletiōe, uel inanitiōe, uel succis acrioribus stomachū erodētibz, quibz per uomitionē redditus, cessat. Plerique uero medicamentū dia trion pepereon assumētes, si statim uinū superbiberint, singultiūt. quod autē nonnulli etiā cibo intus corrupto singultu infestent, cui libet norū est. iā non pauci rigore correpti singultiūt. Vomitu itaq; iis qui ex repletiōe, aut rosione stomachi singultu cruciant, mederi abūde cōperimus. calida uero, iis qui ob perfectiōne. At quū ab humorū repletiōe, singultus originē habuerit, uiolenta indiget euacuatione, quā sternutamentū præstat, ob inanitionē creati singultus, sternutamēto nō finiunt, datur autē singultiētibus ruta cū uino, uel nitru in mulsā, uel seseli, uel daucū, uel cyminū, uel gingiber, uel calamintha, uel nardus gallica. Hæc sanē singultus ex cibo corruptiōe, aut frigore, aut repletiōe cōtracti, auxilia sunt. qui autē ex frigidorū uiscosorūq; humorū copia singultū experiunt, castoreū tribus obolis potui sumēt ex posca, idē cuti impositū unā cū olco ueteri sicyonio adiuuat. Insuper acerū scillites, uel oxymeli potū conuenit. deniq; spiritus retētiō, præsens est remedium.

## DE ALVO IN FEBRIBVS ASTRICTA, ET CITA. Cap. LVII.



Vt arescentē aluū proritat, libro priore quantū res exegerit cōprehendimus. quoniā uerò eadē quoq; liquida febribz incidit, in præsentiarū mentionē ipsius facere oportet. Multi enim nō febris ratiōe, sed ob hoc solū accidens in perniciē præcipitati sunt. Principio igit excipiemus quæ egerunt, nullo remedio occurrentes à corruptiōe & cruditate emanātibz. Sin autē uacuatio modū excedat, cohibenda aluus est, & si quidē acriora efferunt boni succi esse, & alioquin crassioris conuenit, quæ assumunt. huiusmodi existūt ex chondro, & ptisana sorbitiōes. balnea his postq; morbus enaturuerit sunt idonea. Cū uerò pituitosiora & fluida erūpunt, contrā sicciores calidioresq; cibi erūt, quatenus febres permittāt. Huius generis habent, quæ ex panificiis calefactiētibus cōfiūt. Balneis hi prohibēdi si nihil aliud cōpulerit. Porro ubi cōcoctrix facultas infirma, astringētibus tū cibis, tū remediis utendū est. cibis sanē, in quibus maxime malū granatū, aut poma, aut pira, aut mēspila sint iniecta, uel etiā hispissis, & uino tenui odorato astringēte: remediis autē, cataplasmatibus, numirū ex polēta, palmulis, absinthio, rosis, myrtis, & cōsimili materia. Cæterū considerandū uenit, quibus potissimū particulis cataplasmata debeat imponi. dico autē stomacho, aut imo uentri: nonnunq; & circa lūbos applicamus. Cruētās autē excretiōes reprimūt ex thure confe-



Et, desiccantq; uel pollen polentæ, uel farine, uel thus, uel māna uino macerata, uel posca. Porro acriorē humiditatē etiam iniectione per aluū, edulcare competit, nunc ipsa aqua, nunc prisanæ cremore, uel chondri, uel oryzzæ, uel tragi, idq; non semel uerum sæpius. Postea uerò adiungentur etiam  
 5 rosæ siccæ, uel myrti, nonnunq; & gallæ, & ouum simul cum rosacco uinoq; tenui astringēti, uel rosarum decocto inditum: uel sedi quoq; appositum excernendi cupiditates retundit. Cum frequens desidendi est appetitus, agatium sedi accommodatum ex calidis spissamentis immittatur.

## DE SANGVINIS DISTILLATIONE, ET EIVS.

dem ex naribus profluuiο.

Cap. LVIII.



Voniā distillatio totius corporis, aut capitis redundantia in-  
 nuit, per extusionē, uel densitatē eueniēs: largior aut excretio  
 habilis est laxare & minuere copiā, ratioq; est inde ipsam mo-  
 liri, unde natura proclinauerit, his ego cōsideratis ausus sum.

15 in quartanarū distillatiōibus scalpello, ut mos est, nariū uasa cōuulnere, oportet aut nō exiguo fluore contentū esse, sed pro uiribus detrahē. Spō-  
 tanea in febris per nares sanguinis profluvia, si in crisi sūt, excipere con-  
 uenit. sin aut sanguis immodice erumpat, sistere conandū est. Primū itaq;  
 20 extremæ partes ualidē deligabunt, æger sublimi capite figurabit. Videtur  
 etiā præputii deligatura sanguinis peculiariter ex narib⁹ profluvia cohibe-  
 re. æger nō expurget nariū foramina, neq; irriter, uerū sanguinē concre-  
 re sinat. nasus spōgia, quæ in posca maduerit, refrigeret, ac obturamē ex li-  
 nimēto naribus profluentibus demittatur, medicamento quodam ex eis  
 quæ sanguinem comprimunt, inuncto: horum materiam, & reliquam lo-  
 25 corum affectorum curationem libro subsequēti uerbosius persequemur.

## SI ANIMA DEFICIAT.

Cap. LIX.

30 QVI ex cholera, alui profluuiο, aliisq; multis, & uniuersim factis ua-  
 cuationibus, resoluūtur, iis aqua frigida aspergitur, & nares com-  
 prehenduntur, os uentriculi infricatur, uomitus præcipitur, sto-  
 machus turbat, uel digitis immisiss, uel pinnis. præterea pluribus uinculis  
 ualidē deligari debent. Cū per imas particulas uacuationes fiunt, manus:  
 cum per superiores, crura. Cæterum sanguinem fundentibus prospiciēda  
 est & figura sine dolore sublimis, & cucurbitula defigetur, quæ particulas  
 retrahat cōtrario uacuationē experiūtibus modo. Curat etiam uinū aqua  
 35 temperatū resolutiones ex subitis uacuationibus ortas, nisi uiscerum inflā-  
 matio, aut uehēmēs capitis dolor, aut attonitus aliquis affectus, aut febris  
 ardens, in crudo morbo prohibeat: in his siquidē magna uinum adfert in-  
 commoda. Et si æstas fuerit, calidiq; temperamenti æger, ac frigidæ assue-  
 uerit, frigida exhibebitur. sin cōtraria euenierint, calida. At si ex sudoris co-  
 40 pia animæ deficiunt, cutis densanda est, quemadmodū à nobis prius est di-  
 ctum. Tum ut frigidus aliquis perflatus accedat, prospiciendum est. Porro

in uentriculum defluxionibus nihil horū conuenit, præterq̃ ipsi uentriculo stomachoq̃ corroborantia admouere, & affectos in balneum ducere. Hoc siquidē illiusmodi fluoribus est accommodatissimum, uerum sanguinis profluvia, & sudores uehementer proritat. Qui ob plenitudinē animo destituuntur, uino ciboq̃ abstinebunt. itē balneis, si febricitent. Potio autē multæ datur, in qua uel thymus, uel origanum, uel pulegium, uel hyssopū sit incoctum. Propitium uero iis est & oxymeli. At si propter humores uiosos in stomacho contentos anima defecerit, iubēdi sunt uomere ab hydreleo, digitis aut pinnis in os demissis. Sin autem uomere nequeant, oleū glaudatissimum ipsis propinabitur. hoc enim & a luo ex inferioribus partibus infusum, subinde uacuat. Iam uerō absinthium ipsis auxiliatur. Porro si propter stomachi imbecillitatem dissoluantur, iis uti expedit quæ firmando ipsi sunt: ueluti antea in capite de eodem comprehensum est, summaq̃ perficere oportet. Exusti in sole ad balneum ducuntur. qui perfrixerunt, medicamen dia trion pipereon, ipsumq̃ piper assumāt. Qui uero ob caliditatem largiorem, æstum ue, aut lentam in balneo moram, animo deficiunt, curantur frigida aspersa, æris perspiratu, stomachi frictiōe, uini cibiq̃ usu. Sin autē propter inflammationis magnitudinē, aut febris malignitatem in accessionibus animus deliquerit, perfrigescantq̃ artus, fricare ualenter iubeto, fouere & deligare. Ad hæc uigilias inediamq̃ præcipito. Ea uerō & ante accessionem faciunda sunt. Quibus ob siccitatem anima deficit, duabus tribusue horis ante accessionem, cibis offeretur, uel chondri cremor, uel panis ex aqua simul cum mali granati nucleis, aut pomis, aut piris. Si autem magni periculi metus sit, etiam uinum dabitur. item iis qui subito animam perdunt, his remediis succurrendum est. ac ubiq̃ cau- sam considerare conuenit, propter quam animæ defectus accadat, atq̃ contra hanc pugnandum est. Nonnunq̃ uero & symptomatis maior habēda est sollicitudo, nempe cum periculum, uel etiam mortem minatur.

QVOMODO VLCVS CIRCA OS SACRVM

proueniens curatur.

Cap. LX.



Hic affectus, febribus potissimū lentis, ex diuturno decubitu superuenit. Cū itaq̃ sacri ossis regio incipit rubescere, circulū ex lana iustæ magnitudinis, parti subiiciemus. postea rosaceum, uel myrteum ceratum, quod argēti spumam, aut cerusam habeat, supra accommodabimus. Inflammatione autem oborta, cataplasma ex pane cum solano, uel polygonio, uel amoglossio, uel tenera brassica applicatur. Si ulcus serpat, lenticula cum malicorio illinitur.

FINIS LIBRI SECVNDI, IOANNE

Guinterio Andemaco medico,  
interprete.

# PAULI AEGII

NETAE LIBER TERTIVS, IOAN-

NE GVINTERIO ANDERNA-

comedico interprete.

## DE PILORVM AFFECTIBVS.

DE AREIS, ET CALVITIO.

Cap. I.



10 VEMADMODVM STIRPIVM NONnulla humoris defectu inarescentes contabescunt: ali-  
qua vero alienis contrariisq; humoribus infecta e-  
marcent, haud dissimili ratione id ipsum quoq; pilis  
usu uenit. Etenim Caluitium, humidi penuria fieri  
consuevit: prauitate autem uitioq; succi, Arez, nempe

15 Alopecia, & Ophiasis sola inter se figura differetes. Quoniam haec, parte  
oblasam, serpentis modo glabram, ostendit: illa, quod uulpes continue infe-  
stet, sic appellata est. Itaq; coniectura de humore, qui superat, ex cutis co-  
lore sumetes, uacuatione medicamento purgante prius molimur: deinde  
20 loco uitiatu auxilia inducemus. Si igit corporis color nigrior, albidior ue-  
solito existat, antidoto hiera quae dicitur pituita educenda, humoriq; melancholi-  
co est, utemur. Sin pallidior, catapotia ex aloë exhibebimus: quorum descri-  
ptionem in libro de medicamentis compositis inuenies. Vbi corpus iam totum  
inanieris, medicamento quod pituita per os extrahit, apophlegmatismum  
Graeci uocant, usus erit, ex aceto, sinapi, & melle: isq; non semel, uerum crebri-  
25 or. Satius autem fuerit, si etiam in aceto origanum, uel pulegium, uel thymum, uel  
hyssopum commaduerit. Caeterum in aliis quoq; capitis affectibus eadem ute-  
mur cura di ratione: primum humorem, qui praepollet euacuantes, uel alui deie-  
ctione, uel etiam sanguinis emissionem, si eius subest copia, dein ad praesidia  
quae parti extrinsecus iniiciuntur, transgredi conuenit.

### DE ALOPECIA.

30 Cutis nitro infricata, linteoque aspero, lanae uel potius deterfa, adeo ut rubo-  
rem contraxerit, uerbenaca ex aceto detrita, in sole illinitur. Aut alcyonio pri-  
mae asperitatis combusto, reductoque in puluerem cum oleo ex lucerna inungit.  
Aut calami radix, seu amygdalae amarae cortex torridus, oleo, uel adipe ur-  
35 sine exceptus inducitur. Haec itaq; sunt miriora medicamina, uerum ex eu-  
phorbio, rhapsia, & adarce, oleo soluta laurino, uel pice liquida, uehemetio-  
rem uim repraesentant. ALIVD. Erinaceorum marinorum testa igne experta  
cum adipe ursino excepta, cuti prius nitro extersa illinitur. ALIVD. Pi-  
peris, stercoris ouilli sicci, erysimi, & rucis seminis, singulorum drachmae qua-  
40 tuor, ueratri albi drachmae treis, muri stercoris drachma. Excepta felle  
laurino, aut hircino, aut suillo delinuntur. ALIVD. EXPERTVM AD

*in manu scri  
ptor exi  
pla  
ri non habet  
tur.*

**A L O P E C I A M.** Mandragoræ radicis, mali terræ, ari radicis, ceræ, picis liquidæ, singulorū congruō, axungia porcinae insulsa, nerii herbæ medullæ modicū. Axungia cum Nerio incoquit, donec eliquescat: deinde exemptam herbā proicito: & reliqua axungia adiungito, incoquitoq;: mox ceram, & picē liquidam. Vtitor in sole audacius. Vbi iam ulcera ad cicatricē uenerint, caput uulpeculæ urito, & alcyoniū, anchusæq;: nigre folia omnia cōtrita super inunctioni inducito, ut caput pilis cōtegatur. **A L I V D.** Canini capitis cōbusti pars una, testarum marinarū tantundē, axungia porcinae modicum. omnia in fictili coquuntur. Eisdem etiam siccis utitor.

*\* Galenus, in  
ciat duas.*

*○ Galenus,  
cardami.*

**A L I V D E X T H A P S I A A D O M N E S I N V E T E R A T O S** affectus. Euphorbii, thapsiæ, baccarū lauri, singulorū \* uncia, sulfuris ignē nō expecti semuncia, ueratri tantundem, ceræ unciæ sex, laurini, uel recinini ueteris quod satis est. In ualidioribus etiā uti uincit ○ cardamomi uncia, alcyoniū cōbusti uncia: iisq; non solū ad Alopecias, uerum etiā ad omnē diuturnā perfriktionē. Cæterū in Alopeciis primū omnino cutis nitro est abstergenda, infricandaq;: & frequēter pili nouacula radendi. Siquidem pleroseq; noui ex sola infricatione, frequētiq; rasura pilos recuperasse.

#### Q U O M O D O C A L V I T I V M A B I G A T V R E T P I L I

crescant, ex Critonis commentationibus.

*\* Galenus,  
sex.*

*○ Galenus,  
semuncia.*

*\* Galenus, li  
bra una.*

**Leporū** uentriculi \* quinque arefacti diligēter olla fictili frigūtur. His myrti comæ ○ tres unciaē adiiciuntur, acaciæ fructus, acaciæ succi, rubi canini, adianti, singulorū tantundē. Hæc oīa accurate resiccata in pollinē coguntur, & subtili cribro incernūtur: deinde adipis ut fini & phocæ utriusq; \* libris quatuor admistis denuo tundūtur. Excepta pyxide plumbea reseruātur. Cum usus postulat, cuiuslibet unguenti liquore diluuntur.

#### Q V A E P I L O S C O N S E R U E N T.

**Polytrichi** herbæ pars una, ladani partes duæ, uino myrteoq; oleo excepte in usum adhibentur. **A L I V D.** Anemonæ flos tritus cum oleo inungitur: idem uero & nigrefacit. **A L I V D.** Verbenacæ rectam unā cum radicibus torrefactam, tufamq;: tenui cribro incernito, oleum quoad sordiu habeat spissitudinem admittens. Confectum medicamen æreo uase reponito. ubi opus fuerit, cum oleo similiter utitor.

#### A Q V A P I L O S A V G E N S, E O S D E M Q V E D E N I G R A N S.

Aquæ pluuiæ sextarii sex, thus Alexandrini sextarii tres, polytrichi pōdo triēs, brathyos tantundē, ladani uncia, myrti uncia, cucurbitæ aridæ tantū dem. Sinito ad dies uiginti uitreo uase cōmadescere, bis mouēs quotidie rudicula tedacea. Inde in aquā pilos tingēs, utitor quotidie. Itē semen altheæ in balneo illitum pilos conseruat augetq;: pari modo oleum inunctum in quo semen ipsum altheæ decoctum est, uel liquefactum.

#### Q V A E M E D I C A M E N T A P I L O S E X T E N V E N T.

**Ficus** foliorū, uitis agrestis albæ corticis, pumicis, testarum, buccinorum,

terræ cimoliz singulorum minam. Omnibus in nouam crudamq; ollam coniectis, lutoq; oblitis, in fictili coquito, teritoq; adiciens aphronitri minam semissem, gallas immaturas numero triginta. In puluerem redacta excipito, ac utitor. **ALIVD.** Aphronitri minam septem, pumicis tosti minam quatuor, aluminis fissi, iridis, sicca, myrti sylvestris nigra, gumi, byronia radices singulorum drachma quatuor, lupinorum crudorum in pollinem detritorum, congi pars quarta: Vtere absq; pingui.


## AD FLVENTES PILOS.

Aloë ex uino nigro austero illinitur, uel purpuræ tegmina ex oleo cocta, uel mirha, & ladanum cum uino, myrteoq; uel caprillū stercus in testa leui combustum ex oleo cuti prius rasa inungitur.

## QUOMODO PILI CRISPI FIAN'T, ET TINCTV

ris inficiantur, ex Cleopatraz libris, quos de capillis crispis faciundis prodidit.

Cap. II.

**15**  Apite prius deterfo, spodyli radix cum mero pilis inungitur. **ALIVD.** Nucleus pineus recens ad pollinem usq; comburitur, iniectusq; pilis teritur, myrteū unguentum superinfunditur, donec mellis fiat spissitudo. Atq; sic pili raso capite purgatoq; deliniuntur. **ALIVD.** Myrti & betæ pari mēsurā cū oleo pili absterguntur utiliter. **ALIVD.** Gallæ uiginti numero adianthi uncia duar, aqua marina in mellis crassitie coacta inducuntur, sed pilo urina prius deterfo, uel lixiuiō, & aqua calente abluto, caput oblinitur medicamēto ad biduū, tertio die ablui debet, piliq; resiccati myrteo iniungi. Id tenerum crispūq; nigrum efficit capillū. At si prius caput nouacula raseris, crispior euadet.

**25** QVÆ CANOS ARCENT', ET EOSDEM DENIGRANT.

Olei, quod immaturæ oliuæ fuderūt sextarii tres, spice nardi drachma, unguis odorati drachma quatuor, iunci floris tantundem: incoquuntur cum oleo. seorsim habebitur acaciae succi uncia una, uino soluta leuigataq; diligēter. Vbi uero tertia pars olei fuerit relicta, hæc percolato, & acaciae mixtam in fidelia excipito, ac utitor quotidie pilos inungēs. **ALIVD.** Nucū uiridium corticis uncias tres, ilicis radices tantundem, uini nigri sextarios tres, ad tertias decoquito, expressoq; succo cū olei myrtei sextario contundes, usus eius est quotidianus. **AQVA PILOS DENIGRANS.** Gallæ sextarius unus, thus coriarii sextarii duo, myrti nigre rotidæ, cyperi foliorū **35** æqualis mēsurā, cinaræ manipulus, papaueris nigri tantundē, aque lacustris sextarii duodecim. Omnia multis ante diebus macerata, ad tertias decoquuntur. Deinde illinuntur, absterfis, sicatisq; crinibus. At cimoliz terræ acerabulū cū uiua calce pari mēsurā inungitur. Hæc aut succo betæ elixæ soluta illinuntur. Deinde betæ folia tegminis gratia superaccommodantur. ac ubi satis adhæserint, in balneo abluuntur.

**VT RVFFI CAPILLI TINGANTVR ET FLAVEScant.**

Deinde postquam ablueris, thus ex uino oleoq; detritum perūges: die insequenti staphida agriam, hoc est, herbam pediculariam, ex oleo inunges. ALIVD. Nitri, fecis cōcremata, myrobalanorum, singulorum libra, herbæ pediculariæ libra una semis. uino diluris caput abstergitur. sin autē reliquū corpus pruritu uexetur, siccis. Ad humidiorē uero pityriasis, muria, uel lupinorū decocto caput abluendū est. hoc enim subinde sum exptus.

## AD PSYDRACIA ET EXANTHEMATA CAPITIS.

Psydracia exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summā cutē excedunt. Exanthemata uero cutis sunt exulcerationes, subrubicundæ, & asperæ. Vtrunq; uitium facultatibus infra positis exteritur. Argentæ spumæ, & cerusæ singulorum drachmæ quatuor, aluminis drachmæ duæ, rutæ foliorum uiridium totidem. ex aceto myrteoq; oleo leuigata cuti illinuntur. ALIVD. Ruta & alumen cum melle trita, capiti prius raso inungunt. Sin autem cutis à capite abscedit, oleæ folia elixa cum melle inducuntur.

ALIVD. Argenti spumæ, cerusæ singulorū; Ō uncia duodecim, sulfuris uiui drachmæ octo. cerato myrteo excipiuntur.

## AD HVLCVSCVLA CAPITIS DENSE RVBRÆ QVE.

Hæc papillis sunt similia, ex quibus quædam ueluti sanies defluit. Caput prius nouacula raditur, & aqua frigida nitroq; abstergitur. Deinde sulfure uiuo ex hominis urina contrito utitor. Vel cretam futoriam, *μολοτινία* uocant Græci, cum aceto inungito.

## DE MANANTIBVS CAPITIS VLCERIBVS QVAE

Achores Græcè dicuntur, & Fauis.

Inter capitis uitia, quæ in cute oboriuntur, unum est, quod appellatur Græcis Achor, à nostris manantia ulcera, tenuissimis cutem foraminibus perforans: per quæ glutinosa fertur sanies. Simile ipsi malum specie est, quod à faui similitudine *κίσση* à Græcis nominatur. quod magis amplis foraminibus exasperatum est, quibus humor crassitudinem mellis referens sicut in apium fauis, cōtinetur. Origo est ex nitrosa salsaq; pituita. uictus igitur ratio ex cibis boni succi constare: omnia acria & salsa uitari debent: præsertim si inflammationem affectus resipiat. postq; corpus superfluo decēter erit leuatum, de rasīs capillis caput fouendum bis ter uel die, aut etiam sapius, aqua calida, in qua myrtus sit decocta, uel rubus, uel lenticula, uel amari lupini, uel asparagi radix. Quū uero plus saniei emanat, recte illinuntur salicis folia cum aqua, uel lenticula. Delinentur autē terra cimolia, uel cretica, uel samia, uel pompholix, uel spodium, uel argēti spuma, uel cadmia, uel charta cōbusta, uel etiam medicamētum ex charta siccū, omnia ex aceto inducunt. Smegmate uero hoc utendū est, sulfure uiuo, & perdicis herbæ, saponisq; æquali pondere. Cōposita hæc sunt, argēti spumæ drachmæ duodecim, rutæ foliorū drachmæ octo, herbæ pediculariæ quam staphida agriam Græci uocant, drachmæ quatuor, chalcanti drachmæ duæ, Ace-

\* Alexander medicus. Argentæ spumæ drachmæ 3. cerusæ drachmæ 4.

Ō Melius est drachmæ 12. Sic habet Alexander medicus.

## DE CAPITIS DOLORE EX SOLIS AESTU contracto.

Qui ex aestu capite dolent, eorū cutis tactu calida est, & primo statim manus iniecta aridior apparet: oculi rubēt, frigidi foras, & inunctiones placēt, ipsisq; iuuantur. Ceterum curatio his conueniet etiam ea, quam dolori in febribus pręscripsimus. Si dolor remanet, infra scriptis utendū est cataplasinatis. Prodest fronti & temporibus inductus panis ex posca, & rosaceo. Interdū cū amygdalis, uel rosīs siccis, aut mollibus uel menta cui pulegiū sit adiectum, uel panis cū persici foliis. facit etiam ocyum ex aceto & rosaceo tritū, uel hæderæ corymbi in aceto elixi, & rosaceo cōtriti. uel serpilli ex aqua decocto hordeaceam farinā miscere conuenit, uel cardamomū torridū leuigarūq; aceto & rosaceo: uel fermentū cū rosaceo, uel iridem aridā cū aceto. Sed mutetur cōtinue singula: Nā uetustate fiunt inefficacia.

## PASTILLI AD CAPITIS DOLOREM EX intēperie calida.

Croci drachmæ 4 quinq; chalcanti drachmæ decē, aluminis 3 drachmę sedecim, myrrhæ drachmę septē, omphacii, chalcitidis, gūmi singulorum drachmæ tres. Vini austeri quod sufficit. Ex posca sumuntur. Sin etiā uigiliæ infestent, aliquid ex somniferis applicatur utiliter.

\* Alexandr.  
Croci, chalcā  
thi drachmæ  
decem.  
O Alexan  
der, Alu  
minis scissis.

## DE IIS QUIBUS CAPUT EX FRIGIDA intemperie indolefcit.

At si frigus noctuit, contraria, iis qui ex solis aestu dolēt, affectos signa testantur. Etenim facies ipsorum non concidit, sed colorē decorēq; amisit. Itē frigidis nec gaudent, nec iuuantur. Verum horū agnitionem cum uictus ratio, tum reliqua concurrentia firmabunt. Inunctiones igitur adhibendæ ex oleo rutaceo, laurino, uel irino, uel nardino, uel etiam opobalsamo, pręsertim si extremētitii humores fuerint crassiores uiscosiq;. Frons autē tum hoc liquore, tum iis medicamentis debet illini, quæ ex pipere, & euphorbio præparantur. Vinū subtilius propinandū: corporis motio adhibenda est. Item balneum calidum prodest: interim à radícula uomitus. In quibus autem qualitas citra humorū copiam, persistat, hoc utendum est medicamentis drachmæ octo S, stercoris colūbini drachma una S, acetū a certimi quantum satis est. Illinitur pars laborans, sed prius infricata ut concalescat.

## SI BILIOSVS HUMOR DOLOREM INVEXERIT.

Notæ horum persimiles iis, quos ob solis æstus dolor affligit. Sed maior ipsis rosio accedit, & faciei pallor. interim etiā os inamarefcit. Porro affectus hic atatibus uigētibus & tēperaturis calidioribus, uitz solietz & bilē flauā coaceruatibus solet accidere. Quamobrē balneum temperatū his, inunctiones, aquæ potus, & uniuersa uictus ratio humidior, boniq; succi utilis est. Biliosus humor absynthii diluto, uacuabit. Vel aloē aut ipsa picra, iamāro antidoto per se, aut eū modica scāmonia, aut cataportis quæ aloē constat. Inungēda frōs, aut croceo pastillo, aut trigono, aut quodā simili.

## SI CAPUT CONSORTII LEGE INDOLESCAT.



circa ipsam caluariam indolescent. Quapropter dolores cū grauitate molesti, plenitudinem testantur. cum erosione infestātes, uel humorū, uel uaporum acrimoniam: qui cum pulsibus obueniunt, inflammationē: qui cum tentione, siquidem grauitas & pulsus non adsit, spiritus tenuis, & flatulentia redundantiam innuunt. si cum pulsu, membranosa partis inflammatio nem: cum grauitate, humorum qui intra membranas se receperint, copiā. At si putridus etiam humor, calidior euaserit, iam cū febris simul caput doliat. febriunt autem omnino, & quibus inflammatio dolorem parit. Quū igitur corpus totum succis æquabiliter omnibus redundat, quod plethorā cum dicitur, uenam secate si uires patiantur, & acrioribus uti clysteris conuenit. Inde si adhuc sanguis uidetur exuberare, etiam uase narium ad aperitū quātum satis esse uidetur, detrahes. Mox hiera acris exhibenda, deinde pituitæ educationibus, apophlegmatismos uocant, utē dum est, tum iis quæ per nares uacuant, <sup>Græcis dicuntur.</sup> Eiusmodi est elaterii succus, cum lacte iufusus, uel etiam aridum elaterium inspiratum. succusq; cyclamini & porri. Hæc quæ sequūtur, sunt cōposita. Medicamentum quod naribus inditur ad ueteres cephalæas, lippitudines & morbos comitiales. Nigellæ pōdo drachmæ octo, salis ammoniaci, elaterii, singulorum pondo drachmæ quatuor. Tunfa, oleo sicyonio, uel irino, uel cyprino excepta, ut cerati fiat

10  
15  
20

MEDICAMENTVM QVOD PITVITAM EXTRA-  
hit, naribus inspiratum.

Cyclamini sicci denarii octo, \* nitri rubri denarii quatuor. Sin autē in uicē nitri elateriū indideris, magis proficiet. Tritū accurate calamo scriptorio

25

naribus inspirabitur. Porro epithemata quoq; capiti utiliter applicantur. Item inunctiones, ubi morbus in uerustatem incidit.

EPITHEMA AD CEPHALAEAM.

Vnguenti irini, peucedani, castorei singulorum drachma, baccarum lauri drachmæ due, \* rutæ summitatum drachmæ quatuor. Excipitur cerato ro

30

fæceo, rasōq; capiti, tori ipsi imponitur. Mulier quædam in hemicraniciis hoc etiā quod sequitur epithemate usa, mirandū in modū inclaruit. Radicem cucumis syluestris uiridem minutim concisam, absinthiumq; cū hydrelæo incoquebat: dum intabescerent. Ac hydrelæo calente mediocriter partē affectam irorabat, radicē uero, & absinthium, in puluerē cōtrita ob

35

lincebat. Atq; hoc solo medicamine, hemicranicos, id est altera capitis parte dolentes & cum febre, & sine ipsa, curauit. At si malū maxime increuerit, ut dolorem ferre nequeant, utitor medicamētis etiam quæ lenire possunt, & noxia euocare, quale est quod sequitur.

VNGVENTVM AD CEPHALAEAM.

40 Liquoris peucedani drachmæ sedecim, lachrymæ papaueris, anisi, alterci quod hyofcyamū Græci uocāt, croci, myrrhæ, scammoniz, singulorū dra

\* Galenus,  
adicit irini  
denarios du  
os.

\* Galenus, A  
gni semine,  
rosari sicca  
rum singulo  
rū drachma  
due, pntæ.

chmæ duæ. Aceto excepta in pastillos coguntur. Cū usus postulat, ex aceto uel posca illinuntur iis, quibus humores crassi, uel spiritus flatulentus dolorē fecit. Iam dropax & sinapismus iisdē benefacit. Itē pastillus ex thapsia, præterea medicamē ex atramēto scriptorio mirificē eidē causæ medetur, quo in his eo modo utendum est, sicut in opere de compositis docebitur. Quin & istud mirabilem in modū ad hemicranicos ex crasso glutinosoq; humore dolescētes efficax est. Euphorbii portio una cū pari castorei modo aqua excepta auriculæ demittitur qua parte indolescit, inde balneum adeundū, ubi paululum immorati ipsum assument, & consueto more lauabunt. Sic quidē expertum est, uerum non alienū absurdumq; fuerit, & oleo ipsa excepta in aurem instillare. Quod medicamen ad coxēdices inscribitur, etiā longo capitis affectu laborantes, & hemicranicos ex toto perfanat.

#### AD HEMICRANIAM VETEREM.

Scordii drachmæ quatuor, ceræ drachmæ duæ, axungię ueteris drachmæ duæ, cantharidum drachmæ duæ. Vesperī illitum finito per noctem adhuc rere. Mane rupta papula pliquido medicamine, *πέντε* appellat, ei mede-  
deberis. A L I V D. Baccarum lauri quibus cortex sit ablatus, ruræ foliorū, singulorū denarii duo, sinapios denarius. Aqua dilutū oblinito. At iis qui frigori patuerunt, utilissimum est infra scriptum medicamentum ut ple-  
rosq; semel ante balineas illitum, confestim affectu liberaret & à lauacro  
(qui antea laborabant) in totū sanitati pristinæ restituerentur. Olei fabini pondo, ceræ quadrans, euphorbii uncia. Hoc dimidiē frōtis parti, nempe qua temporum musculus habetur, delini debet. Qui uero frigoris iniuriam non senserunt, iis gallæ, & crocomagmatis parem portionem cum uino detritam inungito. Sed qui ex calidis uaporibus, uel succis capite dolent, iis medicamenta quæ euphorbio constant, non applicabis.

#### APOPHLEGMATISMVS, ID EST MEDICAMEN-

tum pituitam per os purgans contra Cephalzā.

Si napeos cōtriti & expressi, aceti, mellis, singulorū *•* uncię quatuordecim, herbæ pediculariæ drachmæ quatuor, pyrethri tantundem. Tunsa cribrataq; miscentur & in sole gargarizanda dantur. Porro si ob biliosum humorem, aut quandam intemperiem orta Cephalza diutius prorogetur, eorū usus ueniet quæ in capite de cephalalgia comprehensa sunt. Si ne sic quidem dolor finitur, neq; cucurbitulis, neq; hirudinibus adhibitis, sed humores per arterias distributi subsistant morenturq; indidem, non absurdum fuerit & arteriam post aures incidere. Porro humidioribus, etiam balineę naturales recte adhibentur.



#### DE PHRENITIDE.

Cap. VI.

Hrenitis, membranarum cerebri, quas meningas appellant, inflammatio est, sic ut ipsum quoq; cerebrum eadem modò cōsistetur, modò calore à natura remoto æstuet. Causa mor

bi est, uel sanguis superans, uel biliosus humor: nonnunquam & flaua bilis perusta, adeo ut in nigram degenerauerit, quæ etiam grauissimâ phrenitidem contrahit. Aliquando cerebrû principitis consortio dolens, ex neruis qui in ipsum sparguntur uitium concipit, idq; in ardentissimarû febrium uigore. Porro quæ stomachi cõsensu gignit mentis perturbatio, phrenitis non est, sed hoc solum puta delirium. Propria phrenitidis comes est plurima parte somnus difficilis: interdum quoq; somnus turbulentus accedit, ut consurgant ægri, exilient, & furibunde uociferent. Quibus sanguineus humor morbû fecit, cum risu in insaniût. Quibus flaua bilis, set ociter, quemadmodû quibus a tra uitium contraxit, tam immaniter fatuant ut coërceri nequeant, omniû quæ dicunt, faciunt ue, obliuiscuntur. Oculos habent cruentos ac sæpe perfricant: interim aridos, interim lachrymâtes, uel ut crassior pituita innatet. Lingua est aspera, sanguis è naribus destillar: floccos festucasq; colligût, febrî per totum morbi decursum acuta cõficiuntur: ut quæ in alto malignius delitescat. Pulsus edunt exiguos, languidos, & quadantenus duos. Respirant magnû, & raro, cum cerebri affectus per se excuriat. At si phrenitis septi transuersi, quod Græci phrenas uocant, consortio concitetur, & respiratio inæqualis est, & præcordia sursum conuelluntur, & multo calore ardent: sicut iis qui ex cerebri uitio insaniunt, frons incalescit, & subcruenta est, uenarum puluini turgescunt. Quod si humor pituirosus sit temperatus bilioso, ut mixtam habet originem, ita nomine composito uigilans coma uocatur. In uniuersum enim succo superante bilioso, uigil efficitur phrenitis. Contrâ pituitoso præstatiore, grauioris modo somni, quem uigilans Græci dicunt, sopiuntur. Atque hoc malum antiquiores Galeo medici, Catochon uocauerunt.

## CVRATIO PHRENITIDIS.

Quod si uires ægri patiantur sanguis protinus è cubito mitti debet, & copiosior. At si desipiens manû non porrigat, aut si porrigat, metus sit secûdum uacuationem, sanguinis profluuii, dum manû æger subinde ob mentis turbationem iactitet, recta in fronte uena diuisa, una uice quod satis est auferemus. itè clysteriis utemur, & enematis ex hydrelco uel rosaceo cum prisanæ cremore. Si uigiliae urgent, rosaceû, uel oxyrhodinû in caput dandum est. Aliquando calida ipsum aqua fouendû: & medicamentum ex pauere exhibebitur, nisi uirtus imbecilla prohibeat. Et alia quæ ad somnû conciliandû superius scripta sunt huc transferemus. Decumbat æger in loco, tum lumine, tum temperie moderato: & uariis quibuscûq; pisciuris libero, nam hæc deterrent. Quò amici quidè gratissimi ingredientur, & comitodum incident, qui nunc blande ægrotû alloquantur, nûc acerbius corripiât. Cibus primû esto aqua mulsa, deinde prisanæ cremore, & forbitiões ex chondro cû quadâ dulci potiõe, uerbi causa, apomelite, uel hydrosafato, uel rhodomelite, uel diluto hydromelite. Nā uinosum hydromel, quod

*phrenitis in somno  
uigilans coma  
appellatur. uel  
st. cypri. par. 39.  
et. 40. in lib. 1.  
comar. in phren.  
lib. 1. cap. 19.*

in patuis uasculis ex Cibra apportat, repudiandū, ut quod grauiore ui-  
no noxas in talibus excitet, & maxime in capitis affectibus, idq; ante cōco-  
ctionē. Panis quoq; aqua lotus rectē exhibet, intrubi, lactuca elixa. Si mul-  
tus feruor conficiat, etiā cruda hæc dantur. Itē cucumeris medulla, pepo-  
nis, dorycnii, & similiū. Aquæ frigida potu cōcercendi sunt, potissimum si  
septū transuersum, confortiū lege malo dedisse originē deprehenderimus.  
Quod si urina ipsis, ut consentaneum est, delirii uitio cohibeatur, calentis  
hydrelæi imbre & pubem & uescicā fouebimus. deinde digitis manus, loco  
innixis ad reddendū urinam incitabimus. Reliquū corpus ipsis decumbē  
tibus calido oleo perungi debet. Etenim in quiete, quoad eius fieri licet cō-  
tineri, si diuites fuerint, a famulis, sin pauperes, uinculis cōuenit. Nam in-  
ordinata motio uires conuellit. Iam uero alia etiam de causa pedes, prius  
forti, deligaturis constringi, manuq; contrēctari debent, nempe quō humo-  
res deorsum reuellantur. Porro si longior affectus, & contumax fuerit ab  
iis quæ stuporem membris accersunt, abstinendum: ea uero quæ digerēdi  
facultatē obtinent, capitis perfusionibus miscenda scilicet mentæ succus,  
uel serpilli, uel calaminthæ, uel rutæ. Tum iis quoq; utendū quæ naribus in-  
ferunt. A septimo die si uiscera sentiant inflammationē, cataplasmatibus ex  
lini semine, & hordeacea farina cum hydrelæo leniemus. Deinde cucurbi-  
tulas leues, aut cum scarificatione, tum his ipsis, tum occipito & spinæ  
commodabimus. Si corpus squalidum perustumq; esse coniectaueris, fe-  
brisq; adsit, etiam balneis utendū aquæ potabilis, & unctione liberaliore.  
Vinum tenue & dilutū, quod *αποπόση* appellant, uiribus recolligendis pro-  
pinabimus, nullam inde mentis alienationē, ut est uerisimile, futurā suspi-  
cantes. Aut enim nulla sit, cum status morbi est: aut certe si sit, ex facili sub-  
sident. Ceterum ubi morbus se remiserit, gestatione corporis uti expedit, &  
congrua uirium recreatione. Sed ita phrenitici sese recolligent, ut ebrieta-  
tem, otium, ciborum corruptiones, & in primis solis æstum caueant.

## DE INFLAMMATIONE CEREBRI. Cap. VII.



Erebrum inflammatione laborans, sæpe ita intumescit, ut ca-  
pitis suturæ distendantur. Dolor comitatur maximus, & diu-  
turnus, uehemens ex repletionē cibi fastidium, rubor in fa-  
cie multus cum tumore molli: oculi fiunt proterui, caput in-  
turgescit. Qui hoc malo impliciti sunt, sanguinem ex cubito mittere, item  
ex naribus, & uasis linguæ subditis debent. Porro ad inflammationes tum  
resperisiones, tum cataplasmata, quæ humectare & mollire sunt idonea, ca-  
piti recte inducuntur.



## DE ERYSIPELATE CEREBRI. Cap. VIII.

Ccidit quoq; erysipelas cerebro, quo laborās hæc patit capite  
doleret uniuerso, adeo ut flāmis id uri putet, facies frigida est, &  
subpallida, os aridū. Quare q in tāto affectu sanguis detrahē-



pitio agglutinare: partim leucs cum multa flāma, partim cū scarificatiōe. Præterea ad naturæ exercitiōes frequēter sollicitare oportebit, tū iniectionibus, rū iis quæ urinā mouēt. Pubē olco tutaceo, aut lycionio, cui sit adiectū castorei paululū, aspergere. Iam uero ut deglutiāt crebrius admonebimus ex calida aqua dulcē quandā potionē, præsertim ex apomelirc confectam, bombylio ori instillātes. Quod si mediā infestet regionē cerebri infāmario, huic itidē medebimur superfusiōibus & cataplasmatis. Naribus sinapi acero tritū, uel castorcū ustū admouere profuerit. Alimētum esto cremor ptisanæ, uel auenæ, uel alicæ cū oxymelirc, uel salibus, uel pulgicio: nūc quotidie, nunc uno die interposito. A cibo, uinciri debēt: summa diu cedere oportet, crurāq; pūgere: nonnūq; pilos etiā in ipsis uehemētius euellere cōniti, quo excitentur. Iam femora & crura exulcerata subinde profunt. Cæterū ubi morbus inclinare inceperit, gestatio statim cōtinua utilis est, & balneū. Viētus qui uires recolligat, recetq; decētet adhibendus.

DE CATOCHO, AUT VIGILI COMATE. Cap. X.

**H**uius morbi causam, ubi de phrenitide sermo est habitus, sumus complexi. nora, ut summam dicam, communes quodammodo sunt phrenitidis & lethargi. Sed pro materia abundante uariant, peculiars autē hæ. Inuadit hoc mali hōmīnē lupinum, expōrētumq; cuius aliās facies subrumescit, & modice lethargicorum modo liuet: aliās rubescit, & superior gena sursum conuelli uidetur, ac excedere ut nec cōnuere quidē æger queat: respiratio nulla apparet, sed quasi emortuus decūbit. pulsus est exiguus, languidus, & creberrimus. Urina & aluus nihil, aut certe parum reddunt. Qui meliuscule habēt, nec tam graui premuntur affectu, liquorem aliquem infusum deglutiūt: qui uero malo uicti sunt, ad nares regurgitant. Itaque pituita bilcm superante affectos à lethargicis discernimus, eo quod nec facies tumescit, neq; liuida est, sicut lethargicis. præterea quod paulatim etiam leuiter desudāt. In iis periculū maius est, quibus per uigiliū adest continens, urinæ non respondent, difficilis inspiratio intenditur, sudores crumpunt, & ad nates potus resorbet. At si mulier hoc laborare uitio cœperit, ab ea quæ uulua strāgulatu corripit, hac nota discernes, quod naturaliter iacere uideatur, & in clamantes percipiat, excitetur, rursusq; somno graui sopiatur. Interim dicunt etiā priuatim diuersumq; à uigili comate catochon fieri, cū simplicē nō mixtā habebit causam, nimirū frigidiorē sicciorēq; materiā, quæ potestiore cerebri uentriculo repleto malum hoc excitat. Quo qui corripitur repente, in illo permanet habitu, quo correptus est, stans scilicet, uel sedens, clausis oculis, aut respiciens. Quā ob causam antiquiores Græci hoc detentos morbo, catochos uel catochomenos, quasi dicas occupatos deprehensosq; nominauerunt: recentiores affectum fœminino genere catochen & catalepsin ueluti detentionē & deprehensionē. Curatio prædictis

*catochos ex sola frigida causa*

*et si morbus sit diuturnus*

est similis, sed ea quæ superueniunt diuersam postulant animaduersionem,  
CVRATIO CATOCHI.

Huic quoq; malo sanguinis missiõe succurritur, præsertim in quibus facies  
rubescit, modo uires suadeant: aut clysteres iniiciēdi, partim qui pituitā pol-  
5 lentem eliciant, partim qui bilem abundantem leniant, pari modo aliorum  
quoq; præsidiorū ratio utilis est. Similiter ægros nutrire confert, interim die-  
bus singulis, interim uno interposito. Porro affectus admodū periculosus  
est, si aut uictu aut potu erretur. Quibus uomere ex usu est, ii statim ad id co-  
gēdi sunt, ac ore uētriculi submisso cura adhibēda ne alius irritetur, ac uisce-  
10 ra resperisionibus ex cumino aut ruta foueantur. Qui ex ebrietate uirium cō-  
ceperunt, crapula dissoluta, humidiorē cibo tractandi sunt, qualis est prisa-  
næ cremor. Præterea caput inunctionibus congruis perfundetur, per æstas  
tē frigidis, per hyemē egelidis. Si nequaquā crapula soluitur, neq; ad sobrieta-  
tem reditus est, tanquam deploratæ ualetudinis hominē uitare oportet.

15 DE MEMORIAE IACTURA, ET RATIOCINATIONO-

nis, item de sopore, & fatuitate.

Cap. XI.

**M**emoriz iactura partim per se, partim etiam cum quadam ratio-  
cinationis labe accidit: quemadmodum & mentis seu ratiocinā-  
20 di facultatis noxa priuatim prius incipit, deinde memoriz iac-  
tura insequitur. Verum cum utraq; pars, mens inquam & me-  
moriz male fuerit affecta, tunc fatuitas seu stultitia, quæ Græcis morosis ap-  
pellatur, oboritur. causa malorum est, noua intēperies, quæ partes illas per-  
tinaciter obsidet. Quod si humida solum fuerit, memoriz & ratiocinatiōis  
35 uitium creabit, torporesq; quos Græci *νεμερτης* uocant, & in somnū longas  
profundasq; delationes. Si uero humori frigiditas etiam accesserit, sopores  
& lethargos. Eodemq; modo si sola fuerit siccitas, uigilias tantū inducit. At  
si calor accesserit siccitati, deliria, & phrenitidas mouebit. Porro intemper-  
es hæc nonnunquam obueniunt humoribus: nonnunquam cerebri uentricu-  
40 lis, uel ipsius uasis: uel utiq; humiditati insparæ, uel ipsimet cerebri corpori,  
uel etiam temporum musculis tali modo uitiatis. At si humores cum ipsis  
sint mixti, similē quoq; morbū experiētur: uerum simplex, an composita sit  
intemperies efficiens, ex specie excrementorum condiscēs. Quod enim me-  
moriz & ratiocinationis iactura, frigiditatis soboles existat, compertum ha-  
45 bemus. Humiditati uero, an siccitati iuncta sit, ex recrementis, ægri habitu,  
temperatura, uictus ratione, anni tempore & loco deprehendemus.

CVRATIO.

Si frigida male habuerit intemperies, calefacere: si humiditati iuncta sit, etiā  
exsiccare oportet: rursus si mixta cum siccitate, humectare simul & caleface-  
40 re. Pari modo etiam in calida intemperie refrigerare conuenit. si siccitas ac-  
cesserit, pariter humectare: si humiditas, refrigerare simul & siccare. In qui-

h ii

*ex frigida caus  
memoriæ iactura*



bus sanguinem deprehendis abundātem, uenam aperire, uel clysteriis acris  
 bus uti consiliū est. Deinde etiā hiera amara, & apophlegmatismis. Itē in-  
 unctiones capiti sunt inducendae ex oleo, cui adiecta sunt quae refrigerant ex  
 iccantq; rosae dico, myrti, iuncus, aliaq; similia. Ad hanc totius corporis soli-  
 citudo habēda est. Quod si aestu & lassitudine orta fuerit intemperies, caput  
 oxyrrhodo perfundendū, tum reliqua curandi ratione frigida humectaq;  
 uti conuenit. Inter cetera & cibo & potu simili. Quod si caros satietati, uel  
 obliuioni accedat, huic etiā succurrendum est, ut in lethargicis prius cōpre-  
 hendimus, ubi & ipsorum discrimen explicū est.

## DE VERTIGINIBVS.

Cap. XII. 10



Vertiginū affectus nascitur cū frigidus, glutinosusq; humor cere-  
 brū occupat. Vnde leui occasione protinus etiam concidūt. ue-  
 luti quādo aliqua circūagi extrinsecus aspexerint, ut rotas, turbi-  
 nes ue, aut quando etiā ipsi circūaguntur. Interim ubi capite in-  
 calecūt humoribus in eo commotis, uel etiā spiritu: interim prioribus cere-  
 bri uentriculis, caluariae confractae perforatu pressis, in quibus etiā uehemē-  
 res oboriuntur cruciatus. praecedit autē primariū capitis affectum uehemēs  
 dolor, torpor, & aurium sonitus. quidā olfactu laeduntur, nonnulli gustu. Qui  
 bus autē uentriculi oris consortiū rosionem stomachi, quam cardiogmon  
 Graeci appellant, accersit, etiam nausea superuenit. 20

## CURATIO.

Vertiginosos in accessione quidem medicamentis quae odore mouent, exci-  
 rare conuenit. item frictionibus, & id genus aliis. Vbi morbus cōquirit, eius  
 discutiendi gratia sanguis primū mittendus est. deinde purgatio ex hiera pra-  
 35 stāda. Interpositis diebus acris clystere ex cetaurei, uel cucurbitae syluestris de  
 cocto utendū est. Secundū huiusmodi uacuationes caput ipsum cucurbitu-  
 lis ad occipitium cū scarificatione lancinari debet, mox apophlegmatismi, id  
 est medicamenta quae pituitā per os eliciant assumi, & sternutamēta moue-  
 ri. At quos capitis calor, auriumq; sonitus male habet, ceu uaporibus calidi-  
 oribus per arterias sursum elatis, etiam arteriae sectio retro aures iis adhibē-  
 30 da est: ut in parte chirurgica sumus dicturi.

## DE MORBO COMITALI.

Cap. XIII.



Orbus comitialis, cum totius corporis sit conuulsio, sed ita ut  
 principis animae functionū noxa comitetur, partim in ipso cere-  
 bro, partim in uniuersis huius uentriculis causam habet subsiste-  
 35 re: modò humorē pituitosum, modò melancholicū. Itē ore uen-  
 triculi affecto cōsortii quadā lege oboritur. quemadmodū in colicis quoq;  
 sicut in illorū capite exequemur. Iam uero aliis quoq; partibus contagione  
 impatiētibz nascitur, cum ueluti aura quaedam frigidior ad cerebrum a-  
 scendit, aliās à crure, aliās à manus digitis. Insuper uisus est quandoq; pro-  
 40 uenire etiam in quadam muliere ab utero quo tempore esset grauida. A par

tu edito cessauit. Occupat hoc morbi genus maximè pueros eosque adhuc paruulos, deinde adolefcentes & iuuenes, minimè senes & decrepitos. Præcedit igitur comitiales, corporis animique status minime arbitrarius, tristitia, eorumque iuxta sunt obliuio, turbulentæ infomniorum imagines, capitis dolor, eiusque repletio continua, ob iracundiam maxime pallor faciei, & inordinatus lingue motus: nonnulli ipsam quoque commordēt. Quibus à stomacho uitiū oritur, palpitatio ipsius præcedit tumultus & erosio. Iam ex inedia seu cibo tardius assumpto, excandescunt. In hoc casu, quamprimū inuaserit, ægri concidunt, conuellunturque: tum impotens quædam uox interdum suboritur. Sed peculiaris admodū mali nota est oris spuma. Quippe alia cōmuniter aliis quoque morbis eueniūt. Non defunt etiā quibus urina & sterces præter uoluntatem excernitur. nonnulli & genitura. In quibus igitur acutissimus est effectus, statim iugulat, & tam crebris accessionibus, & eorumque accidunt, uehementia. Ac plerisque longus esse solet. Nam si non pubertate uel menstruorum initio, uel puerperio solutus fuerit, uel si post hoc tempus remanserit, sæpe usque ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medici curationē fuerit assecutus. Coarguunt comitiales suffimenta, birumen, uel lapis gagates, uel cornu caprillum, iecur hircinum comestū, & iecoris tosti odor.

## CURATIO.

Si infans ægrotus fuerit, nihil moliendum est. nam ætate ad biliosiores, siccioremque statum uergente, & uictu moderatiore, sua sponte plerumque morbus finitur. adeo ut solius uictus infantium, & eorum qui lacte nutriuntur, ratio sit habenda. qui post annos pueriles in morbum hunc prolabantur, eorum partes conuulsæ ac distractæ pingui aspergine adiuuari, contineri & in rectum dirigi debent. Deinde ore distento digitus demitti, aut pinna oleo irino unctæ, piritæ auferendæ gratia. Quin & medicamentis quæ naribus adhibentur sensum mouere conuenit, exempli gratia, peucedano, cyrenaico liquore, birumine, pice cedrina. Post accessiones si nihil prohibet, sanguis utique à cubito mittendus est. At si nihil remittat accessio, summæ partes sinapi implendæ sunt. cucurbitula præcordiis defigetur. Quod si nec his morbus comprimitur, minimum in medicina spei superest, nihilo secius tamen medicus animo confidente castoreum necessitate adactus & liquorem cyrenaicum cum melle & aceto ori infundet. in anum centaurei decoctum, uel cucurbitæ syluestris dabit. Qui conualescunt uiribus ante recreatis purgatione ex hiera sollicitandi sunt. Hæc sanè est recentis & acuti morbi comitalis curatio. deinceps quomodo inueterato succurratur trademus. Itaque egrotos aquam diu bibere expedit, ac si nihil obest, sanguinem dimittere. Interpositis quatuor aut quinque diebus corpusculū reficere, & sic purgante medicamento sollicitare, præsertim ueratro nigro, uel cucurbita syluestri, uel certe scamonia. Porro ueratrum sine medulla rûsum cribratumque: aquæ mulse cyathis quinque uel sex inspergere oportet, aut melle crudo cum piperis mo-

mento excipere. Cucurbitę uero, semine eieſto medullaq; implebis ipſam paſſo, ſineſq; totum noctę cōmadefcere. Mane paſſum temperatū potui da bitur. Vel etiā medicamēto ex ueratro albo purgationē molieris: quod hæc recipit: baccarū lauri purgatarū, piperis albi, alypiados, euphorbii, ueratri al bi, ſingulorū drachmas octo. Hoc totum datur cum paſſo quod in cucurbi ta ſylueſtri pnoctarit. probe uacuat per uomitū. Vbi uero ſat purgati ſunt, ægri balneo credētur. Tertio die in præcordiis & dorſo cure ſcalpello incifa cucurbitulę affigendę ſunt. Deinde cōpluſculis diebus interpoſitis corpus nutriendum eſt, & hiera diacolocynthidos aſſumi debet, poſtea capiti & oc cipitio cucurbitula agglutinari: Sequēti die panis coctus in mulſa, tritus au 10 tem cum amaris amygdalis, uel ſerpillo, uel menta, uel calamintha, uel ru ta ſuperdandus. Atq; id per triduū continuabitur. Ab hoc, caput tondendū eſt, & peucedani liquore cui ſpondyliū incoctū ſit, ex aceto diluto perungen dum. Rurſus corpore interea recreato antidoti diacolocynthidos, oboli no uem ex aqua mulſa exhibent. Interpoſito tēpore, interpoſitis rurſus diebus 15 clyſter ex cētaurio & colocynthide, deinde hiera rurſus dabitur, iterū tres ex antidoto offerre conuenit. Inde medicamētis uti quę ſternutamenta citāt. Poſt quinq; decem ue dies, caſtoreū ex mulſa præbetur, mox quę pituitam per os & nares educant, deinde ſinapiſmus capiti inducitur. Itē uomitiones ciborum acremēto, cum opportunitas eſt, ciere expedit. Auxiliatur hiſ etiā 20 oxymel ſcilliticum quotidie potum, & mel, in quo ſcilla intabuērīt, inſtar co chlearii aſſumptum. Viſtus ratio utilis eſt quę incidat extenuetq;. Cappa ris igitur frequenter eluſ & ſaſamentum prodeſt. Fugere oportet carnes, le gumina, uinum copioſius, uenerem liberaliorem, balnea, ſinapi, & potum ſtatim à balneo, præſertim uini meraci. Exercitia proſunt & frictiōes, ſed ca 25 piti poſt reliquas omnes corporis partes adhibitz.

#### DE IIS QVI STOMACHI VITIO COMITI- ali morbo corripiuntur.

Si ſtomachus primario affectus, morbum inuexerit, ſolicitude habēda eſt, ut ex ſacili æger cōcoquat. Panis igitur accuratē elaboratus ex uino tempe 30 rato quod leuiter aſtringat, albumq; colore ſit, ad horam tertiam recte aſlu minitur. Item medicamentū ex aloë, bis ter ue ſingulis annis dare hiſ expedit. Noui autē quandoq; puellum (inquit Galenus) neutiquam hoc tētatum po ſtea morbo, quā radicem glycyſidis (dicit autem pzoniam magnam recē temq;) ex collo ſuſpenſam geſſerat. Inſuper agaricum opitulator comitiali 35 bus, idem præſtat ſeſeli, ſpondylii fructus, radixq;, ariſtolochia rotunda ex aqua pota. Non parum huc facit & continua crurum ſcarificatio.

#### DE IIS QVI A PARTICULA QVA- dam morbum concipiunt.

Vbi caſus hic inuadere hominē ex particula pcpitur, ſiue ea fuerit manus, 40 ſiue pes, ſune excipi ualenter debet quę ſuperpoſita eſt. Cum remittit, ad-

urens quoddam medicamentum particulæ inducetur, cuiusmodi est lepidi  
um, & diacatharidos similiaq;. Ad hæc oxymel Iulianū comitiales uehemē-  
ter adiuuat, particulatim materiā commouens. Post omnia cōmemorata &  
Theriace, & naturales balineæ locum obtinent. per totum autem uitæ curri-  
culum cauenda maxime cruditas, cibis ante cōcoctionem obitam, isq; cras-  
si succi, tarda nutritio, commotiō, uinū largius & potus à balneo, sicut cōpre-  
hensum est, maximè meracus, prætereā ualde uetusta, crassaq; uina, tū acria  
ex his quæ o dore mouent, & caput replēt, loci præcipitis incōniuens conspe-  
ctus, in balneo mora. Postremo curandum ne caput insolatu uratur.

## DE MELANCHOLIA.

## Cap. XIII.



Elancholia mētis quēdam alienario est sine febre, ex melancholico maxime humore nascens, qui mentis sedem occupauerit: aliās cerebro ipso per se ægrotante, aliās cum toto corpore immutato. Tertia uerò melancholiæ species est, quam flatulentā  
& à præcordiis hypochondriacam appellant, ob inflāmata circa stomachū præcordia proueniēs. quę modò auram quandam maligniorem, modo substantiæ humoris partem ad cerebrum sursum transmittant. Communia omnium signa sunt, metus, tristitia, odium hominum. Item alii se credunt animalia quædam bruta esse, & uoces ipsorum imitantur. Alii uasa fictilia, metuuntq; ne rumpantur. Hi mortem experunt, illi eandem expauescunt, non nulli semper rident, nōnulli plorant. Alii uero putāt à maiore quadā ui se defendi ornariq; & uaticinātur futura, nō aliter quā uates & diuinaculi quos Græci *ἰατροὶ* proprie nominant. Peculiares notæ eorum sunt, qui ex totius corporis consensu melancholia laborant, gracilis corporis habitus, niger, hirsutus & ex toto melancholicus, uel natura, uel etiam ex acquisito per solitudines quasdam, aut uigilias, aut prauorum ciborū esus, aut hæmorrhoidum, aut mēstruorū suppressionem. At qui ex præcordiis hoc uitri cōceperunt, eos testātur cruditates, acidi ructus, ardor, & ipsorū grauitas, tū quod præcordia sursum conuellantur. interim inflammatione conflētentur. Ad hæc quod tam incipientem morbum quā maiorem iam effectum melancholica comitentur symptomata. quodq; hæc leuentur, concoctione, uel excretiōe, uel multis flatibus, uel uomitu, uel ructu. Cum autem nullū ex his, aut certe pauca eueniunt, melancholica quæ apparent signa cerebrū primario affici in totum succi contagione melancholici fatentur. Porro si quando flauæ bilis supra modum exustę in nigram fiat muratio, insaniā, dictam græce manian inferet, cuius impetu ferarum modo reddūtur effrenes, ut etiam eos qui imprudentis ipsis occurrunt, manu uiolenter tractent.

## CVRATIO MELANCHOLIAE.

Qui igitur ex primario cerebri affectu melancholici sunt, crebris balneis uis-  
tu boni succi & humido curantur, unā cum decēti animi delectatione, sine alio præsidio, cum humor qui molestat nondum ob temporis longitudinē

excerni contumax est, quando ualentiora magisq; uaria tentare oportet remedia. Itaq; purgentur per initia epithymo, aut aloë. Nā uel pauxillū ex his sumptū quotidie maxime iuuat, & leuiter aluū subducit. ubi purgati fuerint, uti dictum est, absinthiū propinabitur: nunc herba ipsa duobus aqua cyathis perfusa incocta q; nunc eius succi drachma semis, aqua cōtinue liquefacta. Aceti q̄acerimi modicū sorbitioni datur somnū inituro. Iam multa obsonia in id intincta esse conuenit, prestantius autē erit acetū, in quo scilla, polium, & tenuis aristolochia cōmaduerint. Cum igitur morbū fortē curādum susceperis, qui quidē ex torius corporis affectus consortio, ut supra dictum est, trahit originē, uires autē sint ualentes: à sanguinis missione incipiendum est. Interposito deinde tempore, uiribus recollectis, inferius purgare conuenit medicamento ex cucumere, tum eo quod cōstat nigro ueratro. Porro si hæmorrhoidibus, aut mensibus suppressis malū fuerit concitatū, horū quoq; purgationem moliemur. Laudatur etiā facultates, tum quæ urinæ ciendæ sunt, tū quæ per sudores purgant. Si præcordiorū offensionis morbus debet, & horū habenda erit sollicitudo. fovebūtur ipsa ruta decocto perfusa: itē anethi, absinthii, pulegii, agni seminis, & fructus lauri. Hæc etenim dolores quoq; leniunt, & flatus discutiūt, oleo incocta, & sic affectæ parti applicata. Cæterū præter hæc insint cataplasmatibus etiā ea quæ flatibus discutiendis faciūt. nempe apium, uel anisum, uel cuminū. Nil mali fuerit, si indatur cataplasmati & cyperus, & iris, & libanotis quam rosamarinū uocāt. Cū hæc admoues, longo tēpore per diem & pasto & ieiuno adherere sines. Vbi admeris, aliud quoddā operimētum superaccomodato, lanam scilicet latiorē. Cucurbitulis ad flatus digerēdos leuibus utitor ad dolores inflammationesq; cum scarificatione. Porro adhibita curationi diligētia, nec sinapis obliuiscere, sed acribus incidendi uirtute prædiris, & dropacibus super dorsum, uentremq; uti cōuenit. Quibus uitū inueterauerit, præsentissimū est remediū per ueratrū album uomitūq; purgatio. Viētus omnibus melancholicis cōferet probi succi, & mediocriter humidus. Virāda sunt, caro bubula, ceruina, lenticula, brassicæ, cochleæ, uina crassa, & nigra: breuiter, quæ atrā bilē generant.

#### CVRATIO INSANIAE.

Insanientes consimilem melancholicis curationē recipiūt. Propriam uero habent, ut caput ipsorū rosaceo tum unguine, tum aceto perfundatur. Item per antidotū picrā, id est amarā, utilis est post sanguinis dimissionē purgatio, necnō hirudines capiti admotæ. Vnice ipsos iuuat hippomarathri radix, semenq; eius ex aqua potum. Insuper bryoniæ radice denarius ex aqua quotidie assumptus. Sin autē delirantes purgantium medicamentorū potionē renuant, interim ut facilius fallat ipsos, cibus nepe buccellis, uel ficibus pinguibus, uel palmulis, interdum potionibus adicienda sunt. Ante omnia uero in lecto uinciendi, ne uel sibi, uel alteri noceant. Aut gestandi lectulo, intra cubile quoddam insanientibus dicatum, pensili.

DE INCUBONE, QUI EPHIALTES GRAECE dicitur. Cap. XV.



Phialten, qui latinis incubo est, aliqui ab eius nominis homine dictum asserunt, uel inde quod hoc malo correpti ab aliquo se inuadi imaginentur. Themison tamen decimo epistolarum uolumine à suffocando pnigalionē appellauit. Constituitur id uitii ex crapula, & cōtinua stomachi cruditate. Comitatur eo detētos difficilis motus, torpidus in somno sensus, suffocationis imaginatio, & ueluti ingruentis cuiusdā mali occupatio. Ad hęc uox suppressit aut incerta indiscere taq; editur. Nonnulli in se grassatos etiā audire, & ab eis uenerē exigere putant, sed cōpressis eos digitis fugere. Cui malo succurrēdū est per iniū. Nam si diutius se prorogauerit crebroq; eos per noctē opprimat, grauius aliquod nuntiat malū, ut apoplexia, infania, & morbus comitialis, cū primū in caput huius uitii causa ferri cōperit. Quæ enim comitiales interdiu, eadē ephialtici dormiētes noctū patiūtur. Itaq; commodū est sanguinis detractiōe & purgationibus uniuersum ægri corpus uacuare. Maxime his opitulatur, nigri ueratri denarius, cui scāmōniæ oboli tres sint adiecti. Itē nōnulla ex odoratis, anisum, daucū, petroselinū. Iam hiera diacolocynthidos, id est ex curbita syluestri strenue auxiliatur: est aut ea quæ ad Rufum authorē refertur. Viētus sit tenuis, nō qui inflatiōes pariat. Succurrit ipsis & pēoniæ semē. Dandaq; sunt potui cōtinue grana eius quindecim nigra in aqua contrita.

DE LYCAONE, VEL LYCANTHROPIA, ID EST HO

minum in lupos conuersione.

Cap. XVI.



Vi lycanthropia detinentur, noctu domo egressi, lupos in cunctis imitantur, & donec dies illucescat, circa defunctorū monumenta plerunq; uagantur. Hæ comites ipsorū notē sunt, facies pallida, oculi sicci, & ad uidendum imbecilli, lingua aridissima, nulla in ore salua, sitis immodica, tibiæ sine remedio exulceratæ, quod frequētī per noctē eius partis offensione accidit. Tales quidē sunt notē. Species aut melācholiæ hoc malū est, curandumq; in accessionistēpore: sanguis ex uena ad animi usq; defectū detrahitur, cibis probi succi, æger, & balneis dulcis aquæ sustinendus est. deinde lactis sero per triduum usus, etiam hiera diacolocynthidos, bis terue purgabitur. Ab his purgatiōibus, thriacē quoq; ex uiperis assumet, ac alia reliqua in melancholico affectu cōmemorata. Inuadēti iam morbo, asperginibus somnum accersere conuenit, in id efficacibus, ubi somnus acceperit, nares opio illinuntur.

DE AMANTIBVS.

Cap. XVII.



Mores cerebri affectibus annumerare cū sint quēdā curę, haud fuerit absurdum. Cura uero affectus est animi, ratiocinatione in motu laborioso occupata. Hę sequaces amantiū sunt notē. Oculi concaui non illachrymant, sed tanquā uoluptate pleni apparent, cōtinens palpebrarum motus, & cum reliquæ corporis partes nō colla

buntur solæ hæ amantibus concidunt. Pulsus ipsorū proprius nullus est, ut quidam opinati sunt, uerum qualis eorū deprehenditur, qui cura conficiuntur. Cum uero res amata in mentē ipsius uel auditu, uel uisu, & præsertim repente uenerit, tunc pulsus animo turbato cōtingit immutari, neq; naturalem æqualitatē, neq; ordinem retinere. Hos igitur & tristes, & uigiliis torfos nonnulli qui dispositionē ignorarēt, nullo balnei usu, solitudine & tenui uictu consumpserunt, in quibus sapiētiore cum amantē deprehendūt, ad balnea, computationē, gestationem, ludos fabulasq; animū abducunt. nonnullis metū incutere conuenit. Nam qui amori semper indulgēt, iis difficulter abigi potest affectio. Quidam igitur obiurgandi sunt, ex ratione uitæ quam singuli delegerint. In uniuersum mens ad alias curas abducenda est.

## DE APOPLEXIA ET HEMIPLEXIA, VEL

## PARALYSI.

## Cap. XVIII.



Vando cōmune neruorū principium affectū est, eoq; omnes corporis particulę motū simul & sensum amiserunt, apoplexia morbus appellatur, acciditq; principalib; animi functionibus oblatiis. Sin aut in altera corporis parte obstructio fuerit oborta, hemiplexia & paralytis nominatur. Si unam quandā particulā talis noxa occupauerit, illius affectio particulæ dicitur: quippe Hippocrates memorix prodiit, Attonitum ipsi crus euaserat. Seruatur itaq; in attonitis modica quædam respiratio: quæ si permultū à naturali functione recesserit, maximū inferet malū: si paululum, exiguū. Deterima uero est, cū intermittitur, uel etiam ubi magna cum uiolētia ingruit. Origo uitii est ex frigidiore pituita, quæ principalissimos cerebri uentriculos una uice & cumulatim repleat. Cū spinalis medullæ principū quandoq; totū huic consuectatur malo, omnes faciei subiectę partes resoluuntur, ipsa manēte incolumi, eò quòd sensum motumq; partes quæ ibidem habentur, à cerebro excipiāt. Cū dimidia ipsius regio infestatur, eius paraplexia cōstituitur. Si odoratus uitiatus fuerit, uel ad priores cerebri uentriculos intemperie expertos, uel ad meatus qui à percolando ethmoides dicuntur obstructos, talis referetur affectio. Itaq; procumbūt attoniti, intermoritur uox, sensus motusq; citra febrē. Præcedit hoc mali, capitis turbatio, acutus dolor, & uenarū circa guttur extantium, sphagittas Græci uocant, thoruli prominētes, tenebræ oculis offusæ: itemq; splendores eisdem oborti, extremarū partium sine ratione algores, totius corporis palpitatio, difficilis motus, & dentiū inter dormiendum stridores, urina, ueluti æruginosa, atra, modica, & quod in ea subsidet, farinæ speciem refert. Id genus occupat senes potius, & tēperatura pituitosiores, uictuq; ufos consumili. At si iuuenes, & per ætatem infestet, magnam necessitatem fatetur.

## CVRATIO.

Apoplexiæ morbus, nequaquā, aut raro curatur, ut qui mortē in propinquo minetur. Si uero etiā remedia ipsum sustulerunt, plurimū cum partis cuius-

aliquis ibi habet f. 98  
tr. leuiss affectus sed leuiss  
bi. nā legio. dimittit  
in paralytica uel sed  
et uel etiam in parte.



- dam corporis resolutione discedit. Qui igitur quoquo modo curationem recipiunt, iis statim sanguis ex uena detrahendus est, & si remissionem quandam habuerit, detrahenda conuenit eadem die, aut sequenti, aluū acri clystere ex muria & melle contemperatis ducere. Dein oleo copiosiore sulfurato totū corpus perungere caputq; chamemelinū, uel anethino, oleo quo spōdyliū decoctum sit calaminta, mulsaq; instillatur, ea quæ odore mouent, naribus admoventur, uti opopanax, uel sagapenū, & galbanū, uel castoreū. Oportet autē & ori per uim aperto digitū, uel pinnam oleo madefactā inferere, ut ea quæ insunt, eiiciantur. Cæterū sedes etiam iis quæ flatus educūt, perungenda est: mulsa uel oxymel potioni dabitur. Quinetiā apophlegmatismis ex thymo, uel origano cū aceto decoctis utemur. Vbi morbus se remiserit, cibis mollis, distribui facilis & succulentus assumetur. Si uox nondum redit, & uires permittunt, cucurbitulæ occipitio cum scarificatione defiguntur. Si fieri possit etiam præcordiis. deinde gestantur ægri curru, aut lectica, aut lecto pensili. Valitudini faciunt & quæ sternuramenta excitant crebrius adhibita. Itē quæ pituitę per os educēde sunt, apophlegmatismos nomināt. Vbi quatuordecim dies morbus excessit, ad reliquas gestationes ducentur. Cæterū sermonis sollicitudo habenda est. uetus a pomeli cum micis panis, uel alica dabitur: mox paxillum ex hiera. Post uigesimum primum diem balneo ægroti credentur. Vinum tenerū calente aqua temperatū potui exhibebitur. uires autem balneis & unctiōibus reficiendæ sunt. Loca uero mari uicina, si fieri potest, huic morbo deligentur.
- CVRATIO RESOLUTIONIS, QVÆ PARESIS DICTVR.
- At si principis animæ functionibus liberis, omniū particularū resolutione acciderit, etiā qui has molestat humor, qualiscunq; ille fuerit, euacuari debet. Mox hiera, cui castorei quoq; pars sit adiecta, dabitur per initia drachma semissis, cū tantillo mellis, & aqua calēte diluta, uel per se, piperis dimidio scrupuli addito. Quatuor deinde diebus interpositis integra drachma assumetur, dehinc una & semissis, postea duę, atq; tres. Rursus toridē diebus interpositis quatuor drachmæ, si ægri uires sustinēt, offerent, mellis adiecto cochleario. Membris autē quæ deficiunt, medicamenta quæ dā digerentia, & ea quæ cutē possunt cruentare, imponuntur: quibus castoreum quoq; aut piper, aut pyrethrum, aut cachry, aut euphorbium accommodatur. Prodest etiam super ea oleum rutaceum, uel licyoniū, uel uetus infundere. Cibi conueniunt frumētacei, sorbiles, uel alioqui ad cōcoctiōnem expediti: nec recrementici. Cucurbitulę resolutionis partibus agglutinātur, si multæ fuerint, distinctim: si paucæ, uni: post cucurbitulas, delinūtur medicamenta ex pice, uel resina, uel māna. optimē autē faciunt simul concoctæ artemisia, & calaminta, cunila, & nitrū ex aqua modica, quę inter coquendū absumat. Aluus iterū subducatur ex aloē, uel polypodio, uel scāmōnia, uel ex pulte diacolocynthidos. unctiōi uero aptissimū est, uet. oleū in

quo scilla quadraginta diebus sub sole incubuerit. Si huius copia nō est, duas scilla uncias coquito, illinitoq; uel cachry similiter pręparatū, miscenda uero & cerę uncia, ne illita diffluat. At si galbani, castorei, euphorbi, adarce & nitri, singulorū uncia semissem acceperit, multo erit medicacius. fouet exacte etiā ranūculus herba incocta oleo, in quo per insolatū cōcalu etit. Potiōes erūt castorei circiter drachma, opopanacis succus fabę instar deglutitus. Mirificę facit etiā sagapenō ad eui magnitudinē, ex mulsā, & castoreū cū opopanace. Itē liquoris cytenaici quantū miliū pendet. Auxilia & antidotū ex triplici pipere. Vtemur etiā acopis calefaciētibus, & iis quę pituitę per os educēdę sunt. Post diē quartūdecimū plenioribus uti cibis expedit, & auxilio multū proficiente, in balneū deducere. A' trigésimo dropacē adferre cōuenit, & lauacro cōmittere, insequētibus diebus sinapi illinere, in quibus & motus & sensus periiit. Id hinc debet intelligi, quod uehementē ustiōnē non petcipiūt. In iis autē qui sensus cōpotes sunt, cutis ruborē duntaxat oportet excitare, post tumorē factum ad lauacrū mittere, & mollibus ceratis medicari. Vomitus à cœna cōueniet, & is qui radiculis assumptis cietur: item gestationes cutru, aut lestica, aut uehiculo: postea ducentur ad balnea naturalia. Viētus siccior utilis est, potio modica & frictio. cibos igitur siccos esse debent, sitim q̄ possunt maximam sustinētes.

DE IIS QVI LAXATIONE, AVT DISTENSIONE resoluti sunt.

Quoniam resolutę partes uel conuelluntur, uel laxantur: idq; uel à repletionē uel inanitionē, attendendum rursus quoq; est, partim sanguinem de trahi debere, partim non. Deinde in relaxatis quidem membris astringentia, iis quę laxant miscere, & frictionem intensam moliri conuenit. In contrariis, laxantibus duntaxat utendum, frictiōne simul molli adhibita: oleo in relaxatis nitri paulum & fœculę contritum adiiciatur. foras erunt ex aqua uehementer calida, & potissimum marina, in qua decoctę sint lauri, uel agni germina, uel samfucus, uel aliquid huiusmodi. Si autē æstas fuerit, natationes in mari: rubores in cute concitati his maxime conferūt. Itaq; cedantur etiā particulę ferulis, uel urticę tamis. Quod si perseueret resolutio, carnem, quę intra articulos resoluta est, attrita ferris oportet candentibus, exiguis, tenuibusq; transmissis adurere. Commisus autē membris dropacem continue superiniicere commodum est.

DE RESOLUTIONE QVAE VNAM QVAMQUE particulam obsedit.

Quę à nerui diuisione orit particularū resolutio, insanabilis est: quę uero ab intemperie, uel humore quodā contrahitur, commune quidē ex facultatibus commemoratis pręsidium recipit. sunt autem peculiaria quędam singulis ipforū dicata, quę subiungemus. In iis igitur quibus in utrālibet partem deprauata est facies, affectū Gręci *κνιστὸν ἀσπασμὸν* dicunt, æqualiter

in oppositū capistro appellato deduces. Profuerit etiam sanguinis detra-  
ctio, ex uasis linguæ subiectis. Item cucurbitulæ priori uertebræ defixæ, cū  
pituita per os, naresq; purgatio. Sciendū itaq; est non eam maxillam quæ  
perueria esse apparet, sed oppositā resolutione infestari. Cuttore resolu-  
5 to, cucurbitulas mēto agglutinabis, perūgesq; medicamētis ex castoreo,  
sagapeno, & liquore parthico. auxiliatur etiā gargarizatio ex acribus. Vbi  
lingua resoluta fuerit, uenæ ipsius incidēdæ sunt, cucurbitulæ mento ad-  
mouēdæ, medicamētis ex sinapi pituita per os eliciēdæ gratia utendū est,  
& linguæ exercitiis. Si uocis instrumēta soluta sint, thoraci præsidia adhi-  
10 benda sunt, spiritus retētiōe, & clamore utendū. In superciliis palpebræ  
inunctiones similiter profunt. Item proficit futura. Vesica uero resoluta,  
siue urina impediatur, siue ultro excernatur, pubi & abdomini medicamē-  
ta applicāda sunt: sed immittendū est oleū rutaceum, uel sycioniū cū bu-  
tyro, castoreo, galbano, uel opopanace, uel liquore siphii: uesicæ hæc per  
15 colem transmissa ualde profecerūt. uel sola etiam suffecerant. Iam clyste-  
res ex cētaureo, & colocynthide cū sycionio utiles sunt. Benefaciūt etiam  
medicamina urinam ciētia, potui data, & castoreū consimiliter. In primis  
iis, qui nihil urinæ reddūt, per rectos siphones, quos catheteras dicūt, in ue-  
sicam medicamina infundētur. Præterea laxantibus insidebūt, & catapla-  
20 smata inde conficiēt. Qui præter uoluntatē urinam excernūt, corroborā-  
tibus auxiliis astringēdi sunt, cibis siccis, portione frigida utētur: ubi se te-  
colligūt, cutis exulceratione, & lauacris sponte proueniētibus frigidis utē-  
tur. Eos qui urinam sine uoluntate mittunt ob ceruicis uulnus, aut casum,  
aut uertebræ luxationē, superueniētibus, quæ mortē fatentur, notis, nulla  
25 medicina periculo subtrahit. Quòd si coles resolutus fuerit, iis quæ in ue-  
sica dixi, utendū. In eisdem partibus & lūbis ea quæ intendēdi uim habent,  
usurpabimus. Commendatur autē lac, caseus, & reliqua bellaria, luctuæ,  
aliæq; olera. Longanone soluto, in quo nonnunq; citra uoluntatē stercus  
erumpit, nonnunquam cohibetur, iisdem uti par est: interim hæc ab infe-  
30 rioribus partibus clystere demitti: aliàs astringētia, ut cupressi decoctum,  
iunci, rubi: aliàs laxantia, ut adipē suillum, & anserinū uitulinumq; & oleū.  
Est cū rodentia, qualis est muria, uel cucurbitæ syluestris, uel similiū deco-  
ctum. Neq; enim sic motionē promouent, ueluti uaria agitatio. At si fri-  
gus prehēderit, etiā ex euphorbio acopon oleo dilutum inditur. Crura &  
35 brachia resolutionē experta, cōmuni curatione flectātur, perficiētur, extē-  
danturq; in modū prædictū. Nam in frictione spei plurimū consistit.

DE RESOLUTIONE OB COLICVM DOLOREM contracta.  
Nostra ætate colicus quidam dolor incruduit: ex quo præsertim supersti-  
tes futuros cōsummata artuū motus priuatio comitabatur: tactus sensu,  
40 ut uidetur, incolumi, ceu Critica quadā ex alto oborta trāsmutatione, un-  
de motus plerisq; spatio tēporis sponte rediit. Qui uero imbecilliores ex-

titere, etiā simplicioribus ex prædictis inūctionibus leuati sunt. præcipue efficacia sunt experti, acopon ex populo nigra confectū. Item quod abiete cōstat. Sed quæ roborādi uim obtinēt, ac modice refrigerāt, multis præelare opitulata sunt.

## DE CONVULSIONIBVS. Cap. XIX.



Ostēdē de resolutiōe tractatū est, deinceps cōuulsiones exque-  
mur: quoniā utraq; neruorū affectus est: quare etiā de tremo-  
ribus dehinc dicetur. Cum igitur statim ab initio, uel nō mul-  
to post morbi principia exoriētes cōuulsiones lōgius pro-  
gantur, ex repletionē dueūt originē. Vbi uero sudores largos, aut uomitū,  
aut deiectiones, aut sanguinis profluvia, aut uigilias, aut famē, aut morus,  
tum multos, tū uehemētes subsequūtur, inanitioni ferūtur acceptr. Et cū  
ex sanis alicui repētina superuenit cōuulsio, ob repletionē eam fieri neces-  
se est. At si uniuersum corpus, neruiq; ex febribus perardentibus inarue-  
rint, ac deinde ob siccitatē conuellātur, maximū sane hoc malū est, & pro-  
pè modum insanabile. Primū itaq; partes quæ contrahūtur, ualenter con-  
tinēdæ sunt, & inordinatis resistendū moribus, oleo perficere oportet ru-  
taceo, aut sycionio, aut ueteri, aut quodā ex hoc genere: tum aquā mulsam  
assumere. Eos qui ex inanitione conuellūtur, oleo, uel hydrelæo calido so-  
uere cōpetit, si nihil prohibet etiā ad lauacrū deducere, temperatōq; folio  
uti, cum oleo & fritione lenissima. Nutriendi sunt sorbitionibus ex chon-  
dro & alica, uinoq; tenui & aquoso, quod facile per omnia corporis mēbra  
distribuitur, nisi febris adfuerit: tunc enim prisanæ cremor utilis erit, so-  
mnumq; accersemus. Iam uero ex plenitudine, aut inflāmatione, contra-  
ctas cōuulsiones curabis, si humores elicias, & inflāmationis materiē pro-  
priis ipsi præfidiis discutias. fit etiā conuulsio, eū uomētes grauius turban-  
tur. Succurrit ipsis æanthii radix, spinæ albæ & Aegyptiæ semē epotū, nō  
nulli cētaurei tenuis fuceū potui exhibent, cū repletio conuulsionē parit.  
Atqui nō modo bibitur castoreū, sed etiā a foris cuti unā cū sycionio illi-  
nitur. Si uero malū hoc modo nō finiatur, cucurbitulas cū scarificatione  
admoouere prodest: si crura cōtrahātur, eoxis & postremæ uertebræ: si ma-  
nus cōuellantur, etiā dorso, & primæ ipsius uertebræ, tum ei quæ humeros  
superioret. At toto uniuersim corpore ab affectu immuni, si labrū, aut pal-  
pebra, aut lingua cōtrahatur, graue symptoma existimandū est, quod ma-  
xima inuehat pericula, licet exiguæ partes affectæ uideātur. In his itaque  
sanguinis ex occipitio & primis uertebris detractio recte adhibetur.

## DE CERVICIS MORBIS, NEMPE TETANO

cuiusq; differentiis.

## Cap. XX.



Etenus, eū & ipse conuulsionē quandā præ se ferat, procreatur  
museulis corporis, & præsertim spinæ, gelu modo cōcretis, fri-  
gido nimirū humore a foris & intus partes eas astringentes  
ideoq; hoc malo occupati, flectere sese nequeunt. Verum cum particulæ

- corporis in anteriora tēduntur, affectus nominatur emprosthotonos: cū in posteriora, opisthotonos: cū in alterutram partē æquali tobore intendūtur, tetanus appellatur. Pelops hæc uitia tensionē uocat, & contensionē muscolum ceruicis, neruorūq; per quos caput inclinat, renuit, & circumuoluitur.
- 5 At si circa posteriores ceruicis musculos malū cōsistat, opisthotonos ex accidente: si circa priores, emprosthotonos: si utrinq; tetanus nūcupatur. Originē tribuit musculis repletis spiritu, & aëre crasso nebulosoq;: quem impēse frigidū & concretum, eoq; ad morū contumacē asserit, unde etiā non sicca potius sed humida fomēta malo prehensis cōuenire. Hæc quidē tetani differentię sunt. Omnes eadē ratione curantur. Optimū itaq; præsidium est febris, quæ per initia non fuerit, superueniens. Notæ horum sunt, angusta respiratio, pulsus rarus & exiguus, nōnunquā & tūsus ipsis sardonius oborif, rubet facies, oculi magis intumescunt, adhæc aut non urinā reddunt, aut aquę similem, aut cruentam, bullis quibusdā turgescētem: alius siccescit, uigilię
- 15 magis urgent, crebroq; à conuulsionibus periculū est, ne lecto ægri excidāt, quinetiam singultire incipiunt: indolentq; alii capite, alii clauiculis & lūbis, quidam ipsorū subteremuli quoq; euadunt. Porro facit affectū (quāuis raro) lassitudo, humi dormitio, pōderis eleuatio, casus, uulnus, ardor, ictus, & alia quæ eandem neruis offensam inferre possunt. Curatur, quomodo conuulsi
- 20 ones ob inanitionem generatæ, solent.

## CVRATIO TETANORVM.

- Quibus ceruix recta intenditur, initio sanguis detrahendus est, partes lanis oleo imbutis sicyonio, castoreoq; cum ueteri contegendæ, aut uesicæ quoq; laram calido oleo repletam, tendinibus superimponere oportet, & cucurbitulas admoūere, sic ut cutis exasperetur. leues enim noxam quoq; inferunt,
- 25 item ceruicibus nonnunquam cucurbitulæ defiguntur, & utriq; spinæ parti, adhæc pectori, quæ est musculosius, & præcordiis: interim uesicæ loco, & renum. Porro liberaliter sanguinem auferre cōuenit, modo nō uniuet sim id si at sed pluribus uicibus. Sudores lanis oleo madentibus abstergere, ubi refrigerint, in memoria habeatur. Quod si tetanus in uetustatē inciderit, in oleū bis quotidie descendere confert, non tamē diutius immorari: quippe in oleum descensus, maxime uires conuellit. Potus erit hydromeli pingue ad dimidias decoctum. Qui robusti sunt, panacis liquoris drachmam bibent. Sin minus, tres obolos, uel minimum, obolum. At si quis ipsum ceu stomacho
- 35 inimicum habeat suspectum, ammoniacū quoq; exhibebit, uel liquoris cyrenaici instar erui incocto meli circumlitum deuoratur, & silphii radices duo cochlearia, tribus mulsæ cyathis inspersa, uel ipsius decocto exhibentur, uel myrt hæ drachma ex mulsæ, hyssopiq; decocto: sed omniū securissimum expeditissimūq; est duo, tria uel castorei cochlearia, particulatim præbere. Nō
- 40 enim obest ad ualitudinē, uel secundum cibū ex eo dari. Potus uero ipse præter alia tum paulatim tū modice assumetur. Nam dum ægrē potionē trans-

mittunt, in nares ipsam propellunt, unde uehemēter turbati, ad conuulsionem prouocantur. Sedes oleo rutaceo cum opopanace perungi debet, quod ab inferioribus quoque partibus inferetur. frigida superfusionem, cum sit (quemadmodum ait Hippocrates) periculosissima, eoq; posteris, credo, uiruperata, & nos damnamus deuotamusq;. Vnguentum hoc conuenit, nardi sextarius, ceræ uncię duę, foliorum amomi, styracis, mastiches, singulorum uncia: castorei, adarçæ, euphorbii, piperis \* singulorum uncia: spicæ nardi, opobalsami, singulorum tantundem.

Manuscrip-  
tum exem-  
plar dra-  
chmā habet  
idēq;.

#### POTIO OPISTHOTONICIS ACCOMMODA.

Panacis radice, piperis albi, costi, myrrhæ, papaueris lachrymæ, singulorū pares portiones, exhibentur cicerculæ modo lorum capturis: benefacit etiam orthopnæcis, id est, qui recta ceruice spirant. Porro uictus erit tenuis, qui expeditè distribuat, & recrementis omnino uacer.

#### DE TREMORIBVS

#### Cap. XXI.



Remoris origo communiter ex nervos: imbecillitate est, quod ætas senilis palam testatur: priuatim uero plures & diuersę alię: nempe frigidius naturę temperamentū, frigida potio, & præsertim in febribus intempestiue assumpta: frigidi glutinosiq; humoris redundantia, & uini usus liberalior. Qui igitur ex erroribus cōmissis manifesto tremūt, à noxiis abstineāt. At si remanet diu in febribus tremor, primū corpus torū oleo sabino perfundatur: ubi autē accessiones remittūt, ueteri, aut sicyonio. Summa corporis mēbra lanis mollibus præuncta cōtegantur. Deinde cucurbitulę à priori uertebra usq; ad spinā lumbosq; agglutinentur, sic ut particulę prius cum præcordiis hordei farina delinātur. Iam hæc quoq; partes lanis ex ueteri aut sicyonio oleo respersis operiātur. Quod si febres inueterauerint, die uno interposito, in oleum aut hydrelē tremuli descendant, utenturq; frictionibus teneris. Si lōgius prorogatur dispositio frigoris suspicione, mulsa castoreūq; potui dabitur, & calidis locis gestatio proderit. Cibis diductu facilis offeretur, primū sorbilis, mox uolantiū & piscium qui molli carne sunt præditi: febribus solutis in balneas eundū est, sed uitari debet frigidum folium, uiniq; potio. Porro si crassiorū uiscosorumq; succorum copia fuerit, uti conuenit uis quæ incidunt extenuantq; uerbi gratia, rutæ ramusculo, spondyli quantū tribus digitis comprehendi possit, castorei & nitri, singulorū obolis duobus. Quotidie cochleare unū cum oxymelite ad tres usq; dies ieiuno porrigitur, uel panacis & piperis grana quinque ex mulsa cyatho. Simplicia præsumpta tremētes adiuuant castoreum, leporis cerebrum comestum, althææ radice decoctum, damassonii foliorum drachmę quatuor in mulsa, eupatoriū ex aqua. Superante autem frigore etiam zodymi unguine, non modò acopis ad resolutionem cōscriptis, unctiōibusq; & cutis rubrificatione, phæznigmon Græci uocant, utemur: præterea exercitiis perfricationibusq;. iis uero qui ex uini potu tremunt, uinum

circumcidendum est, quo ad in totum morbo fuerint liberati.

Ocularia, et primum de dolore ex ga-

leni commentariis.

Cap. XXII.



5 Vm oculi grauissimos sentiunt dolores, considerato, quoniam ex statu corporis hi ipsi in inflammationibus accidunt. Vt enim, dum ab influentium acrimonia uehementius eroduntur, uel quia tunicæ succis repletæ tenduntur, uel propter aliquam crassorum succorum, aut spirituum flatulentorum, intensionem dolores in ipsis graues excitantur. Rosiones igitur purgantibus tolluntur præsidis, quæ noxiū humorem uacuēt, itē  
10 candido oui liquore in oculos infuso. Vbi uero concocta iam fuerit inflammatio, corpusque superfluis uacuū, balneis uti commodissimū est. Ex repletionē cōtractas inflammations sanguinis detractione, alius subducta, & partium inferiorum frictio cōmode persanatur. Tunicarum intensiones soluiuntur, toto prius corpore uacuato: itē humoribus qui sursum tendunt, ad inferiora reuulsis. dein  
15 de loco injectis remediis, quæ digerēdi facultatem habeant. fomēta itaque adhībenda ipsis sunt, & tenuerēci decoctū infundendum. In quibus aut sanguis crassus oculorum uenulas intendit, uerū ut corpus nō ex aquo succis abundet, uini usus est, quod possit excalfacere, uacuare, & meatus aperire.

DE PERTVRBATIONE, ET LIPPITVDINE QUAM

proprie ophthalmiam Græci uocant.

10 Perturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore naturæ alieno, non ex corpore, sed à foris adueniente causa aliqua, (uerbi gratia) sole, fumo, puluere, aut oleo: quare etiam occasione ipsius cognita, promptissime soluitur. In genere huius perturbationis, lippitudo est: uerum non extrinsecus tantum,  
15 sed ex interiore etiam causa cæca ingruit, perque tres quatuor uel, aut quinque dies plerumque durat. facillime discutitur, si obseruentur omnia quæ foris accidentia turbare lumen possint, item parciore cibo, atque potu, aut in ambulatione, & alio ex facili respondente.

DE INFLAMMATIONE.

30 Cum inflammatio ipsos oculos occupauerit, post totius corporis uacuatiōnem, perungendi sunt iis quæ impetus humorum possunt repellere & uehementiam lenire, quale est, quod ad Neilum auctorem refertur, item diarrhodium, uel etiam media cum, nardinumque. Vbi membrana adhærescens inflammatione tentatur, medicamentis utemur, quæ Græci ab uno die monemera  
35 uocant, cum oui candido infusis. Die inscuto nisi inflammatio crescat, nardino delinētur: foris ex meliloti decocto utiles sunt. ubi crassus humor est, qui lippitudinem facit, medicamenta accommodantur, quæ neque obstruant, neque humores incrassent, sed quæ diffundere, humectare, & excernere idonea sunt. quale est, chiacum. At si humores in capite fuerint obstructi, cucurbitulam  
40 occipiti admoouere oportet, uel scarificare, uel hyrūdines fronti quæ oculus dolet, adhibere: tum panem purum aqua madentem cum modico rosaceo,



aut polētis incoctis capitum papaueris decocto, super dare. Similiter etiam efficaciore utendum est cataplasmate, ex croco, melilotis, palmularū carnibus, teneris coriani foliis, ouis, tritico tosto, micis panis in decoctū intinctis, rosacei momento, & papaueris contriti diluto. Interdum semen quoque ipsius ad leniendum dolorem miscetur. Si magna doloris necessitas est, etiā opii pauxillū adiicitur. Vbi dolor abest, stupefacientia uitari debent. Quod si mediocris inflammatio infestet, aloē per se, uel aqua, uel oui albo dilutam illinito, ut aut expeditiū sit auxilium, croci pondo librā semissem, aloes pondo drachmas sedecim, gummi pondo dodrantē, simul coniecta aqua pluuiali excipiro, singitoque collyria. Iam quæ uocatur diacrocū lippitudinū initis sunt idonea, in quibus tumor mollis cedensque & exalbidus habetur. In palpebris autem earumque commercio sine tunicarum offensa benefaciunt itidem liquida collyria (Græci hygrocolluria uocant) ex croco, atramento sutorio & melle præparata. Inter quæ hoc est laudatissimum:

HYGROCOLLVRIVM QVOD DOLOREM LE-  
uet, anodynū appellatum.

Cretæ sutoriæ, mellis atticī, succi fœnugræci, singulorū pares porciōes incoquito, donec mellis spissitudinem habeat, deinde specillo duos angulos attingito.

AD DEFLUXIONIS IMPETVM, QVI  
epiphora Græcis dicitur.

Si pituitæ cursus in oculis sentiatur, per initia quidem conuenit nihil assumere, aquam bibere, & multo magis uenere abstinere. Aluius subduci, facies posca diluta collui debet, præsertim si feruens fuerit pituitæ cursus. Sin minus, atramento sutorio cum melle frons & palpebræ delinentur. Nonnulli atramentum sutorium aqua dilutum ad ablutionem exhibent. Porro in iis qui defluxu citra inflammationem uexantur, uel etiam cum inflammatione quidem, sed ita ut supra os caluariæ emanet, agglutinamētis utendū est in fronte. Ex simplicibus sanē, uiridia uitis folia efficaciter profunt, uel rubi succus, uel portulacæ, uel cydoniorum cum polenta tenui, uel galla cum uino & polente polline contrito, uel cicutæ succus, uel psyllii cum aqua, uel solano, uel cochleis cum testis suis in puluerem reductis, à tempore ad alterū tempus illita. In uniuersum quæ adstringunt refrigerantque. Inter composita hæc, pollen frumentaceus, & myrrha, uel thus cum oui aquato illitum, uel samia terra cum myrrha, & manna similiter oui albore inuncta. In frigidio re autem humorū cursu sulfuris uiui, bituminis, picis, colophoniar, singulorum drachmæ duæ, item Musæ pastillus, & aster, similiaque probè repellunt. Iam uero theriace uino astringente diluta, fronti que illita frigidus humorum influxus sistit. Quinetiam eadem pota uehementer his succurrit. Ipsi uero oculo, lana aut panniculis tenuis, oui albo madens imponitur, item ca-

collyria à reprimendo dicta staltica, si illinatur, instillenturq; diluta idē efficiunt. At si in imo, & sub ossē hærescens humor lōgiore spatio emanet, post generales corporis uacuationes, medicamentorū usus est quæ per nares atq; os picuitam eliciunt, errhina & apophlegmatismos appellāt: caput attondetur, & incisa cura exasperabitur. Porro in his etiā curādi rationes conueniūt, quas in capite, manu administramus, nē pe angiology, arteriotomia, hypospatismos, & periscyphismus, uti Græci apellāt. Itē capitis uertex usq; ad os aduritur. Et cucurbitulę occipitio incisa cute ad mortē, impetum floris possunt reuellere. Fluxiones extra caluariam notant, uasa in fronte & tēporibus distenta, & caput ueluti reuinctum, tum quod exagglutinamētis sicca præfidio sunt. Si hæc desint, & floris impetus prorogetur, & sternutamenta nonnunquā moleste elidantur, humorem sub calua teneri censendum est.

## DE CHEMOSI.

Chemosin appellant, cum utraq; palpebræ ex uehemēti inflammatiōe inuerſa fuerint, ut uix oculi ab ipsis contegantur, & album oculi nigro sublimius euaserit, rubrumq; etiam magna ex parte nigrū occupet. Curatur uenæ sectiōe, medicamine purgante, collyrio diarodon albo, & quod à cinereo colore uocatur *αρωδ' αλωδ' p*, cū lacte, uel oui aquato. Eodē uero palpebras tempora & frontem illinere oportet, tum fomentis & cataplasmatibus lenibus uti, Cum remittit inflammatio, acrioribus, quale est etiā uiride diarodon.

## DE HYPOSPHAGMATIS, ET EMPHYSEMATIS.

Hyposphagma uenarum commercii diuortium dicitur, ex ictu potissimū factū. Instillatur itaq; ipsis sanguis palumbi, uel columbæ, uel calidū lac muellebre, cui thuris paululū sit adiectum, uel muria, & præsertim ex sale cappadocico: fots recte adhibetur ex hyssopi decocto. Porro tumor mollis, ædema uocant, oculis ex ictu obortus, fomentis ex posca cōtinuis, & sponsia ex eadē superdata discutitur. Recte huic speculariū combustum, & sterco colubæ æquis portionibus, uino aut aceto contrita illinunt. Iam caseus recēs, uel radiculæ cortex, uel uua passa sine acinis, singulatim ex posca, uel mulſa applicantur. Eadem faciunt ad emphysemata.

## AD EMPHYSEMATA, ET PSOROPHTHALMIAS.

Emphysema palpebrę tumor est, ædemati similis: psorophthalmia aut pruriginosa eiusedē scabies, ex falso & nitroso humore cōtracta. Conuenit ipsis posca, lēticulæ decoctum, ex rosaq; fomentum. Hygrocollyrium autē hoc, æris drachmæ sex, misyos tosti, myrrhæ, singulorū drachmæ tres, croci drachma una semis, piperis drachma, uini Chii & passi cretici singulorum cyathus unus, semis: incoquantur quoad mellis ipsissitudinē habuerint. Hæc est Erasistrati compositio, quā à multiplici usu panchreston appellat: facit etiā ad anginam, ulcera oris, pudendorūq; & aurium dolores. Inungant & oleo palpebras, somnum inituri. Ab acidis, salis, & acris abſtineant.

## DE SCLEROPHTHALMIA, ET XEROPHTHALMIA.

Sclerophthalmia, durities oculi, & difficilis motus est cū labore ruboreq; citra humiditatē. fouere ipsos crebro, spongiis aqua calida imbutis ex usu est. Item ouum palpebris in lecto imponitur, cum rosaceo, uel adeps anserinus. Frigida, & quæ indurant, uitanda: caput uel andū ungendūq; alius ducēda. Xerophthalmia, quasi dicas arida lippitudo, pruriginosa oculo, est sine fluore dispositio. Curatur balneis, inunctionibus, & uictu prohi succi: utrisq; uero cōmuniter conueniūt medicamēta acria, ut uel lachrymas prouocēt, per quæ & durities emollietur, & siccitas humectabitur. Talis est Erasistrati quoq; panchrestus, & quod dicitur dicenteton. itē cui nomē est stratitico.

## DE ECTROPIIS.

Hic affectus palpebræ inuersio est, aut propter cicatricē, aut ex crescentiam carnis nascens. In quibus igitur ex crescentia inueterauerit, æruginē rasam torrefactam conterito & ad moueto, uel plumbo usto cum sulfure uiuo, & loto utitor, uel utrisq; paribus & æruginē & plūbo. Nam ex cicatrice proficiscens ectropion, si in totum curare studueris, id manu faciendum est.

## DE AEGILOPE ET ANCHILOPE.

Aegilops abscessus est, qui inter maiorem oculi angulum, & nares fit: qui ruptus, si negligatur, usq; ad os fistulam aperit. Idem, priusquam disruptus exulceretur, anchilops uocatur. Probē igitur faciunt glaucium & crocus unā cum perdicii herbæ succo imposita, crebro autē uariare oportet, etenim statim immutata uim suā perdunt. ALIVD. Alica cocta in aceto & probē trita, non solum incipiētes, sed etiam in uomicam mutatos per sanat, rūpitq; & usq; ad os penetrat. Hoc usus non solum ægilopas, sed etiam anchilopas curabit. ALIVD. Ruta fatiua unā cum cinere lixiuo, qui primus distillaue rit, contrita cocta q; & imposita, pulchre admodum ægilopas emēdat, & ad usq; os permeat, initio erodens, postea nō ita: ac mirū est, quod ne cicatricē quidem inde coram hoc præsidii relinquat. ALIVD. Cochleas cum testis suis tritas imposito. interdum aloē, uel myrrha admista præsidium hoc anrequam ægilops in pus uertatur, & postq̃ ruptus fuerit abscessus, eum desiccāt. ALIVD. Cum manus opera ægilopa & anchilopa aduris, hoc utere cataplasmate: Lenticulas decoquito, & cum melle utitor: ubi crusta exciderit, uuam excipiens, liquida terebinthina utitor in modū emplastri. Hoc enim & purgat, & carne replet, & cicatricem inducit.

## DE TRACHOMATE.

Trachoma asperitudo palpebrarū interiorū est: harū intensio, ut ueluti incisuras habeat, lycofis à fici similitudine appellatur. Cum inueterauerit uiriū callosq; contraxerit, tylosis uocat. Collyriis igitur utendū est, tum eo quod ex uino, tum quod ex duobus constat lapidibus, ipsoq; hæmatite lapide, ex aqua loto uehementer palpebræ abstergentur: harmatioq; cum cygnarii modico. Adhæc diacrocu collyriū pariter psorophthalmiis efficax est, palpebræ citra exulcerationē inuersæ illirū. At si durior callus his non cesserit

remediis, palpebra inuersa pumice raditur, aut sepiæ testa, aut foliis fici, aut etiã instrumento, quod à palpebrarũ rasura blepharoxiston Græci appellāt.

## DE CHALAZIIS.

Chalazion, otiosi humoris in palpebra colluuius est, in qua ammoniacum aceto detritum simul cum galbano inungitur. facit etiam terebinthina pariter cum cerato excepta.

## DE CRITHE TVBERCVLO.

Crithe, parvulum abscessus tuberculũ, oblongum, palpebrę cilio obueniẽs. Id cera alba foueri oportet: reliquum corpus, uel muscę capite amputato in  
10 fricari, uel hordei diluto perfundi.

## AD PALPEBRARVM PEDICVLOS.

Expurgatis prius pediculis, marina egelida palpebras colluere oportet. Deinde medicamento subscripto cilium attingere i aluminis scissi partibus duabus, herbe pediculariæ parte una, tritis utitor.

## DE MADAROSI, VEL MILPHOSI.

Hic affectus palpebrę pilorum defluuium est. Ad quod cura prius uniuersi corporis habita, smegmatis utere, quibus ab honestandis palpebris nomen est calliblephara. Terrę ampelidis, croci gallicę, ladani, singulorũ pari por  
15 tione contrita utitor. ALIVD. Stymmeos tosti lotiq; drachma, plumbi cõ

busti & eloti drachmis quatuor, croci rotidem, nardi indicę drachmis tribus, in puluerem redactis utitor. ALIVD. Palmarum, ossium combustorũ singulis tribus drachmis, nardi gallicę drachmis duabus: leuigatis utere hoc etj  
20 am scabiosis oculis medetur. ALIVD. Neapolitę ad palpebrarum defluuia,

appellant, longosq; palpebrarum affectus Stymmeos, cadmię, chal  
25 citidis, mifyos, xenici, singulorum pares portiones. minutim cõtundẽtur, & melle resperfa torrefiunt: leuigata usui sunt.

## DE PTILLOSI.

Ptillosis palpebrarum crassities est, callosa, rubicũda, quibus accidit sepe pi  
30 lorum defluuium. Pręter prædicta igitur etiam hoc summe facit, Muscerdę

## AD SVPERCILIORVM DEFLVIA SEV MADAROSIM.

Plumbum digitis oleo uel adipe asferino unctis detritũ, illinitur. ALIVD. Hoc etiã subnigros reddit: nuces auellane exuste simul cum adipe caprillo, uel ursino infricantur. ALIVD. Hoc efficax est etiã barbæ alopeciiis: Alter

35 ci drachmę duę, muscerdę drachma, polytrichi drachma, irini unguentj cochlearia quatuor. Tritis perbelle unguentum admisceatur. fotuq; prius adhibito illinitur. quod si attonsa pars ante fuerit, magis proficit.

## DE PALPEBRARVM PILIS OCVLVM IRRITANTI-

bus

40 Pilis qui oculum pungunt prius euulsis, locus statim sanguine ranę per se inungitur, uel cum cinere chamęleontis albi, uel sanguis cimicum, uel fuma

riæ quæ in hordeo nascitur succus, cum gummi, uel tellinarum salfarum cinis cum cedria, uel loti cinis, uel alumen liquidum quod phorimon appellant, uel muscæ caninæ sanguis admodum in id efficax est.

#### PILORVM GLVTINANS MEDICAMENTVM.

Conglutinant pilos infractos bitumen, mastiche, colophonia, gummi, cochlear pars glutinosa.

#### DE ENCANTHIDE ET RHYADE.

Encanthis naturalis in maiore angulo cariculae excrecentia est. Rhyas autem huius imminutio. Encanthidas igitur iis quæ aduersus ectropion dicta sunt, similibusque causticis uel septicis absumes. sed non totas, ne eius loco rhyas subnascatur, uerum ad naturalem usque magnitudinem. Rhyadas, carnosa parte in totum, uel rudi manus opera, uel medicamentis absumpta, insanabiles existimato. Quod si pars ipsarum imminuta fuerit, iis quæ mediocriter astringunt, carnemque creantibus reficitur: qualia sunt medicamenta ex croco, glaucio & aloë confecta. item collyria diacroci inscripta, necnon altercum prodest in uino coctum impositumque, & aluminis ex uino pauxillum.

#### DE VLCERIBVS.

Vlcerum in oculis genus quidem unum est, differentiæ uero speciales diuersæ. etenim in cornea membrana quæ Græcis ceratoides appellatur, ulcus cauum, angustum & purum, ob uiaz similitudinem botryon dicitur. quod autem latius botryo est, sed minus altum, celo ma nuncupatur. Argemon in pupillæ circulo nascens, ambientia comprehendit, ut etiam in exteriori pupillæ parte rubicundum, in interiore candidum appareat. Epicauma ulcus est sordidum, & crusta obductum, quo repurgato humores oculi sæpe effluunt. tam uero alia plures ulcerum sunt differentiæ, de quibus dicemus communius. Si igitur ulcus simul cum inflammatione obortum fuerit, curationem ex iis quæ inflammationem lenire possunt & concoquere, moliemur, non neglectis iis quæ ad ulcus proprie pertinent. Talia uero sunt collyria, libanium, cygnus & pelaria uocata, item aster & similia: insuper quæ ex malo terra samia & cerusa constant: omnibus autem magis leniendo dolori esse illam monem nouimus, uerum diu ei insistendum non est, eo quod admodum stupesciat. Laudatissimum uero & quod diazematō dicitur, quod ne sensum quidem stuporis habet. At si cum fluxione ulcus infestari, collyrium aliquod illi admiscebimus, quale est diahydraz, & chiacum, præterea cygnus fuluus, & quæ repellendi sine rosione facultatem obtinent. Sin autem ulcera sordida fuerint, mulla mediocriter aquata, & sœnugræci decocto utemur per se, & cum aliis ad id dicatis collyriis. Si acriora sint, seberiano & sœnugræci diluto. Si non acria, diasmyrnes, & nardino unguento medebimur. Purgata uero ulcera probe potest medicamentum cleo cicatrice obducere, eamque præterea concolorem reddere.

#### DE OCULI PROXIDENTIA QUAE SPONTANEE DICITVR.

Proptofis tuniculæ quæ Græcis ab uua acino *ὑμῶν* dicif, procidētia est: quæ erofa rupta ue cornea tunicula accidit. Ea cū nondū creuit quòd mufcæ capiti fimilis fit, myocephalon nominatur. Cum uero amplius & eo ufq; succreuerit, ut acinū uua repræfentet, ftaphiloma, quafi uuatio dicif: ubi plurima facta est accessio, ut palpebras malæ tranfiliat, obcallueritq; clauus tunc dicif. Si igitur ad myocephalon ferè oculi procidētia degenerauerit, repellentibus denfantibusq; ipfum medicinis utendū est: Chio nimirū Phazo, Nardino, & Theodocio. item eo quod oliuæ furculis, & quod cornu præparatur. iam uero fpongiā leniter ipsis poſca, aut uino astringēte, aut roſarū decocto imbutam ſuperdate commodum eſt, aut ſpleniū. Principatum uero obtinet ad procidentias omniāq; ulcera, medicamentū cui nomē eſt Olympiacū, uel Olympus, cū ſucco oliuæ, uel polygoni, uel pollii. Eadem hæc etiā clauis conueniunt & ſtaphilomaris, priuſquam inalbeſcāt. Vbi uero alborē, aut callū contraxerint, nullus remediis locus eſt.

## DE OCVLIS PURULENTIS.

Aliquādo pus ſub oculi tunicula, cui nomē eſt ceratoides, nūc alius, nūc in ſumma ſuperficie colligit, humani unguis ſpecie: quæ cauſa eſt ut hoc etiā malū unguis oculi nominetur. Huc ergo ſpectat curatiōis ratio ut uel pus digerat, medicamētis mediocriter in id efficiacibus, quale eſt aqua mulſa, & ſœnugræci ſuccus, ex eoq; collyria, ſimiliter libaniū, & quæ ex thu re conſiūt: uel rūpatur uomica, & uehementioribus repurgeſ, quod genus ſunt diaſmirnes, & hygidio. At ſi pus in oculis citra exulcerationē coierit, etiā hoc liquido collyrio utēdū eſt: Atramēti ſutorii, croci, ſingulorū drachmis octo, myrrhæ drachmis quatuor, mellis pōdo libra. Ceterū phlyctena cū ſit ceratoidis mēbrana excreſcētia, ex humore quodā commeticiū cōpagemq; ipſius excoſante, purulentorū curatiōi ſubiicit. Hygra, hoc eſt, liquidū medicamentū ad luppurantes oculos quos hypopios uocāt, Baſſi: croci, aloës, myrrhæ, ſingulæ uncię, uini quadrās, mellis optimi ſelibra. Crocus ex uino modico reſiſ, deinde aloë & myrrha. Vbi craſſitudinē acceperint, mel addiſ. Vnita in uitrēo uāſe reponuntur: uti licet bis quotidie, aut ſi neceſſitas urgeat, ter. Deligatū oculo carnem tollit, & cicatricē inducit.

## DE CICATRICIBVS ET ALBUGINIBVS.

Quæ per ſumma oculorū cicatrices ſiunt, aliqui hoc nomine cicatrices dicunt, alii uero nubeculas. Altiores aut albugines, medicamētis quæ astringunt, purgantq; diſcutiuntur. Nebulas igitur anemonæ ſuccus abſtergit, & minoris centaurei ſuccus cū melle. Vetusiores cedria extenuat, itē ſolum aqua nitrū modo collyrii, ad hæc quæ detergēt collyria: quale eſt quod cornu ceruino conſtat, dia ceratos elaphiu dictū. adde Rhinariū, Hecatomben, ſimiliaq;. Albugines uero nitrū cum oleo ueteri detritū diligenter, & inunctum probe, abſtergit. Item ſepiæ teſta combuſta, & cum melle in pollinē redacta. Inter collyria hoc benè & leniter abſtergit.

Collyrium diamamira. Mamiræ, guttæ ammoniaci, myrrhæ troglodytidis, crocodilorum fimi, singulorum æqualia pondera. in collyrium coactis utere: uel crocodili terestris fimo collyrii modo ex aqua utitor. Recte autem sal cappadocum aqua soluitur, quo collyria albuginibus exte-

5

#### QVOMODO CICATRICES TINGANTVR.

Gallæ, acaciz, singulorum drachmæ quatuor, atramēti sutorii drachmæ duæ illinentur. Collyrium autem hoc proficit, floris mali Punici, cytinorum, atramēti sutorii, acaciz, gummi, singulorū drachmæ quatuor, stymnios, gallæ, singulorum drachmæ duæ. Aqua teruntur: si flos mali Grana-

10

ti desideretur, interior ipsorum in granis membrana miscenda.  
DE VNGVI OCVLORVM, QVOD PTERYGION Græcis uocatur. Vnguis quod pterygion Græci uocant, mēbranula est quædā neruosa, oculis sese obtendēs, quæ ab angulo quidē oritur, sed ad usq; pupillā peruenit: eamq; ubi fuerit adaucta, obtegit. Magni igitur & inueterati unguēs solā  
manū expostulant. Recēiores uero & magnitudine mediocres, præsidii  
eliduntur abstergentibus, qualia asptetudini idonea sunt, & albuginibus.  
inter simplicia igitur es combustum, uel atramentum sutoriū simul cum  
porcino felle pulchre faciūt. Efficacius autē hoc est quod sequitur: atramē  
ti sutorii pars una, gummi pars semissis: uino leuigata illinuntur. uel etiā  
collyria formantur, nonnulli uero caprinum fel melle mistum inungunt.  
AD VNGVES OCVLORVM, SVPPVRATIONEM, & hebetudinē.  
Lapidis magnetis, æruginis rasæ, minii sinopici, suffiminis ammoniaci, sin  
gulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, mellis Attici cochleariū.  
Idem ualet aduersus albugines.

15

#### DE CARBUNCULO ET CARCINOMATE.

Carcinoma affectus est tunicæ quæ cornus imaginē repræsentat, ob id ce  
ratoides dicta: dolor huic superuenit, rubor tunicarū, cruciatus pulsantis  
ad usq; tempora si moueantur, cibi torquet fastidium, acia irritant, offen  
duntq;. Hoc malo nulla medicina subtrahit. Nihilominus dolor leniri la  
ctis portione debet, item cibis frumentariis & alioquin probi succi, omni  
acrimonia uacuis. Collyria lenia infundantur, ut spodiaceum sebernianū  
& consimilia. Cæterum bonæ totius corporis temperaturæ prospicien  
dum est. Carbunculus autē & ipse malignū ac contumax ulcus est, crusta  
tium, aliàs bulbo, aliàs palpebræ, quemadmodū reliquis pariter corporis  
particulis accidit. Itaq; in bulbi carbūculis per initia quidē clystere primū,  
mox lacte coctionem nō experto, mediocriter purgare conuenit. deinde  
spongia fotum erui farina, uel triticea ex aquæ mulsæ decocto delinere,  
nonnunq; & pupillæ pollinem eius accommodare, & lacte oculū eluere. Si  
ulcera serpendo depascant lenticula cū melle, uel malis cydoniis incoctis  
superapplicatur. Si latius depascendo penetrent, foliis oleæ decoctis, uel

40



malicorio in uino cocto leuigatoq; ex melle oblinitur oculus. At si cessent prosperpere, crustaq; medicamēto quod subiūgetur imposito, exciderit, & ulcera sint pura, lutea ouorū tosta leuigataq; cum croco & melle illinentur, quousq; ad cicatricē perueniant. Medicamentū autē recipit sporidii drachmas quatuor, myrrhæ nō nimis torrefactæ drachmas treis, totidemq; obolos. Detritis in uino amineo quousq; inaruerint, passum creticum uetus miscetur. Vbi unitas facta fuerit, liquida pyxide fictili excipiuntur, oblinunturq;. Ad palpebrarū uero carbūculos malū Granatū acidū, <sup>hys</sup> Græci dicūt, torū frustratim concisum aceto incoquito. Vbi tabuerit probe, leuigatumq; fuerit ad illitionem utitor, bis ter ue quotidie immutans, noctu semel.

## DE MIDRYASI.

Cū pupilla colore quidē nihil euariat, sed multo q̄ cōsueuit est latior, & interim ex toto orbat lumine, interim permultū cernēdi potentiā impedit, aciesq; hebefcit, ut oīa minora q̄ sint uideātur esse, Mydriasis quidē affectus est, causa autē ipsius humor quidā extremētus itaq; curationē ipsi sanguinis emissioē à cubito, uel purgatioē tētabimus: sin minus, uenas in angulis oculorū diuidere oportet, deinde cucurbitulā occipitio ad mouere, & marina frontē, & oculos perfundere. Si marina desideretur, nūria, uel posca. Medicamētis autē iis utendū est, quæ ad pustulas simul conducūt.

## DE PHTHISI ET ATROPHIA.

Phtthis affectus oculi est, quo pupilla fit angustior, obscurior, rugosiorq;. Res lumini obiectæ, in his maiores apparēt. causa uero est desectio, quæ sic citati potius fertur accepta. Sed phtthis ab atrophia hoc dignoscit discrimine, quod illa angustior pupillā, hæc totū oculi bulbū minorē, humilio <sup>re</sup>q; reddat. Mederi his cōuenit exercitio, & studiosa capitis, faciei & oculorum fricatione. Ad hæc frons aqua perfunditur, caput unguine quodā calfaciēte, oculus medicamēto, quod rarefaciat acriore oblinitur, quale est infra scriptū. Ammoniaci drachma, crocomagmatis drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, æruginis drachma. Tritis in aqua, subactisq; utitor.

DE NOCTVRNA CÆCITVDINE QVÆ NYCTALOPS dicitur.

Nocturna cæcitus, qui Græcis Nyctalops dicitur, uitiū est quo per diē homo cernit, sole dein occiduo obscurius, noctu omnino nihil. Curari debet sanguine ex cubito, & oculorū angulis uacuato, mox purgatione, uel per clysterem inanitione adhibita. Deinde apophlegmatismi indicētur, & quæ sternutamētis ciendis sunt medicamina. Ante cibū hyssopus potui, uel ruta dabitur. Si his remediis morbus non aboletur, iterū purgationē moliemur ex scāmonia, & castoreo: oculi melle despumato illinētur, claudunturq;, premēdo humores, continēdoq;. Aluminis scissilis partes duæ, salis fossitū pars una. Trita cum melle sublinuntur. ALIUD. Iecur hirci nū assatur, aquosus inde humor collectus inungitur. Quin & ipsum iecur comedendū exhibetur, coctiq; uapor oculis excipi a pertis præcipitur.

## DE GLAUCOMATE ET SVFFVSIONE

quod hypochyma dicitur, ex Rufo.

Glaucoma, & hypochyma uereres unū idēq; mali genus esse existimarūt. Posteriores autē glaucomata humoris, qui ob similitudinē crystralli <sup>αἰσθητὸν</sup> appellatur, uitia, ex humiditate in glaucū colorē transeuntis iudicārūt. Hypochymata humorū effusione, qui inter tunicā ceratoidē, & crystralloidē con crescentes, uisum impediūt. Verū omnia glaucomata curatio nē non recipiūt: hypochymata autē curantur, sed non oīa. proinde suffusione tētaris succurremus, anteq̃ malū radices egerit, consistatq; sanguinis ex cubito detractio, & purgatione. itē uacuationibus acrioribus, ueluti ex cēraurii, aut cucumeris amarē decocto petitis, alui solutione continēti, cucurbitulis occipitio cute incisa admotis. Aquā potus toto uictus circulo competit, cibi qui extenuār assumpti. Proderit autē tēporis spatio, & pituitam per os diebus aliquot educere. Quibus uero ceu culices, oculis obuersari perperā uidetur, ex quadā humorū prauitate, uel biliosioribus uaporibus sursum distributis, medicamentū dialoēs amarū exhibetur subinde, uel etiā inde sumetur purgatio. In oculis autē medicaminibus utendū est, primū simplicibus, pura melle, cū oleo & marathri succo. postea cōpositis, quale est hoc. Sagapeni drachmā duā, liquoris cyrenaiici, ueratri albi, singulorū drachmā sex. Alii in mellis heminis octo assumūt. Nos autē, tradit Oribasius, subscripto utemur, caualidis succi, chamedryos, sanguinariē, singulorū equis portiōibus cōtritīs. Benefaciūt itē collyria, & quod succo marathri cōstat, & Protheus & Thalasserus, & diaopobalsamu, & quē ex his praparātur, præsidio esse solēt. Insuper marathri decoctū per initia perfusum adiuuat. itē ex liquoribus confectū, opobalsamo, melle, oleo ue

## DE GLAUCOMATE ET SVFFVSIONE (teri &amp; similibus. ex commentariis Demosthenis.

Floris zris oboli quinque, myrrhæ drachmæ tres, nardi indicæ drachma, lapidis hæmatitidis drachma: aphronitri drachma, salis floris drachmæ duę, opobalsami drachmæ nouem. melle Attico excepta offeruntur.

## DE OBSCVRITATE ET HEBETVDINE.

Obscuritas, quā amaurosīm Græci uocāt, est totius cetnēdi uisus plerūq; absq; manifesto oculi affectu impedimentū. Hebetudo (quæ amblyopia Græcorū lingua uocatur) obscuritas uisus est, ab occulta quadā causa proueniēs. Curatio cōmunis est ei quā in suffulis diximus. Priuatim uero ab angulis sanguinē mittere prodest. hirudines admouere tēpotibus, inferiores partes p̃ficare. P. cedēte tēpore etiā iis, q̃ sternutamenta prouocāt, mēdū est, tū uomitu anre cibū, & inunctionibus, primū ex mellis & olei aqua portiōe, deinde cōposito quod subiūgitur. Croci obolis duobus, fellis hyenæ drachma, piperis communis grani octoginta quinque, marathri succi drachmis sedecim, guttā ammoniaci drachma. Contritis aridis cum suc-

co, mellis cochlearia quatuor adiiciunt. Preparata, excepta q̄; ærea pyxide in usum cōdūtur. priusq̄ uerò illinātur oculi in marinā calidā demerſi fouent.

## DE STRABISMO.

Oculi infantium ab origine distorti sanescunt rebus faciei circumpositis, ut in rectum uideant. Nam strabismus conuulsoria musculorum qui bulbum mouent, dispositio est. ergo lucerna in conspectu ponitur, quæ non ex obliquo appareat. Præterea cum ad nares conuiuent oculis, stipulas palmeas agglutinare uincit & angulis qui tempora respiciunt: ut uisu ad has inconniuerter directo oculos emendent.

10 DE OCULORVM EXPRESSIONE QVI EXPRIMOR  
appellatur.

Exprimuntur oculi nonnunquā, ut exerti perseuerent. quibus strangulatus, mali causa est, ex cubito uenam incidere oportet: sin alio modo id acciderit, medicamēto purgare, ueratro nigro, uel scāmōnia. Si à doloribus origo est, frequenter sanē in puerperio superuenientes uteri purgationes soluunt: unde his opitulari conuenit. in uiris autem post sanguinis detractionem, si nō remiserit uitium, cucurbitulā occipitio defigere commodū est. Lanā melle imbutā imponere, aut panni floccos cū aqua superq̄; duplicatū linteum illi gare leniter. His prodest & marina frigida fronti superfusa, itē sereos & polygoni succus cū meconio illitus, tū alia quę reprimere possunt, & contrahere.

## DE CONFUSIONE.

Confusiones ex ictu, curamus sanguinis detractione à cubito: torū oculum sanguine, potissimum quidē palumbi recens occisi, sin minus, etiā columbæ replemus: deinde lanam mollē in ouum cū uino rosaceoq̄; cōtusum demersam imponimus illigamusq̄; sequenti die idē facimus, & tertio fomenta exhibemus, lac instillamus, applicamusq̄; idonea, deinde sublinimus medicamentis quæ ad ueteres affectus inscribuntur: quale est Chiacum.


## DE MYOPIASI.

Myopia dicuntur Græce, lusciosi nostris, qui à prima natali die propinqua sanē uidēt, remota uero non itē. Insanabilis est huiusmodi dispositio, ut quæ ab imbecillitate spiritus uisorii proueniat. Contrario his modo senes afficiuntur. Cum enim propinqua non uideant, procul disſita assequuntur.

## AURICVLARIA. ET PRIMVM DE

aurium dolore.

Cap. XXIII.

35  Vrium dolor qui frigiditati fertur acceptus, ex anni tēpore, præcedēte uictu uel ægrotātis quoq̄; tēperatura, ubi ob exteriorē ne causam acciderit didicerim⁹, inde quòd dolor alte citra gratitatē, uel distentionē, uel ardorē fixus sit, calfacientibus curabitur præſidiis, nēpe oleo rutaceo, uel laurino calido, uel amaracino, uel philiato, 40 uel spicato, uel cōmuni cū euphorbio, uel piperi, uel castoreo, uel cōmage no dicto unguine, uel liquore balsami. Iā uero oleū in quo alliū decoctū sit,

uel cepa, instillatum auxiliatur. At ex calida conceptum intemperie, dolore  
 in quo fetoris cuiusdam sine grauitate seu tensione sensus est, contraria dis-  
 cutiunt: oui aquatum in aurem demissum, quemadmodum oculis adhibe-  
 mus, lac muliebre cum quodā collyrio, quod dolore lenit, uel succo perdicii  
 herbæ cum modico rosaceo: ipsumque rosaceum, oleum, uel acetum, uel suc-  
 cus solani, uel coriani, uel hastulæ regiz, uel oleum in quo lumbrici, uel asel-  
 li qui in aquosis & humidis agūt, Græci *ὀνομασπιν* appellant, incocti, uel  
 oleum amygdalinū per se, uel buccina uiua numero tria, in eo decocta miri-  
 ficē proficiunt. Quod si glutinosi crassique succi dolores fecerint, capitis, ipsi-  
 usque auditus grauitas & præcedentis uictus ratio testatur. sola uero citra gra-  
 uitatem distensio, spiritū aurium flatulentū, cui exitus non patescit, indicat.  
 Itaque in ambobus uitis utre medicamentis, quæ aperiunt inciduntque, cuius-  
 modi est aphonitrum cum aceto & melle. Item sel ouillum cum olco com-  
 muni, uel amygdalino: præterea porri & cepæ succus tepidus cum melle, aut  
 origanum cum melle & lacte muliebri instillatur. Ad uehementiores aurium  
 obstructions, sel caprillum cum succo porri inditur. Verum quos amplius  
 labor longusque urget, & grauis simul auditus existit, hæc quoque commode u-  
 surpantur, cuiusmodi dracūculi succus est, ari, bryonia, & similia. priuatim  
 uero qui ob flatuofum indolescunt spiritū, cucumis ex aqua calida foras, au-  
 riisque demissa strenue auxiliatur. Si grauitas, distensio, simulque calor & dolor  
 pulsatilis, aut etiam febricula oboritur, inflammatione aurem laborare cen-  
 sero. Atque statim hic sanguis emittendus est, deinde fons ex olco dulci & calē-  
 te per specillum lana inuolutum continuo adhibēdi, meatui uero adeps an-  
 serinus uulpinus uel, aut medicamen basilicū cum rosaceo, uel cyprino, uel  
 irino debet instillari: extrinsecus ea quæ dolorem leniūt, materiamque impa-  
 ctam concoquunt, superaccommodare. Si dolor uiolētus est, iis utere, quæ  
 leuiter sensum stupefaciunt: non enim mediocriter periculum est, ne cerebrū  
 neruo per quem facultas audiendi erogatur, uicinū, confortii lege afficiatur.  
 Probē igitur dolorem lenit, opii pars una, castorei partes duæ, cū lacte mu-  
 liebri, uel oui albumine, aut uino dulci tepido instillatur. Iam pastillus cro-  
 codes, aster, Philonis antidotū frequēter his profuerūt. Cæteris ex cōmuni ce-  
 rebro fouere, siue ex olco, siue ex quodā calido fomento oportet, lanāque hoc  
 ipso imbutam in aurem cōiicere, sed ita, ut partes inflammatione tentatæ, quæ  
 fieri potest, minimē attingantur. Verum si dolor in uetustatem incidit, ac in-  
 pus degeneraturus est, medicamēto utitor, quod ex lini seminis succo con-  
 ficitur, quod unā cum rosaceo, aut chamæmelino solutum instillabis. Cum  
 autē aqua medicata ex balnei usu meatu recepta, auditorio dolorem parit, si  
 quidē copiosa fuerit, ore, uel etiā calamo ipsam euocare ratio est, ubi paula-  
 tim specillo lana inuoluto fuerit protracta, oleum quoddā instillatur quod  
 sit partium tenuium, aut rosaceū, aut oui album, aut lac muliebre. Calida  
 uero omnia mediocriter esse conuenit, quæ auribus adhibentur.

AD VLCERA QVAE SIMVL CVM INFLAMMATI-  
one affligunt.

Lycium & meconium æquali portione trita cum melle iniiciuntur.

AD DOLORES MAXIMOS, PVS ET GRAVEM AUDITVM.

- 5 Amygdalarum quibus corticem detraxeris & aphronitri singulorum drachmæ tres, opii drachmæ tres, thuris drachmæ tres, croci drachmæ quatuor, galbani drachmæ duæ, myrrhæ drachma: aceto leuigata instillantur. Si dolor exercet, rosaceo diluta: si pus obsedit, mulso, uel oxymelite: si grauius audijunt, aceto. recentia ulcera glauciū solum perfanat, aceto subactum: irē  
10 ex eo collyria, tum quæ appellatur diarodon, diacrocu, & dialsmynes: quem admodum rursus suppurantes citra dolorem ferri stercus cum aceto diutius contritum.

## AD SORDIVM DVRTIEM.

Nitro aceto diluto cum aqua auris illuitur, cumq; sordes deterfere sunt, nitru

- 15 aceto solum cum rosaceo instillatur.

## ALIVD AD SORDES.

- Cardamomi & nitri exiguum, cum ficis pinguibus exceptum sine seminibus, & in collyrii formam redactum, auriculæ committitur. Tertio quoq; die educitur. Copiosas enim sordes extrahit, & abinde leuat. Proficit hoc etiam  
20 aduersus carnis excrescentias, dolores, exulcerationes. recipit aloës, thuris, myrrhæ, singulorum drachmam, myscos drachmas quatuor. Ex aceto in pastillos digeruntur, cum usus requirit, aceto & rosaceo soluta instillantur. Idē Andronis pastillus & Heræ & Musæ faciunt.

## AD DIVTIRNA VLCERA.

- 25 Cedria melli admista illinitur. ALIVD. Ad eos quibus pus profluit, Myfi ustum & in puluerem redactum inspiratur. Per clysterem uero oriculariū eluuntur aures posca, uel oxymelite, uel mulso, uel decocto quorundā repel lentium (uerbi causa) lenticulæ uel rosarum.

## SI CRVOR EX VLCERIBVS APPARVIT.

- 30 Iunci rotundi decocto auris illuitur, polygoni uero succus cum paucissimo aceto instillatur, uel lycium, uel amurca, uel acacia, uel porri succus.

## SI SVPER VLCERA CARO EXCREVERIT.

Nitro ex aqua tepida, squama quoq; aris cū sandaracha pari modo auriculam illinito. Vbi crustam acceperint, melle repurgato.

- 35 ADVERVS AVRIVM VERMES.

- Abfinthii decocto, uel centaurii, uel marrubi eluuntur, capparis foliorū uiridium aut fructus eiusdem instillatur, uel cedrinus liquor, uel urina humana, uetus uel album ueratrum cum melle, uel calaminthæ succus, uel scāmonia cum aceto, uel succus abfinthii, oleum uero meatui inditum sursum uer  
40 sus remeare ipsos compellit: potus autem est oxelēum. Eodem ad ea quæ auribus incidunt animalcula utitor.

## AD CALCULOS ET SIMILIA QUAE IN AV

rem inciderunt, extrahenda.

Specillum lana inuolutū in resinam, aut gummi, aut aliud quoddam glutinans medicamentū demittendum, idq; in aurem iniiciendum, ubiq; uertendum est: utiq; enim sic protrahes. Si hoc modo nihil efficitur, oleum feruens meatui continue instillato. At si ne sic quidem exciderit, aut comprehensum fuerit, aliis quoq; utitor modis, ut in parte chirurgica docebimus.

## AD SONITVM AVRIVM INTRA SEIPSAS.

Si in febris, aut harum crisis sonitus aurium euenerit, nullum ei negotium facessere oportet, quippe statim magna ex parte finiuntur. Sin autem post morbum perseverauerit, absinthii decocto foueri aures debet, acetum rosaceumq; infundi, uel radicula succus cum rosaceo, aut ueratri nigri cum aceto. Ad ueteres autē sonitus, qui ex crassis glutinosissq; humoribus creantur: inde uero illos cognosces quod non uniuersim, sed paulatim incrementum nascunturq; aceto, nitro, & melle aurem illinito. ALIVD. Veratri albi drachmae duae, castorei totidem, croci drachmae tres, nitri drachmae sedecim. In aceto contrita, ut in pastillos coalescant, in usum conduntur.

## AD VETERES SONITVS, ET TINNITVS.

Euphorbium cum cyprino oleo leuigatum calefactumq; in usum capitur. in quibus autem ex amplo consensu uaporum spirituumq; summa petentium excitantur, castoreum & cicuta semen tritum cum aceto instillatur.

## AD GRAVEM AUDITVM, ET SVRDITATEM.

Quae ab origine quidem, uel etiam prima natali die, sed longissima & absoluta surditates constituuntur, nullo remedio eliduntur. Quae uero non absolutae quidem, sed diuturnae tamen, & ipsae curationem non recipiunt, aut certe difficilissimam. Quae ob biliosum humorem sursum uergentem nascuntur, uacuationibus per medicamenta bilem ducentia ex facili abolentur. quidam etiam sua sponte affectu liberantur, bile inferius descendente. At ex crudis crassisq; humoribus prognatas surditates, uel grauem auditum, uenae incisione curato, aut omnino purgatione ex hiera, tum medicamentis quae per os & nares pituitam eliciunt, Graeci apophlegmatismos & errhina dicunt. item balneis sua sponte scaturientibus, uel ex aqua marina. Porro in meatum ubi facultas audiendi est, conuenit instillare, quae ad sonitus tradita sunt. Primum uero haec: Vrina & fel caprillum, aut seorsum fel, aut ruta succus cum melle, aut castoreum cum oleo anethino: & ex hyssopo medicamentum cum nardino unguine, uel caprillum fel cum galbano: uel quod recipit castorei drachmas duas, nitri, ueratri albi, singulorum drachmam.

## AD COMPRESSA AVRIVM FORAMINA,

na, quae oaaa' xix dicitur.

Hippocrates quidem nihil ipsis adhibendum praecipit. Cum uero saepe ab aegrotis cogamur, utendum est his: Myrrhae, aloes, thuris, acaciae, pari singu

lorum modo, aceto uel oui candido illinuntur: uel panis calidi mica cū mel  
le in pila tusa admouetur: uel bituminis, thuris, aloës, cochleæ, carnis, bulbo  
rū spumæ, paria pōdera aceto cōtrita imponito. Si inflāmmatio oborta est,  
sefamo leuigata applicantur, uel chondro, cum aceto cocto. laxiora aut fun  
to cataplasmata, & lana oleo imbuta auris anfractui demittatur.

## DE PAROTIDIBVS.

Parotis glandularum sub ipsis auribus affectus est, materia morbi illic ema  
nante modò à capite humoribus uidelicet in eo obstruētis, modò à reliquo  
corpore in febribus crīsim expertis oritur. Si igitur altè adhuc delitescens pa  
10 rotis in tumorem nō attollitur, natura debet adiutari præ sidiis, quæ coactas  
sordes extrahant, uel etiam cucurbitula agglutinata, uel crebro forum usū.  
Nam si in altū recurrat colluuiēs, periculū haud mediocre subsecuturū est.  
Sin autem inflammatione tentata in tumorem erumpat, e contrario iis quæ  
leniunt, & concoquūt utemur cataplasmatīs, quale est ex farina hordeacea,  
15 aut triticea, aut semine lini cum mulsā, aut fœnugræci, aut altheæ aut chamæ  
melorum diluto incoctum. item quod ex lapatho & axūgia insulsa constat,  
at si exuperare sanguis tibi uideatur, prius ipsum uenæ sectiōe uacuabis: mo  
do uires permittant. Tumore autem nō discesso, medicamētis utere quæ pu  
ri mouēdō sunt, nempe farina triticea cum pinguium fīcorum decocto, uel  
20 oleo, tum medicamento quod ex polline, & quod fermento confectum est.  
Vbi iam abscessus ad suppurationem spectarit, uel cute ferro discissa pus ex  
cernetur, uel acri medicamēto rumpetur, cuiusmodi existit smilion appel  
latū, & diascordon. Ceterum mitiores parotidas etiā fotus ex muria discutit,  
item medicamentum diaperanu. Hoc sanè etiam pus iam maturatum dige  
25 rit, præter quod dolori leniendo sit efficacissimum. Ad inueteratas paroti  
das buccinorum, aut purpurarū combustarum cinerem cū melle, uel axun  
gia imponemus, aut ficus marina incoctas, uel marrubium cū sale. Indura  
tas autem iam emollit & medicamen Mnasei, & Ariobarfanios. optimū eti  
am quod ex succo lini feminis præparatur. ante hæc autem illincere ammo  
30 niacum conuenit, mista cū cataplasmatīs pice liquida, uel seuo taurino, uel  
bdellio, uel styrace, uel medulla ceruina.

## DE NARIVM ET OLFACTVS VITIIS. Cap. XXXIII.



35 Lfaciēdi facultate oblata, si uox feruetur incolumis, ad priores  
cerebri uētriculos morbus refert, qui aut ex intēperie sola no  
xā conceperūt, aut etiā ex humorū copia. sin aut uox quoq; ma  
li contagiū senserit, laboriosior quodammodo reddita propter  
meatus (qui à collādo ethmoides græcè uocant) obstruētos, affectū rursus ma  
lis quibusdā succis cōtrahi cōfeto. Itaq; cerebri intēperies, ubi ex notis sepius  
à me dictis deprehensa fuerit, contrariis curatur remediis: caput marina cali  
40 da superfundit: humores apophlegmatis eliciēdi. Maxime uero utitor medi  
camētis quæ per nares ualide educunt, & quæ odore mouēt ex tenuibus facta



particulis, quemadmodū in defluxionibus, adhibeto. Cum totius corporis humorū copiae suspicio subest, hæc prius, aut sanguinis dimissione, aut purgatione ex hiera uacuatur. Ita quoque in polypode & ozzna faciundum est, deinde loco inducitur remedia. quin & theriace pota sæpe magno fuit presidio. Cæterum polypus, tumor præter naturam in naribus oritur, substantia respondens polypodis caruncula: eiusdem uero naturæ est, & sarcoma. Ozzna ulcus est, putridum ex humorum acrim illuue creatum.

#### AD POLYPODAS ET SARCOMATA.

Squamæ æris drachmæ octo, atramēti sutorii drachmæ sex, sandarachæ drachmæ quatuor, ueratri nigri drachmæ duæ: naribus inspirantur. In usu hoc est laudatissimū, nam tredecim diebus insigne affert presidium. benefacit & atramētum sutorium cum aceto. ALIVD. Malicorū drachmæ duodecim, atramenti sutorii drachmæ decem, chalcitidis drachmæ octo, fellis taurini, amomi, myrrhæ, calaminthæ, marrubii, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, ueratri albi drachmæ quatuor. sicco utitor. ALIVD. Di-  
phygitrito nares, linamentoque funiculari attinguntur dilatanturque.

#### AD OZAENAS.

Misyos, chalcitidis, myrrhæ, singulorum drachmæ septem, atramēti sutorii drachmæ sex, aluminis scissilis, gallæ, squamæ æris, singulorū drachmæ quatuor, aluminis rotundi drachmæ duæ, thuris drachma una, aceti sextarius. Vbi ad mellis spissitudinē uenerit, totum in uase æreo coquitur, ex carptis linamentis utitor. ALIVD. Aeruginem & æris squamam pari portione aridum medicamentum facito.

#### AD FOEDVM NARIVM ODOREM.

Myrrhæ, acaciæ, amomi, singulorum pondo drachma melle cocto excepta summo nariū intersepto iubeto agglutinari. ALIVD. Amomi, myrrhæ, rosarū siccarū partes æquales, nardino unguento exceptas illinito. Item bene facit a duersus fœditatē odoris, & malagma ex menta cum uino admotum.

#### AD NARIVM VLCERA.

Cerux libra, argenti spumæ quadrans, recrementi plumbi tantundem, uel plumbi cōbusti. omnia uero lota sunt, excipiunturque uino myrteoque oleo.

#### AD VLCERA QVAE VOCANTVR GLYCEA.

Argenti spumæ drachmæ quatuor, rutæ nouellæ totidem, aluminis scissilis drachmæ duæ. Myrteo oleo acetoque excipiuntur.

#### QVAE STERNVTAMENTA CITENT.

Veratrum album, uel castoreū, uel piper, uel struthiū, uel simul omnia: non aut oportet inspirare, sed pinna uel digito penitissime in nasum demittere, ubi sternutamentum frequentius est, medicamento sedari debet. Infunditur nardinum, uel rosaceum, uel glycelæum. Iam quæ odorem mouent, sternutamenta sedant, anisum, ocimum, stipulæ contusæ: sed ante hæc omnia caput desiccandum est. smegmatis ex nitro & pumice factis, uel etiam ascle-

pio uocato utendū, & Constantini saponē, & sale cappadocico, similibusq̃.

#### AD SANGVINIS ERUPTIONEM, E' NARIBVS.

Sanguinis ē naribus profluuium, quod febribus superuenit, secūdo uolumi-  
ne inter illas sum executus. De eo aut̃, quod alia quacūq; de causa accidit, nul-  
loq; fisti potest remedio, in pręsentia tractabimus. Chalcidē contritam li-  
namēto funiculari, aquā imbuto, uel eo quod ā genialis humani forma pria  
piscem appellāt exceptam, nariū foraminibus demittes. Vel testā oui exustā  
admiscebis, & dimidiatā gallæ partē, uel lycio indico attinges. Vel aselli do-  
mestici combusti cinerem inspirabis. Vel aselli expressi succū instillato, uel  
molaris lapidis aceto extincti, uaporem naribus obii cito. Vel hoc quoq; me-  
dicamento obstruenti utitor, Mannæ, thuris, partem unam, aloēs partē di-  
midiam. Candido oui liquore excipito: ac utitor, per linamentū funiculare,  
extrinsecus leporis pilis unctioni adactis. Vel lintcum intortum in nares cō-  
iicito. Vel cucurbitulam leuem directē, quā sanguis profluit, affigito: pręcor  
diis aut̃ magnā, & constanter admoueto. Vel aures ualide obstruantur, frōs  
spōgiis ex aqua frigida foueatur. Vel cucurbitula occipitio agglutinetur, cū  
sanguinis detractione: interim etiam sanguinem emittere conuenit, si nihil  
prohibet, & summas partes uinculis excipere. pręsertim brachia & femora,  
sicut in uenæ sectione fieri solet. Eadem motu concuti iubeto, manus uero  
fricatione, pedes autem obambulatione. Nam uenis indidem sanguine re-  
pletis narium uasa deplentur. Item spongia in poscam frigidā demersa: nari-  
busq; profluentibus a foris strictim admota: id quod requiritur, subinde per-  
fecit: melius autem proficit longo penicillo naribus prius subiecto.

#### AD FACIEI VITIA.

25 QVOMODO FACIES A' RVGIS ASSESTATVR. Cap. XXV.



Huris denarii quatuor, fuci drachmę tres, argēti spumę, piperis,  
singulorum drachmę octo, omnia ex ichthyocollæ tunfæ dilu-  
to soluūtur, in pastillos redacta usui sunt. ALIVD. Eburnei scobis  
drachmę octo, thuris masculi, ichthyocollę pares portioēs.

30 Utitor, quemadmodum est prędictum.

#### AD FACIEI NIGRITIAS.

Iridis, uel ptisanę, lomenti singulorum sextarius unus semis, salis ammonia-  
ci, cornu ceruini cōbusti, thymiamatis, ammoniaci, singulorum uncie duz.  
Aqua dissoluta in pastillos coguntur, ac iterum aqua trita ante balneum illi  
nuntur. ALIVD. Ptisanæ, erui, thuris, illyricę, aphronitri, singulorum chœ-  
nices quatuor, costi, amygdalorū amarorum singulorum drachmę uiginti.  
Quorum albumine, lacteq; asinino subigito, ac utitor ueluti prędiximus. Be-  
nefacit etiam pastillus Peponatos.

#### AD EPHELIDEM ET LENTICVLAS.

40 Terrę cimoliæ torrefactę, congius semis, aphronitri costi drachmę octo, er-  
ui filiquę drachmę quatuor, fellis taurini, eburnei scobis singulorum dra-

\* Editū ex-  
emplar gra-  
cū erit, sed  
apud pro-  
prium distin-  
ctum habet  
denarios de-  
cem, comēti  
totidem, sed  
uetus sequor

chmæ octo. Leuigatis facies defricatur. ALIVD. Fzcis combustæ denarii decem, \* erui farinæ denarii quindecim, ueratri albi denarii quinq, aphroni tri denarii decem, alcyonii denarii decem, trita infricantur.

## AD SVGGILLATA.

Per initia decocto sœnugræci, postea & mehloti oculi fouentur. Nilei colly-  
rium diarodon aqua solutū illinitur: deinde diasmyrnu. Et si nihil profecerit, id quod diasandicos inscribitur, combustum perungitur, uel hyssopum aqua maceratum applicatur. Vel hyssopo in panniculum illigato, & calida aqua resperfa foueri debent, uel acri muria. item radicula corticem cū melle detritum impones. hoc etiam ueteribus efficax est. Porro ad uetusta faci-  
ei soggillata & liuores, tordili partes duas, terræ famiæ partem unam cū melle admoueto, cura adhibita ne exulceretur.

## ALIVD DETERSORIVM.

Hyssopi, thapsiæ, casie, singulorū drachmas duas, ceræ tantundē, terebinthinæ drachmā iniicito, cauens ne exulcerationē excites, eoq; frequenter tolles.

## DE VARIS.

Exigui sunt & duri in facie tumores. Oxymelite illito, uel argenti spuma cū terebinthina, aut olei cādidi momēto trita infricādo perunguntur: uel alumen fissile cū terebinthina, uel amygdala amara aceto macerata infricantur. In callū uero concretos uaros, saponis gallici drachmis quatuor, thuris, am-  
moniaci, singulis drachmis aqua dissolutis perungito, & post horā eluito.

## AD VAROS, PILOS, ET ASPREDINEM FACIEI.

Ceræ denarii decem, terebinthinæ denarius, uisci denarii duo. Liqueantur, superq; oleum infunditur, facies hoc medicamento eluitur, tollit enim radicitus. ALIVD. Papauer detritū, uel pulegium cum sale acetoq; illinito.

## CERATVM THAIDIS QVO FACIES RVBESCAT.

Croci erythrodani radicis, fuci, thuris, myrrhæ, singulorum drachmæ duæ. Adipe uitulino oleoq; mastichino excipiuntur: deinde illinuntur. Interposito tempore, spongia ex calente aqua facies abstergitur. Caterum faciei re-  
media, etiam reliquo corpori conuenient.

DE ORIS AFFECTIBVS: ET PRIMVM DE  
dentium dolore.

## Cap. XXVI.



Entium dolorem sine gingiuarum inflammatione interim in proprio ipsorum corpore, interim in neruo, qui ad ipsos pertinet, oriri contingit. quapropter ualentissimorū in hoc medicaminum usus est. Atq; inde plurima ipsorum q̄acerrimo aceto præparantur. At gingiuis propter inflammationē dolētibus, præsentissimū est remediū, oleum lentiscinū, calore temperatū, si in ore retineatur, esto autē id recens: nam uetus tantō recenti deterius, quāto calidius. Huc autē omnia dirigi debent, ut humor qui toto corpore superat, prius euacuetur.

## AD DENTIVM INFLAMMATIONEM.

Os colluitur a ceto, in quo decocta sit galla, uel halicacabi radix, alterci semen, folia uel uel pulegiū, uel solani fuce, uel capparis radix, uel myrti folia, uel poliū, uel cucumis syluestris radix, uel ruta folia, cū oxymelite, uel cornu ceruinū, uel acetū scillites, uel pyrethrū, cū hyssopo. At erosionem experto denti, styracē cum opio imposito: uel sulfur unū cum lycio: uel alterci seminis uapōre excipiat per infundibulū. Item Philonis antidotū denti circūlitum, dolorē sedat. Quōd si defluxione laborent dentes, myrti, lentisci, & gallæ diluto colluentur. Vel rhus syriaci, balaustii, uel malicorii. salis autē partes duæ adiguntur: aluminis usti, & aceto extincti trii; pars una: deinde uino perluuntur. porrō gingiuis cruentis alumen tenue inspergitur, uel aloē cum uino eluuntur. uel rubi radice uino madefacta. uel rhu syriaco. cruētis autem & defluxione rentaris gingiuis crudum salisamētum in olla combustum, quoad cinere in carbones redigatur, attingito. At mobiles stabilit aloē insperfa, uel rhus syriacus, uel alumen scissi se, uel galla, uel rubi radix per se, aur cum uino incocta.

## ALIVD AD DENTES.

Ficus pinguis uitidis corticē terito, eiusq; ius, cum habes, in dentem conuicito. Myrrham ueram, & alumē scissile, ubi omnia in unitatem coegeris, ad usum recondito. Ac in aurem quā dēs indoler, demittito & persanabis.

ALIVD. Ad dentes mobiles, & gingiuas fluxione pressas: omniaq; oris uel cera depascenria, chalcitidis tostæ drachmæ duodecim, cadmiæ drachmæ octo. In usu siccum, cum aceto sine dolore dentes tollit. farina cum liquore thymalli imponitur, & super hederæ foliū accommodatur, ac per horam sinitur, sua enim sponte dens conteretur. Dentifricium, quod & parulidibus bene facit. Aluminis laterculari, salis ammoniaci, myrrhæ, costi, pyrethri, singulorum pondotriens, piperis grana octoginta.

## AD PARULIDAS.

Sulfuris uiui, piperis, aluminis scissi, æquales portiones. Ac parulis inflāmatio quādā est in aliqua gingiuarū parte sulcitata, quæ nisi discussa fuerit, in suppurationē conuertitur. & cū suppurauerit, scalpello inciditur, lunamētisq; insertis aperitur. Epulis autē carnis excrescētia est, quæ ab inflāmatione contracta ad intimos molares dētes pertinet: nonnunq; cum febris & dolore. Quoniā igitur reprimi debet, utendū est æruginē rasa priuatim: uel cū pari galla, uel fori cōbusto, uel alumine quolibet cremato, uel galla per se, uel squama æris cū aceto dieb<sup>9</sup> fat multis leuigata desiccataq;.

## DENTIFRICIUM.

Aristolochiæ radix combusta, cerui cornu combustum cum mastiches momento, salis candidi melle respersi & fici folliis inuoluti exustiq; donec in carbones mutantur. ALIVD. Buccina sale respersa, ustaq;, cochleæ terrestres cum melle combustæ, lanæ succidæ cum paululo sale ustæ. Singulis ipsorum grati odoris gratia misceatur iunci rotundi flos, uel nar-

124      PAVLI AEGINEI 22,  
di spicz, uel folium malabathri, uel iuncus odoratus angulosus, uel iris.  
NON ORDO FIAT ET ORIS

DENTIVM CANDOR QVOMODO FIAT, ET ORIS

suauitas, gingiuæq; reprimantur.

Pumicis, salis tosti, iridis, singulorū drachmæ quatuor, iūci odorati anguloſi drachmæ quinq; ſpicæ nardi drachma, piperis drachmæ ſex. Tritis uſitor.

AD STUPOREM DENTIVM.

AD STVPOREM DENTIVM.

AD STYPOREM DENTITUM.  
Stupori benefacit portulaca cōmanducata, uel oleū quod immaturæ oli-  
uæ tuderūt infricatū, uel a murca in xreo uase cocta, donec mellis spissitu-  
dinem habeat. \* atq; uetusta si perungatur, magnum affert momentum.

AD DENTES ATTRITOS.

Dentibus attritis, baccarum lauri, aluminis scissi, aristolochiz sarmenta  
cia, singulorum pares portiones iniiciuntur.

AD GINGIVAS EXESAS.

Rosarū floris drachmis octo, gallarū drachmis quatuor, myrrhæ drach-  
mis duabus, si gingiuarū exesæ & flaccidæ, cumq; infirmitate humētes collu-  
antur, consanescūt. Idem præstat lac asininū, oliuarū foliorū decoctū, acētū  
scillites. Arida uero admota, ærugo ferri, cytini. Tumidas excrecentesq;  
gingiuas portulacæ succus in ore retētus, muria, oleum ex colymbadibus  
oliuis, uel immaturis expreßum, uel lentiscinū, uel melinum amurcæq; di-  
scutit, sicca autē ærugo ferri, uel æris, aristolochiæ radix, arnoglossi semen, 20  
dyphryges, atramentum sutorium tostum, cytini.

AD DISRUPTA LABRA.

Amutca cocta illinatur: uel adeps anserinus cū melle, terebinthina æquali portione, rosarum floris, hyssopi, rosacei, singulorum momentum.

ADVERSUS LINGVAE MORBVM QVI

batrachus appellatur.

Batrachus tumor est, ad inflammationis similitudinē, sub lingua erūpens, maxime in pueris: itaq; locus misyos, æruginis rāsæ, pari pōdere sicco perfricatur. Mēto aut̃ adhiberi debet medicamentū Anthera, uel sphæzion, uel ex ouis parygrū. postremum remediū est uenas sub lingua diuidere. 30

ALIVD. Valet etiā ad oris ulcera, quas Græci aphthas uocāt, æ ruginis rās-  
sæ gallæ chalcitidis, singulorū æquale pōdus cū passō. os etiā his colluit.

ALIVD. Erui farina cū melle prius absterfis, delinitur. Galla leuis cū mel  
le, uel rosarū flores similiter. Vel oliuz foliorū decocto pars affecta eluit.

AD TONSILLARVM INFLAMMATIONEM.

Si in febris tōsilla, & columella inflammationē senferint, gargarizare cōue  
nit decocto fursfurū, aut rosarū, aut myxx, aut lenticulę. Cum  
uero inflammationē remittit, consistit ue, mel ipsi adiiciendū est, quod per  
initia facere nō oportet, nec in augmēto, ne a crimonia fluxionē quādam  
concitet. Vbi in suppurationē conuersa fuetit, gargarizandum est ex mul  
sa uel lenticulę decocto, uel rosarum: idq; faciūdum est, donec in totum

soluatur. Aut stomatica cōpositio ad gargarizandū etiā exhibebitur. At si  
 serpētia tonsillis ulcera oboriantur, utendū quidē & præsēcriptis, sed priua-  
 tim exhiberi debet medicamē diamoron, ex aqua calida, uel aqua mulsa,  
 quæ rosarū insperarū florē obtineat, uel costū, uel rhus siccū, uel decoctū,  
 5 uel glauci foliorū aridorum decoctū, quod amarū est. optime aut facit, si  
 succus, ut ad collyria utimur, leuigatis in mulsa additur. ipsius autē fruti-  
 cis sicci, si inspiretur, usus est laudatissimus, aut si digito admoueat. cu-  
 ra uero habenda est ne prorsus attingatur, aut certe leniter admodū. Pro-  
 fuit & pastillus Andronius. Post hæc acria irritatiā ue gargarizatur ex me-  
 10 dicamento, quod radice quam dulcē appellant, constat: aut eo quod cro-  
 co, uino scybelite, terra chia, & myrrha cōponitur. deinde amylo, & traga-  
 cantho. Vbi iā cōstitit ulcerū depastio, gargarizandū medicamento ex  
 lacte, & samia terra cōfecto. ALIVD. Ex malo Punico dulci cū cortice tu-  
 so succus exprimitur, & eius partes sex, mellis uni mistæ coquuntur, donec  
 15 eis mellis spissitudo sit & perunguntur. ALIVD. Gallæ immaturæ unciz  
 duæ, aluminis scissilis uncia, salis ammoniaci tosti, tantundē. Aridū appri-  
 mitur, ALIVD. Gallæ drachmæ octo, misyos drachmæ duæ, salis tosti  
 drachmæ quinque, sicca in usum adhibetur. est aut Anthias tonsillarum tu-  
 mor, duritiem præferens.

## DE VVA.

20 Vva si inflammationē experitur, gargarizandū ex iisdem, quæ tonsillæ in-  
 flammante postulat, & mediocriter astringētibus, qualis est mali Punici  
 succus per cochlear, uel instrumentū, quod ab uua attollēda staphilepar-  
 ton appellat, subiectus, tū per se, tū cum melle affatim cocto: uel dulcis ra-  
 dix, mali Punici succo mista. proficit etiam succus dulcis radice cū melle  
 25 illitus. iam hæmatites lapis uuam reprimat, & phrygius combustus, & age-  
 ratus, item ex lapide phrygio medicamē ad pudēda inscriptū. His addun-  
 tur terra samia, erethrias, sinopis, lemnia, omphaciū, per se & cum horū ali-  
 quo. Item spinæ Aegyptiæ fructus: alumē scissile. rosæ uero, & semen, & fo-  
 lia leniorē effectū præstant, præterea gūmi, tragacantha, sarcocolla, amy-  
 30 lum: quibus utendū dum magis uua prematur ab astringētibus cōstricta.  
 ubi crassior in rotunditatē creuerit, quod uitū iam uuam proprie dicunt,  
 gargarizationibus eluēda, & ex myrrha, & croco, & iunco odorato angulo  
 so. Contusiones autē cauendæ sunt. ob quod pinna potius perungere cō-  
 uenit. cōpositū uero hoc utile est, rhus syriaci drachmæ octo, croci drach-  
 35 mæ quatuor, costi drachmæ octo, rosarū seminis drachmæ quatuor. Præ-  
 terea gingiuis benefacit, linum ex purpura murina, quod uiperæ collo cir-  
 cundatum ipsam strangulauerit, deinde circumadigatur tonsillis, & colli-  
 uitis, mirabili quodam modo opitulatur, ut Galenus auctor est.

## AD SANGVINIS EX ORE PROFLUVIUM.

40 Marrubii folia tunsa imponuntur, uel spongia recens in picem crudam  
 immersa comburitur, in puluerem coacta admodū utile est remedium. Item

os, perluere rosis siccis, aut uiridibus. Ad hæc decocto frigido, uel pampinorum uitis, uel lentisci foliorum, uel rutæ, uel malorū cydoniorum, uel rosarum, uel uux acinorum, uel lenticularum.

DE ANGINA EIVS QVE SPECIEBV8: VBI ETIAM

de strangulatis, uel alio modo suffocatis agitur. Cap. XXVII. 5



Angina, quæ musculis faucium interioribus inflāmatīs accidit, synanche Græcis appellatur: quæ exterioribus, parasyanche. Eodē modo & in gutture habet: cui⁹ si interiores musculi inflāmatione conflētūr, cynanche: si exteriores, paracynanche.

Hæ enim comites notæ sunt, spiritus rectæ ceruice uix trahitur, nonnullis 10  
febriula oritur, faciei rubor, ceruicisq;. Ad hæc tumor etiā in quibusdā su-  
peruenit. Aeger ore cōiunct, cibū nō deuorare, nō potionē potest. Cynā-  
chicos uero strāgulatus quoq; interdū secutus est. Pueris raro talis affect⁹  
oboritur, nisi cū ceruicis uertebræ affect⁹ loco excidūt. Verū illis ceu cu-  
rationem nō recipiētibus, ac deploratis, manū admoliri non oportet. Re- 15  
liquis autē sanguis protinus ē cubito mittēdus est, sed non uniuersim, ue-  
rum pluribus interpositis uicibus euacuabitur. quippe cumulara, uniuersimq;  
facta uacuatione, anima ipsis deficiente, suffocationis periculum su-  
peruenit, dum materia in affectam partē collectim prorumpit. Si per hæc  
parum proficitur, eas quoq; uenas incidere conuenit, quæ sub lingua sunt, 20  
uel ipsa quoq; lingua scarificanda, si turgēs magis exeritur. Alius acriore  
clystere subduci debet, pedes, aqua calida foueri, extremæ partes ualide de-  
ligari, collū lanis suecidis, uel etiā oleo imbutis cōtegi. crudaq; polëra, quæ  
Græcis ἀνὰ λυγρὸν dicitur, gargarizandū per initia ex iis, quæ in tōsillarū in-  
flāmatione dicta sunt, uel eo medicamēto simplici quod ex moris est, cū 25  
rhus decocto. Potius autē est quod syluestribus moris cōficitur. Deinde  
& cōposito, quod mora recipit, uel eo quod ex nucibus pinguibus petūgi-  
tur. Cum morbus uiget, consistitq; & nitri momentū admiscendū est, aut  
sulfuris uiui, nisi acrimonia quædā prohibeat. item stercus caninū aridū  
contusum, & cum melle perunctū, præstantissimū est remediū. Atq; hu- 30  
ius generis albū maxime, tum syluestriū hirundinū similiter cinis efficax  
est. Si malū longius prorogāt, etiā perunctiōne diabesafa, utemur, nūc ui-  
res ipsius remittētes, aliorū mistura, nunc iterū intendentes. Cucurbitula  
quoq; uel hirudo sub mēto, & circa ceruicē admouetur. tum commodum  
gargarizare, ex ualētoribus, iride, hyssopo, melāthio, abrotano, dulci radi- 35  
ce, hīs pinguibus in mulsa decoctis, uel rutæ succo cū lacte, uel sinapi cū  
oxymelite. Sin autē hæc quodammodo acria percipiātur, oleū ipsis q̄ opti-  
mum calēs exhibetur, aut rosacū per se, aut cum cremore ptisanæ, aut fœ-  
nugraci gargarizandū. Cibus sit triduo aqua mulsa, inde ptisanæ cremor  
cum dulci quadam portione, deinde & ouorum lutea perliquida, ac sorbi- 40  
tiones ex chondro, ubi deuorare melius cœperint. In summa, cibi ægri



uiribus respondebunt. Cum morbus cœperit inclinare, ægri deambulationibus & balneo credetur: pars affecta cerato ex oleo rutaceo operietur, reliqua: uirium recolligendarum ratio, ut par est, adhibebitur. Porro ex strangularis, quibus spuma iâ circa os emanat, manus admoueri nō debet: si Hipocratis consilio acquiescimus. Alii uero uita restituantur, aceti infusione & piperis, uel urticæ fructus in aceto triti acerrimo. Verum quia ægre magnoq; negotio assumunt, compellere eos ratio est. Simulatq; uero colli impedimenta dissoluuntur, statim sursum respiciunt & anguntur, simili modo in his qui naufragium passi sunt. Summatim in omnibus qui suffocantur.

10 Nam ita horum calor recreatur refocillaturq;

## DE GRAVEDINE, DESTILLATIONE, RAUCI

tate, &amp; tussi.

Cap. XXVIII.

**G**ommunis est omnibus uitiiis, excrementitii humoris ex capite in subiectas partes descensus: si in nares decubir, & per eas defluat, ut *ῥινορροία* Græcis, grauedo Latinis malum appellatur: si per palatū in fauces, simplici uocabulo *ῥαυκισμός*, nobis destillatio: si in guttur & asperā arteriam destillet, ut membranā interiorem quæ hâc integit, exasperauerit, raucitas tunc sequitur, uocaturq; malū græce *ῥαυκισμός* & *ῥαυκισμός*. In quibus non solū ex capite, sed etiā uehementi clamoris conatu, & spiritus

15 inspiratu frigidi, asperitas contrahitur, inflammationē representans. Si morbus non finitur, fluxioq; in pectus pulmonesq; ingruit, ruffis obōritur ipsis maligna ac contumax. Quæ & propter intemperie subinde accidit, interim calidam, ut in febribus: interim frigidā, ut aquiloniis diebus, eaq; magis sicca est. Iam uero aliis quoq; morbis tussis nonnunquā superuenit: uerbi grati,

25 pleuriticis, iecorariis, phthisicis, pulmonariis: quare Galenus in diurna tussi grandines quasdam ex pectore educi memoriz mandauit. Alexander autem calculum quendam grauē, qualis in meatibus urinariis nascitur, post lōgam tussim expulsū, ac inde illam quoq; cessasse prodidit. Porro nos in sanguinis eruptiōe calculos excerni uidimus, quemadmodū cum illuc per-

30 uentum erit, ex ætius commemorabimus. Qui igitur ex æstu grauedinem, uel destillationem concipiunt, his particulæ incalescunt, acris, tenuisq; humor destillat, tum per nares, tum per os, tum facies rubescit, & nasus. Qui ex frigore, iis caput undiq; & frons distēditur: meatusq; quos à colo ethmoides uocant, clauduntur, ne uox deorsum per nares transmeat: si longius malum

35 trahatur, tussicula quoq; affligit, piritu educitur, nūc cruda & liquida, nunc uiridis. Quibusdam & febris superuenit, quæ ob æstum laborantes nihil iuuat: frigore pressis, etiam concoctionem efficit.

## CURATIO DESTILLATIONIS ET GRAVEDINIS.

Vbi calida præpollet intemperies, iis pugnandum est præsidii, quæ dolori capitis ex tali causa contracto cōueniunt: balneo utendū est, caput aqua copiosiore calida perfundendum. Cibi uero his proderunt ad forbitionem

40

aptari, oua forbilia, amyli, sumenalia, quae itria dicuntur, selsama necnon amygdala. ite fructus conii: & quae ex lacte sunt bellaria: uina dulcia, non uetera: medicamentum dia codion linctum assumptum, & quae his congruunt composita auxilia. Quod si frigida intemperies afficiat, & morbus contumax sit, modico utendum cibo est, caput calefacientibus subtilibusque: nardino, rutaceoque debet perungi. Irinum uero non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur: quae intus thure, & myrrha cum oleo perunguntur, praesertim si perfrictio grauedinem crearit. Alios lacinae paniculorum combustae, uel melanthiū, uel cucumerinum ustum demissumque panniculo reficit. Iam cyphi selenici, id est lunare, olfactum prodest, fronti: illitum, cui simul unum ex emplastris, quae inflammationem arcent agglutinabitur. Exepli gratia, Icesium, uel Oxera, uel Barbarus, uel Athena ad destillationem ex frigore ortam & cyphi potius utilis est. Thorax autem balsami liquore per lanas succidas superillinitur, idem styrace & irino, uel anethino circumfouetur. Cibis calidioribus & ad concoctionem promptis uti commodum est, ubi iam materia concoquitur, medicamen quod pituitam per os educat, idoneum erit, tum capitis smeigmata, nempe Constantini sapo, atque eius generis consimilia.

#### RAUCITATIS CURATIO.

Raucitati, quam artetiacum & branchū appellauimus, competent quidem superius comprehensa, uerū priuatim ubi arteria & guttur inflammationem exasperit, emplasticis, id est, obstruendi meatus facultate praeditis, per initia utemur, donec inflammatio remissior euaserit: illiusmodi uero sunt quae ex passo cretensi, tragacantha, gūmi & amylo constant. Item pinguiū palmularum decoctū, & dulcis radices cum sapa, donec mellis spissitudine conquirat. Item compositio nū, quas, quod sub lingua teneatur, *ῥαυκισμὸς* appellant, usus est. Ante omnia uinū hoc tempore circuncidendū: postquam inflammatio moderatior fuerit reddita, uinū dulce assumetur, tum confecta ex melle, lacte cum amylo, uel pane siligineo. Ad haec forbitiones ex amygdalis, buryrumque, utile. At si humor in particulas se receperit, transeundū est ad ea quae ualentius abstergunt, cuiusmodi est faba cum corticibus suis elixa, & quae ex melle praeparantur. His adde brassicam & porra probe cocta: medicamenta uero calidiora & ad tussim accommodata prosunt, quae constant sapa, ficis pinguibus, thure, iride, terebinthina, styrace, galbano, pipere, cinamomo, cassia & his similibus.

#### DE TVSSI.

Tussis quoque eadem ratione curanda: hoc solum inspicitur, num & aliae particulae cōdolescant: uerbi gratia, an gurgulio destillet, uel caput, aliis ne morbis conflictetur. His ubi fieri potest optime erit prospectū, curationem molire, quemadmodum à me comprehensum est, diciturque in posterum. Compositorum uerò remediorum scriptura, deinceps subiecta est.

#### CATAPOTIA AD DESTILLATIONEM IN fauces & tussim.

Styracis, myrrhæ, opii, galbani singulorum pares portiones. passo excipiuntur, uel priuatim in pila contunduntur, & ad magnitudinem erui terna, quaternæ uel aut quina, noctu dormituro dantur: passumq; superbibitur. *Hæc ad acrem tenuemq; fluxionem ualent.*

*ad acrem tenuemq; fluxionem.*

- 5 ALIVD. Alterci feminis drachmæ duodecim, nucleos; pineorum drachmæ sex, croci drachmæ duæ, sapa, uel passo in usu excipiuntur.

## ECLEGMA.

Mellis pōdo uncia, butyri pondo semuncia, simul in cocta exhibentur: itē ex hyssopo, ficubus, nucleis pineis, & iride decoctum sorbetur.

- 10 CATAPOTIA AD VETEREM TVSSIM ACCOMMODATA. Styracis drachmæ sex, myrrhæ drachmæ duæ semis, terebinthinæ, galbani, popanacis, iridis, singulorum drachmæ duæ, piperis albi, nitri, feminis alterci, lachrymæ papaueris, singulorum pondo drachma. sine ullo liquore in pila tunduntur, & catapotia formantur: utitor ut prædictum est.

- 15 AD ASPREDINEM GVTTVRIS, TVSSIM ET sputum cruentum.

Amygdala amara, quibus cortex sit detractus uiginti quinque, feminis lini torrefacti drachmæ quatuor, tragacanthæ drachmæ duæ, pini nuclei triginta, oui in adipe cocti luteum. Tragacanthum, aqua maceratur. Totum uero passo excipitur: si uero & sonus uocis fuerit oblatfus, mel miscetur in passi uicē, & præsertim in quibus educi ex gutture aliquid oportet.

ARTERIAE QVAE QVOD SVB LINGVA TENEATVR HY-poglossis appellata, facit ad abscisionē uocis, raucitatē. itē ad eos qui ægrè reiciunt, anaphoricos Græci nominant.

- 25 Tragacanthæ drachmæ sex, gummi tantundē, myrrhæ drachma, thuris drachma una semis, piperis albi grana uiginti, croci drachma una, dulcis radicis succi drachmæ sex, phœnicobalanorū trium caro, passi cretici, quantū sufficit. Atq; succus tragacanthæ solus ipse sub lingua loco dulcis radicis succi retentus. Eiusdem decoctum dum spissitudinem habeat quadruplū inditur.

- 30 ARTERIAE AD ABSCISSVM VOCIS SONVM CON-uenit, & eius claritatem.

Porra sex coquito, dum tabuerint, atq; ipsa proiicito, iuri ipsorum succū alicæ admisceto, mel & ouorum prius decoctorum lutea tria simul incoquito, circumagittans anethi rudicula.

- 35 COMPOSITIO AD TVSSIM, GRAECE BE-chicon appellatur.

Pulegii pondo sextans, nucleorum pineorum, cnici feminis, lini feminis, singulorum pondo uncia, piperis cocti pondo triens, melle cocto excipiuntur, *Vide an fesa conciat legendum sit;*

- 40 ALIVD. Hyssopi, pulegii, piperis cocti singulorum uncia, petroselini semūcia, mellis hemina.

MEDICAMENTVM TVSSIM VETEREM CONCOQVENS.

Mellis denarii sedecim, terebinthinæ denarii duo, galbani denarii quatuordecim. Vbi simul fuerint incocta, orbiculi finguntur, circa fabæ magnitudinis, nucis uel auellane atque ex his delingit. ALIVD. Arida tussim curant: tum arteriaca medicamenta, tum aquæ nonnunquam feruentis sorbitio. nam dum propter pituitæ crassitiem non excreant reiciuntque; humectantibus aliquantulum iuuantur. Catey: conuenit ipsis etiam hyssopi, iridis & pinei nuclei decoctum.

PASTILLVS A' FVMO DICTVS CA.

pnistos, ad tussim continuam.

Syracis, piperis, mastiches, petroselini, singulorum unciam, sandarachæ scrupulos sex, baccas lauri duas. Melle excepta in carbones proiicito fumumque excitato, ut tussiens hunc per infundibulum aspiret. conuenit & qualemcumque perfrictionem expertis.

DE ORTHOPNOEA, SVSPIRIO, ET SPIRANDI

difficultate.

Cap. XXIX.



Vi febris expertes, crebro ueluti à citiore cursu respirant, ab ac-  
cidenti quod superuenit, nostris suspiriosi, Græcis *ασπυρτικοί* ap-  
pellant, iidemque quod strangulari metuentes, subrecto pecto-  
re toto respirationi incubant, orthopnoæci dicuntur. Creat hoc  
mali dum fistulosa pulmonum cauetur crassus glutinosusque humoribus fue-  
rint infarctæ: spirandi autem difficultas communiter & his & aliis copulibus af-  
fectibus superuenit. In curandis suspiriosis huc omnis cura dirigenda est, ut  
per extenuatiam abstergentiamque medicamina, glutinosus humor & crassus ab-  
sumatur. Acetum igitur ipsis conueniet scillites, & oxymelitis ex ipso præparati  
potio, ipsaque scilla tosta tritaque cum melle. Ex antidotis hiera, & purgatio conti-  
nens ex ualidissimis medicamentis petita, à radícula uomitus, aristolochia ro-  
tunda pota, cætaurii magni radix, spondylii fructus radixque, calaminthæ fru-  
ctus, hyssopus, iris, melanthii: asellos, qui in aquosis & humidis agunt, sexta-  
rius in uas fictile coiectus, carbonibus subditis frigitur: ubi candore acquisi-  
erint, teruntur, & melle excepta mystri mensura ante cibum secundumque ipsum  
dantur. Quod si necessitas urgeat, etiam uena ante hæc omnia inciditur, & quan-  
tum uires patiuntur, sanguis detrahatur, aluus clysteriis irritatur. Thorax  
à foris ficibus & lolii farina adiuuandus est, cui adiecta sit resina, cera & mel.  
Iam iris & manna insperguntur. Non inuutilis est & polenta cruda, cum resina,  
cera, iride & manna. Postea superimponuntur unguenta, quæ magis exal-  
faciunt, irinum, anethinum, rutaceum. Sed quod subscribitur medicamentum,  
huic uitio propriè dicatum est: Pumicis pars una, sæculæ quæ est uini sæx  
combusta, partes quatuor, auripigmenti pars una, iunci rotundi floris par-  
tes duæ, alcyonii pars una, aphronitri partes duæ. Contusa percolantur: un-  
guentisque excepta, thoraci infricantur. Malagmaris utendum est quæ sani-  
em possunt extrahere.

POTIO SVSPIRIOSIS APTA.

- Polii, abrotani, castorei, chamæpyteos, guttæ ammoniaci, singulorum par  
 modus. Melle conspersa exhibentur. ALITER. Nonnulli dederūt, aphro-  
 nitri cochlearium cum tribus mulſæ cyathis. ALIVD. Aphronitri dodrans,  
 piperis drachma, ſilphii drachma ſemis. Cochleariū ex aqua datur. ALIVD.  
 5 Castorei, ſuſſiminis ammoniaci ſingulorum drachmę ſex, piperis grana ui-  
 ginti paſſo excipiuntur. Inſtar fabæ cum mulſa exhibetur. ALIVD. Sinapi  
 drachma, nitri ſpumę tres oboli, elaterii ſemiobolus. Totū in paſtillos octo  
 digeritur: bini duobus diebus offeruntur, nam ſine moleſtia ſupra purgant.  
 Hiſ qui præfocantur, aphronitri drachmę tres, cum tribus hydromelitis cya-  
 10 this aſſumentur, ac cum cardamomo nonnunquam ſubito auxiliantur. be-  
 nefacit etiā coxendicibus.

## DE PERIPNEUMONIA.

## Cap. XXX.

- P**eripneumonia pulmonis eſt inflammatio, quæ plurimū ex u-  
 lentibus in eam partem diſtillatiōibus, aut angina, aut ſuſpirio,  
 15 aut pleuritide aliis ue morbis contrahitur. Aliquando etiā ipſa  
 inflammatio affectus origo eſt. Hunc caſum ſubſequitur ſpiritus  
 diſticultas, febris acuta & ardens, grauitas diſtenſioq; peſtoris, uultus turgi-  
 dus magnā repletionem materiæ ſuſum ignis inſtar impetu uergentis, fate-  
 tur. Malæ in hiſ rubēt, oculi intumeſcūt, ſupercilia deorſum ferūtur, tunica  
 20 oculi ceratoides ob cornus inſaginem diſta in pinguedinē languēſcit. Cum  
 hæc ſigna æſtum ſagrantiorē referre uidētur, inflammatio eryſipelatis natu-  
 ram reſiciens, ſub eſſe exiſtimabitur. In iis igitur qui ex aliis morbis in hunc  
 decidūt, ſanguinis detractio uitanda eſt, maxime ſi diu hoc in ſtatu fuerint,  
 uel ſi per initia ſanguinem dimiſerint. Verum alius in morbi remiſſione cly-  
 25 ſtere ducenda eſt, ſi ægrē reſponder: aut cucurbitulæ, ubi nihil obſtat, peſto-  
 ri, & lateribus admouendæ ſunt, eęq; per grandes, & multæ, cute inciſa. Sin aut  
 peripneumonix affectus ſtatim ab initio inuaſerit, ſanguinem mittere, ſi ui-  
 res id permittāt, ex uſu eſt: ſin minus, cucurbitulas certe defigere: quibus tã-  
 tum elicietur ſanguinis, quantum uirtus patitur. Quod ad cibū uero attinet,  
 30 danda eſt ſorbitio ex pitſanæ cremore & chondri cum melle, uel ex amaris  
 amygdalis cum ſimilagine, aut chondro dulci quadam portione admiſta, hy-  
 dromelite, uel apomelite, uel hydoroſato. Reſte ſumitur & recens butyrū,  
 cochlearibus circā tribus. Propinatur autem ipſis ficuum cum hyſſopo de-  
 coctum, uel iridis in mulſa coctæ, uel leuigaræ inſtar duum cochleariū mul-  
 35 ſæ inſperforum. Hoc itidē, ab inferioribus partibus expurgat. At uirtutis tu-  
 endæ gratia, crebrius potui aſſumetur mulſa per ſe & cum nucleis pineis, ac  
 cucurbitulæ uniuerſo thoraci lateribusq; agglutinabuntur. Ceratū uero cy-  
 prinum quod cōtineat iridem adaſtam, imponetur, uel ceratum ex rutæ co-  
 oleo, & iride ſicca, uel medicamentum ex cera, reſina, medulla, butyro, hyſſo-  
 40 po, iride ſicca, & nardino unguento.

## DE CRVENTIS SPVTIS.

## Cap. XXXI.



Ruentum sputum si uiolēter disrupta uenarū cōmercia excita-  
 rint, magna sanguinis profusio comitatur. Et quidem rumpun-  
 tur illa modò manifestiore ex causa, ut alto delapsu, clamore  
 & consimilibus, modò ex occulta, ueluti plenitudine, aut frigo-  
 re immodico, nā id uenis rumpēdis esse habile scribit Hippocrates. Si uero  
 exesa parte, aliquā sputum eruentū editur, non confertim sed paulatim san-  
 guis reiicitur, sic ut acres quidā prauiq; cibi, uel inedia, uel acris ex capite in  
 pulmonē destillatio præcesserit. At si os alicuius uenarū ad apertum sanguinē  
 emittat, nullū quidem ex prædictis, præterq̃ plenitudo interdum præcedit.  
 sed uictus humidior calidiorq; balnei immoderati usus, calidi nimis loci in  
 habitatio morbum facere uidebitur, ut neq; inflāmationes, neq; febres labo-  
 res uel torserint: sicut in iis euenit qui exeso uenarū corpore, *phlegmatici* appellāt,  
 sanguinē expuunt. Imò contrā leuius faciliusq; agent (ut uerisimile est) euacua-  
 ti. At si hæmorrhoides, aut mulierū menstrua, non responderint: etiam  
 periculis erumpens sanguis subtrahet. Idem uero hic pariter iis qui plenitū-  
 dinis causa per rupturam uacuantur, satis ad ualitudinē proderit, nisi ex ul-  
 cere, aut immodica uacuatione noxam senserint. Quæ uero exesis uasorū tu-  
 nicis sanguinis fit euacuatio, nunq̃ cōmodè cadit, facitq; ualitudini. Quod  
 si per uomitum excreetur, clarum est eum ex stomachi aut uentriculi regi-  
 onibus procedere. In quibus & per anū proritatus nonnunquā uacuat. *20*  
 Tussis sanguinem extundit ab instrumētis respirationi dicatis. Iam uero si  
 spumans & subalbidus ex interualloq; reiicitur, ut dolor absit & pressio, ex  
 pulmone ferri notum est. In quibus temporis spatio, febris sequetur conti-  
 nens, partibusq; quibusdā potissimū corrosis, nonnihil etiam pulmonis  
 substantiæ, aut guttur, aut uena egeretur. Notus certe quidam mihi est ex iis *25*  
 qui sanguinem è pulmone reiiciunt, temporis processu maxima cum tussi  
 & sanguinis copia, calculos quatuor aut quinque expuisse asperos tribulorum  
 modo, ad magnitudinem \* cicerum trium aut quatuor, ac deinde dolore le-  
 uatus est: paulò post tabe consumptus interiit. Porro si pituitosa cum tussi  
 leuiore, uel sputo quoq; edantur, eaq; spumosa leuiaq; ex aspera arteria pro-  
 ducere scito: si ater sanguis & in grumū concretus fuerit, doloremq; in loco in-  
 tendat, ex thorace educi significatur, per pulmonem arteriam uel translatus:  
 qui uero cum sputo, ex faucibus per palatū educitur. Ceterū si quando à ca-  
 pite destillet, cum irritatione quadā & tussi editur, ut qui ad guttur defluat,  
 iterumq; sursum feratur. horū causa primaria est, acris plurima ex parte de- *30*  
 stillatio, uel capitis dolor, uel grauitas. Accidit autē nonnunq̃ per palatum  
 sanguinem uacuari, & propter hirudinem deuoratam, & alicui indidē par-  
 ticulæ adhærescentem. Verum de hac in libro de uenenis pertraetabitur.

## CVRATIO.

Quibus destillatio eruentum sputum concitat, uena protinus debet incidi, *40*  
 nisi uehementer acris humor destilla uerit, ac pro uirium modo sanguis de

\* Hoc uerbi  
 græce nō est  
 sed conijecio  
 tale quid de-  
 esse.

trahi. Extrema deligari, oleoq; ueteri calido, uel ficyonio præter caput perfricari. cibus adhiberi frumentaceus, cui succus alicuius austeri adiectus sit, Verbi gratia, Mali granati, pirorum, pomorum, uel illa eadē simul incoquatur. Dormituro ex pastillo diaelectru datur, tertio die mellis cocti memento delingitur. Quod si morbus longior hoc uicerit, capiti detonso medicamentum, quod ex fimo syluestrium columbarum cōstat, imponis, & tribus horis interpositis, balneo ægrum committis, sic ut caput nequaquā inungatur. Deinde ubi forbitionibus alueris, somnum capturo, theriace antidotū datur iterumq; die insequenti. Similiter totum corpus, præter caput perfricatur. huic autem ceratum ex rapfia, aut aliud quoddam iniicitur. Et rursus utendum forbitionibus. Quod si malum in uetustatem incidit, cucurbitula occipitio defigenda est. At si acris admodum fuerit destillatio, sanguinis detractio caueri debet. alimentis autem & præfidiis iis tum quæ supra, ubi de destillatione egimus, comprehensa sunt, tum quæ mox dicentur, utendum.

Qui ob frigoris iniurias sanguinem spuū, thorax illis fouēdus est remedijs, quæ calfaciunt ipsum & deficcant: quod præstat medicamentum dia dyo pereon, id est, quod duplici pipere constat, unā cum pastillo diaelectru exhibitum. At qui diruptis spiritus officinis, aut oris uenarum patefactis, sanguinem reiciunt, uenam iis secare conuenit, nisi sanguinis copia prorumpat. omnes autem quos hoc uitij premit, locis aëri expositis decumbent, lecto immobili figura sublimi, cauentes ne uehementer respirēt sonumq; edant, imponendaq; extrinsecus supra id quod dolet, sponsia ex tepēte posca. A septimo die lana succida cum rosaceo, uel myrteo, uel lentiscino, cui interim acetū, interim uinū austereum sit additum: si copiose effertur, farina pollinē, & mannam cum aceto superacomodamus, uel alumen, uel acaciam, uel malicorium, uel gallām cum aceto, uel palmulas cum polētis & malis cydonijs in uino austero decoctis. post hæc autem & emplastrum ex salicibus iniiciendum, præsertim ubi moderatior sanguis fertur. Per os aut hæc sumpta proficiunt: portulaca cōmanducata, benefacit. efficacior autē, succus ipsius eporus balaustiū, rubi fructus & flos, roboris fibrosum, & quod sub glandis cortice est. maxime uero cocto ipso utuntur, fagi & ilicis. præstantiora sunt, rheum, samia terra ad omnem sanguinis reiectionē. Item lemnia sphragis, lapis hæmatites in tenuissimum pollinem detritus cū succo mali punici, uel polygonii. pondus autem lapidis erit scrupulus unus. Composita medicamenta hæc profunt: pastilli diaelectru, dia coralliu, & qui ex spina ægyptia cōficiuntur. item aridū cōpositum ex terra samia, lēnia sphragide, corallio, symphyto, amylo omnibus pari modo. In his aut qui corrosis partibus expuunt sanguinē, idq; potissimū, ut destillatio præcesserit, & opii partē semissem adiciamus. Insuper medicamentum his facit, quod samia terre, agerati lapidis, lemnia sphragidis, æquas portiones capit: duobus cochlearijs potum ex duobus arnoglossæ succi cyathis, ALIVD. Lemnia sphragidis drachmas sede-



⊙ *Vulgatū  
exīplor bē-  
bet, cochleas  
pennū.*

cim, famiæ terre drachmas octo decim, amyli drachmas octo, sarcocollē dra-  
chmas quatuor, gummi drachmas duas, aridi, quod xerion medicamentum  
dicitur, cochlearia ⊙ undecim, cum decocti palmularū cyathis duobus. Sor-  
beant aut poscam frigidam, uel palmularū, uel pomorū, uel pirorū, uel pam-  
pinorum uitis, uel eiusmodi cuiusdam decoctum. Cibus sument, si uires re-  
quirant, ad secundā tertiam uel horam: sin minus, circiter quartam. Panis sit  
lotus ex aqua frigida, uel alica, uel chondrus cum quodam succo refrigeran-  
te, puta mali granati, uel myrti, uel omphacomelitis, uel oua sorbilia, uel ali-  
quod ex lacte bellariū, cum quodam astringēte. Inter olera seris, cichorion,  
amoglossa cum oleo immaturo acetoq; incocta. Ex fructibus fugacibus po-  
ma, pira, mēspila, malum granatū, corni fructus: potus erit, si febris careant,  
uinum aquosum, modicū: si febris adest, ex prædictis quædam potio, uel hy-  
dromelum cibariticū. Potrō qui uomunt sanguinē, iisdem sustentādi sunt,  
sola hac cura adhibita, ne crebro cibū sumant: quippe ex facili curantur, qua-  
tenus auxilia etiam quæ bibuntur particulis ipsis sanguinem fundētibus ex-  
aduerso applicentur. At sanguine in uentriculo grumi instar concreto, coa-  
gulum potandum est, maxime leporinū, aut lixiuium ex ficu cum aqua, uel  
thymū, uel thymbra cum aceto, uel etiam ex lacte scissili uacuari debēt, aut  
ex aloē. Rursus qui per palatum sanguinē excreant, gargarizabūt ex astrin-  
gentibus, fronti; & capiti admouēda sunt quæ ex naribus sanguinē funden-  
tibus accommodantur. Hæc eorū qui sanguinē expuunt curatio est, quā sum-  
ma obire cura conuenit propter imminens ex immodica uacuatione peri-  
culum: siquidē copiose uacuatus sanguis, quemadmodū in his qui iugulan-  
tur, mortem infert præsentaneā: si affectus remanet, in tabem transire mina-  
tur. Postq̄ igitur omnia, ut postulat ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluor  
substituerit, uires ipsis nutriendæ sunt roburq; adhibendum, ac pisces & recē-  
tium porculorum petunculi ac cerebella huc faciunt: corpus perfricari de-  
bet. inimica sunt balnei frequens usus, & uini potio, ira & uenus.

#### DE PURULENTIS ET TABE QUAE PHTHI

sis dicitur.

Cap. XXXII. 30



**P**urulenta excreatio quam Græci empyema nominant, in uacu-  
is thoracis regionibus, uel membrana quæ costas succingit, col-  
ligitur: interim propter sanguinis eruptionē, ulcere ad cicatri-  
cem nō perducto, quod etiam tabes statim comitatur, si ex pul-  
mone fiat reiectio: interim ex inflammatione, ubi abscesserit, ruptaq; fuerit:  
quemadmodum & in laterum doloribus, quam pleuritidem uocāt: uel pro-  
pter confluxum & capite manantem. Hæ notæ pus collectum testātur, gra-  
uitas pectoris, tussis ualida, siccaq; cum dolore, aliquando etiam cum humi-  
ditate ob quam releuari quoq; uidentur, febriculæ per initia affligūt, langu-  
idæ, inordinatæ, & ad iudicandum difficiles. postquam uero abscessus ad uo-  
micam inclinauerit, uehementius cum quodā horrore febricitant, ac in ser

monis proprietate conturbantur, offendunturq; spiritu. Rupto abscessu, pus educitur, nunc purum, nunc fœculentum, nonnunquam sursum abscessus erumpit: quando etiam periculosior est: nonnunquam infra. Atq; ea quæ inferius tendunt, partim in uentrem & intestinum transsumuntur, 5 partim in uescicam traductione per uasa quædã administrata. semper autem febri hæctica laborant, quoad sursum omnia fuerint educita. In quibus nisi summa adhibeatur diligentia, protinus saniosa illa collectio, tabem ac erisit, dum pulmo exulcerationem sustinet. Simulatq; uero phthisis confirmata fuerit, genæ liuescunt, sudores in fronte, ac ceruice defluunt, carnes consummuntur, ungues curuantur, pinguesq; & exalbidi, uel pallidi 10 apparent. Malo iam uincente, uenter turbatur, præcordia sursum conuoluntur, sitis ipsos magis conficit, cibiq; fastidium urget, & id quod sursum uergit uehementer, fœdi odoris est.

## C V R A T I O.

Primum igitur puris concoctio adiuuanda est, fomentis per spongas, & 15 cataplasmatibus, ex hordei farinis cum ficis pinguibus incoctis, resina modica, columbarum fimo, nitro, & hebisco. Rupturam uomicæ promouet etiam sani lateris incubitus. mulsæ autē sorbitio interposito tempore, & prisinæ cremoris cum melle. Valētiores, bibant decoctum quoq; hyssopi, & thymi cum melle. opitulatur rupturæ, & salforum esus, & catapotia hueræ 20 diacolocynthidos dormituro data. At ubi pus excerni cœperit, iterum dabitur hyssopi, iridis, & dulcis radicis, decoctorum in mulsa dilutum, uel dulcis radícula cum sisamo detrita. Item pollen, mulsa & oleo incoctus super accommodatur. Quod si ulcus curationi sit rebelle, composito utendum est, puta medicamento ex marrubio, simplici & composito. item eo quod 25 eruis constat, necnon dodecatheo & phloxeno appellatis. Verum in tabem quæ phthisis dicitur decidētib; porra capitata, quæ chondri & prisinæ iure contrabuerint, exhibentur: quæ simul per se bis cocta offeruntur. Potus, aqua cœlestis erit, atq; mulsa inde confecta. Extrinsecus applicantur per initia, ubi conquierit malum, cataplasma ex semine lini & pollinis 30 decocto, scœnugræci, uel maluæ, olei, mellis & foliorū altheæ. Inde tempore quodam intermisso, ad cetata ex butyro, cyprino, laurino, & iride transitus est. quin & emplastri Mnasei usus conducit. Verum si thorax fluxione infestetur, medicamentū ex salicibus confectū recte imponitur, atq; superius in purulentis simplicia dicta, nonnullaq; composita ipsis propinā 35 tur. Tussi uero grauiter affligente, thymum, hyssopum cum succo radiculæ dulcis melle discocto excepta, formataq; sub lingua tenenda dantur. Cæterum conueniet ipsis & antidotum Mythridatis, diebus intercedentibus: sic quod uiperis constat. Optimum uero auxilium est, & boli armeni portio. Item Esdræ antidotum, nihilo prædictis minus proficit.

40 DE LATERALI DOLORE, QUI  
pleuritis dicitur. Cap. XXXIII.



Leuritis, qui nobis lateralis dolor appellatur, proprie inflammatio est mēbranz, quæ costas succingit. Huic accedit spirā di difficultas, tussis, febris continua, dolor à summa humeroꝝ cōpage, ad extremas costarū cartilagine pertinenēs. Sed pleuriticus morbus à iocinoris inflāmatione, in qua etiā oīa modo comprehēsa apparēt, his notis discernetur. Illi nanq; dolor pūctilis adest, tussis aliās sicca, cum & crudus morbus significatur, aliās cū sputo, quod humoris qui morbu facit, index est. Rubrū siquidē & cruentū editur, cum sanguis superat. Flauū uero & suppallidū, cum flaua bilis: quemadmodū rursus albū, & leuiter spumofum, cum pituita. ob melancholicū succū nigrius: pulsumq; durum & ferræ modo asperū obtinent. Iocinoris autē inflāmationi, neq; pūctilis dolor, neq; pulsus adeo durus superuenit, uerum tussis perpetuo sicca & quæ nihil emolitur, male habet: facies colorē, decoremq; amittit. At quibus laterū morbi ex musculorū exteriorum inflāmatione creantur, qui proprie pleuritici non sunt, iis sine tussi, sine sputo, ac pulsus duritie, tactu leniter locus affectus indolefcit: atq; si tumor purulētus non fuerit discussus, ad exteriora post sectionē prorumpit, cum pleuritis quæ inflāmationi membranæ costas integētis, fertur accepta, eò non euadat. Illa nanq; nisi uel extra, uel intus, purulenta colluuiēs, empyema dicitur expurgetur, multo citius in peripneumoniam degenerat.

## CVRATIO.

Itaq; si dolor ad iugulū usq; peruenit, remediū est sanguis dimissus. sin autē ad præcordia descendat, purgatio. Recentiores autē omnibus uenam incidunt, ueriti, ut opinor, turbationē, quam purgatio solet accersire. Quod si uires non patiantur, neutrū facere oportet. Clysteribus acribus utēdum: post illos, si dolor fuerit tolerabilis, aqua mulsa, & ptisanæ, uel chondri cremor propinari debet. Vbi morbus inclinauerit, porrū cremoribus recte iniicitur, uel calamynthæ, uel pulegii, uel cnidi semen, cum melle delingitur. Porro uehementēs dolores à corporis uacuatione leniēdi sunt lana calēte, aut sulphurata imposita, aut etiam fomētis ex milio, aut surfute per sacculos adhibitis, aut ex aqua calida, aut oleo in uesicula. Lanāsque succidas imponere utile est cū oleo & uino ex marina præparato. Vel sal iniicere, uel cataplasma quod feminib<sup>9</sup> constat ex discocto chamæmeli, althææ, uel scorū pinguiū, iridis, absinthii, mellis modico cū oleo nardino. Quar to die cibi erūt sortitiones cū mellis momēto. à septimo autē linētus ex amygdalis, & cnidi semine, melle contritis dabitur, uel eclegma quod ex butyro & melle coctū est, utendūq; medicamento ex melle cocto, quod quia sub lingua tenetur, Græci uocāt hypoglotida. Epithemata conueniēt tū quod à graui odore dyfodēs nūcupant, tū quod cōstat samplucho. Itē emplastrum pereganera dictū, locis dolētibus utiliter accommodatur. Præterea ad curationē bulbi cum axungia costi frequenter fuerunt abunde.

Aluo iniici debet ab inferioribus partib<sup>9</sup> medicamē, ex butyro & terebinthina. At efficacius eclegma est ex fructu piceæ, amygdalis amaris, lini semine, nucleo pineo, & amylo æquali portione cū melle. Quos torquēt uigiliaz, medicamē ex papauete salubriter delingūt. Ex antidotis & Athanasia, & aliis ad hoc cōpositis utemur. Post quartumdecimū diem, si malū remanet, cucurbitulę ip̄sis admoueri, tenuiorq; seruari uictus debet. Dein de morbo inclinante balneo æger credetur, frigus uitabit, firmiore tectabitur cibo. At si inflammatio membranz costas integētis non discussa, in pus transire uideatur, supra commemoratis utendum.

## AD LATERV M DOLORES SINE FEBRI.

Laterū doloribus sine febris, bdelliū medetur, & costas, & brassicę caulū combustarū cineri adipiū mixta. Nam id medicamētū affatim digerit.

## DE CORDIS AFFECTIBVS. Cap. XXXVIII.



Ordīs affectus si quidē primario accidit, omni destitutus me dicorū auxilio, in maturā mortē præcipitat. nēpe cū inflammationē, erysipelata, & intēperies calidas in acutissimis febribus ip̄sum experitur, itē sanguinis profluuiū ex sinistri uētri cūli uulnere. At si cōsortiū lege afficiatur, cerebro, iocinore, ore uentriculi laborante, tū si obtristitiā, metumq; & alias plerasq; causas, syncopen appellatam sustinebit, in qua subito uires uniuersę collabūtur. Notā ip̄sius sunt, resolutio, animę defectus, pulsuū paruitas, extrema frigida, & in sudorem prorūpētia. Quę, inquā, syncope, si ualida est, medicinā loc<sup>9</sup> nō est. Si uires adhuc tantillū constāt, aliquādo ad sanitatē recursus est. Itidē ualentes cordis palpitatiōes sæpe ex sanguinis in eo cōcepti copia, aut feruore contrahūtur. Idē uero cor si incaluerit, magnā crebrāq; edit respirationē: si refrixerit, exiguā & rarā. Sed quomodo cordis syncope possit emendari, secūdo uolumine, inter ea quę febribus superueniūt, sumus executi. Tantarū uero hic adiciendū est, si casus euincit ubi extrema perfricata fuerint, inunctaq; puluerē ex uiz pauimēto alia uē refrigeria particulis sudore distatis iniicere prodest. tū myrtus detrita, uel cimolia creta, uel electrū, uel malicoriū cū māna, uel terra samia cū gūmi recte inducetur. Extremis autē frigētibus aduscq; inguina & alas sinapi, uel pyrethrū, uel a darce imponitur. Cibus erit panis ex aqua, aut uino frigido tēperato, suū ungula, articuli, rostra, alz, oiaq; frigida. Capiti fronti; omphacinū, aut astringens ali

## DE PALPITATIONE CORDIS.

Novi, Galenus inquit, qui annis singulis uerno tēpore, cordis palpitatiōe affligeretur. Aduersus quā uenę sectiōnē trienniū expertus cōmodā quartō anno sanguinē prius misitq; morbo corripereetur, atq; ita secutus fuit: eoq; modo multis subsequētibus annis factitauit, & cōueniēti uict<sup>9</sup> ratio

ne usus est. attamē & hic ante senectutē, fato functus est, quēadmodū alii quoq; oēs, nonnulli in febribus acutis subita syncope oppressi similiter interierūt. alii ipsos; etiam citra syncopen, ueluti a poplexia tētati. Complures repente diem obierunt, annos nati minus L. magis uero XL.

DE MAMILLARVM AFFECTIBVS. Cap. XXXV. 5



Ac à partu sæpe casei modo coactū mamillis inflāmationes parit. Utendū igitur per initia est hisce rebus. spongia mollis posca egelida imbuta, expressaq; loco fasciis superaccommo-  
datur: uel palmulę eū pane ex posca contritę, uel ouo toto utendū est cū rosaceo, & cerati momēto, uel alumine, psyllioq; cū coriano, 10  
uel porpūlaca delinitur. Vel lapis pyrites tritus cū cerato impositus illigatur. At distēione oborta, uel lacte in grumos cōcreto, panis ex hydreleō, aut mulso iniicitur. Aut panis cū perdicū herba uiridi simul & cerato bis quotidie, aut lomentū eū hydromelite, uel sapa applicatur. Quod si uero grauitatē non tolerauerint, superfusione utendū est ex dulci oleo calente, 15  
per lanas delicatesiores. Forus aut adhibēdi ex fauore calidę aquę, uel decocto scēnugręci, uel altheę, uel apii feminis. Delinare uero mamillas conuenit polline farinaeco eū semine lini, aut scēnugręeo cum hydromelite, aut selamo quod cū melle aut butyro sit leuigarū. Ceterū lactare cautio est. nā maior per exuētione materies illuc citabitur. Inclinate aut inflam- 20  
matione, cerata hæc recte inducūtur, beta oleo incocta quoad intabuerit, ipsa quidē proicitur, oleo aut cerę modicū iungitur, usuiq; est. A L I V D.  
Quorū crudorū lutea decē, cerato miscētur, cui uncie duę & semis cerę, rosacei uncie quatuor sint adiectę. Postq̃ rudicula agitaueris, munię quantū recipere potest inditur, & rursus ubi permoueris, utitor. Porro ad mamil- 25  
larū duritias, facit & medicamentū ex melle: tū oīa molliēdi facultate donata. Cū tumor in abscessum uertitur, iis utēdū est, quæ in parotidibus cōprehēsa sunt, itē illis, quæ, ubi de abscessibus tractādū erit enumerabimus.

ARCHIGENIS DE EROSIONE MAMILLARVM cum malignitate. 30

Vini Adriani boni sextarii uiginti, xhus, quo coriarū utitur pōdo libra, cupressi pilularū tantundē, gallæ immaturę nigrę pondo selibra, cassiæ tantundē. Contusa uino diebus decē commadeseāt, deinde mota cupressi rudicula, ad dimidias fere coquūtur. atq; tū herbę proiciūtur, suę cogtur dū mellis spissitudo fiat, deinde uitreo uase recōditur. In ulcerib⁹ depascē- 35  
tibus mero utitor. Si aut crassius fuerit medicamē, uino liquādū est: ut applicetur mamillis depastis, auribus suppuratis, gingiuis cū infirmitate humētib⁹, intestinorū torminibus. Idē uel o dolores etiā lenit, lacte dilutū. Alię māmārū exulceratiōes cōmunē reliqs ulceribus, curationē recipiēt.

QVOMODO MAMILLAE CONSERVENTVR. 40


Cuminum cum aqua tritū mamillis illinitur, deinde spongia extrinsecus

imposita, ex posca pectus cinctura stringito, à tribus diebus cumino deposito, mamillis florem bulborum cum melle superaccomodato. Et deligatum rursus triduū finito, idq; ter mēse facito. ALIVD. Cicuta in pollinem detricta, ad nouem dies imponitur: spongiaq; extrinsecus, sicut cōprehensum est, pauculis diebus interpositis idem facito. Quin & Naxiæ cotis detrimētum, uirginum mamillas conseruat, tueturq;.

## AD FOEDVM AXILLARVM ODOREM, §V-

dationesq;.


Cap. XXXVI.

10  Luminis liquidi partes duæ, myrrhæ pars una. Vino dissolutis utitor. ALIVD. Molybdenam combustā, uinoq; odorato extrinctam, ex uino terito, myrrhæ momētum iniiciens quo ad fordiū fiat spissitudo, ac utitor. ALIVD. Argenti spumæ pōdo denariorum sedecim, myrrhæ pondo denariorum duū, amomi pondo denariū unius. uino excipiantur. ALIVD. Aluminis liquidi drachmæ octo, amomi, 15 myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachmæ quatuor. uino leuigatis utitor.

## DE STOMACHI, PRAECORDIORVM ET

uentriculi affectibus.

Cap. XXXVII.

10  E cibi fastidio quod febribus superuenit, grādi fame, quā Græci bulimō uocāt, canino appetitu, stomachi imbecillitate, animi defectu, insuper siti, singultu, nausea, & syncope, libro superiore ubi de febribus tractatū est, abūdē differuimus. quare de eisdem rursus dicere oportunū non est. At inflāmationes oris uentriculi, & iocino 15 ris, astringētia misceri desiderāt. Nam si solo relaxāte prēsidio curationē tentes, uitæ periculū intuleris. Ob quā causam, siue oleū fuerit quod supfundis, siue cataplasma, rectē adiicitur astringēs aliquod, uerbi causa, absinthii, uel nardinū unguentum, uel melinū, uel cydoniū incoctum. Ceratū uero eius notā est quo subinde utimur, ceræ candidæ uncia, per astatē drachmis septē, 25 aloës, mastichæ, singulis denariis, olei omphacini, uel melini, & nardini in usu quantū ad spissitudinē satis est. Sin maiore regrat astrictiōne tāta stomachi 30 imbecillitas, ut ne eibis quidē sit retinēdis, rectē miscetur & omphacini drachma, aut absinthii fueci æqualis mēsurā, & tertio ad hanc hypocistidis, cennathæ, & rhus succi. Deinde ceratē modus adiūgendus est, qui aliorū medicamī nū numero proportionē respōdeat. Quod si inueteraseit inflāmatio, indure 35 scitq; tūc uaria magis applicare oportet. tū ea quæ ex aromatis nōnihil, & emolliētibus digerentibusq; cōtinēt, cuiusmodi est quod philagrianū, & quod ab odore grato iūuāt dicitur. Itē quod ex meliloto pręparatur, & uiridis iaspidis torques à collo suspensus, ut stomachum contingat magno est præsidio. In calida autē stomachi ac ardēte intēperie sic ut eius resolutio simul inuaserit, uel anima deficiat, uel quoddā cibi fastidiū urgeat ex quacunq; tan 40 dē occasione pręterq; febris, aqua frigida cū acoris succo propinatur, uel maiorū cydoniorum decoctū, uel pāpini uicis, uel feminis cucumis: uel puluis

cū frigida. Verū stomacho uesticā aqua frigida repletā, uel cucurbitę semina imponito. Catapotia quę siti restinguendę sunt, danda, ut supra de siti à nobis dictū est. Porro medicamen quod stomachū cū infirmitate humentē refrigeret confirmetq; istud est: Rosę uiridiū folioꝝ drachmę sex, dulcis radicis succi drachmę quinę: nino dulci excipiunt, & ut sub lingua teneri possint, formātur. Ceterū in quibus crassior pituita calefieri incidiq; desiderat, hoc medicamentū proficit: Marathi radicis corticis unciaz duę, aceti sextarius unus & dimidiū, aloës quadrās, mellis pondo quatuor. Radices cū aceto coctę exprimunt abiiciunturq;. Mel aut inditū ad spissitudinē usq; coquitur, & tunc aloē trita inspergitur. Tria huius cochlearia cū aqua sumuntur: quidā uero sine aloē ipsum preparāt. iam uero medicamentū dia calamithes his idoneū est. Quibus autē cibus accessit, coriani seminis, drachma polentę modo formata cōmodē bibitur, uel mastichę cochlear, uel lactucz albę seminis cochlearia duo. Compositū autē hoc est: Piperis pondo drachma, anethi seminis pondo drachmę tres, cumini pōdo drachmę quatuor: trita cochleari uno, noctē sub somnū uino tēperato prębētur. Porro in quibus atra bile uitiosus est stomachus & inflatione laborat, spongię in accessionibus aceto acerrimo imbutę applicentur. Deinde si dolor remāserit, alumen cum are trito, melle exceptū admouetur, sereos succus bibitur, uel mēta potui inspergitur. Si flatibus turgēt stomachus, & distēditur, calaminthes decocto, mediocris mellis piperisq; mensura mixta exhibetur. Ad stomachi peruersiones conueniūt mali granati acidi nucleos; succi partes tres, mentę succi pars una. Vbi coxeris quoad in unitatē coierint, ante cibum mystērū unum dato.

#### AD STOMACHI SALIVAM.

A cetū scillites, aut halmadaꝝ oliuaz cremor, aut sumitatis oleę decoctū per clysterē ab inferioribus immittitur, aut etiā minimū ex ipso deuorat. Inter omnia pręsentissimū est, aloē aqua diluta. Adeos autē qui cibū nō continēt, quos ueteres ppriē stomachicos nomināt, scēnugrę ci farina mellis mixta, & maluę semē tritū aridū illinif: cceratū uero ex cera, irini olei fęce & castoreo.

#### DE CIBI FASTIDIO QVOD GRAECI ΑΝΟΡΞΙΑΝ VOCANT.

Fastidiū, quod anorexia dicitur, est, cum stomachus intēperie uitiosus, aut humorū redundantia cibos auersatur. Calidā intemperie testantur, sitis, nīdorosi oletosiq; ruētus, si cibus prater uoluntatē sit assumptus. itē si frigidi ora potius & elaboratu peruicacia, hac detenti queant cōcoquere. Frigidam contraria indicant: neq; enim in hac agri sitiunt: neq; frigida sustinēt, & acida nonnunq; eructant. Qui humorū uitio cibum respuunt, partim ob tenuitatem ac rosionem illorum ita laborātes, uentriculi demorsu torquentur, nauſeāq; magis & siti consciuntur. Quibus autem humores cōputruerint, interdum uē etiam febricitant. At quos crassi uiscoliq; succi male habent, uē nec rosionem uentriculi, nec sitim experiuntur omnino. communiter autem omnibus superuenit nauſea. Porro si in uentriculi sinus humores se



receperint, etiam ex hisipis uomitus erumpit. si infarcti tunicis adherescunt, etiam eo quod ingererant, sursum educto, nausea solum, non uomitu premuntur, præterquam cum cibos assumpserint. Calida intemperie adfecti, refrigerante uictu curantur, præcipue qui ex aceto assumitur. Panis igitur posca imbutus esui, ipsaq; posca potui datur. Item oxygala & quam Romani melcam appellant, obsonium ex lacte intybi & lactuca, interim etiam aqua frigida, omniaq; mediocriter iuxta præsentis intemperiei contrarietatem. Nam immoderatus horum usus, non modo non iuuat, sed etiam sæpe insanabilem morbum efficit. Frigida intemperie laborantes, contrariis medicari oportet, uino ueteri & condito, hydrogaro cum anisi, ruta & petroselini decocto, iam pipere ex aqua calida communi, uel etiam ipso medicamine, quod inscribitur dia trion pepereon, uel cui nomen est dia calaminthes. Da bis etiam non nihil theriaca ex uiperis confecta, quæ nec ipsa, fastidio ob humorum copiam laborantibus inidonea est. insuper allia his & alimēti & medicaminis nomine conueniunt. Sin aut humorum abundātia fastidium excitarit, renues, mordacesq; aut uomitu, aut per aluū euacuabis. facilem itaq; uomitum reddit aqua temperata, uel mulsa dilutissima præbibita. Satius fuerit, si ante hæc, humectātia exhibeas alimenta, ueluti ptisanæ cremorem, uel quorum lutea. Ceterum quomodo ex facili uomas, priori libro est expositū.

At si difficilius æger uomat, præstat materiam ad aluū elicere copiosiore temperatoq; alimento prius humectatā. Purgans uero medicamentum esto, uel ex aloë amarum, uel ex malis cydoniis preparatū, cui adiectū sit aliquid scāmonia, uel quod constat rhodomelire. Si uero citra scāmoniam fieri possit, melius feceris, eo quod illa stomachū offendar, aloë potius copiosiore ipsos euacuās. Quibus crassi humores uiscosiq; fastidii authores sunt, medeberis extenuādo ipsos incidendoq; tū oxymelire, tū iis quæ ex hoc & ex muria componuntur, ut cappari, oliuis, sinapi & similibus. Non inepta sunt his, & quæ ex frigida intemperie laborantibus consulimus, maxime post uacuationē, quæ ni mirū fiet oxymelire Iuliano. Extrinsecus utēdum quæ fouere stomachum & corroborare queant, item unguentis & malagmatis, qualia sunt potissimum quod dicitur dia omphacus, & Marciatum aliaq; consucta unguina: insuper epithemata, Baium & euodes huiusq; notæ reliqua. His addentur exercitia & frictions ualentissimæ. Ad eos qui frigidi humidiq; humoris, uel talis intemperiei uitio difficulter concoquunt, cibumq; respuunt, ea quæ ex malis cydoniis confiunt, pertinent. Dico autem quod uocant meloplacuntium, item quod ex malorum succo præparatur, tum quod ex carne eorum constat, præterea ex citrio confectum. Malagmata uero Marciatum ex immaturæ uuæ succo. itē Baion, Polyarchion atq; his finitima. Sin ulcus fuerit in stomacho, aut uentriculo, omnibus acribus & cibis & potionibus abstinere oportet, uti uero medicamentis quæ leniunt, puta sorbitionibus absq; oleo, tum iis quæ ex amylo, terra samia, lēnia sphragide & lacte, uel quæ melle paucissi-

mo conficiuntur, ut quæ purgēt citra roſionē. Epithema facies ex palmulis & cydonior: carne & polenta. Ceratū ex melino, uel roſaceo cum ammoniacō & thure. Ad hęc Nelei epithema conducit, & emplaſtra ex ſalicibus, & iceſſion. Noſcunt ulceris ſunt, uomitus ſanguinis, uel puris, uel etiā ramentorum. AD SOLVTVM IMBECILLEM QVE ſtomachū, ut cibum nō modo non cōcoquat, ſed etiā euomat, ualet hoc: Aloēs, maſſuchę, maſtiches, ſtyracis ſinguli ſextantes, abſinthii triēs, cenanthę quadrans, gleucini ſelibra, melini quadrans, uini quod ſatis eſt, Nonnulli etiā cypheos & roſarū ſingulos ſextantes miſcēt. Hęc in leuorē redaſta, purpura uel lana excipiunt, ac ſtomacho imponūtur. Quidā cerę ſelibrā adiungentes, epithema ipſum faciunt.

AD STOMACHI AFFECTVS, QVI ILEON REPRÆſentant, hoc eſt, uehementes & conuulſorios dolores.

Optimē facit paſtillus Amazonū: inuenies autem huius ſcripturam, tum aliorum ad ſtomachum compoſitorum materiam ad calcem libri de medicamentis compoſitis explicatam.

#### DE FLATV VENTRICVLI.

Cap. XXXVIII.



Latus in uentriculo generantur, humoribus uel cibis languida caliditate in uapores diſſolutis: nam refrigeratio hoc nomine quod extenuare ac diſſoluere non ſit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum non tantū extenuet, ſed etiam diſcutiat, flatus generationē impedit: minor uero caliditas diſſundit quidē & tranſmutat alimentū, uerū minus quā opus ſit, unde flatus excitantur: quare calidis eos medicamentis extenuare conuenit, cumini ſemine, & apii, & ſpōdylī, & dauci, in oleo decocto. Vbi uero adfectui adeſt frigidity, ruta, bacea lauri, nigella & marathrum oleo incoquuntur, miſceturq; bitumen & oleum laurini. At ſi inſlāmatio dolores comiteſ, in uicē caleſcētiū laxatibus uteris, anethū decoquēs, cui gallinæ anſerisq; adipē adicias. iā uero polli faſciculus, uel calaminthę decoctum cui mellis pauillū cum piperis drachma ſit iunctum, flatibus inſeſtatis auxiliatur. Hęc itaq; dum uehemens dolor inciderit, adhibenda cōſulo: dum mediocris, etiā formēta ex milio ſufficiunt. Ceterę cucurbita bonę magnitudinis umbilicū undiq; cōprehendēs toto ſymptomate frequenter uniuērſim liberat, caſtoreūq; ipſis prodeſt, tū ex poſca potū, tum extrinſecus eū oleo ſicyonio appoſitū, uel ſi cum tormine flatuſ incidunt, medetur. Item talus ſuis cōbuſtus potuſq; tormina & flatuſ tollit. Idē facit ariſtolochia rotūda. Iam uero aduerſus dolores flatuſoſos ex uentris obſtructione, uel craſſitie, uel perſiſtione obortos, uinū meracius à cibo ſumptū proficit. Vbi ſomnus acceſſerit, etiā ex toto leuat affectos.



#### DE CHOLERA.


Cap. XXXIX.

Holera eſt immodica uentriculi perturbatio ſupra infraq; erūpens: Ciborū cruditas apparet, quæ nōnunq; ex magna alimentorū prauitate, interim ex uitioſorū humorū ſuperfluō trahit

originē. Si igitur nauseabundus æger est, & turbatur, cibus etiānum crudis in  
 uētriculo manētibz aqua egelida propinari debet, deinde uomere oportet,  
 digiro, uel pinna ori indita: itē a lui ductiōe adiuuāndus est stomachus. Vbi  
 uero hæc exinanita est, conquesce, & præcordia oleo dulci cū uini modico,  
 5 uel mastichino uel etiā nardino si hyems fuerit, fouere conueniet, somnūq;  
 accersite. Vbi iā exacta apparuerit cōcoctio, balineis & probi succi cibo utē-  
 dum est. At si inanitio fiat immodica, sufficiēt quidem initio uel ea quę secū  
 do libro de uētris perturbatione cōprehensa sunt. Sin autem perseueret cor-  
 ruptio, uēter concidar, pulsus minor dēsusq; euadat, cataplasma adhibendū  
 10 ex palmulis cū ænanthe & acacia, itē hypocistidis & malicorii succo. Adhęc  
 offerēdus est potui aquę mediocriter frigida cyathus. Præstiterit rosarū, uel  
 ænāthæ, uel rhus, uel ex uire capreolorū decoctū, uel mali granati acido dul-  
 cis succus, cui mēta pauxillū sit adiectū. Porrō si excremēta fuerint aciora,  
 15 uexetq; ardor & siris, cucumeris semen cū aqua cyathis tribus, tū in trybi, & la-  
 ctuce in posca coctę exhibeātur. Verū si fluxio sisti nequeat, uinū quoddam  
 austerum, potui dādum est: si febris absit, palmatianū, uel aminazum, uel spx  
 thites, uel omphacamelites: sin adsit, rethinum, uel myrtinū, uel cibyraticę  
 hydromeli potus cum mica panis, uel chondro, uel alica. At si respuant cibū  
 frumentacium, fugaces fructus mandent, mēspila scilicet, uel pira, uel mala  
 20 cydonia, uel punica: quod carnosum est & durum expuāt. Si ne his quidē au-  
 xiliis cibum retinent, extrinsecus contra uētriculum ipsum, cucurbita leuis  
 quā maxima admouenda est, mox cibo aliquo ex prædictis recreatio uirium  
 tentanda. Ad conuulsorias contractiōnes calida linimēta, oleo modico im-  
 buta musculis circumponere oportet, tum cerata liquida, quibus adiectū sit  
 25 aliquid castorei & sicyonii. Ante hæc extremæ partes aquę calidæ fomentis  
 nutriendæ. At si uigilia torquent, somnus iis quæ aduersus illas prodidimus  
 conciliabitur. Si uires autem non prohibent, etiā medicamentum dia coditō  
 ipsis propinabitur: ubi morbus inclinauerit, ad balneum deducuntur, cibus  
 ad tēctiōem, pulli gallinacei erunt, columbæ, uel suū petunculi, similia ue.  
 30 Alui profluuium, quod ciborum corruptela est, plerunq; sua sponte cessat.  
 Non autem citius alimentū ægri sentiunt q̄ absoluta fiat concoctio, & corrū-  
 pta euacuentur: sin autem remanent, iis quæ in cholera dicta sunt, utēdum.

DE LEVITATE INTESTINORVM QVÆ LIENTE-  
 ria dicitur, & cœliaco affectu.

Cap. XL.

35  Euitas intestinorum quæ Græcis λευκία dicitur, duplici conti-  
 netur discrimine: hæc ex summa intestinorum exulceratione cō-  
 trahitur: quorundam uerbō lienteria ex cicatricibus quas exci-  
 tauit dysenteria parte plurima, uel aliis oboritur fluxionibus.  
 Altera uero ex infirmitate & languore uirium, alimenta in uentriculo conti-  
 40 nentiū creatur: ea demq; cū cœliaca dispositione cōfunditur, misceturq;. Ete-  
 nim in hac languēte & imbecilla uētriculi facultate, nec coquūtur, nec dige-

runtur alimēta, sed cruda, humētia imperfectaq; reddūtur, alio continēter fluida. Verum in utroq; leuitatis genere celerius q̄ in cōliacis, quē assumpta sunt, egerūtur, tāq; intēsa est cruditas, ut alimēti assumpti genus apertē cognoscat: atq; hac nota potissimū à cōliacis discernunt. Itaq; semē lini cū palmulis ipsis illinet. Sūmē aut facit lentiscus, rubus oxymelite incoctus, cū ad est inflatio cuminū miscebitur, anethūq; & ruta: augescēte uero profluuiō adiungemus mala cydonia, alumen liquidū, acaciā, hypocistidē, gallam, uel quāzā, uel omnia. Cerata ex myrto cum uino quodā astringente. Epithemata calidiora quidē ex baccis lauri, & quod ex feminibus cōstat. Astringūt aut magis dia cēnanthes & dia gigarton, id est ex acinis malorū punicoz. Itē quod ad Antyllū authorē refertur, & erethrii mirificū: si morbus in uetusta tem incidat, etiā uentri rectē applicatur dropax & ceratū ex sinapi, ipsūmq; sinapi. Portiones conueniūt, simplices quidē, arnoglossē semen, uel lapathi, uel mali granati cortices, uel forba arida, uel immatura, uel acor siccus ex uua aminza, tribus obolis potus. Qui febris carent cū uini austeri cyathis sex: febricitātes aut cū aqua pluuiali sumūt. Porro alius arida gallinas, potui in sperfa, stomachū minus accendit, tum ea quē urinā citat: exēpli gratia, apiū, adiantū, similiaq;: epota deriuatiōē molīūtur. Composita uero sunt polyidz sphragis, pastillus ex electro, item ex spina aegyptia confectus, insuper elidiū appellatus, & dia spermaron. Itē hoc est prāstātissimū quod sequitur: lapathi syluestris seminis fescuncia, arnoglossz seminis uncia, hypocistidis succi drachmaz sex, gūmi uel acaciā drachmaz tres: excipiūtur cydoneoz ad tertias decoctorū liquore. **ALIVD.** Cumini, piperis, rhus syriaci, balaustii singulorū fescūcia, malicorii uncia, silphii fescūcia, aut xeris drachma potui inspergitur, uel oxymelite macerata dantur mane & uesperī. **ALIVD.** Myrti nigraz cochleare, eiusq; dimidiū, anisi, rosarū siccarū, cēnanthes, singulorū cochlearis dimidiū, phœnicobalanos uiginti, in pastillos cogiro, & drachmā unam cum aqua aut diluta uini portione porrigito iam theriace ex uiperis optimū his est prēsidiū. Cibis aut, si acris & biliosa sit deiectio, ex chōdro, oryza, alica & similibus erit: quibus cū astringens aliquod decoquatur, pirū, malum cydonium, mēspilum & id genus alia, item lac discoctū his proderit. Potus erit, aut uinum aquosum, renue, aut quoddam dulciarium. Sin autē pituitosiora excernunt, contrariis ipsis cibis adhibetur, nonnulla stomacho grata admiscuntur, anisum, cuminū, uel apii semen. Ad hāc lenticula bis cocta plerunq; ipsis profuit, cum aceto modico uel oxymelite commanducata. Præterea brassicę & ipsaz bis coctionē expertz. Præstat autem secundam ipsorū coctionem in posca fieri. Vinum assumetur uetustius calidiusq;.

## DE TENESMO.

## Cap. XLI.




Eeneismus interdum dysenteriam præcedit: sæpe uero & ipse solus paulatim generatus, definit. Est aut affectus hic, cōtinua & implacabilis desidendi cupiditas, qua nihil præter modica cru-

enta, uel muccosa egeritur, quæ totius propè mali causa est: facta quæ in longa-  
 none inflammatio, mollè cedentem quæ tumorè, quod œdema uocant, referēs,  
 hærentium illic excrementorum opinionem, & deiiciēdi ea desiderium, mo-  
 uet. Galenus memoria: prodit etiam calculum quendā in tenesmi constituti  
 5 one per anum fuisse excretum. Subinde uero obstructionem stercoris in  
 tenui intestino coacti, tenesmus secutus est, qui astringētibz quidem obtru-  
 rantibus quæ; remediis magis increuerit. Clysteribus aut acribus, nempe mulsa  
 cum sale, uel stercore excreto medicamine quod emolliat, per os assumpto;  
 ut damasceno, uel pinguibus ficis, mercuriali, sero lactis, confestim finitus  
 10 est. Quod si igitur citra talem causam, tenesmus obortus sit, conuenit inflā-  
 mationem, calida ordeï polēta & foru ex uino, oleo myrteo, uel rosaceo, uel  
 omphacino lumbis & pubi adhibito lenire, ad ea quæ lōganoni muscosa in-  
 hærescunt, mulsa indita aluo, muria quæ; sæpe demissa auxilii fuit abundè. Suf-  
 ficiunt autem salis drachmæ sex in aquæ calentis hemina. Porro dolores in-  
 15 tentiones quæ; leniuntur in fessu scenugraci, uel maluz, uel seminis lini. Alii autē  
 & horū in fessu frequenter usi sunt, rubi, myrti, cyrini, lauri, cupressi. & aqua sin-  
 gulorum uiridum portio in aqua coquitur: est autem Marelliū. Vbi alē  
 affligit inflammatio irritationes quæ; iniuci debēt ab inferioribus partibus cre-  
 mores frumentacei cum quodam astringēte decocto: oleum uero dulce in-  
 20 ditum retentū quæ; pluribus horis, dolorē soluit. Cum autem crebra desidēdi  
 est cupiditas, etiam agathidē spissamentis calidis sedi apponūt, aut fursures  
 calidas in fascia, aut spongiam, aut aliquid huiusmodi.

## DE TORMINIBVS QVÆ DIGITVR

dysenteria.

Cap. XLII.

25  Vm intestina intus exulcerātur, latini tormina, Græci dysente-  
 riā appellant, quæ nunc ex tenesmo, uel quadā ex prædictis alui  
 turbatione prouenit, nūc per se incipit. Excernuntur primū bili  
 osa, uaria: deinde subcruēta, postremo saniei similia, cuiusmodi  
 à mortuorum cadaueribus solent profluere. At quæ à bile nigra oritur, exiti  
 30 alis est: ut quæ cancerum cum exulceratione testetur. Si igitur ab exulceratio-  
 ne, cruenta stercori commista deiici cum labore & torminibus cernantur, ul-  
 cus tenuia intestina obsidere nota est, quod per os potissimum remedia desi-  
 deret. Sin autē syncerum stercus defeendat, crassa: quod enēmatibus magis ce-  
 dit. Porro cū multum sanguinis priuatim excernitur, affectū, cruentam dy-  
 35 senteriā appellant: quanquā interim sanguis etiā nigrior, quā naturaliter esse de-  
 bet, & splēdescens deiiciatur. Cum uero iecur alimentū distributū non pro-  
 bē cnohicit, & retētrix ipsius facultas, uel alteratrix imbecillisset, sæpe eiusmo-  
 di defeendūt ut recēs in eis caro lota esse uideatur: atque hāc iecorariā uocant  
 dysenteriā, de qua in iocinoris affectu agemus. Itaque utendū est communiter  
 40 iis quæ in cœliacis & aliis præter naturā excretionibus cōprehensa sunt. Pri-  
 uatim conueniunt lemnia sphragis, quæ etiam depascētem modo dysente-

riam perfanat, & pota & in aluum data, si intestinū multa prius fuerit abster-  
sum. Deinde muria & portulacæ succus porus cōuenit dysentericis: ipsaq;  
portulaca in posca cocta esui idonea est, item arnoglossum, rubi tū fructus,  
tum folia, & althææ radices decoctū, hippuris ex aqua, uel uino bibita, eiusq;  
succus prodest. Mori succus immanus exiccatus, atque hoc magis batina  
mora similiter resiccata. Siccāt etiā uentris fluore oua ex aceto cocta come-  
staq;. Satiū fuerit, si cōmista quibusdam ex iis quæ ad dysenteria faciunt, fri-  
xaq; esui exhibeas. Vtilissimū his est omphaciū, rhus rubens, eiusq; succus,  
malicoriū, galla, acini uuez, mespila, myrta, corni, cochlearū integro coctarū  
cinis. Cōpositū hoc bene facit: Cochlearū cinis partes quatuor, gallæ partes  
duas, piperis partē unā, in puluere redacta obsoniis inspgito, uel ex aqua, uel  
ex uino albo diluto potui dato. Generose iuuat dysentericos quos nondū ul-  
cus putre occupauerit, & canum ossa uorantiū sterces aridum, cum lacte ca-  
seato, harundine demissa assumptū. Mirificè profunt composita, nōnunq;  
ex ægyptia spina pastillus, interim Philippi, tum ex cornu ceruino, necnon  
ex seminibus pastilli: ad hæc qui ad Trigonē refertur. Iam catapotia ex ma-  
cere admiranda. maxime aut cōmendatur & hoc. Opii, croci, lycii indici, aca-  
ciæ, rhus, thuris, gallæ, hypocistidis, malicorii, myrti, aloës, æquales singulorū  
portiones, nempe sesquicrupulus ex aqua propinatur. ALIVD. Rhus dra-  
chmæ octo, gallæ, malicorii, singulorū drachmæ quatuor: cochleare unū ex  
uino datur. ALIVD. Rhus denarii octo, gallæ, acaciæ, gūmi, singulorū dena-  
rii duo, opii denarius. Exhibetur pōdo denarii ex uino temperato. Hoc autē  
eclegma ipsis cōueniet: Myrti nigræ, rhus syriaci singuli sextarii, palmæ the-  
baicæ duo pondo, malorum cydoniorū carniū pondo unum, mala grana-  
ta acerba cum ipsis corticibus decem, uini astringentis sextarii duodecim,  
ad tertiās decoquantur. Percolatis libræ sex mellis iniiciuntur: ad spissitudi-  
nem incocta delinguntur. Notū uero est cataplasmata quoq; ex astringēti-  
bus componēda, quorū materiam explicitā habes. Porro ençmata propter  
tenefimos infestātes, dysentericis ex usu fuerint. Cremor oryzzæ, uel chondri,  
uel huiusmodi alterius cum adipe caprillo uel hircino, tū ea quæ capite de  
tenefimo diximus. Si autē pus uel sanguis profluit, ex inferioribus partibus  
infundere oportet succū polygoni, uel arnoglossæ cū acacia, uel hypocisti-  
de, uel id genus aliquo. Sin urgeat fluxus, etiā impedimentū quoddam iniici-  
endum est: cinis lanæ succidæ, uel spongiæ recentis, pice liquida, uel sangui-  
ne bubulo imbutæ, uel cum alumine liquido cōbustæ, uel onidis succo. Huic  
& Andronis pastillus præstās est remediū, tum qui Musæ ascribitur, ac per-  
similes. Insuper subiecta collyria multò sunt in id efficacissima, in quibus  
dolor deiectionē comitatur: ubi uero ulcera intestina depascantur, quæ sædo  
excremētorum odore, tum putredine, tum quòd non statim per initia fiat,  
sed temporis interuallo agnoscimus, ençmatibus, quæ crustam inducunt  
utemur, cuiusmodi sunt pastilli nomine Faustiani, itē ex charta inscriptus,





purgabitur hiera amarescente, uel his catapotiis. Aloës, euphorbii, coeci  
gnidii puri, scammoniaz æquali singulorū modo. dantur duobus scrupulis.  
Victus utilis erit calidior siccioreq; per initia morbi, à cibo abstinebitur.  
deinde acia assumentur. Porra igitur ipsis exhiberi cocta cum condi  
to debet, apium, asparagus sylvestris, cruda allia, & maxime iis qui talibus  
non offenduntur, ipsumq; uero conditū portione panisq; cum ipso assume  
tur. Insecutis diebus etiā reliqua boni succi alimēta concoctūq; facilia dā  
tur, ut satietas cruditasq; uitetur. At si flarulentus spiritus doloris author  
fuerit, secundū clysteres qui status discutiant, portionesq; etiā cucurbitæ q̃  
maximæ cum flāma ac leues toti abdomini defixæ, frequēter abunde auxi  
lii præstiterūt. Porro cum inflammatio intestinū exercet, uena in cubito  
aperiēda est. Sin urinz difficultas distorqueat, etiā ex malleolo sanguis de  
trahi debet, & prædicta admoueri præsidia, præterq; quæ acia sunt & ualē  
ter purgant. enāmata uero quæ magis leniunt, item cataplasmata & super  
fusiones. Ad hæc in oleum descēdere cōuenit, cucurbitulasq; ipsis defige  
re, & ceratū abdomini applicare quod habeat ceræ quincuncē, chamæmeli  
sextantē, rosacei tantundē, lomenti semunciā, uitella ouorū quinq;. Hæc  
succo lini seminis soluūtur. Victus tenuis ac febricitantiū proprius ipsis  
conuenit, quousq; inflāmatio discutiat. Atqui si propter acreis roden  
tesq; succos dolirāt, oleum ipsis ab inferioribus partibus iniicietur, in quo  
sœnugrēcū decoctū sit, uel althea cum molli adipe recenti anseris, uel gal  
linæ, uel etiā cremore prisanæ cū rosaceo, uel succo quonq; lini seminis pro  
pinatur. Antidorū ex aloë amarū & balneis urendū ex dulci aqua, cibo for  
bili ex chondro, uel prisa, piscibus saxatilibus. In summa uniuersus ui  
ctus humidior erit & frigidior. Abstinendū acribus omnibus, cum cibis,  
tum medicamētis, fœtuq; ex asperginibus, item cataplasmatibus, uini portio  
ne & potissimū ueteris. Cum autē dolor excruciat, etiā iis utendū est quæ  
sensum obstupefaciunt, nam offendūt minus aliis huiusmodi dispositio  
nes medicamēta quæ tenues mordacesq; humores in crassant, & mediocri  
ter refrigerant. Puto autē colicum affectū, qui etiamnū in crudescit ex hu  
iusmodi cōtrahi humoribus, ut qui ab Italia regionibus incepit, in aliis  
autē multis Romanorū rei publicæ locis pestiferæ cuiusdam luis cōtagio  
simul grassetur. Quamobrē plerisq; in morbū comitialē, aliis in artuū re  
solutionem sensu incolumi, nonnullis in utraq; transit, ac eorū qui in com  
itialē morbū inciderunt, plures interiire. Ex illis uero qui in paraly  
sim, non pauci euaserunt, tanq; causa, quæ ipsum tentauerit, per crīsim fi  
nita. Sic igitur laborantes, medicus quidā in Italia curauit uictus quadam  
ratione parū fida, sed multū audaci, nempe quæ refrigeraret. Iacūcas enim  
non coctas refrigeratasq; ipsis porrigebat, intybumq; similiter supra satie  
tatem comedendū. Item uuas, poma, pisces dura carne præditos, omniaq;  
crustacea quæ uocant Græce *δυσώδη* quas, pedes bubulos, bulbos & similia,

hiera amarescente  
scammoniaz æquali  
singulorū modo  
dantur duobus scrupulis.

Curas. ex flām.

Curas. ex flām  
vne (retri).

Victus tenuis  
Curas. quæ  
humores.

hiera

Supra facit dñs omni  
facit dñs omni.

Hyponia de quod dñs  
isale.

Morbus cum hī  
hī morbi. morbi curas

Fragula uictus, m  
morbi.

non solū uirtute sed & tactu frigida, uinum raro praebebat, idēq; frigida tēperatum, ipsamq; frigida uel etiam poscam frigidam exhibebat, ab omni alio calido & mediocri cibo abstinens. Atq; plurimos sic praefer omnium opinionem persanauit, imō nonnullos qui iam in morbum comitalem uel resolutionem prolapsi erant, propemodum sanitati restituit.

## DE TENVIORIS INTESTINI MORBO,

qui ileos dicitur.

Cap. XLIII.



Leos morb<sup>o</sup> est peracutus, qui grauissimos moueat dolores.

At quae ei superueniūt, etiā periculo sunt grauiora. Qui enim hoc malo sunt oppressi, miserabili tandē morte pereūt, ster-

cus per os reddētes. Cōtrahitur id uitii cruditatibus & obstructo rectemētorū itinere, iis nimirū retētis, quae iā corruptionē experta sunt. Icē lethaliū medicamentorū potu, cūq; in scrotū descēdūt intestina ac inflāmatio nē sentiūt, coli dolore plerūq; praecedēte, causamq; adferēte. Pueros itaq; superfusionibus, cataplasmatibus, clysteriis, glandibus & fomētis, sicut in capite de colicis cōprehēsum est, curare oportet. A dolescētes autē & aetate floridos modica sanguinis detractiōe: sin minus, uincit multas ac leues curbitulas toti abdomini admouere. quia aut dōlēt, etiā cute incisa: itē perfricare & deligare, tū efficacioribus clysteriis & iniectionibus uti. Ad haec in oleū calidū descēdere, antidota purgatiōesq; assumere, breuiter oīa quae ad colicos scripta sunt, praeter eos qui ex acribus rodentibusq; succis indolēscunt. Mirifice ipsis facit, uel si uomuerint, anethū coctū potūq; mox panē in calidā demersum statim esse, dū incalescit. Ad eos autē qui cibos non retinēt, thus & cuminū in eadem tritū potui datur in senis oxymelitis cyathis. Qui ex medicamēto in ileon inciderūt, ut uomāt cōpellēdi aque calidae potu. Noxiorū autē medicamentorū notas, quinto libro habes expressas. Deinde oleū calēs propinari debet, aut iura pingua ut denuo uomāt. Diebus aliquot interpositis, theriace darur. At si obstructio nō discutitur, laetescisso cū scāmōniq; uel aloēs, uel cuiusdā purgātis momēto, aluū inanire cōfert. Si ex intestini prolapsu in scrotū affectus processerit, figuratis statim ipsis sublimibus in inguina cōpelleatur de lapsu intestinū fasciāq;

## DE RENVM ET VESICAE AFFECTIBVS, (deligabitur.

&amp; primum de calculo.

Cap. XLV.



Orborū uicinitas cognatioq; ordinē disciplinē trāsgredi nos cōpellit. nam cōmunis est Colicis, & lapidē in rene habētibus aluus initio astricta, uehemēs dolor, fastidiū, cruditas, & tormina. Propria uero colici habent oīa haec magis intēsa, nephritici minus. At colicis quidem in dexteriore ileū parte dolor excrucians usq; ad stomachum, iecur, & lienem peruenit, nec aluus, imō nec spiritus infra trāsmittitur. Cum uero necessitas stercus expellit, statulentū bouilli modo est. Interim etiā uitrea pituita excernitur, urina copiosior pituitosaq; redditur.

uerum nephritici grauem in ipsis renibus dolorē, aculei infixi instar sentiunt, rectusq; testiculus indolet, femur obstupefcit, directe excernunt, & sponte quidē raro, uerū clysteriis aluo citata, flatu, stercusq; biliosius egerit. urinæ autē pauca & arenosa magis prodeunt: meatu, per quos urina  
 5 ex renibus in uesicam distillat, <sup>conferuntur</sup> Græci uocant, astringuntur. hæc indicia calculos in renibus esse fatentur, quæ adultis potius oboriuntur. in uesica autem pueris magis calculus solet cōcrefcere, quod testatur cruda & subalbida urina cui subsideat arenosum. Pruriūt laborātes crebro, & cōtrestant pudenda, intenduntq; & continue in urinā propellunt, ac stillicidio uexantur. Materiā calculis creandis suppeditat crassus terreusq; humor. Effectrix ipsoꝝ causa est ignea renū, aut uesicæ caliditas. At in renibus quidem medicamētis uti conuenit, quæ calculos confringunt dissolcantq;: non autem manifesto calefaciunt. Talia habentur basilicorū asparagorū radix, rubiq; uitrum combustum, graminis radix, adiantū, bdellium, lauri radices cortex, altheæ semen, cicer nigrum, arietinum, spongiarum calculi, acetum scillites, phu, meon, asaron, carpesion, saxifraga. Sion uero, & esu, & potu prodest, scolimi radix, erysimon, & prionietis. balneis autem uti crebro licebit, & postea statim quædā ex prædictis bibere. Ceterum resperfusiones, cataplasmata, fotus, infessus, relaxantia & quæ leniunt,  
 20 ex colicis huc transferre conuenit. Cōpositæ potiones sunt, rutæ syluestris, malux syluestris, apii radices. incoquuntur uino, & liquor inde expressus tēperatusq; aqua, duobus cochleariis porrigitur. ALIA POTIO. Balsami fructus, lapidis spongiarū, pulegii sicci, malux syluestris singulorū pares portiones. ubi rōsa fuerint, cochlear inde cū uini tēperati cochlearis duobus exhibetur. Item sanguis hircinus inaresfactus, cicadæ siccæ sine  
 25 pēnis pedibusq; lapis Iudaicus, qui tecolithos dicitur, ex mulso in calido balnei folio offertur. tum medicamēta cōposita, quæ ex ipsis præparantur. Insuper, Fusca nephritice, & ad hoc cōposita, cōdita. His accedit laudatissimum remediū, passer, qui omniū auium minimus, solo basilisco appellato maior existit, eiq; similis colore inter cinerū & uiride, tenui rostro, in parietibus maxime & sepibus degēs. Hic, inquā, torus sale cōditus crudusq; frequenter cōmanducatus, calculos iam creatos per urinā expellit, in posterumq; generari prohibet. Cōbusti integro cum pēnis pollen uni uersus per se & cū pipere, phylliq; momento ex aqua mulsa potus, idē potest efficere. At dolorū uero acrimoniā & uigilias bona sunt remedia So-  
 35 tira, & Philonis medicamē. iam sanguinis missio adhibita dolorē sæpe leuauit, celeriter calculū emoluit. Tuetur à calculis, ne fiāt, cibis boni succi, & moderatus, dein exercitia, rarusq; leguminū omnis generis, frumentaceorumq; usus, item casei, lactis & quæ ex ipsa præparantur, obsoniorū, uini nigri, carniū copix, & omniū summatim crassi succi, ac nimis calidoy acriumq; hydrogarorū dico, & conditorū similiū. Hæc enim si obseruen-

calculus. p. m. i. s.  
 idia.

potiones nephritice

sanguis hircinus

bus. Pus autē per urinas cōfardim excretū, abscēssum esse ruptū, & ulcus in particula ostēdit. Quoniam uero etiam sine abscēssu, instrumenta per quā urina fert exulcerationi parēt, uase, aut rupto, aut exeso, materia acri uel lapide perō dēte, distinguēda est renum exulceratio, ab ea quā uesicā  
 5 exercet, uel meatus quos <sup>quosdam</sup> uocant, hoc pacto. Renibus quidē exulceratis in lumbis dolorē cum grauitate & sine impedimēto urina reddit, cui pus mixtū repentur, carnis particulis innatātibus, uesica autē exulcerationem experta, tormentū uehēmēs in pube imoq; uentre mouet, urinae difficultas urget, pus ubi redditū est, subsidet, squamulæ fædi odoris,  
 10 uel laminis similes insunt. Porrō surfuracea subsidentia uesicæ scabie laborare notāt, si meatus urinariū sint exulcerati, etiam puris mixtura medio quodāmodo habet, & pilis similia potius in lotio ferūtur, la borq; mediam inter renem & uesicam, regionē occupat. Si autē pus aut sanguis excernat, idq; citra urinā, nullius particulæ ex prædictis, sed pudendoy exulceratio  
 15 significatur. Itaq; cum uasa urinæ dicata exulcerationē sentiūt, aqua multa bibitur, aut scēnugræci decoctū cum melle, aut cucumeris semē cū passo. Pus reddentibus per urinam, holus armenus datur, aut ferulay combustarum cinis, quantū tribus digitis cōprehendi potest, ex passo, item lactis potio uehementer his auxiliatur. Composita autē hæc, seminis lini, seminis  
 20 cucumeris, tragacanthæ, singulorū drachmæ duæ: pastilli finguntur. A L I V D Nuclei pinci numero triginti, cucumeris domestici feminis  
 \* grana quadraginta, amyli, thuris, nardi, singulorū drachma, seminis apii drachmæ quinq;. Nardus, apiū, in aquæ sextario coquunt, mox horū iuri reliqua miscētur, postea cyathi duo potui dantur. Archigenes in epistola  
 25 ad Atticū iubet, cum urinæ difficultas urget, pa paueris albi torridi seminis detriti drachmā unam capi, quæ decocto iunci rotūdi, aut calami, aut dulcis radicis inspergatur. Dolores autē ex ulceribus cōtractos hoc lenit: cucumeris domestici purgati seminis grana numero triginta, nuclei pinci duodecim, amygdala amara corticibus exuta triginta quinq;. O lapathi se  
 30 minis, apii, alterci seminis, singulorum drachmæ tres, cicuræ seminis, drachmæ quatuor O croci quantū ad colorem fatis est. Ieiunus quotidie assuet cū lacte, aut passo. Mitius erit si pro nucleis pinceis maluæ seminis equalē modū iniicias. Elidere autē potest, inquit, uesicæ exulcerationes etiam cyphi & antidota inde cōfecta. Ego uero in uetustioribus hoc usus,  
 35 nunq; aliud desiderauī: chamædryos, chamæpyteos singulorū drachmæ uiginti quatuor, asari, piperis albi singulorū drachmæ septem, cinnamomi drachma: optime detriti cochlearia duo ex passo cretico, porrigo, si febris adsit, ex aquæ cyathis tribus, ubi uero mordax est exulceratio, etiā amyli duabus heminis & cucumeris feminibus quindecim adiectis, uoti cōpos  
 40 euasi. Hæc quidē ex Archigenis scriptis sunt. Item medicamenta diaphysalidon, id est, ex uesicariis, & antidotū ex syluestris maluæ semine, nec nō

\* Græcū exemplar uidetur deprauatū. Galenus unde hic ad uerbum sumptu, habet ut hic scriptū est. ut Alexander, O Hæc in exemplari uetoz, deside rabatur ex Galeno & Alexandro inflaurata.

ex tragematis confectum benefacit. Pubi pectiniq; cerata imponuntur ex hyssopo lota, butyro, adipe anserino, styrace. In uelicam autem infunditur clysterio mulla dilutissima, uel lac cum paululo mellis, uel cum cucumetis semine, uel cādidō ouī liquore cum pompholige uel dictorum medicaminum aliquo. Si ulcus pascendo serpit, pastillus ex carta immittendus est, aut Bithynius: cataplasma ex palmulis & uuis passis cū galla, acacia, hypocistide, & alumine debet imponi.

#### DE SANGVINIS RENV M PROFLVIO.

Renes infirmi lotium subinde retinere nequeūt, sed patēiores redditi sanguinis nōnihil ex uenā ore laxāt, aliasq; crassicies remittūt. Sæpe renes etiam iuxta circuitū quemadmodū ora uenarū in ano extantiū *ἀποσπένοντες* dicunt, sanguinis profluuiο laborant. Inaniti subleuātur, in quibus nihil subito tentandū est, si sanguinis cursus sistatur. At si fluxus eius perseueret, uena in cubito aperitur, ac medicamētis quę ad sanguinis spurū, aliaq; ipsius profluvia inscribūtur, in renibus ac uelica sanguinē fundētibz, utē dum est. Pręclare facit symphyti radix, & tragacanthū uino maceratū. Ad hęc polygōni & plātaginis succus, cū posca, aut amygdalana amara cum passo. Vel hoc. aluminis scissi drachma, tragacanthū drachmę duę, gummi oboli qnq; ex passo: crudaq; polēta illinis ex posca & rosaceo, aut cataplasma ex palmulis & pane siligineo cū acacia, uel hypocistide, in uino astringenti, uel posca decoctis. Cū uelica cruorē edit, etiā cucurbitulas in iliis & coxēdicibus defigemus. Cæterū particula quę sanguinē fundit, hisce notis agnoscitur, loci dolore, & quōd sanguis urinę miscetur, aut ecōtrario, uel uti in pure cōprehensum est. Cōcretus in uelica sanguis inde adeo deprehēditur, quōd post illū urina subito cohibeatur, & fibrę quędā (ut ueri simile est) aut humiditates cruētę emanent. Datur aut potui artemisiz dilutū, heliochrysiq; uel cunilę, uel radiculę semen. uel liquor sulphii, uel cyrenaicus, uel apii succus, singula in aceto tēperata: aut leporis coagulū, aut hinnuli aut hœdi in oxymelite, aut myrrha stillaticia cū oleo, spōgiaq; à foris ex muria, uel myrrha stillaticia calida accommodatur. Quod si uitiū his nō abigitur, secatur pubes, quęadmodū in calculosis, ablatisq; grummis commodē curantur.

#### DE RENV M DVRTIA.

Quę durities in renibus contrahuntur, nullū sanē dolorē movent, sed uidentur renes ipsi tanq; ab aliis suspendi, coxę stupent, crura uacillant, urina modica egeritur. Torus deniq; habitus iis potissimū qui aqua subter cetera laborant, similis est. hi emolliūtur ceratis, malagmatis frictiōibz & fomentis. Ad hęc quę urinam cient, assumuntur, aliusq; subduci debet.

#### DE DIABETE.

Cū porio, protinus qualis assumpta est transmittitur, diabetes uitiū appellatur. Qui igitur eo sunt occupati, immodica siti conficiūtur, unde quoq; diplocon, Gręci idē mali nomināt. Origo ipsius ex retētricis renū facultate

tis impotentia contrahitur, attractricis autem tanto robore, ut totum corpus ob immodicum calorem exhauriat. Itaque aduersus hunc pugnantes, cibum pleniorē, quique difficulter confici queat, nec liquidus sit, offeremus, ueluti alicā cū rosato, uel rhodomelo, uel aqua multa uel uino nō uetusto, uel alioqui calido. Ex oleribus autē inrybum, serim, lactucas, inter pisces erunt saxatiles: suum petunculi, uulua, pira, poma, mala Punica, & frigida porio. Item polygoni succus, heleniumque recte ipsi propinatur ex uino nigro, palmularumque & myrti dilutū, præcordiis & renibus illinitur polēta ex aceto rosaceo, folia uitis, cotyledonis, parieraria, portulaca. sudores excirandi, uomitusque a poru frigido, omnibus quæ urinā mouēt, abstinendum. At sanguinem per initia mittere non fuerit alienum.

#### DE STILLICIDIO VRINAE ET EIVS DIFFICULTATE.

Cum neque inflammatio, neque calculus, neque aliud quippiam ex prædictis infestat, urina autem acris, totusque habirus apparet, uel etiā reliqua signa bilem testantur, ex hac uel urinæ difficultas, uel stillicidium contrahitur. Quare ex usu sunt quæ hanc inalterant temperantque, pituitiæ cremor, pisces balnea uictusque idoneus: acris uitanda sunt, uinum, exercitia, ira & tarda comestio. Quod si urinæ tenuitas, alborque & reliqua signa frigidam fateantur intemperiem, conueniet uinum calidum, condita, tum quæ urinam cient & medicamina & cibi, adhuc infusus calidiores. At si præter albotem, etiam crassities in urina appareat, pituitosus humor celsendus est, qui ceruicem uesicæ obstruxerit, ubi utendum est oxymelite, rum decoctis hyssopi, pulegii, uel origani, uel thymi uel silphii cum aqua multa, item superfusionibus calidioribus. siue autem humor crassus, siue calculus, siue grumus, uel eius generis aliquid obstruens, urinæ transitum impediāt, siphonem rectū indere ex usu est, nisi particulæ inflammatio prohibear. Porro in febribus urinæ difficultati medemur, superfuso rutaceo, uel anethino, uel ueteri oleo. Si aluus astricta est, iniicietur ab inferiori parte decoctum fœnugræci, uel malua, uincitque insidere ægrotantes in hydrelæum, uel aliud quod dictarum specierum decoctum cum oleo. Ceratum hoc magnifice proficit, syluestris malua radices in sicyonio cum aqua modica decoctæ donec frigrant, ipsæ quidem proiciuntur, succus autem oleo miscetur, rutæ quarta pars, ceræ & castorii quantum sufficit.

#### DE VESICA RESOLUTA.

Vesicæ resolutionē nunc urinæ difficultas, nunc spontanea ipsius remissio comitatur, ut in ipso capite de resolutione supra expositum est.

#### DE VRINAE INCONTINENTIA.

Musculus, qui ceruicē uesicæ mouet, relaxatus, hoc mali generat. Quare pueris etiā maxima ex parte solet accidere. Itaque roborantibus potissimum uti conuenit. exempli gratia, ænelæo calido & similibus, obsunt etiā quæ ualide refrigerant: calidis fouēdi potius ægri, quare nus fieri potest. Etenim

refrigeratio ueluti resolutionis uim molitur. naturaliter autem hæc uitio huic opulantur. Gallinæ guttur combustum ieiuno bibendum in aqua tepida præbetur, uel leucanthesi flores similiter, uel leporis testiculus totus ex uino odorato contra hæc uitia bibitur. Et calaminthæ myrrhæq; ante cœnam porio salutaris est, uel rutæ syluestris semē torrefactū per tri-  
duum exhibetur. Cæterum pudenda eius qui hoc detinetur uitio, cimolia cum succo herbarū periclii perunguntur.

## DE IOGINORIS AFFECTIBVS.

Cap. XLVI.



Ecur pluribus uitiiis opportunū est. nam modò imbecillitas, modò inflātio, modò erysipelas, modò scirrhus, modò abscessus afficit. Interdū exulceratio, interdū obstructio excreet. Primū de infirmitate ipsius dicendū est, à qua propriè iocinorolos nominare ægrotantes cōsueuerunt. Si ergo aluus in cremorē conuersa uerū liquidiora deiciat alimēto minus probè, aut neutiq; in iecur digesto, sic tamen ut uentriculus à noxa sit immunis, attracticē uisceris facultatē infirmari suspicio est. Si uero in eis recens caro lota esse uideatur, alteratricē, tum eam quæ sanguini creando est dicata. At si calida malè habet intēperies, recrementū alui temporis spatio fœculētius apparet, adeoq; fœtidū, bilis colore suo insignis, crassaq; descēdit. quando etiā iocinoris substantia, totūq; ipsius corpus absumitur, urget febris, cibi fastidiū, & bilio-  
sus uomitus. Cum aut frigida affligit intēperies, neq; frequens, neq; copiosa aluus est: quippe affectus longius prorogatur, & certis diebus uenter cumulatus deiciet, sed minus fœtida ceu sanguinis crassi fœcē, ut propè atrabilis uideatur. Item uaria deiectio ac figuratior, frigidā notat intemperie, in qua febris languida apparet, facies non collabitur, maior ciborum appetentia inest. Horum uitiorum alterutri si accedat siccitas, recrementa erunt sicciora, magisq; ægri sitient. si humiditas, liquidiora & copiosiora, tum sitis minus excruciat. At si inflammatio iecur infestat, omnibus quidem ex æquo dextra parte sub præcordiis dolor est: idemq; ad iugulū supra, ad costas spurias infra peruenit. Huic dolori accedit febris acuta, rufis sicca, sitis, cibi fastidium, spiritus difficultas, lingua primo rubra apparet, mox nigra. interdum bilis euomitur, & aluus non respondet. Quoniam autem similia pleuriticis signa existunt, quo modo hos ab illis discernas, capite de pleuritide comprehensum est. Si uero Erysipelate iecur confluetur, inflammatio ardorq; gliscit, tabes comitatur. Quando caua iecoris pars priuatam sentit inflammationem, nausea adest, uomitus, cibi fastidium, & ardor intenditur, anima deficit, & sæpe eadem uisceris regio refrigerat, ut aqua subter cutem transfundī inde incipiat. Rursus si gibbā ipsius regionē inflammatio exerceat, præter alia superius cōmemorata, tumor quoq; manifestus in superficie oculis & tactui cōspicius est. hæc quidē ualidam grandēq; inflammationem testant. sin obicura quædā fuerit,

attractio in noxa

altera in iecur  
calida in iecur

frigida in iecur

si iecur sicca  
humida

si iecur

si iecur  
si iecur  
si iecur

si iecur  
si iecur



obfcuri, flant.

- iubebimus ægro, magnā edat respirationē. Et si dextraparte præcordia dolere asserat, moderata iecoris inflāmatiō censebitur. Quod si oblongus inflāmationis tumor, quā musculi abdominis recti porrigūtur, appareat, sed ita ut nullū ex prædictis adsit, illos ipsos eadē occupari agnoscemus.
- 5 Verū si grauitas, distentio, dolorq; dextra parte sub præcordiis sentiatur, nullo substante tumore, nulla febris urgente, uenarū signatur obstructio, quā uenarū portas & concaua iocinoris perreptantes iis quæ per gybba ipsi us excurrunt, cōmittuntur. Itaq; si in abscessum erumpit inflāmatiō, dolor & distentio ipsis increfcit, rigores sine ratiōe accedunt, dolentesq; iocinore, in sinistrū magis latus decumbere nequeunt, rupto autem abscessu, uel per urinas, uel per aluum cum ulata puris subluuies prorūpit. At si tumor in duriem quam crassus dicunt Græci, deciderit, dolores quidem remittūt, sed tumor cum duritie est cōspiciuus, quæ ambiunt partes extenuantur, & tempore procedente difficulter poterunt discerni. Quippe aqua
- 10 inter curem protinus comitatur, & tota præcordia humiditate conteguntur. Itaq; aduersus calidam iecoris intemperiem, refrigerantibus, tum iis quæ uiscus mediocriter confirment, uti consilium est. id autem præstat levis & cichorium, interim crudum, interim coctum, cum coriano assumptum, item decoctum ipsius succusq; e potus, deniq; mulsæ iniectus & calidis, & frigidis iocinoris uitis opitulatur. Eiusdē generis sunt, intybus esculenta, & ciccrbita quæ sonchos Græcè dicitur, Benefacit etiam mali medici cyathus in aquam mulsam demissus, similiterq; filicis succus. At si cum obstructione mediocris affligat intemperies, ea ex uino quodam tenui, & quod urinæ mouendæ est, porriguntur. Catapotiiū uero quod recipiet cichorii drachmas quatuor, chamepyteos radice drachmas, & quatuor tritæ cū melle cocto dantur ad nucis auellanae magnitudinē, quibus aquæ calidæ cyathos tres superbibere cōuenit, iam ex opio & semine alterci cōfecta propinantur, ipsumq; Philonis antidotū. In quibus calor intenditur, etiā rosaceum primi meriti ipsis, uel melinum potui datur. Esui, prifanae cremor, uel chondrum cum hydrorosato, similiter panis ex aqua, cum quadam id genus dulci porione. Et summatim cibi erunt, qui mediocriter refrigerant, non obstruunt: uinum omnino circunciditur, nisi alteram obcaulam, nempe stomachi imbecillitatem, hoc requirant: tum enim tenuis & quod Græci βαρυστόμαχος uocant, & dilutum aliquod exhibetur. Ac Erysipelas quoq; in eum modum curabitur. At ubi iecur perfrixerit, contrariis pugnandum est. panis igitur rectè cum uino assumitur, item brassica bis ter ue incocta, castaneasq; esse confert & uuas passas, tum ex gallinis quod satis est. Vinum ab eupatorio, uel asaro, uel medicamento diapedeum assumpto bibitur. Iam ex iis quæ prius ad cæliacos & dysentericos inscripta sunt, idonea deligi debet: cyphoides autem appellatæ compositiōnes, ad calidas intemperies neutiquam conueniunt, nisi modica quædā ca

signa dysentericæ iecoris, ad eandem signa obfcuri flant.

signa abscessus flant.

signa abscessus flant.

Hæc effecta aqua.

\* Galenus habet ossio. Alexander addit intybi drachmas tres.

uinum ad eandem flant.

ad eandem flant.

signa dysentericæ iecoris, ad eandem signa obfcuri flant.

liditas cum humiditate copiosiore oborta fuerit. Ceterū ad frigidas opti-  
ma sunt remedia, magisq; si cum humiditate, aut iecoris obstructiōe eue-  
nerint. Si uero obstructio ex crassis glutinosusq; cōtracta humoribus fue-  
rit, myocātha & præsertim huius fructus datur, itē lauri radice cortex. eu-  
patoriumq; ex oxymelite, uel lupinorū amarorum decocto cū ruta & pi-  
pere. Ad hæc farina lupinorum pota, & capparis radice partes duæ, costi-  
pats una cū uino, & medicamentū diabacanu ad obstructiōnes quas crassi  
uiscosiq; humores excitarunt salutariter sumitur: præterea iris & pista cio  
rū fructus cortexq; marrubiū insuper, amygdalę amarę, & ex ipsis pastilli,  
dracunculi, ariq; radix, a garicū, acetū scillites, oxymel, iecur lupi, aridū tri-  
tum & cochleario datū, omnibus iecoris affectibus ex uino dulci succur-  
rit, itē antidotum Theodoretū efficacissimum est iecori obstructo, in dura-  
to, inflāmatoq; diu. Idem colicis & ictericis auxiliatur. Similiter etiā picra  
ex oxymelite. Cibi his dandi sunt calidiores & qui aperiundi facultatē ha-  
bent: nēpe porra ex oxymelite, plaustris asparagus, & capparis, reliquaq;  
obsonia ex cōdimēto aliquo calefaciēte, quodq; meatus distēdat, incocta.  
Vinū tenue ac uetus utile est. uitanda sūnt alimēta crassi succi, balnea cre-  
bra, eaq; potissimū à cibo. Si morbus in uetustatē incidit, etiā uenę sectio  
purgatioq; adhibēda, si nihil prohibet. Cum autē iecur inflammationē ex-  
perit, sanguis ex cubito dextro intrepidē mittendus est, & copiosus si uires  
sufficiēt. Extrinsecus farina hordeacea, & scenugraci, & semine lini cū pal-  
mulis uiscus illinet, uel malis cotoniis, meliloti flore, absynthio, chamæme-  
lino. Illud autē in summa præcipiendū est, ut astringētia emolliētibus sem-  
per admisceātur. Epithēmata uero iniici debēt, tū quod ad Nileū auctorē  
refertur, tū quod à grato odore euodes dicitur: item Philagrianū & Apol-  
lophanis, necnō ex melilotis confectū. deniq; quod coptū appellatur. Por-  
rō ad maximas inflāmationes hoc ualde experiētia comprobatum est: ab  
synthii comæ, nardi galliçę, asari, croci, singulorū uncia, iridis, myrrhę, sty-  
racis, bdellii, ammoniaci suffuminis quod thymia ma appellant, singulorū  
unciaz duæ, medullę uirulinæ unciaz quatuor, cerati, lentiscini libræ quatu-  
or. Ad hæc oxymel ipsis dandū est, simpliciaq; auxilia, nēpe, asarum, nar-  
dus gallica, uel indica, iucusq; odoratus, rotundus, petroselinū. Aluus irri-  
tāda est, urtica, uel mercurialis, coctorū esu. In declinatiōe morbi, epithy-  
mum & polypodii ex mulsā porrigūtur, aluusq; inaniri postulat per cly-  
sterē, initio quidē ex aqua mulsā cū sale, uel nitro, facta autē inclinatiōe, mi-  
scetur hyssopū, uel origanū, uel cnicum, uel centaureū & cucurbita sylue-  
stris. Caua iecoris pars per aluū: gibba per urinas expurgatur. Alimētum  
his dabitur, cremor ptisanæ, in quo apiū decoctum sit. At inflāmatiois  
quę Erysipelatis naturā referat, curationē superius sumus executi. Absces-  
su autē factō ruptura adiuuanda cataplasmate trispermio, cum resina, mā-  
na, pice, radicibus althęę, colūbę fimo, caprillo stercore: præbitor aut ius

musculi. si fuerit in iecore.  
habetur in iecore. Periphr.  
periphr. applicata.

si fuerit in iecore. si fuerit in iecore.  
si fuerit in iecore. si fuerit in iecore.

musculi. si fuerit in iecore.

si fuerit in iecore. si fuerit in iecore.

si fuerit in iecore. si fuerit in iecore.

polij & fumaria, item ius thlapis ad terras decocti uel cichorii & chamædryos radices, uonicaq; facta, multa conuenit, & quæ in renibus exulceratis commemorata sunt. Extrinsecus imponitur medicamentum *M. rasei*, reliquaq; emollientia. Item *lecison*, uel quod salicibus constat. Si uero iecur induratum fuerit, parum in medicina spei est, affectu in aquam subtercutem decidente. At tamen emollientibus admiscenda sunt, *ammoniacū*, *hdellū*, *medullæ*, *adipes*, & quæ his similē potentiam obtinent. Potiones expediūt, quæ angustias uisceris recludunt, absterguntq;. Huiusmodi sunt quæ urinā citant, & calculos confringunt. Ad hæc quæ nuper ad iccoris obstructionē dicta nobis sunt, & cibis nimirum conueniēter adopratus.

## DE MALO CORPORIS HABITU, QVI

cachexia dicitur.

Cap. XLVII.

**R**incipia aquarū cutem subeuntiū, uocare nostri malū corporis habitū, Græci καχεξία consuerūt. Auxiliū est, nisi aliquid impedit in sanguinis detractione, quæ paulatim ad tertium quartum uel diem producit. Sed uacuandi sunt potissimum, qui hæc morrhoidibus, aut mēstruis non respōdentibus in morbū inciderūt, quæ admodū iis qui copia uiriosorū humorū laborāt, uacuatio sanguinis per uenā noxia est: purgatio autē ex hiera, quæ syluestre cucurbitā recipit, per mēstrū utilis, uictus erit tenuis, & siccus. Aquarū naturalium usus adhibebit, primū aluminosarū nittosarūq;, mox sulfurosarū: pluribus diebus interpositis aliud balneū accommodatur, uarioq; exercitationis generi credūtur egrotantes, maxime autē ei, quod per medicos alipras, id est, reūctores administratur. postea aut ueratrū assumēt: minime quoq; iuuat ipsos & absinthij potio, & cottabismi, & dropaces. Si affectus in hydropem deciderit, aquæ subtercutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

## DE AQVA INTER CVTEM.

Cap. XLVIII.

**V**m iecur interim primario, aut uehementē perfrixerit, aut inflammatione, aut duritia, aut alio implicitorū affectu fuerit, interim lege confortii quod cū aliis partibus habet, sanguinis elaboratio nō succedit, ac uitium aquæ intercutis quod hydrops Græce dicitur, inde contrahitur: à quo nonnunquā sanguinis copia cū humiditate momento intra membranā, quæ peritonæos appellatur, & intestina colligitur, ut abdomen percussum tympani modo crepitū elidat: quæ ratio etiam tympanias nūcupatur, q̄ stomachi, alui, & lōganonis inflationi, se febribusq; lōgis superuenit. Est cū peritonæi, aut uulū in mulieribus duritie, aut scirrō cōstetur. Aliquādo rursus humorū cū paucissimo spiritu abundantia, in eisdē regionibus tanquā in utre quodā conseruatur. unde malū, ascites nominatur hydrops, & ipse ex causis quas comprehendimus, contractus. Plurima uero ex parte, tum liene, tum iocinore indurato, occallesceatq; item ex longis intestinorum profluiis oritur, in quibus uenter intumescit,

reliquum corpus quod alimentum non sentiat, consumitur. Nonnunq̃ etiam in tota corporis mole frigidior pituitiorq̃; sanguis cōrinetur, qualis partim à iecore descendit, partim ex tota carne corporis ueluti in aquā reloluta emanat, ut corpus albidum, & pituitosum emortui instar appareat, uocaturq̃; hydrops leucophlegmatias, hypofarcidios, uel anasarca. 5  
 Quem lentæ febres, malus stomachi habitus, hæmorrhoides diu suppressæ, fluxus muliebris, spiritus difficultas, uigiliæ insolitæ, & sine ratione oborientes, causæq̃; his consimiles mouerunt. Curatio igitur cōmunis ab euacuatione incipit. Verum ascites & tympanias appellatus medicamentum requirit, quod aquam educat. Cui autē anasarca nomē est, sanguinis detractione succurrimus, maxime si affectus origo ex hæmorrhoidē est, aut mēstruis neutiq̃ respondētibus, nisi malo habitu præditi sanguinē emiserint. Et hic igitur in iis qui malam corporis habitudinē sortiti sunt, per uices tētanda est uacuatio. Deinde sterqus bouis gregarii aridū exacte tritum, coctumq̃; in posca, uel oxymelite, sulfurisq̃; pars quarta superinfusa, toti 15 uentris capacitati iniiciatur, uel stercora caprilla in pueri urina, uel capræ luti crassitie applicata, per uētremsumme ipsos purgat. Item cataplasmatis utendū ex fermento, ficis pinguibus, calce, nitro, iride, cardamomo, sulfure uiuo, ammoniaco, baccis lauri, agresti uua, columbarum ruralium simo, uel omnibus, uel quibusdam ex his cum oxymelite. Post quæ epithema 20 spongium appellatum ex caprillo stercore mirifice humiditatem uacuat, tum per latentes meatus, tum per aluum. Insequentibus diebus emplastra persiccantia imponuntur, tum quod ex salicibus est, tum quod ice sum dicitur, uel quod Cureo ascribitur, uel quod ex baccis lauri factū est, uel polyarchiū, uel epithema ex seminibus præparatū. Atq̃; hoc indubie 25 mirificos præstat effectus, quod sequitur, quippe humores ex alto eripit: lapidis pyritis, sulfuris uiui, guttæ ammoniaci, singulorū drachmæ duodecim, cumini drachmæ sedecim, nitri drachmæ duodecim. Excipiuntur cera modica, & terebinthina, pelliq̃; illita, toti uentri imponuntur. Ius radices actææ decoctæ in uino potui datur, uel cucumer syluestris uino austero 30 maceratus per triduū, cyatho uno propinatur. Accessio autē fit quotidie usq̃; ad cyathos tres. Hoc quod subiungitur, uaria constat mistura: balsami, nardi, cassiæ, cumini dulcis radiculæ, hyperici, iunci rotundi, asari, dauci, amomi, myrrhæ, petroselini, calami aromatici, piperis, scelis, spondilii pares portiones, faciunt autē bene etiā singula per se, & omnia quæ urinæ 35 ciendæ similē facultatē obtinent. Ceterū scilla tosta, cum melle trita & linctus modo exhibita, sine grauitate urinā mouet: coquetur autē ex aqua potabili. id quod subiungā præcipue bonū est: interioris scillæ pondo duo, in uini austeri sextariis tribus adusque tertias incoctā porrigito ex uino quotidie, orsus à mystro usque ad unciam. Istud urinam optime prouocat, quod recipit a luminis liquidi circa fabæ magnitudinem: ubi aqua di-

lueris, linteoq; percolaueris, ad tres dies propinato, uel ad unum. Conue-  
 nit etiam his picra ex oxymelite. Ad hæc Theodoretus, & ex amaris amy-  
 gdalis pastillus. Plura uero aquam educūt, sed hæc uisus comprobauit, gni-  
 dia grana quadraginta, aut quinquaginta, uel latyrides uiginti, aut trigin-  
 5 ta, uel euphorbii siliquæ quinq; aut leptē, uel squamæ æris drachmæ duæ,  
 aut tres cum micis panis exceptæ, ac in orbiculos digestæ, uel sambuci ra-  
 dicis corticis succus epotus cum condimento, uel chamelææ foliorū, æris  
 combusti, anisi singulorū par modus datur in aqua, per initia quidē drach-  
 ma una, diebus aliquot interpositis etiam duæ, aut plures. Atq; in sequētia,  
 10 mirifica sunt cataporia: aloës, euphorbii, cocci gnidii, singulorum uncia,  
 rhei semūcia, excipiūtur succo brassicæ, singunturq; cataporia, dantur sili-  
 quæ septē, aut nouē. Antidorū ex gariophylo, aquā mirabiliter elicit, iam  
 uinum quod aquæ educēdæ est, dare tētabimur. Est autē infra scriptū me-  
 dicamentum ad id efficacissimum, scillæ uncie tres, seminis apii, capparis  
 15 radicis corticis, piperis, singulorū drachmæ quatuor, cocci gnidii decorti-  
cati drachma, phylli drachma, malabathri galbuli duo, uini optimi hēmi  
næ duodecim, mellis crudi libræ sex. Contusa colatāq; uino perfundūtur,  
 scilla simul leuigatur, dantur cyathi tres: post humoris euacuationem, eti-  
 am theriaca utendū est, & stercoreis bubuli usti cochlear ex uino potū quo  
 20 tidie strenue auxiliatur. item clysteres adhibēdi acres, nisi uēter sua spēte  
 humescat: tūc enim exicare ipsum magis conuenit. Porro in mulieribus  
 quas aqua subter cutē male habet, etiam pessus hic utilis est. Anisi, carda-  
 momi, cumini, nitri, aristolochiæ, scœnugræci, pulegii, sicuū interioris pa-  
 res portiones fusino excepta imponātur. Secundū hæc aquis naturalibus,  
 25 uti continenter expedit, ad hæc ut exerceantur, sabuloq; & arena saburren-  
 tur, reliquis balneis abstineant. Quod si uero interim lauēt etiam, utentur  
 in lauacro nitro, sale, sinapi, calce & persimilibus inspersis. Hæc sane uel ci-  
 tra lauatiōē utilia sunt, aridaq; cum oleo uētri adfricata. At si id uitiiū est,  
 cui anasarca nomē est, reliquas partes exerceri, quaten⁹ licet, oportet, & sic-  
 30 cas ad solē perfricari. Reliqua uictus ratio siccior assumetur. Cibus itaque  
erit falfamentū, sinapi, & allia: ex auibus syluestres, & siccæ magis. Inter ole-  
 ra asparagus, bis acutū, porrum, sinapi, caucalis, reliquaq; syluestria. Obso-  
 niis miscebitur sal theriacus, uel ammoniacus: uinū uetus, tenue, ad urinā  
 mouendam efficax recte bibitur. Sin autē facultas datur, ex marina aqua  
 35 confectum. deinde potio liberalis uitanda est, aqua in totū. Quod si cum  
 febris aqua subter cutem inuadat, calidioribus acrioribusq; cibis & auxiliis  
 abstinetur, ubi permixta sunt uitia, uehementiori succurrendum est, si ue-  
 ro id morbi genus est, quo uenter sonitum edit, Tympanias uocatur, pur-  
 gantia, & quæ uniuersum corpus emaciant, eligenda sunt, item ad urinam  
 40 efficacia. His autē quæ extenuare & digerere spiritus possunt, tum intrin-  
 secus, tum a foris utendum est. Cucurbitulæ leues crebro toti uentri suf-

figentur, sin id uitii male habet, in quo in uterum aqua cōtrahitur, nisi prædictis cesserit remediis, cute compuncta perniciosus humor elici debet, quod nulli alii aquæ subter cutem generi conuenit.

## DE LIENOSIS.

## Cap. XLIX.



**L**ien atræ bilis excrementum, ceu limū sanguinis ab iocinore elieit naturaliter. Eius facultas attractrix, si infirma fuerit, meatus uel obstructus per quē illud prius euadebat, sanguine impuro per totum se corpus spargente, atrum morbum regium constituit. At si lienem grauitas & distētio, uel etiam dolor exerceat, meatus obstructio ostenditur: si nihil horum euenerit, attrahendi potentia imbecillitas. Quinetiā si atræ bilis uomit<sup>9</sup> sine febre alia uel malignitate oboritur, retinendi potestatem laborare indicium est. Sin contrā, nō attractrix naturæ uis, sed expultrix ægroter, cibi fastidiū accidit. Haud enim amplius atræ bilis excrementum, quod appetentiæ excitandæ est, ab liene ad uētriculi ostium defertur, eoq; in liene obstructo obseproq; inflammatio primum, cuius notæ sunt, feruor, dolor & distentio, excitatur. quæ paulopost in duritiē tumidam, scirrus dicitur, occallescit, sic ut feruor quidē dolorq; finierit, tumor autē cum duritia maneat. Hoc pressis uitio, os fœtet, gingiua exeduntur, ulcera in cruribus cicatricē non recipiunt, ob quē simul affecto iocinore, cutē subeuntes aquæ colliguntur, sicut comprehensum est. Itaq; intēperies ipsius eandem cum iocinore curationē postulat. si adest inflammatio, sanguis à cubito sinistiore, uel ab extrema manu dimittendus est, eo quod reuulsio longioribus interuallis fieri debeat, uel etiam propter naturæ quandam confinitatē: deinde quæ citra euidētē calorem extenuant, illinentur, admixtis quibusdam etiam nunc astringentibus: uidetur autē hanc facultatem habere suapte natura, qui uocatur flos salis. Porro est & hoc cataplasma mirificum, scēnugræci triens, farinæ hordeaceæ, cardami, singulorū uncia, ficuum pinguiū libra, uerbenacæ herbæ aridæ uncia. sicus, aceto quā macerrimo maceratur. Deinde cum aliis iam prius tunsis incoquuntur, postea iterū coquuntur. Vel stercus caprillū cum cruda polenta coctū ex posca illinitur. Adhibeto autē, si placet, salis florē: ad fouendum eypriuo cum aceti momento, & malagmatis utitor, primū sum

ptioribus, quale est hoc: Ceræ sesquilibra, cētaurii libra, nitri triquadras, terebinthinæ, seminis agni, capparis radices, singulorū quincunx. Quæ liquari possunt, cocta aridis superfunduntur. iam quod ad Nileum autorem refertur præstantissimū est. Verum ubi inflammatio in scirrū degenerat, ualentioribus uti conuenit, ut etiam cutis summa exulceretur, quale est quod ex fimo caprillo constat, & citrinum. huc accedūt Macherionis, Cui rei, item ex baecis lauri confectū, & ex salicibus. Quod subsequetur, etiā ipse expertus sum, auripigmenti unciæ duæ, sandarachæ unciæ duæ, fauorū terebinthinæ libra, picis aridæ tantundem, galbani uncia, opopanacis uncia,

in bilis generatim  
apparetis generatim.

- capparis radice corticis, glandis unguentariæ, singulorum uncia quatuor, lachrymæ amoniaci scrupula sex, nardini, uel cyprini scrupula quatuor. Ammoniacum etiam cum aceto applicatū, lieni sæpe profuit, item porum scrupulis tribus quaternis uel cum uno castorei, si priusquam in la-  
 5 uacrum descendant, sicum pingue comederint, sputoq; eam reddiderint, uel ammoniaci pars una, castorei tantundem: datur drachma. hæc etiā ad induratos cum tumore, proficiunt, quemadmodum capparis quoq; cortex ex aceto contritus illitusq;. Idem bibitus aceto, uel oxymelite, crassos glutinososq; humores uacuat, interim sanguinē. Iam salicis cortex, confi-  
 10 militer inungitur, & cinis fabrorum cum cruda polenta ex oxymelite illitus. item centaurei succus à foris impositus, epotusq; & lupinorum amarorum decoctum cum ruta & pipere assumptum, necnon farina ipsorum illita, & aqua in qua candens ferrum subinde extinctum est, febricitantibus  
 15 per se data cyathis tribus, febricarentibus autem cum uini & aceti cyatho uno, uel lapathi syluestris radice cum scilla tres oboli, uel chamædryos, uel serpilli acetabulum totum. Vel oxymelitis, anagallidis, quæ cæruleæ  
 20 um florē obtinet, duo oboli, cum posca bibuntur, uel acetum scillites, uel oxymel. Composita autem hæc, panacis radice, guttæ ammoniaci, capparis radice corticis, struthi, scillæ tostæ interioris æquales portiones exhibentur denarii unius pōdere: benefacit etiam suspiriosis, & hydropicis.
- ALIUD. Myricæ fructus drachmæ quatuor, piperis tantundem, spicæ nardi drachmæ duæ, sussi minis ammoniaci totidem. Terūtur aceto scillino, instar denarii unius dantur ex oxymelite.

## AD LIENEM INDURATVM.

- 25 Cyclamini drachmæ uiginti, brionia drachmæ tres, dictamni drachmæ duæ, scillæ tostæ drachmæ octo, struthi drachmæ sex, capparis radice drachmæ sex, pastillus triobolaris ex oxymelite potrigitur: & qui ex erica præparatur, nō inidoneus est: cibus cōpetit tenuis, acris, siccus: potio paucissima: adhibendæ exercitationes frictionesq;, & sinapismi, interim etiam  
 30 cucurbitulæ cum scarificatu defigendæ.

## DE MORBO REGIO, QVI ICTEROS

Græce dicitur.

Cap. L.



- 35 **R**egius morbus, quē Græci icteron appellāt, bilis est per totū corpus suffusio, mōdo atræ, de qua in lienosis à me dictū est, mōdo flauæ. Differētiis cōstat numerosis: quarū causæ & natura hæc sunt. Siquidē hoc uitii febricitante ægro repente ac cumulatim superueniens febrim finierit, crism testat, materia ex alto foras prorūpente, contractū. Medicina nō indiget, ut quod balneis & moderata frictione subito discutiat. Si autē cum febrī & biliosis deiectionibus in-  
 40 uadat, & præcordiorū dextra parte dolor adsit, seruēs iocinoris inflammatio significatur, cuius ui sanguis in bilem mutatus, per uniuersum corpus

*Vini? quæ ad  
feruē extinguitur  
ad lienes potest.*

*pastillus ex erica*



defertur. Sin autem fetuor citra grauitatem in ipso substat, ex sola iecoris calida intemperie, uirium gignitur. Si absque febris alba deiiciantur, uescique fellis malum ostenditur, uel ipsius meatuum, si grauitate precordiorum dextram partem premente, obstructi conspecti sunt, aut citra illam uires ipsorum infirmantur, uel huius attractrix, quae humorem atrum ex iocinore eliciat, uel illius expultrix, quae ad intestina eundem protrudat. Quippe sanguis biliosus non expurgatus, in totum corpus diffunditur, quemadmodum in nigro arquato fieri dicebamus, statim uero his etiam urinae biliofissimae affatim excernuntur. Ceterum fit etiam arquatus cum solidae partes calore nimis intemperato, in bilem degenerant, ratione alimentati, quod ipsis offertur, quemadmodum in aquae subter cutem genere, cui nomen anasarca in pituitosam humiditatem est mutatio, uerum haec talis arquati discriminis nota est, nimirum quod non uniuersus, sed paulatim procreatur, sic ut nullum ex commemoratis adsit. Iam uero noxi medicamenti potus, tum uirus extrinsecus à ueneno animali illatus, res gium morbum parit. Cum itaque calida iecoris intemperie, & inflammatione uiriumque robore destituitur, curationem supra comprehensam, ubi de ipso agebatur admovebimus, eamque integram in hoc transferre caput oportet, ne eadem mihi sint repetenda. At si meatus coepectuli fellis utriusque sint obstitati, uel alter duntaxat, uenam in cubito dextro ipsis diuidi consilium est. Nonnulli uero, tum his, tum illis qui ex iecore inflammato, arquatum contraxerunt, uenam propter minimum dextrae manus digitum, soluunt. Cataplasmata quae inflammationem arcent, hic utilia sunt, & purgatio ex hiera, necnon clysteres, potui recte datur arquaticis, apii, uel adianthi, uel lapathi, uel serpilli decoctorum ad tertias succus, uel absynthiiu portioni inspergitur. Praeclare faciunt radicularum succi cyathi duo, cum uini cyatho uno. Et cichorei succi cyathi bini, uel terni per se aut cum uino poti. Sed qui iecoris inflammationi arquatum ferunt acceptum, multum bibent, uel decoctum tenuis aristolochiae, uel hyperici, uel adianthi, uel struthii, uel erythrodani similiter, uel cornus ceruini scobis drachma, cum uino, uel pastinaci syluestris decoctum in uino, ut tertia pars supersit, uel sulfuris uiui drachma in ouis sorbetur. Haec etiam propter obstructionem arquato laborantibus ualde auxiliantur, seminis autem atriplicis scrupuli octo, cum chrysanthemum, uel alio dulci à balnei ingressu poti, uacuatio nem magnam praestant. Recte etiam picra datur, & sicca, & ex oxymelite, & Theodoretus. Iam ex amaris amygdalis pastillus comode porrigit, & cinamomi quantum tribus digitis comprehendere potest, in mulsi cyatho uno, uel aqua temperata, uel myrrha ad fabae magnitudinem cum piperis granis quinque, tantundemque cinamomi. Qui uero ex calore solidarum partium intemperato in arquatum inciderunt, simplici frictione, exercitiiis moderatis, unctione & balneis ad sanitatem reducentur, cibo humido & me-

diocriter refrigerate cum pifana, intybo, feri, cichoreo, piscibusq; uino tenui aquoso. Qui ex lethali portione, aut ex uirulentorum animalium moribus affectu sunt impliciti, de iis quinto uolumine tractabitur. Porro si bilis oculos faciemq; dehonestet, elaterii instar erui cū lacte muliebri naribus in balneo instillatur, & statim in solium descēditur, sed ita ne caput immergatur. Post balneum uictu recreatis, rursus unguentum in sole, naribus infundito. Benefacit etiam cyclamini succus, porri, & nigellæ. Accertum uero acerrimum naribus attrahat in folio desidēs, contineatq; etiam pressis naribus paulisper, & mirifice uacuabitur.

DE VMBILICO PROCIDENTE. Cap. LI.



Aufam umbilici prominentis, & quomodo id uitii manu curetur, in parte chirurgica docebimus. Quoniam uero nōnulli etiam medicamētis in naturalem statum redierunt, ipsa hoc loco dicemus. Aluminis scissilis drachmæ quinque, hocium

uini drachmæ octo, rosæ faciei decem, gallæ immaturæ drachmæ duæ. Vino diluta, & in mellis spissitudine redacta loco affecto resperguntur. Extrinsecus spongia posca madens superiniicitur, & fasciola deligatur. ALIIVD. Lomenti, gallæ, balaustii pares portiones, coquuntur in aqua: ubi dissoluta fuerint, tritaq; diligenter, spongia, ut prædictum est imponuntur. ALIIVD. Plumbi scobis drachmæ sedecim, cicutæ, manna, cerussæ, hypocistidis succi, singulorū drachma, uino dissolutis in modum prædictū utitor.

QVOMODO IMPVBERES IMBERBES QVE

diu maneant, & particulæ naturales testesq;  
ita conferuentur, piliq; abo

leantur.

Cap. LI.



Imoliæ cretæ, & cerussæ æquales partes, alterci succo excipiuntur ut fordiū spissitudo fiat, deinde oleo lētiscino quātum sufficit adiecto contundito, ac utitor. ALIIVD. Cicutæ succum, solani, alterci, lupini foliorum tenerrimorum, psillii æquale modum. ubi contriueris, utitor, sed locum prius abstergitō abluitoq;. Oportet autem pridie quā usurpare uelis, aquam bibere. Medicamentum pilis abolēdis dicatum, psilotrum appellatum. Asellorum domesticorum, qui tacti conduplicant sese in orbem, pilulæ rotundissime similem, Græci κατὰ φύσιν ὀφθαλμοῦς uocant, pondo denarii duo, sandarachæ pondo denarii

quatuor, calcis pondo denarii octo, aceti ueteris cyathus. Lixiuū ē ficti tantundem: coquito in fictili, ac in balneo utitor. ALIIVD. Calcis, cineris lixiuæ partibus duabus, auripigmenti totidem, terræ cimolizæ parte una: in aqua coctis quemadmodū explicatum est, utitor. ALIIVD. Simplex odorisq; expers: cineris lixiuū, calcis, utriusque sextarium, sandarachæ unciam. Coquito, ut dictum est, & utitor. Porro quæ pilos adimant, in oculariis exposita sunt,

## DE RAMICVM GENERIBVS.

Cap. LIII.



Vm intestina peritonæo rupto diuoluuntur, operosa est curatio. cum raritatis texturæ uitio descendunt, facilius sanandi ratio est. Achiue malo pueri potius, utpote humidioris naturæ, sunt opportuni. multiq; adeo citra manus operam medicaminibus impositis, & cōuenienti deligatura persanati sunt. Vtēdum uero est facultatibus infra cōprehensis, ubi hoc solum addiderimus, affectus solo loci situ uariare. Quando intestinū etiam tantū supra in inguinibus iacet, nostri inguinis ramicē, Græci *βροτοκίδα* uocāt. Cum in scrotum infra delapsum est, intestinorū ramex, Græce *ρεμγούδα* dicitur. Malicorū igitur drachmæ decem, gallæ immaturæ drachmæ quinque, in uini austeri cyathis tribus incoctæ, & in pollinē coactæ, intestino prius perficitur imponuntur: quæ aqua frigida superfusa decimo die soluantur, sed ita, ut æger in lecto maneat diebus triginta, bibatq; cupressi decoctū cum uino, uel eius globulorū tres obolos, ex diluta uini portione. hoc medicamentū auxiliatur pueris. ALIVD GLVTINATORIVM. Symphyti radicis, marrubii succi, amygdalatū amararum, gummi pates portiones ALIVD. Terebinthini pōdo fescuncia, ceræ, thuris, myrrhæ, ichthyocollæ, cochlearum cum suis testis, singulorū pondo uncia, ichthyocolla in aceto diebus tribus maceratur. ALIVD. Cupressi, galbulorū uncia, gallæ tantūdem, malicorū semuncia, taurocollæ unciz tres, mānæ, thuris semuncia, symphyti tantundē, cochlearum cum testis uncia. Galbuli & malicorū uino astringenti diu incoquuntur. Et cum reliquis probe in puluete detritis excepta, in usum accommodantur. ALIVD. Aloës, malicorū, thuris, hypocistidis succi, glutini fabrilis, picis, bituminis, singulorū fescuncia, uini dulcis quod sufficit. ALIVD. Magis uarium, facit etiam adultis, cum morbus uetustatē nondum senserit: chrysocollæ, taurocollæ, sarcocollæ, ichthyocollæ, lapidis iagatis, lapidis hæmatitis, rhus syriaci, & coriarii, acaciz, singulorū fescuncia, lapidis pyritis ignem nō experti, magnetis cærulei coloris, aluminis scissi, mannæ, thuris, singulorū uncia, picis brusæ unciz quinque, cochlearū cum testis uncia, plūbi retosti quod helcisma dicitur, unciz quatuor, gallæ, squamæ stomomatis, atq; singulorū uncia, bituminis uncia sex, myrsinati quod satis est. Vino astringēte arida excipiuntur. Medicamēto tā spisso ut digitos nō coinquinet, utitor. Quod si iacere nō sustineant, tria ungula ipsos fascia crassiore, quæq; intestina possit cōstringere, tuto deligabis. A cibis inflātibus abstinentiū, uino copiosiore, crebris balneis, uehemēti motu, nēpe cursu, saltu, clamore, & id genus aliis.

## AD AQVOSVM RAMICEM QVI HYDROCELE DICITUR, ut humor collectus discutatur.

Piperis grana centum, lauri baccæ octoginta, nitri drachmæ uiginti, ceræ drachmæ quadraginta, olei hemina dimidio exceptis utitor. ALIVD. Præ

stantissimum. Lapidis asii floris drachmæ sex, uux passæ acinis uacue dra-  
chmæ duæ, cumini æthiopici drachmæ octo, Nitri rubri tantundem. Tri-  
ta imponito, fouēs uesperi & mane: quidā uero adiiciūt etiā sulfuris dra-  
chmas octo. ALIVD. Calcē balnei lordibus exceptā cū cerato impones,  
& paululū nitri calci miscebis. ALIVD. Radicis brassicæ crematæ cinis  
adipē suillo ueteri liquefacto exceptus inducitur: pēt triduū soluitur. Ne  
autē humoris magna fiat colluies, hoc utere malagmate. Ceræ libris dua-  
bus & semisse, picis triēte, guttæ ammoniaci triēte, aluminis liquidi fescun-  
cia. Proficit etiā medicamentum ex populo & reliqua extrahentia.

## DE INFLAMMATIONE TESTICVLI SCROTÏ QVE

&amp; aliis ipsorum affectibus.

Cap. LIIII.



Scroti inflammatio hisce agnosceretur notis, is locus leui cōta-  
ctu quamprimum indolefcit, feruor, duritiesq; intēsa appa-  
rent. Testiculo autem inflammatiōem sentiente non ex leui

tactu dolent affecti, sed in pactis ualidius digitis rubor & du-  
rities ipsius per summa minor extare uidetur. altius autē impressis illis, du-  
rities occurrit, & febris nonnunq; oritur. Itaq; testiculorum inflāmationi-  
bus propriē conuenit sanguis ex talo dimissus: communiter aut omnibus  
cataplasmata & cerata. Imponi igitur debent ex lomēto diluta uini mixti

one cocto cum uuis pinguib; acinorum expertibus & cumino, uel hastu-  
læ regiz radix: incocta cōtritaq; miscetur polentæ aquali, illiniturq;: uel  
lini semē ex diluto uino, uel fornugracum ex mulsā, uel lilii radix ex mul-  
sa recentibus uel uini flocibus cum polentæ polline. Vel fenecion, & coria-  
num uiride cum uuis quibus acini sunt exēpti. Sin multus infestat ardor,

foliis alterci cum triticea farina, aut ciccris delinuntur: uel calami foliis,  
uel cucurbita syluestri cruda. Si uetustior est morbus cū duritie, cucume-  
ris syluestris radix in mulsā cocta, leuigataq; cum lolii farina admouetur.  
Item hoc efficax est auxilium, uuarū quibus acini sunt exēpti, unciz quin-  
q;: ciccerum subferuefactorū fescuncia, cumini uncia, sulfuris unciz nouē,

nitri uncia, resinz unciz tres & semissis. contrita omnia cum melle in cata-  
plasmatis formā digerens, utitor. cerata hæc sunt, olei cyathus, colopho-  
niz scilbra, molybdenæ, cumini, uuarum passarū, lomeni singulorū tri-  
ens, ceræ sextans. Molybdena cum oleo adusq; spissitudinem incoquitur,  
deinde cera resinaq; inditur. Sublatū ab igne egelidū, uuis contritis, farinis

q; superfunditur. ALIVD. Olei anethini & rosacei, ceræ, resinz piceæ, sin-  
gulorū quincūx, cumini unciz duæ & semissis, stercoris asinini fescuncia,  
cuminū reritur cū stercote asinino, ceratūq; refrigeratū miscetur unaq;  
leuigatur, deinde in panniculū illitum admouetur, lana superaccommo-  
data. olei omphacini uel buryti, uel resinz aquali modo utiq;. Quod si à

sudoribus ulcera in scroto excitent, gallam detritā, uel alumē inspargito,  
pingui & hircino felle perungito. Porro ad testes incēsos tertam cimoliā

modicus, sitis indicitur. At si prorogatur uitium, cucurbitulæ cute ferro incisa defigendæ sunt. Si plenitudo adsit, etiam hirudinibus uacuare, & uentrem cruda polenta oblinere, alienum non est.

## DE PRIAPISMO.

## Cap. LVII.

**P**riapismus est firmū genitalis incrementū, quod in lōgum latūq; intumescit, citra ueneris appetentiā. statulentus nimirū est spiritus qui particulā in timorē attollit, humorū uiscosorum crassorūq; soboles, modici caloris beneficio. Notū uero est cuilibet, particulas non esse calefaciēdas, sed leniter refrigerandas, cetero rosaceo cum aqua cōtuso, item chamæmelino in genitali & lumbis imposito, uictus & medicamenta exhibentur, quæ extenuare citra manifestū calorem possunt. Applicabūtur etiam quæ naturali modo operantur, experimentis ac usu probata. Nymphæa his quoq; potui dabitur, agni semē, rutæq; uiridis obloniis mixtū. Sed per iniria id non assumi debet, ut quod uehementer calefaciat: uerum post aliorum extenuantium usum. Id faciundum uenit, cum uacuationem per uomitum moliris. Nam uicissim partes sæpe per aluum inferiorem profluunt. Exercitium fricatioq; spiritibus discutiendis recte adhibentur. Nulli prædictorum uenus prodest, nisi quibus ex huius abstinentia semen abundare coniicimus.

## DE PARTICVLIS INEFFICACIBVS. Cap. LVIII.

**V**i hoc uirio laborant, non ruunt in uenerem, eoq; animum perdunt. Causa horum est, particularum resolutio, uel seminis inopia. Cum igitur ea quæ semini generando sunt, libro primo inter præcepta salubria exposuerim, tum quæ simplici uirtute ad uenerem incitant, nunc ualētiora adiciere oportet. Communi ter igitur medicamentis quæ à lassitudinibus resciciēdis, acopa dicūtur, ad resolutionem inscriptis, hic quoq; utendū est. Priuatim stellio concrematus, in pollinemq; reductus magno dextri pedis digito, oleo adiecto illinitur, & uenus exercetur: ubi cessare uoles, digirus abluitur. Iam medicamentum ex stellionibus efficax est. Potui uero dantur quæ incitant, quale hoc primum est, piperis, baccarum pini, petroselinī, ceruini genitalis ramenti, terebinthinæ pares portiones. melle excipiuntur. **ALIVD.** Cicerum crudorum, baccarum pini, singulorum uncia duæ seminis erucæ, piperis, singulorum uncia, mellis datur quod drachmas duas impleat cum uino.

**I**tem satyriacæ dicta ex multis composita congruet, atq; id genus alia. Inspicere præterea oportet reliquas morbi causas, & conuenientem ipsi curationem accommodare.

## PVDENDORVM ET ANI REMEDIA. Cap. LIX.

**A**turalium aniq; ulcera citra inflātionem oborta, medicamentis indigent, quæ uehemēter rescicant: cuiusmodi sunt ex charta combusta, anethū uisum aridum, cucurbita cōcremata. At siccis

recentibusq; ulceribus, etiam aloë præsens est remedium, si arida in pulue-  
 rem redacta applicetur. Porro omniū lenissimum est, & nihilominus ef-  
 ficax pompholyx. At si humidiora euenerint ulcera, piceæ cortex per se,  
 & lapis hæmatites. sin altè descenderint, manna miscebitur. Si pascēdo ser-  
 pant, lēticula cum malicoriis illinetur, utendumq; est Coraco ex oxy me-  
 lite appellaro, & bithyno, ad hæc, eo quod ex charra componitur. Rimas  
 autem naturalium sedisq; Græci uocant rhagadas, iuuat resina fricta cum  
 rosaceo contrita, ut sordidū fiat spissitudo, adiecto etiam luteo oui, opioq;  
 uel hederæ foliorum combustorū cinis cum rosaceo in plumbea pila tri-  
 tus admouetur. Iam pastillus ex œnelæo, & lithophrigium admodū pro-  
 bata sunt remedia ad rimas, rum sordida ani ulcera, præsertim quæ elidi  
 nequeunt. **ALIVD** simplex, quod etiam acrimoniam obrundit. Cadmiæ,  
 piperis singulorum unciz dux, rosarū ungue ex foliis defecto, unciz sex.  
 Aridum inspergitur parti, apio quam nostri radicem syluestrem uocant,  
 prius abstergæ. Ad condylomata uero faciunt chalcitidis, hyssopi, medul-  
 læ ceruinæ, rubi foliorū æquales portiones cum cerato, idem præstant pa-  
 stilli ex œnelæo similiter. Quod si in cole inrra genitalis foramē ulcus de-  
 lituerit, pus, uel sanguis citra urinam redditus fatebitur. Curatur primum  
 dilutiore mulsâ collutum, mox lacte, postea collyrio asteri lacti mixto,  
 aur albo pastillo, aut is qui uocatur dialorion in blumbea pila subactus  
 demittitur, uel etiam penna tincta perlinitur. inde renue linamentum tor-  
 tile unctum imponitur. Præstantissimum uero est etiam quod capit gal-  
 læ, pompholygis, amyli, & aloës pares modos, rosaceo & plantaginis luo-  
 co maceratos.

#### AD NATURALIUM DOLORES.

Butyri, resine, paribus portionibus pulchrè liquatis perungito uel seminis  
 lini succo, æquum myrrhæ & resinæ frictæ pondus leuigarum imposito.

#### AD INTUMESCENTIA PVDENDA.

Vitis foliorum tenerorū pondo denarii, cerussæ pondo denarium quinq;  
 trita applicantur. Cæterū fotu ex aqua marina frigida coles recreatur, de-  
 ligaturq;. Carnosas naturalium excrecentias, quas Græci rhymos uocant,  
 cōpescit, nec finit rursus augescere cinis palmitū cum aceto illitus, itē sali-  
 cis corticis combusti cinis. In uniuersum & thymus, & myrrhecia, & uerru-  
 ca pensilis quæ dicitur acrochordon per medicamenta ualenter exulcerā-  
 tia eliduntur: iis autem quæ exedunt, emoriuntur. Propriè contra hæc ui-  
 tia proficit, clarerium cum sale impositum, grossi cum aceto, nitro & fari-  
 na. Liquor fici illitus, smaridis caput falsum cremarum in cinerem, ærugo  
 cum sulfure uiuo cōbusta, tithymalli liquor illitus, ocymi folia cum atra-  
 mento sutorio, uel heliotropii maioris fructus cum uino iniectus.

#### AD ANI INFLAMMATIONEM.

Cerussæ pōdo unciz quatuor, pompholygis pondo uncia, uel cadmiæ te

neræ, thuris pondo uncia: fereos succi liemina diluuntur, succus autē pau-  
latim affunditur, donec absumatur. Deinde ceratum ex unciis duabus ce-  
ræ, & rosacei libra confectum: ubi deraferis, miscetur: ualideq; emollitur.  
Demittitur autem instrumento quod *πυλινξ* Græci nominant, & super-  
deligatur, facit autem ad ani fistula cum inflammationem sentiūt. item ad-  
uersus sedis exulcerationes, cum ardore, aut rosione infestantes.

## AD SEDIS ERYSIPELATA.

Medicamenti, quod ab herbarum succis diachylon appellatur, pondo  
libra, rosacei quantum satis est, panis puri pondo libra, croci pondo uncia,  
10 opii pondo uncia. crocus & opium passo macerantur, panis aqua. Deinde  
leuigatis ipsis, medicamen diachylon, & rosaceū admiscetur, emolliturq;.  
Vtile est etiam ad podagras calidissimas. ALIVD. Arcet ani inflammatio-  
nem cerussa cum uino, rosaceoq; in pila plumbea, & cochleari simili trita  
inunctaq; uel cerussam & oui candidum rosaceumq; in eadem pila leuiga-  
15 ta, dum sordium spissitudinem habeant, perungito.

## HEDRICVM AD ANI DOLORES.

Alterci folia tenera, portulacę folia tenera, micas panis in uino tinctas,  
ouorum tostorum lutea pari pondere, rosacei quod satis est, ubi locum ro-  
larum & melilori decocto foueris, cataplasma imponito.

HEDRICVM OPTIMVM AD ANI INFLAMMA-  
tiones, eiusdemq; excrementias.

Cerussa, spumę argenti, suffiminis ammoniaci, bdellii, singulorum scrupula  
sex, terebinthinę uncia, cerę semuncia. Arida succo solani, alterci, uel  
portulacę conteneruntur. Quę liquantur, ubi illis adiuncta fuerint, excipi-  
25 to. Et solutis rosaceo, utitor. Tam medicamen phicotyche, & ex plumbagi-  
ne præparatum. Ad hæc quod Græce dialotarion dicitur. Præterea pastil-  
lus ex halicacabo & ex rosas ad ani inflammationes genitaliumq; laudata  
sunt remedia.

## AD EXCRESCENTIAS ANI.

Excrecentiis si inflammatio adest, opitulantur generatim iam comme-  
30 morata, & proprie hic pastillus: Cerussę quadrans, pompholygis uncia, ar-  
genti spumę sextans, mastichę scrupula sex, alterci succo excipiuntur. Si  
careant inflammatione, cupressi galbulorū combustorum cinis loco do-  
lenti, uino prius absterfo inspargitur, uel cucurbitę aridę corticis combu-  
35 sti, uel palmularum ossium cinis similiter, uel testarum ouorum, & scēni-  
culi cinis, uel succi mali Punici foliorum, & qualis modus. Vino albo deter-  
sa pars diebus septem eluitur. callosa autem tubercula calce & auripigmē-  
to cum aceto acri trito recte etiam in sole perungis.

## DE HAEMORRHOIDIBVS.

40 Venulis, quę in ano extant, iusto largius inanitis, habitū in aquam subter  
cutē resolui cōtingit, & affectos infeliciter cibum sentire, ac contabescere:



v. scriptor. 12.  
 lib. 6. c. 12. acut  
 lib. 12. c. 5. m  
 cum. lib. 6. c. 12. ap.  
 18?

periculum uero est, ne largum quoque sanguinis profluium accidat, quemadmodum ne idem in totum supprimatur: unde laboriosa est curatio. Quare cum plura uenarum ora in ano pateant, unum non suppressum purgationis gratia relinquere oportet. Quædam superius cæcæ delitescunt, eoque uix curantur, quæ quidem nihil excernunt, sed dolore mouent acriorem. hæc succo cyclamini illito adaperiuntur. Contra eas uero quæ immodice fundunt sanguinem, spinæ Aegyptiæ, foliorum sambuci, artemisiæ, singulorum uncia quinque, sideritidis uncia quatuor. coquuntur in aqua heminis octo ad dimidias, inde herbarum proiciuntur. aqua uero miscetur aridum hoc, cretæ futoriæ, <sup>μυδακτυλίας</sup> Græci uocant, aristolochiæ rotundæ singulorum drachmæ octo, argenti spumæ drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, misyos drachmæ duæ, sereos tantundem. ubi aridum decocto solueris, septies quotidie intro rato. insecuto die pari modo aliam confectionem mensura æquale indito: sic tertio. Et si reliquæ aliquæ remaneant, quarto die acicula compunges: si sentiat æger, aut cruor emanet, decoctum similiter facit. aridi uero partem dimidiam miscebis. Cum foueris, arido attingito, ut exacte aduratur. panis ob inflammationem illinitur. A L I V D. Panis purus in garum primæ notæ tinctus,ustusque in nouo fictili, & pertritrus illinitur, ano prius uino abluta. Facit etiam ad tubercula. A L I V D. Sereos denarii duo, chalcitidis denarius, misyos tantundem, atramenti futorii, quod chalcanthum dicitur, denarii tres, <sup>20</sup> aluminis scissili denarii nouem, zris combusti denarius, cretæ futoriæ denarius. sicco utitor. Cibi erunt iis qui supra modum inaniantur, pauci sanguinis, efficaces, & minime recrementitii, quique siccant, & astringunt, cuiusmodi est chondrus ex posca lotus: oryza & alica. Ex oleribus conueniunt intybus, choreum, portulaca: inter uina, quæ astringunt. In hæmorrhoidibus autem <sup>25</sup> cæcis, his contrarius uictus proderit: potissimum uero lolliginum, sepiarum, mulripedarum, torpedinis, selachiorumque: esus probe conueniet. hæc enim sanguinem commouent, item quæ mensibus ciendis sunt, hisce congruunt.

## AD PROCIDENTEM ANVM.

\* Melius  
 drachmæ octo,  
 ut habet  
 Galenus in  
 eodem medi  
 camento.

Eriæ fructus, gallarum, cerussæ, acaciæ, hypocistidis succi, piceæ corticis, <sup>30</sup> thuris, myrrhæ minyæ, paria pondera. Sicca admoueto, ano uino prius austerio deterfa. A L I V D. Recrementi plumbi, rhus syriaci, singulorum uncia octo, rosarum floris drachmæ quatuor, myrrhæ minyæ drachmæ duæ. Vtitor sicut priore. A L I V D. Piceæ corticis, mannæ, spumæ argenti, singulorum drachmæ octo, cupressi orbiculorum siccorum, plumbaginis singulorum drachmæ duæ: utitor quemadmodum præceptum est: item urina ipsius ægri calens adhuc superfusa adiuuat.

## DE VTERI AFFECTIBVS ET PRIMVM

de mensium purgatione. Cap. LX.



Vt utrum plurimis, menses quarto decimo anno fluere incipiunt: paucis, ante tertium decimum, aut duodecimum, plerisque autem <sup>40</sup>

post quartumdecimum erumpunt. Tempus cuique purgationi statum non est, ordinatumq; multis ad duos tres ue dies, haud paucis usque ad quintum profluit, aliis etiam ad usque septimum: raro ad duodecimum purgatae sunt. Porro desinunt mēstrua aliis anno quinquagesimo, paucis autem usq; ad sexagesimū durant. Nonnulli à trigintaquinq; annis, praeteritum obelis, menses cessare incipiunt. Strāgulata igitur purgatione, laudum est circiter statum menstruale tempus, ac praesumetur potui, aut salsum, aut capita porri cum pipere, & ruta simul incocta. Potio autē ex passo cretico erit, cuius heminē mensura porta ambulationibus mēstrua dimoueātur. Cibus sit, lolligines, scipia, polypodes, & quae eiusdem sunt generis: quippe sanguinem proprie commouent.

## DE MENSIVM SVPPRESSIONE.

## Cap. LXI.



Vpprimitur mēstrualis purgatio, interim toto corpore male affecto, nonnunq; uero locis peculiari uitio cōsuetudinibus ex frigidityte insita, aut ictu, aut intēperie abortū, seu acq̃sita malignitate: magna uero ex parte ob hebetudinē: uel principaliore quadā parte primario affecta, nēpe iocinore, aut uētriculo, aut thorace, aut id genus aliqua, lōgo mōrbo uitata. At suppressio cōplures affectus lōgos solet procreare. Cū igitur propter aliquod interancorū uitium primariū purgatio circūciditur, aut strāguletur, ex usu maxime fuerit, id quod primario afficit curare, inde uteri habere rationē. Notā quibus hac deprehendūtur, in superioribus sunt exposita. Cū uero nihil illorū adfuerit, cōstat liquido primario affectu occupari. Itaq; si aetas nō prohibet, aut habitus, aut aliud quippiā, uenā oportet incidere, idq; nō ante statū mensium tēpus: sed ubi iam accesserit, decē dies superadiiciātur. Detrahetur autē sanguinis, neq; plus duabus libris & semisse, neq; minus una, si quidē uenā diuiserimus. Sin aut non, hiera diacolocynthidos purgari debēt, duarum drachmarū pōdere, in sex mullae cyathis. Si febris adsit, hiera quidē uti nō expedit, uerū sanguinē mittere in primis febriculā diebus est opportunū.

A purgatione reficiendā sunt mulieres diebus pauculis infecuris, exercēdā obambulationibus, inferiorū frictionibus, & balneo. Cibi congruū distribui faciles, & liquidi, olera dulcia oīa, pisces saxatiles, ex auiibus teneriores, lactis potio, ex melle cōfectiones, *μαρτυριαν* uocāt, uinū tenue, album, nō adeo uetustū. carnes inidoneae his sunt, & legumina, praeter prisanam.

Vbi statū mensiū tēpus propinquū est, dātur ex marinis selachia, & malachia, ut dictū est, item ostracoderma, hoc est, testaceā cutē sortita, capitata porra, cū ruta & pipere cocta, corūq; ius potui datur, infernae partes uinculis, tribus quatuor ue diebus constringūtur. Cū instat tēpus purgationis, tollitur deligatura, myrrhae obolus bibitur, aut fabae instar, uel castoriū ex passo, aut mulla, uel decoctū artemisiē, aut saluiē post balneū ex passo absinthioq;. Absinthites autem uinum per totius curationis decursum po-

tatur. Vbi accesserit iam mēstruale tempus, si nihil, aut nulla mentione di-  
gnum fuerit excretū, ex ralo sanguis detrahendus est. Post septimum, aut  
oñtauum diem, purgatione ex hiera utendū est, secūdum quartum diem,  
dropax pubi, lumbis & feminibus applicetur, atq; aque potu triduum usa,  
sinapi cum aqua panis macerati portione adusq; aequinoctiū admoueat,  
deinde lauet, insecuto mēse figus liccatae in vicem panis miscantur deco-  
cto scēnugræci, maluz, pulegii, rutæ & artemisiz. In sinū uero dimittetur,  
fulinum, aut amaricinū, pessusq; enneapharmacus, aut libanius. Est autē  
pessus lana pectita, siue quodcunq; aliud teres, digiti humani formā præ-  
ferens, quo medicamēta sustinentur. Hæc igitur curatio plerisq; ad purga-  
tionem abunde fuit. sin autē uehementioribus indiguerit medicamentis,  
hæc sunt, iris illyrica cum uino pota, iunci angulosi, ariq; radix, calia, iunci  
rotūdi flos, & nardus, helenii radices decoctū, myrrhæ ad sabz Græcæ ma-  
gnitudinem cum passo ex dimidio multæ cyatho pota, atq; dictamni de-  
cocti cyathi duo, item ammoniacū & sagapenum. Quæ minus stomachi  
uiriis sunt opportuna, etiam opopanacis paululū in globulos redactum  
percocto melli intrinctū, assument. Iam uero consueta nobis semina men-  
ses mouere possunt, sed minus: sceniculū, cuminum, apium, daucū creti-  
cum, sefeli, ami, sinon, cicer, fructus cedri, ac omnia quæ urinā prouocant.  
Accedunt huc myrrhæ, absinthii, aut lupinorū decocto trita aut rutæ suc-  
co leuigata, bdelliumq; similiter, styrax, syluestris olez gummi, aut rutæ  
succi itidem, aut longa aristolochia, in collyrii formam concinnata. Per-  
similiter etiam magni centaurei radix, aut ueratri, aut liquor scammoniz,  
& cucurbitæ medulla per se, & artemisia applicata cum ruta, insuper & gal-  
banum suffumigatum. Eadem uero & fœtus solent educere.

## DE IMMODERATA PURGATIONE VTERI

&amp; sanguinis profluui.

Cap. LXII.



Immodicæ purgationes mulieribus oboriuntur, interim mē-  
sibus confactim ac concitatus erūpentibus, interim ob par-  
tus grandiores, quæ plerunque etiam sponte sua cessant. Cre-  
bro autem abortiui fœtus causa, uehementi laborant proflu-  
uio, ut subinde periculum accedat. Imprimis igitur extremi artus ab alis  
& inguinibus, uinculis excipiuntur: Posca non frigida potui datur, eadem  
que fouetur, iniiciunturq; loco multæ lanz, ex uino, oleo, uel rosaceo, uel  
melino, uel myrteo expressæ. Cibus dabitur chondrus lotus ex posca: uel  
oryza, uel alica: uino abstinetur. Eius loco hydromeli austerum, aut om-  
phacomeli, aut huiusmodi quippiam ipsis exhibetur. Balaustium in po-  
sca propinatur, uel hypocistidis, uel acaciæ succus, uel lycium, uel samius  
aster, uel immatura uua sicca, uel rheon, uel lenticulæ ex Italico fistili com-  
bustæ cinis. Aut sesamum editur in posca madefactum, quoad molle de-  
licatūq; euaserit: insinuada uero per naturalia, sanguinis fluorem sistunt,

hypocistidis succus, aut acaciæ cum manna in aceto contrita. Mirifice auxiliatur spongia in uino, aut liquida pice demersa, appositaq; uel combustæ ipsius cinis cum aceto, uel posca admotus. Similiter etiam ilicis italico fictili cōcremata cinis. A foris autē imposita iuuant astringentia epithemata, & confecta ex palmulis, & cotoneis: cataplasmata, quæ melicoria receperint, aut ilicis glandis, aut rubi furculos, aut lentisci folia, balaustiu, acaciam, hypocistidem, gallam, brathi, alumen. Maxime uero hoc, taurocolle madescit posca, quousque soluatur. deinde in linteolum ualidum illinitur, lumbisq; agglutinatur. Efficacia ad hoc sunt, & glutinantia emplastra, ueluti Armonia, Icesios, Athenæ, Nelinæ, Indica, & similia. Pessuli quoque ad sanguinis profluuium sunt utiles. Gallæ interius leuigatum, & thuris lachryma aqua diluta apponitur, uel cytini, uel mala Punica dulcia similiter, uel polygonum tritum. Componuntur autē, aluminis scissi, gallarum interioris, acaciæ succi, mannæ, singulorū drachmę quatuor, ouorum tostorum lutea quatuor: arida leuigantur succo plantagininis, miscenturq;. Cum usus exigit excipiuntur in pessum lana, & in rosaceum intinguntur, applicanturq;. Iam cucurbitulæ leues magnæ frequenter subter mamillas affixæ abunde retrahunt. In seßus autem profluuiio sanguinis laborantibus conuenit, ex marino iunco, Gręci uocāt oxyſchœnum, capitibus myrti, rosis, rhamni foliis, rubi furculis, æquali pondere in aqua coctis. ALIVD. Mali Punici dulcis radicis corticis, myrti, cupressi corticis, singulorum tres partes, gallæ pars una, aquæ quod satis est. In fundito autem per oricularium clysterem succum plātaginis, aut seſeos, aut polygoni, aut solani, aut perdicti herbæ, aut pſyllii, aut hypocistidis, aut acaciæ, eaq; lana aut digito, aut specillo, aut pinna in longitudinem figurata, adusque orificium imponatur. Insuper pastillus Andronis per oricularium infusus cum quodam ex succis commemoratis, aut uino astringente efficax est remedium.

## DE FLVORE MV LIEBRI.

## Cap. LXIII.

**V**lva fluor, totius corporis recrementi est distillatio. Talem uero speciē id quod euacuatur, repræsentat, qualē humor in corpore superās. aliud rubrū, ueluti sanguinis sanies, aliud cādidum, pituitæ soboles est, pallidū aliud, aliud biliosum, interim aquosum. at si sanguis purus, sicut in uenarū sectione, efferatur, attendendum est accurate, ne quædā in uulua erosio sit excitata. his notis fluor deprehenditur, loci cōtinue madent humoribus, colore uariantibus, laborans decolor est, cibū nō sentit, eumq; fastidit, in obambulatione difficulter spirat, oculos habet prætumidos, nūc cum dolore, nūc citra illū, aut cū exulceratione, aut sine illa, aut inflāmata, aut fordida, aut puræ. Toti igitur corpori auxiliantur quæ citra manifestū calorē exiccant, cum affectus sit humidus, frictio totius corporis, & unctio ex melle abūde cocto, medica-

mina dātūr urinam, cēntia, utpote aqua, cui a sarum & apiū sit incoctum; uacuatur etiam totum corpus per aluum: prāterea portulaca commāducata, succusq; ipsius potus prāsidiū est. Item balaustium, rubi fructus & flos, roboris pars quā sub cortice habet, trunci membranofum, & quod glandis putamini subest. Equisetum maxime sistit rubrum fluorem, potum ex aqua, aut uino. Vel hypocistis, lētisci fructus torrefactus, cum uino sumptus, famius aster, lemnia sphragis, coagulū leporis, aut hēdi, aut ouis, aut uituli, aut cerui, uinacea trita, myrti, uua immatura sicca, piceæ cortex. & quæ ad uulua sanguinis profluuiū laborantem dicta sunt, nō admodum efficacia. Vbi uero cum labore fertur, per siphonem uteri, clysterem uel alicū succum, aut prisanā, aut tragi, aut oryzæ demittes cum aliquo medicamentorum quæ dolorem sopiunt, <sup>et sic</sup> Græci uocant, & in accessionibus recte lenies. Cum remittit, circuitum enim nonnunquam habet, dimouere gestationibus, diuersisq; obambulationibus & uoce, inunctionibus, cucurbitulis, dropacibus ad partes supra positas, insolatu, frictionibus, psilorhris, smegmaris, sinapismis, uomitibus à radícula uti consuetum est. Recolliguntur uires, balneis, uino, uario ciborum genere.

## DE INFLAMMATIONE UTERI, ET

declinatione.

Cap. LXIII.



**I**nflammatiō uulvæ, pluribus ex causis oboritur. nempe ex ictu, mensium retentione, frigore, & inflatione: adeoque ex abortu, item ex fœtu sinistre edito. Comes inflammatio nis uulvæ est febris acuta, dolor capitis, tendinum, basis oculorum, brachialis, digitorum, & colli conuulsio, inclinatio in aduersum, stomachi ex consortio dolor, oris uulvæ coniuuentia, pulsus exiguus, crebrisque. Et si languida fuerit inflammatio, haud ualido uteri dolore torquentur. Sin uehemens, & ipsa tota pulsatilem cruciatum percipit, undequaque inflammatione oblecta. si pars ipsius illam sentit, in ea magis dolor intenditur. nam si posteriora ipsius solum laborent inflammatione, dolor lumbos inuadit, stercus in longanone compresso retinetur. si priora, dolor pubem occupat, & stillicidiū, aut urinz difficultas uel sic pressa excitatur. larenbus inflammationem expertis inguina tenduntur, & crura grauātur. posteriore uteri parte inflammata, in umbilico dolor potissimum cum tumore infestat. Cum uero os uulvæ inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoq; immisso os occurrit durum rigidumque. Itaque in curatione primum usui uenit fœtus ex ænelæ, uel uino rosaceo, super pubem & lumbos adhibitus hapsis ex lana puriore citra deligaturam. Cibo abstinetur triduum, secundum quod sanguis ex cubito mittendus est, si nihil prohibet. Curatio absoluitur chondro ex aqua mulsa, uel pane, uel ouis sorbilibus, uno die interposito. Post quintum, cataplasma superaccommodatur, polline farina ceo, semine lini, fœnu ugræ-

co, ex mulla in qua papauerum capita decocta proücianrur & ex oleo. At  
 si inflāmatiō erysipelatis naturam sortita excandescat, meliloto in passo  
 cocto tritoq; ouoꝝ tostor; lutea aduicito cum rosaceo, uel melino, uel cro  
 cino, illinitoq; aut palmulas uino tēperato feruefactas, cū polentarū pol  
 line, aut quodā ex enumeratis unguētis leuigato, perungitoq; in morbi  
 5 declinatione ceratum nardinum, aut cyprinum iniiciendum est. Per to  
 rum uero morbi decursum, etiā infessus utiles sunt ex decocto sœnugræ  
 ci, seminis lini, maluæ, artemisiæ, & oleo. In iis autē quæ non sustinent ca  
 lorem, ex aqua calida rosaceo superfuso: pessos autem infusionesq; adhi  
 10 bere cōuenit ex hyssopo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, unguē  
 to fusino, & cera thyrrenica. in quibus autem calorem ferūt, etiam pessus  
 qui ab aureo colore chrysus nuncupatur, ipsis cōueniet, item enneaphar  
 macus: rursus in quibus non tolerant, ex ouo, rosaceo, adipe anserino, uel  
 gallinaceo adaptabitur. Portō ad inflammationes magis furibundas ex  
 15 herbatum succis pessus in uase fictili cū rosaceo liquefactus miscetur suo  
 co plantaginis, uel seteos, uel cichorii, uel intybi. Aut hoc utere: adipis an  
 serini, uel suilli recentis drachmis quatuor, cerati rosacei, uel fusini sextan  
 te, ouorū tostorū luteorū uncia, croci drachma, myrrhæ tribus obolis, o  
 pii obolis duobus, uel loco opii, papauerū capitum decocto: si dolor mul  
 20 tus excruciat, lachrymę papaueris instar lēticulæ cū lacte muliebri, & suc  
 co sœnugræci apponēdū exhibeto. At si inflāmatiō cum duritia infestat,  
 medicamentū rosaceo solutum, applicatur, uel infunditur. Si à naturali se  
 de in latūs uulua declinauerit, per accessiōes similem inflammationibus  
 curatiōem recipiet, ubi remittitur dolor, leuioribus utēdum. At ubi ma  
 25 lum inueterauetit, roborantibus, quæ metasyncritica dicunt. Extrinsecus  
 autem duritie oborta, malagmatis pugnandum, nempe ex sertula campa  
 na confecto, item Mnasei, lcesio, nigro Serapionis, aut pyriño: uictus au  
 tem per initia tenuis adhibetur. Cum paulum releuati fuerint ægrotātes,  
 ad balneum ducentur. Varius magis cibus & leuior utilis erit.

## DE VVLVAE ABSCESSV.

## Cap. LXV.



30 Nflammatione in abscessum transeunte, dictæ quidem notę  
 intensiores erūt. Præterea inordinatæ cum horrore accessio  
 nes ipsi obueniunt. primis quidem temporibus intēsa, cumq;  
 doloribus ad ultimum, ubi suppurauerit aliquantulū remi  
 35 tunt. Postquam uero erumpit uomica, dolores acriores subinde uisi sunt,  
 ceu lacinantes & punctus modo incidere, febriculæ uehementiores infe  
 stant. Atq; urina nonnunq; retinetur, aliquando stercus, impedimento in  
 affecta uteri parte facto. Aliās tumor in pube eminet, & ueluti exundatio  
 nis sensus, cū abscessus maior fuerit. At quod in expositis locis est, etiā ori  
 40 culario spicillo, aut digitor; tactu deprehēditur, propter quod dolores ob  
 neruofam oris uulua membranā acriores urgēt, sicut in fundo sinuq; mi

male uerit nob.  
 legēda erit. si quis  
 exalta exnabit  
 v. de omib. cap. ubi  
 lib. 1. ad eupt. lib.  
 male etia uerit in  
 tunc. Actū lib. 16.  
 cap. 79. reuocatur  
 hūstus. id q. omib. a  
 lib. 1. p. lib. 1. actū:

nus doloris percipitur, & digitis quidē tumor non cedit, os autē gracilius ostēditur. Suppuratio celerius adiuuāda est cataplasmatibus ex sœnugrœco, semine lini, farina hordeacea, aut frumētacea, cui ficus coctæ addiciantur, interim & sterces columbinū. Infeſſus ad inflammationē scripti, frēquentiores utiliter usurpantur. Item pessuli ex terebinthina, myrrha, hyssopo, butyro. Abscessu autē rupto, si ad uescicā pus euaserit, lactis & cucumeris seminis potu utendū est: sin ad langanōnē, lenticuli & malicorii decoctū indetur aluo. At si in sinū purum quidem pus eruperit, rosaceum infunderetur, aut cādidum oleum, aut tetrapharmacū basilicum, aut butyrū recens. Quod si effusa sanies tenuis, sœtida, ceu ab ulceribus depascētibz, magis astringens erit enema ex myrto, palmulis, & lēticula. Si ueto humoribus etiam excretis, inflāmatio diuexet, persistere in cataplasmatibus, & infeſſibz, ratio est. Cæterū si in uulua ostiolo, abscessus sit obortus, neq; tumpatur, partibus, quæ puri incumbunt, extenuaris, ad pus expellendū, quod manu administratur, diuertere consilium est, ut in chirurgica pertractabimus.

## DE VTERI EXVLGERATIONE.

Cap. LXVI,



Ulceratur subinde uulua ex infelici partu, aut sœtu excusso, aut corrupto, uel ex medicamentis acribz, uel fluore, uel abscessibus disruptis. si igitur prompta in conspectum uenerit exulceratio, spicillo oriculario, quod *ὀρίκτιον* uocāt, deprehenditur. sin alte defederit, ex recrementis. Humor enim diuersus excernitur: inflāmato quidem ulcere, paucus, cruentus, aut sœculentus cum magno dolore: sordido, copiosior, & sanies cum minore cruciatu: depascēte, sœtidus, niger cum doloribus uehementioribus, aliisq; inflāmationis signis, præterea quæ laxant medicamina, hoc irritant, contraria leniunt. Cum purum ulcus est, humor paucus, æqualis, odoris experts, crassus, candidus, ob exquisitū loci sensum exciratur. Si inflāmationē experitur ulcus, iis, quæ ad illam scripta sunt, utendum est. In sordido, pitisanq; cremor cum melle ano immittendus est, aut tetrapharmacū cum susino, uel mulsa, in qua sœnugrœcū sit decoctū, aut malua, aut furfures, aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro quo magis expurgeret, etiam marrubium, aut eruum, uel melli adiuncta erui farina, uel iris, uel alumen rotundū, uel aliquid simile iniiciatur. Hæc ipsa etiā extrinsecus ex mulsa macerata illuntur. Peculiaris prodest hoc medicamētum. Crocus primæ notæ leuigatur cum lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cum adipe anserino inūgitur linteolo, uerum quod infra ponitur, isto quoq; efficacius dolores discutit. Capita papaueris in passo tēperato madescūt diebus tribus, deinde incoquuntur, donec emollescant, postea teruntur unā cum rosæ foliorum drachmis quinque, croci drachmis tribus, iure capitū papaueris admisto, inde ceræ cum rosaceo liquatæ denarii duo ipsis superfunduntur, ac pessulo apponuntur in rosaceo tincto. Salutate est etiam medicamen



ex ouis, croco, rosaceo, adipe ansetino, cerui medulla præparatū. Itē Aegyptia citra æruginē mirificē ad exulcerationes conducit. ubi pascendo serpunt ulcera cū inflammationē, illinitur panis egelida maceratus, ex hydromelite, oleo, althea, fœnugræco, palmulis pinguibus. Ceterū plātaginis succus, solani, polygoni, lereos indetur, primū per se, mox cum uino austero, aut aceto. At citra inflammationē serpentibus, robustiora iniiciuntur, ueluti decoctū malicorii, rosarū, summitatis oleæ, cupressi, malorū coroncorū, rubi, myrti, lentisci fruticis, rhamni, rhus coriarii ex uino astringente. postea uero aluminis, acaciæ, lycii, hypocistidis. ex eisdē uero decoctis parabitur etiā infessus: si nihil proficitur nō alienū fuerit medicamē ex charta cū posca primū demittere, deinde cū aceto, aut Anthērā, aut chalcitidē, aut atramentum sutoriū, eisdem liquoribus, & quæ dysentericis congruunt: cibus dandus boni succi modicus, purgato ulcere, egrorās balnearum ciborūq; uarietate sollicitari, uinoq; rehci debet, quo caro statim procreetur. Pelli loco apponetur medicamentū, diamoron, hoc est ex moris, dilutum cadmia, uel ladano, uel plumbagine. A foris autem emplastrū, quod cicatrici ducēdæ est, abdomini coxisq; imponitur. Quemadmodū enim cataplasmatū, ita etiā emplastroꝝ facultas per latētes meatus traheretur.

## DE CANCRO.

## Cap. LXVII.

**C**ancrorum uulū alii cum exulceratione, alii citra ulcus inuadunt. ubi igitur exulceratio non est, tumor in uulū ostiolo reperitur durus, inæqualis, prætumidus, colore fœculentus, subruber, interim subliuidus, ac uehemens dolor exercet inguina abdomen, imum uentrē, & lumbos. Ad manus contactū, uariamq; medicinam ex candescunt. Exulcerato autem cancro, præter dolores, durities, tumoremq; ulcera erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte, sordida, labris prætumidis, albicantia, concreta colluue humorū ingrata. Quæ uero pura uidentur, fœculenta, liuida, subrubra, & cruenta apparent: sanies inde manat continuo tenuis, aquosa, nigra, aut fulua, graui ter olens. Interdum uero & sanguis defertur, alixq; notæ in uulua inflammationem testantur. Itaq; affectus nulla medicina sanatur. Quemadmodum etiam Hippocrates pronūtiauit, lenire tamē est infessibus ex fœnugræco, malua, ac cataplasmatibus similibus. Insigniter autem leniunt, solanturq; in accessionibus malua, aut althea in mulla liquefacta, & rosacei paululo leuigata, illitaq;: Ad hæc cataplasmata ex ficis siccatīs, melilotis, ruta, thure, bu niade herba diligenter cum oleo confusa. Item quod constat palmulis in passo coctis, cui adiecta sunt ouorum lutea, polentaq; uel ex papauete cū coriano factū, aut polygono, aut feri. Hæc in doloribus usui sunt. Postea ceratū iniiciatur cum rosaceo, aut myrteo, aut cænāthino, aut melino, cū palmulis in passo coctis. propriè uero conuenit præparatū ex sedimento officinarū fabrilium, quod tostū leuigatur, & rosaceo cerato, adusq; empla-

stri spissitudinem excipitur, hæc quidem extrinsecus conferunt, intus aut olcū quoq; lenit locos ubi fuerint exulcerati, itē lac muliebri infusum. Pari modo succus plātiginis tepidus. Sin cruentū sit, succus polygoni cū thuris modico dolorē sopit. Ad hæc pessuli ex croco, muliebri lacte, lachryma papaueris, & hyssopi succo. Omnibus autē efficacius est etiā ad sedis affectus medicamentū quod recipit: Argenti spuma Italica lota scilibrā, thuris masculi, hyssopi, adipis suilli recentis, butyri recentis, ceræ thyrrenicæ, singulorū sextantem, rosacci triētē. Argenti spuma ex sercos succo trita, liquatis iniicitur. Cibus dabitur qui facile in corporis membra queat distribui, boniq; succi, uinum paucissimū, aquosum: acrium eius, & reple-  
tio omnis uitanda est, ut quibus cibi prompte corrumpantur.

## DE SCIRRO ET DURITIE.

Cap. LXVIII.



Cirrum contrahit uulua, aliās repente, ut nulla causa cuius præcēserit. plerunq; uero eundem inflammatio mouet, quæ nec soluta, nec in abscēsum mutata fuerit. At scirrōū genere comprehenditur etiā durities, quā *σκληρόμα* Græci uocant, circa uuluz ceruicē potissimum obucniens. Aequali scirrus tumore crescit, sed minus tactū repugnat, & cum mediocri dolore sentitur. Superuenit his, in aduersum declinatio, & tumor qui ratione depressionis uehementer renititur, item grauitas motusq; difficilis, non crurū modō, sed totius etiam corporis, atq; obeundis actionibus pigritia, sequitur non probè curatas, malus corporis habitus, aquam inter cutem representans. Per initia igitur sanguis educi, aut purgatio ex hiera Archigenis assumi debet. Deinde cataplasmata ex caricis hyssopo, nitro, absynthio: & cucurbitulas cute ferramento incisa admouere consilium est. Malagmata uero hæc, Polyarchion, & diaspermaton hoc est ex seminibus confectum, & quod baccis lauri constat. Inseſsus ex caricarum decocto, artemisiæ, pulgii, althææ: pessulos ex terbinthina, galbano, myrrha, iride, hyssopo, dropace, aquas naturales sulfuroſas, bituminoſasq; usurpare commodum fuerit: si uires constant, etiā ueratrum exhibetur.

## PESSVLVS EMOLLIENS.

Exemplar  
manuſcri-  
ptū nō habet  
○ Poſſet le-  
gi ex uſuſi.  
nā habetur  
ἀπὸ τοῦ αἵ-  
ματος ſit pro  
ἀπὸ τοῦ.

Ceræ ponticæ, nardini unguēti, singulorū quadrans, irini, gleucini, cyprini singulorū & uncie duæ, adipis ○ agnini aſneriniq; butyri, hyssopi, medullæ ceruinæ, terbinthinæ, singulorū uncia. ALIVD. Polii drachmæ duæ, myrrhæ drachmæ quatuor cū uino Mendefio tritū irinoq; tinctū applicatur. ALIVD. Ceræ thyrrenicæ, adipis uitulini, terbinthinæ, medullæ ceruinæ, mellis attici, olei uetris, partes modos. MEDICAMENTVM roborans seu recorporaticium Græci dicūt metaſyncreticon, & ad inflationes, uuz paſſæ candidæ ſinc acinis, uncia tres, rutæ uiridis foliorū uncia duæ, aquæ marinæ ſeſcūcia, cymini drachmæ quatuor, mellis quod ſufficit. Inun-  
ctū uero peſſulū cyprino olco immergito, & apponito. Præterea Chryſus

ab auro sic dictus pessulus Libaniusq; & Enneapharmacus affectui sunt utiles. Verum Tiranus his magis accommodatur.

## DE MOLA.

Cap. LXXIX.



Ola quoq; induratus est tumor, interim in uulue ostiolo, interrim in tota ipsa quoq; prominet, unde in tophaceâ quoq; duritiem occalescit, tum ea quæ superiacent contrahuntur, corpus emaciatur, color prauus apparet, cibi fastidium urget, menses supprimuntur. Item mamillæ inturgescunt, ut in quibusdam per initia de sætu concepto sit suspicio. Insecuto tempore discernuntur: nonnullæ uero aquæ inter cutem præbent opinionem, sed hoc intercedit discriminis, quod tumor in duritiem occaluerit, nec sonus cum digiti iniiciuntur, quæ admodum in morbo hydropico, edatur. Cum autem uerè inrenditur, in aquam subter cutem degenerat. Nonnunquam etiam insanabilis magna ex parte affectus redditur, quibusdam & sanguis erumpit. Itaq; decumbere in domûcula angustiore minus luci exposita, modicè frigida, cubili immobili, omnibus ex æquo confert, sed ita ut pedes habeant elatiores quietosq;. Nam motus quamlibet fluxionem concitat. Ac tumores duritiasq; iis remediis quæ in scirris & duritiis uulue dicta sunt perfanamus. Porro hydropicas suffusiones, illis quæ in capite de aqua intercute comprehensa nobis sunt, sanguinis que exitum leuem qui hæmorrhoids dicitur, sicut eiusdem cum impetu effusionem quam hæmorrhagiam nuncupant, fluoremq; muliebrem curabimus. Cæterum sunt qui molam carnem asserant informem, ipsis uulue tunicis adhærescentem, fortis modo in lucem edi. Atq; hæc morbi species uictus ratione laxante tractabitur, quò citius excutatur.

## DE INFLATIONE VVLVAE.

Cap. LXX.



Nasat uulua ex frigore, uel humoribus in ea corruptis, uel ex ægro partu ostiolo conuiuente, uel sanguine in grumū intus coactio. Aliàs spiritibus in cœcauo ipsius spatii cōceptis, aliàs ueri corpore rarefactio tumor pubis & imi uētris comitat cū dolore pulsatili, qui ad septū transuersum usq; & stomachū inguinaq; pertingit, ac sonitus digitorū impulsu tympani modo reddit. Auxiliat ergo primū sanguis demissus, si nihil obstat, mox in accessiōibus inedia, fomentaq; ex oleo rutaceo adhibet: infusus ex ruta, pulegii, artemisiæ, cassiæ decoctio, si milibusq;, cataplasmata ex semine apii, cumini, fœniculi, anisi, ameos, farina lolii. Ad hæc cucurbitulæ, tū leues, cū cure incisa affixæ. At si diutius uirū se progauerit, purgatio ex hiera picra utilis est: dropaces, sinapismi, & aquæ naturales. Obstetrix aut prius digito perustio inserto grumū incurrit bēre si cōtingat, auferet, leniter ipm dissipās, rursusq; admouebit cataplasma, ex ficu, nitro, & absinthio. At epithemata mollietia erūt, Polyarchiō, diazpermatō, qd est ex seminib; & ex bacis lauri pparatū. Præterea pessuli ex

ruta, melle & nitro. Maximè uero hic conducet, ficuum siccatarum confusarum drachma, cumini drachmæ duæ, aphronitri drachma. at acrimonia causa, in lac prius immergantur. Iam emollientes pessuli sunt huic uicio accommodati.

## DE VVLVAE STRANGVLATV.

Cap. LXXI. 5



Trāgulatus uulua ad superiora recursus est, quæ principalissimas partes in doloris consortium perducit, utpote arterias, quas uocāt carotidas, cor, cerebriq; mēbranas. Comitatur affectas, cū accessio propinqua est, torpor mētis, pigritia, crurū imbecillitas, pallida facies, aspectus oleosus. Cū iam instat strangulatus, 10  
grauis sopor premit, quæ cataphora dicit, mēs desipit, sensuū instrumenta deprehendunt, impediunturq; uox obmutescit, crura cōtrahuntur. deinde maxillæ ruberæ incipiūt, faciesq; repletur. Cū remittet, humiditas quædā ad tactū ex locis muliebribus præcedit, sonus quidā exauditur ac aliquod ex intestinis progreditur, ipsaq; uulua paulatim laxatur, atq; sic mēs ipsis, 15  
& sensus redit. Ceterū morbus iuxta circuitū mouet, sicuti comitialis, idq; nimirū uulua repleta, aut seminali, aut alia materia, aut si hæc intus cōputruerit, ac multæ rursus à morbo sese recolligūt, nōnullæ uero in ipsis accessiōibus perierūt subito, quibus pulsus quidē crebriores, & inordinati, 20  
collabūtur. deinde etiā in torū abolentur. Modicus uero humor superficiali irrorat, respiratio primū languida est, mox in torū absconditur. Porro uitū hoc hyeme & per autumnū magis infestat iuueneculas ad uenerē procliues, steriles, & potissimum si ex medicina sumpta fuerint infœcundæ, itē alias perfrictiones expertas. In accessiōibus igitur summa deligare cōuenit, crura tota, corpusq; torū perfricare, ut animo destituta sese recipiant, item quæ fœdioris sunt odoris, naribus oportet admouere: Exēpli gratia, linamentum ex lucerna extinctū, castorium, picem liquidam, cedriā, 25  
lanāsq; laciniasq; combustas. Quidam uero & matulā naribus admouerunt cum utina ueteri, uel deiectione: cucurbitulas adglutinare uincit inguinibus & imo uentri cum multa flāma, & leues & cute incisa. Quod si lōgius accessio se produxerit, etiā quæ flatibus educendis sunt, proficiunt, ut quæ colica dicuntur, ano admota, nempe cuminum, nitrum cum melle. Item stercus clystere subducere profuecit, ne illorū appositu sedes premeatur. In uulua uero unguenta odoratissima infusa, ipsam solēt detrahē, si 30  
cut amacinū, malabathrinū: ac sinapi, partim naribus offeratur, partim applicet pedibus. Deinde inelamabit aliquis ipsas uoce asperiuscula, excitabitq; & ea admouebit quæ per sternutamētā cuocant, ex castorio, struthio, & pipere. ubi accessio conquirit, ad uomitum cogere, cibum nullū aut paucū præbere oportet. A septimo die, purgatio ex hiera diacolocynthidos dabitur, post triduum cucurbitulæ desigentur lumbis & iliis. Mox 40  
castorei potione utemur, nūc artemisiæ decoctio, nūc ex mulsā, in quibus-

\* Male Graeca exempla  
ria habent  
meo iudicio,  
in exemplum  
propter illi,  
in, quod p  
priū est pul  
sibus interci  
denon.

dam enim hoc uel solum ad integram morbi curationem abunde fuit. In  
 fessus porro & pessus mollientes his adiunguntur. Atque hæc ad accessiones  
 proficiunt, uerum ut totum corpus reficias, à sanguinis dimissione auspi-  
 catus, ad purgationem ex hiera transgredieris. Inde picram ex aloë factam exhi-  
 bes denarii pondere cum tribus aquarum mulsarum cyathis, diebus continuatis,  
 uel interpolitis mensura duorum denariorum, cum senis aquarum mulsarum cy-  
 athis. Iam dropacismos, cucurbitulas, & sinapismos utiliter applicas, nec-  
 non acopa ex euphorbio. Postea exercitui uti, frictione & clamore pro-  
 dest, denique & aquis naturalibus.

## DE VULVAE PROCIDENTIA.

## Cap. LXXII.



- Vulua procidit raro quidem, sed multis occasiōibus, uel enim  
 ab alto delapsa, & in coxas firmata, membranarum, quarum interane-  
 um id continent, ruptis, aut in difficili puerperio secundis ex-  
 tractis, quas uulua adhuc rescens sequitur: uel indiligentius im-  
 peritiusque mortuo foetu excusso, uel ex uulnere, uel aliqua animi perturba-  
 tione, scilicet nuntiatio filiorum interitu, aut hostium accessu, aut pericu-  
 losa nauigatione, aut eiusmodi quadam causa. Accidit etiam hoc mali to-  
 ta corporis mole soluta collapsaque, partibus illis languidis & resolutis, præ-  
 sertim in iis, quarum ab integra ætate longius iam senescentes dilabuntur. Ob-  
 tales causas procidunt in foeminis ad naturalia, loci. Quidam uero & totam  
 uuluam prolabi memoriarum produnt, quod à uero longe abest. Qua enim  
 ratione sursum acta queat affirmari: Cōuenit igitur foecibus clystere pri-  
 us euacuatis, urinæque excreta, quo uulua undiquaque sit libera, laborantem  
 figurare supinam, ut coxas habeat sublimiores, poplitesque flexos cruribus  
 diuaticatis. Deinde hapsum capere ex lana, figura & crassitudine sinui mu-  
 liebri proportionalem, tenuique linteo circumdare, & in succum acaciarum, uel  
 hypocistidis uino dilutum demergere, tum uulua inferere, & citra uiolen-  
 tiam totum quod procidit sursum agere, quoad totus tumor in sinu factus  
 subsederit. Pubes spōgia in posca expressa extrinsecus contegenda est. Mu-  
 lier iacebit extēsis adaptatisque inuicem cruribus, ut alterum alteri incum-  
 bat. Inde cucurbitulæ agglutinabuntur cum flamma copiosiore umbilico  
 & utrisque iliis: naribus odorata admovebuntur olfactanda. Tertio die la-  
 na sinui iniecta, mulier insideat in uino nigro austero modice tepido, uel  
 in decocto myrti, lentisci & malicorii. his probe peractis, lana ingesta tol-  
 litur. Altera in uicem prioris eodem humeta medicamento inseritur. Ca-  
 taplasmata à foris imo uentri superiniiciuntur ex palmulis, polenta, uel le-  
 ticularum & malicorio cum oxymelite, ac tribus diebus interpolitis rursus hæc  
 fient, quoad perfecte uitium discusseris. At si processu temporis id quod  
 prolapsum est, putredine fuerit expertum, id ipsum auferetur, nullius me-  
 tu periculi. Etenim si uulua uniuersum ablata, ubi computruerat, mulierem  
 superuixisse commemorant.

Alia  
 & uires  
 male pro-  
 xire.

utro uenerit fine  
 ablati sunt in xix.

## DE MULIEBRIVM LOCORVM CLAVSVRA,

quam phimon appellant.

Cap. LXXIII.



Oci muliebres circa ipsorum os clauduntur, uel ex præcedente exulceratione, uel durata illic inflammatione. Curabuntur in seffibus, qui emolliant, ex hydrelæo & fœnugraci decocto, consimilibusq; cataplasmatis & pessulis. Porro si malum inueterauerit, suffimentis uaporibusq; aromatum utendum erit. Iam uero soluit etiam hoc uitium cum nihil aliud sit quàm uuluz ostioli astrictio, pessulus ex hyssopo, nitro, resina, & terebinthina.

## VT STERILIS MULIER CONCIPIAT. Cap. LXXIII.



Ommuniter itaq; ambobus cōgruit, & uiro & mulieri uniuersum corpus cōseruare probe temperatū, laboris, cibi, balnei & reliquosq; omnium mediocritate, & quod inter ea maximū est, curare ne habitu sint obefiore. Neq; enim pingues liberis procreādis sunt idonei, eò quòd genitalibus mutuo se cōtingere haud possint cōmode, tū quòd momentū seminis emittāt. Neq; tamē nimis extenuati, liberis operā dare feliciter queunt. Iuuabunt autē ipsos omnia calefacientia & leniter infantia, uinum calidū modice sumptū. Et ex oleribus, cruca, horminiū, erisymū & consimilia. Ruta uero & calamintha omnino uitanda sunt. At si humorū quodam uitio fœmina non concipiat, has expurgare, aut proba uictus ratione emendare expedit. Proprie uero mulieribus conueniet, curam locorū genitalium q̄ fieri potest maximā habere, & menses sine ullo impedimēto emanare. Cum igitur propinqua est purgatio, cū bi potusq; q̄ maxime licet, mediocritatē, curæ habebūt. & ex iis quæ purgationi irritandæ sunt aliquid assumēt, utpote odorata olera & acria, exēpli gratia, scādicē, crethmon, fœniculū, apium, smyrniū. Porro uuluz intēperiem corrigere orporet: frigidiores, notat menstruorū retētio, uictus frigidior, & crassus succi, stupor in pube, lūbis, & cruribus oboriēs. Quæ uero penitus refrixerūt, ne uenerē quidē appetunt. Quare cōuenit tum aliis remediis, tum fomētis omnibus etiā iis quæ constāt sufficitibus, calorē reuocare. Nec abs re fuerit, castoreū bibere, & ex seminibus odoratis, cuminum, anisum, pulegii comā, iuniperi fructū, pipere singulis adiecto: at fomēta ipsorum genitaliū locorū, partim uapores crūt, qui inferius per sellā assumentur, partim aqua calida ad collutionē iniecta, in qua decoctus sit elclisphacis, artemisia, ruta, iuncus odoratus angulosus, pulegiū, acorū, seminaq; odorifera, hæc singulatim etiā pubi applicantur. Præsidio est, & Polyarchi epithema. Item pubis coxarumq; fricationes nihilominus conducūt. Insuper appositu utilia sunt, ex myrrha, ruta, galbano & castoreo, ubi prius aqua mulæ aut marina iuliam foueris. proficit etiam ad hæc pessulus gone appellatus. Calidiores locos fatetur corpus totū calidius, men- ses pauci & laboriosi, genitaliaq; mulieris exulcerantis: corriguntur modi-

*Quædam & Calamintha  
C. Lepthi ad uictus rationē  
Hormine. lib. 16. cap. 26.*

*.....  
.....  
.....*

40

ce humeris & frigidis, cuiusmodi sunt olera quidē, laetuca, malua, blitū,  
cucurbita, cucumis, pepon, atriplex, portulaca, aliiq; cibi conſimiles. ueſi-  
 ca, abdomini & lumbis frigida applicantur cataplaſmata, ſucciq; illinun-  
 tur. At humiditatis locorū uitio ſecunditatē frustrari indicat in coitu hu-  
 5 mor diſtillans ab inguine, tenuius & copioſum mēſtruum. His uiētus uti-  
 lis eſt ſiccior, labores, ſuperiorum perfricationes, uomitus, cibi ſicci & me-  
 diocres. Proſuerit & uulua a cetbis medicaminibus continere, quale eſt,  
 lentifci decoctum, myrtorum, roſarū, thus coriarii, item mali Granati flo-  
 ris, rubi ramuſculorum, & gallæ, ſiccioſiorem uterum contrariis curare opor-  
 10 ret, balneis dico, inunctione, & alimento humido olerosoq; mediocri ui-  
 no & non nimis ueteri. Quod ſi à craſſioribus ſuccis concipere impedian-  
 tur, ſiquidem rodētes fuerint, mulierem probe purgare conuenit medica-  
 mento quod euilibet humori proprium eſt. maxime autem picra ex aloē:  
 15 mox ſero lactis aluum ducere, & uiētum exquiſitiore deligere. Pituitoſos  
 autem humores laboribus uacuare, ſudoribus, & uomitu: uel per inferiora.  
 Cæterum ex medicamentis epithymum quoq; euphorbium, piper, dauci  
 ſemen, petroſelini ſemē, omnia contrita denarium duum pondere potui  
 recte dantur. Hoc & uentrem probe iuuat, ac uulua calefacit, quæ ad mo-  
 dum ſape iam menſes eruperunt iis quæ purgationem non ſunt expetq;  
 20 Poſtquam uero medicamenta profeciſſe conſtiterit, menſtruis bene re-  
 ſpondentibus, tūc uenus eſt ineunda, purgatione deſinēte. Nam uero, quo  
 niam ſpiritus ſimiliter in uulua concepti ſecunditatem impediunt, notas  
 ipſorum ex capite de uulua inflatione ſumemus. Medemur autem par-  
 tiore primum uiētū, mox cuminum, anethum, apii ſemen, rutæ, aniſi &  
 25 pleraque eſui idonea præſtamus, partim potanda, partim applicanda. Con-  
 niuentes locos aperiemus iniectis clyſteriis odoriferis, ſomentisq; ex mal-  
 ua, ſemine lini, ſcutugræco, & oleo. Nonnunquam etiam melle, ualidiori-  
 busq; artemiſia, euſnila, calamintha, pulegio, & anthemide. Apponuntur  
 autem utiliter terebinthina, niſtrum, cucumer agreſtis, elaterium, caſſia, li-  
 30 quida pix. Quibus autem os hiat, uiētus, ſomenta, medicamina ſicciora a-  
 ſtringentiaq; grana mali Punici, lentifci, radices, rubi, myrti & quæ humi-  
 diori uulua congrua ſunt. Peruerſiones autem ſomentis inſtaurare ac di-  
 rigere oportet, item iis quæ molliunt, inſertis, uenus autem à tergo exerci-  
 ta, ad concipiendum uidetur conducere.

35 DE VVLVAE SCIſſVRIS, CONDYLOMATIS,  
 & hæmorrhoidibus. Cap. LXXV.



40 N uulua oſtio rimæ, quas Græci rhagadas uocant, ex enixu  
 uiolento ſiunt. Primū ſane latēt, cum recentes adhuc ex pat-  
 ru ſunt dolores, poſtea uero paulatim percipiūtur, aliās ma-  
 nu, aliās in coitu. nam & propter affricationem eruoſent red-  
 dunt. deprehenduntur autē ſinu adaperto. etenim diruptiones ſciſſuræq;

Arquitura minima  
 hinc et p'p'ia uoluptas

idem Aenior 66. n.  
 cap. 27.

flans i uulua  
 hinc aduocantur

5 non hinc ex ore uul-  
 uæ

2 Male Ab-  
 das hinc p  
 hinc



in ostioli circuitu oculis patet. In quibus manū todētiaq; medicamina uitates simplicioribus infelsibus, pestulisq; utemur. prodest etiā tetrapharmacū dilutū. At si callū cōtraxerit, medicamēto quod charta cōstat, ex rosaceo utendū. Sin aut ipsius uim nō tulerint, iridē illyricā terebinthina exceptā imposito. ulceribus iam cicatrice obduētis, cōueniet ex cadmia cōfectum, aut aliquod ex iis quā sedi cōsecrata sunt: ueluti quod recipit argēti spumā. Cū uero scissuras ueteres in codylomata degenerare cōtingerit, si milibus excindi, adq; cicatricē duci debēt. Cāterū hāz morrhoides uuluaros & ceruicē infestant, quā in partibus instrumēto ad perspiciciendā uuluar accōmodo, quod dioptrifmon uocauimus, deprehenduntur, quia tuberculum in accessionibus apparet euident, cruentū & subrubrū. At ubi remiserint, fluxio citatur citra dolorē subliuida & contumax. In his igitur cum morbus dat inducias, scalpello modo fieri queat, exceptas amputare oportet: sin minus, certe medicamētis ipsas astringere, partim attingētes sicco malicorio cū galla, aut huiusmodi aliquo, partim iis quā in uulua sanguinem fundente exposita sunt, utētes: quā etiā propter fluorē muliebrē sanguinē fundētibus cōducent, potissimū hoc notis discrimine, quod uulua cōtinuo cruore manet per interualla, nō solū in menstrualis purgationis tempore.

## DE PARTU DIFFICILI.

Cap. LXXVI.

**D**ifficilis partus accidit, aut uitio parietis, aut fœtus, aut secundarum, aut foris aduenientū. parturientis quidē, si crassa obesaq; sit, aut uulua tota exigua, aut dolorū imperita, aut timidiuscula, aut inflammationē in locis genitalibus aliā ue parturicula experta, aut alio quodā modo laborās, aut natura imbecillis ut fœtum nequeat propellere, aut si ante tēpus pariat. At fœtus uitio, si uel inuitatē magnitudinis existat, uel exiguus & modicę grauitatis, uel magni capitis, uel mōstrosus, uerbi causa, biceps, uel mortuus, uel uiuus quidem, sed imbecillis, ut foras nō possit procedere, uel si plures fœtus sint. Nam Herophilus, quinq; edidisse mulierē, memoriā prodidit. Vel si figurā naturę cōtariam obtineat. Naturalis siquidē figura est fœtui: prima quidē qua manus femoribus porrectę sunt, caput ad os uuluar recta dirigitur. Proxima huic, ubi in pedes conuersus est. Alię omnes prāter has à natura abhorrent. Ob secundas, quod uelamentū intus est, partus redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiē, aut priusq; opus est propter subtilitatem abrūpatur, humore siquidē euacuato, infans prā siccitate & gre mouet. Ab externis difficultas oritur, aut frigore, quod uuluar densauerit, aut calore immodico, qui uires dissoluerit, aut ex quodā fortuito accidente. Si igitur ex astrictione, aut ueluti fœtus ad arētatiōē parietis oriatur difficultas, laxatione prius opitulandū, infundendo largiter oleū dulce & calidū, item decoctū scēnugzci, aut maluz, aut seminis lini, aut etiā oua, quod leniendi facultate prāditā sint. Deinde & pubem cum abdomine & lumbis

medicamento illinere, quod femini lini cōstat, aut aqua mulsa, aut hydre-  
 lœo, in fessibusq; similibus p̄dest. Insuper laxationes balineis moliri, ni-  
 si febris, aut alia quædā occasio impedierit, mouerēq; parientē gestatione  
 in aëre calido mediocriter. Nonnulli etiā conuassationes ualidas, sternu  
 5 tamentisq; cīcīdis idonea adhibuerūt. Timidē, mentis robur ad mouendū;  
 imperita dolorū docebitur, ut ualidissime spiritū comprimat, & ad ingui-  
 na depellat. Animo deficiens iis quæ stupori abigendo sunt, naribus ad  
 motis recreabitur. Alleuiata mediocriter, cibo modico refocillabit. Obe-  
 sam mulierē in lectulo resupinā figurare oportet, ut cum feminibus ge-  
 10 nua sueclinēt, quō uulua ad abdomen tendēs, ē directo ostioli habeatur,  
 quod ceratis, aut pinguedine delinire digito oportet, & sensim aperire. At  
 que si morbus aliquis particulas male habeat, etiam huic prospicere. Ad  
 hæc stercus detentū molli clystere emoliri, & secūdas adapertas diuidere,  
 aut digitis, aut ferra mēto quod *πλευρόν* uocāt, in ipsis occultato sinistra  
 15 manu præcedēte. ac humorē quendam oleosum in uulua spatium interius  
 clystero indere. Verum ubi infans præter naturā figuratus fuerit, natura  
 lem reddere figurā deet, partim pellendo, partim adducendo, partim fle-  
 ctendo, partim in rectū agendo. Et si manū pedem uē præmiserit, non at-  
 trahere membro prehensum oportet, magis enim affirmatur, uel luxa-  
 20 tur, uel etiā abrupitur: uerum digitis humero infantis, uel coxæ affixis  
 rursus in conueniētem locum, id quod promissum est, diducere. Porro si  
 ore uulua cōpresso, totius infantis indecora fuerit figura, sursum prius i-  
 psum ab uteri ore sublimē detrudere consiliū est. deinde prehensum rursus  
 ad os dirigere. Postremo si plures uno infantes deferātur, iterū à superio-  
 25 re, infernaq; parte referes. sic ut omnia sensim & citra contusionem fiant,  
 oleo locis perunctis. Tēpus quo in sellā collocabitur parturiens, est, cum  
 uulua os dehiscēs, digito sublabitur, & quod præruptū est, procumbit. Ve-  
 rum si nō procedat, quod infans mortuus sit, aut alia de causa, ad extracti-  
 onem quam Græci *ἡμερολυκία* appellant, ueniendum est.

## DE COXARVM MORBIS.

## Cap. LXXVII.

**O**xendix ab articulari morbo nihil differt, nisi quod ipsius cau-  
 sa, nempe crassus pituitosusq; humor in sola coxarum compa-  
 ge, articuloq; concretus insideat. Dolor ipsis à natibus ingui-  
 nibusq; ad genua usque, in plurimis autem ad summum usq;  
 35 pedem pertinet. Per initia igitur ægro nobis oblato, fœcibus clystere uacu-  
 atis, uena in cubito secanda, cum sanguinis detractione: si autem uetustas  
 uitium occupauerit, ex malleolo partis affectæ imminutionem sangui-  
 nis moliemur. In accessionibus fotu hoc utendum, Cyprini cyathis octo,  
 — aceti cyathis quatuor, nitri cyathis duobus, cachrys cyatho uno. Succis  
 40 dis lanis calida ad mouētur. Deinde applicabitur ipsis farina lupinorum  
 amarorum cum oxymelite, aut farina lolii, cum resina cucumeris sylue-

uestris radice, nitro, calamintha, cachry, baccis lauri. Iam calamintha fo-  
 la utiliter ex oxymelite, aut aqua mulsa admouet. Emplastri uero huius  
 quod leniendi facultatem obtinet, usus est salutaris. Cerae pondo denarii  
 centum, terebinthinæ pondo denarii uiginti quinque, eruginis pondo dena-  
 ri sex, myrrhae, galbani, iridis, singulorum pondo denarii sex, cedriæ pon-  
 do denarii quinque. Propinabitur ipsis liquoris cyrenaici quantum eruius im-  
 plet, aut castorii drachma cum opopanax tribus obolis. Porro radicis cap-  
 paris cortex potui datus, & cataplasmatibus admixtus praesentaneo est reme-  
 dio. Cum dolor multus ex cruciatu, etiam medicamenta à dolore leniendo  
 dicta locum habent, ut potest quod ad Philonem refertur, & quod du-  
 plici pipere constat. Hoc autem enema inferetur, mellis cyathus sesquiplus,  
 olei tantumdem: aquae cyathi duo, nitri drachma octo, terebinthinæ drach-  
 ma quatuor. His calidis iniectis, anus praeterea fouetur, quod longiori tem-  
 pore mucofa astricta inhaerint, uacuat nonnumquam sanguinem quando  
 etiam magis opitulatur. At si malum perseueret, quod raram est, iterum  
 frequentius eo utendum est, in uicem aquae centaurei decoctum admiscen-  
 do, sanguinem trahit & thlaspi semen inditum, succus elaterii, & medicame-  
 tum ex ipso factum, quodque ipsius radicibus constat. Item oleum sicyoni-  
 um, salforum piscium muria, & oliuarum colymbadum probe ingeretur. Cu-  
 curbitulae coxendici multa cum flamma, cute prius incisa dehiscens, inte-  
 rim quoque hirudines. Quod si his malum non finitur, ad purgationem con-  
 tum est, aut ex hiera, aut colocynthidos partis internae probe contritae  
 drachma offerretur in aquae mulsa cyathis duobus, aut paulo amplius, aut  
 minus, pro laborantis uirtute & alui facilitate dabitur. In aqua mulsa ru-  
 ta incocta, tum puls ex cucurbita syluestri confecta recte hos expurgat. In  
 quibusdam uero & uomitus à radiculis citatus per initia profuit. Cum mor-  
 bus se remiserit, dropaces ipsis applicantur, acopaque ex euphorbio sunt uti-  
 lia. praeferrim quod à uarietate uocatur pæcilon, mox balineae naturales ac  
 commodae. Si desiderantur, in aliis lauabunt balneis, commemoratisque: uten-  
 dum est acopis, & compositis nitris, medicamento Asclepio, & quod ex eu-  
 phorbio, adarce, nigro ueratro, castoreo, pyretro, pipere, pedicularia, quam  
 staphida agriam uocant, simili potest conserui. Secundum balineas inspergen-  
 tur picis aridae unciae tres, sulfuris ignem non experti unciae duae, cuti adhuc  
 calidae: quae charta etiam contegetur. At si ne haec quidem profecerint, ut mor-  
 bus infestare desierit, congruum erit & sinapi cum caricis, uel etiam, per se illi-  
 tum. In totum uero hos restituit sanitati, iberidis herbae usus, quam lepidion  
 quoque, alii syluestre cardamum appellant. Quae uero apud nos fruticosa na-  
 scitur similibus lauri foliis, & multo amplioribus, respondere, multa experi-  
 menta testantur, non solum in coxarum, sed in aliis quoque diuturnis affectibus.  
 per aetatem uero longe sunt efficaciora. Atqui si folia tunc non produxe-  
 rit, cortex ipsius radicis contunditur cum adipe suillo, ut emplastri specie

repræsentet, inde linteolo densiori illitum locis maxime dolentibus imponitur, necnec acetabulorū cōfinio & femoribus, sin cūq; tam diu quoad cuticula superior nigrescat, aut ex toto liucat. Postea ipsum auferes, lotoque ægrotandi cetrū impones, opopanax drachmas quatuor, quæ acetyathis duobus dissoluūtur, excipiunturq; cerato cyprino. Quod si taliū adurentium usus abominentur, emplastris uti refectoriis oportet, e quorum numero hoc quoq; est, ceræ, resinæ pityinæ, singulorum drachmæ duodecim, crebenthinæ columbarū sylvestrium stercoris, flociū uini recentiū, singulorum drachmæ sex, galbani, sesquidrachma. Atq; ex rescientiis est quod læna appellatur. utilia uero sunt quæ ex myrrha stillaticia & nitro præparantur. Iam nonnulli iis usi sunt portionibus quæ ad annum continuantur, in quorum gregē habetur medicamentū diatreseron uocatū: chamædryos pōdo, gentianæ dodrās, aristolochiæ rotūdē dodrans, rutæ seminis sicci sextarius. hæc tusa cretiq; dantur quotidie cochleariū mēsurā ieiuno & probe cōcoctione obita, ex duobus aquæ frigidæ cyathis ad annum, donec morbus finiatur. Eadem promittit medicamentū dia hepta, id est ex septem confectū, & quod ad Proclum authorē refertur. Exercitia absoluantur, in ambulatione, continuis flexionibus, saltatu, & cursu. Cibus mediocriter tenuis & concoctu facilis conuenit. porro si malum nulli ex cōmemoratis cedit, aliās in suppurationē conuertitur, aliās neruis qui artus conuincunt, laxatis, membrum luxatur. Quare cum uitū longius se prorogat, articulū tribus, quatuor uel locis urere oportet, ut in chirurgica dicetur, ac complusculis diebus ulcera ad aperta, sine cicatrice feruare.

## DE PODAGRA ET ARTICVLARIIS

25 morbis. Cap. LXXVIII.



On sola particularum corporis imbecillitas, podagricos articulares uel cruciatus excitat. sic enim accessiones, sine ullo tēporis interuallo urgerent, præcipue cum infirmitas imbecillibus articulis semper incumbat. item ne humor quidem forsus hos dolores creat, quandoquidē non solis uitium articulis insidet: sed utrumque, & humor à natura alienus, & particularum imbecillitas motū adfert articulare. quoties enim alterix facultas, imbecillior solito, ciborum grauaturs copia, tunc cruditates enascuntur. Itaq; excrementitius humor superans, in quodeunq; articulamentum, quod antea imbecillius euascribit, se confert: & artubus sese insinuans colligantes neruos sic distendit, ut dolorum pariat: neq; enim neruos, per quos motus dispensatur arbitrariorius, affectu primario, inflāmatio infestat, quoniā artuum prius internodia, obsideat ea necesse est, ut quæ medias tibias uel femina, uel crura, cubitos, aut brachia intercedant. Sed afficiuntur iidem nerui tamē lege cōsortii, quod cū articulis ineunt. Quare si in inferiores partes factus cursus pedum articulamenta repleat, podagra uitium nuncupatur. Si cæteros cor-

poris artus intricet humor, <sup>hæret</sup> Græci, nos articulares morbos appellare consueuimus. Quo uitii nomine, uertebrae, humeros & maxillas comprehendimus, omnemq; articulū, quicumq; morbo implicatur. Nonnulli uero aures, dentes, fauces, & nonnunq; iecur, <sup>liem</sup> articularii doloris <sup>bus</sup> <sup>efficiantur</sup> pronuntiant. A quibus nisi de subito uitium in artus <sup>seorsim</sup> <sup>emittit</sup> <sup>periculu</sup> breui tempore laborantes occupauerit. Sed humor superas qui iumenturis sese infertit, uel biliosus est, uel sanguineus, aliās atra bile uitiosus, plerunq; etiam pituitosus, crudusq; copia alimentī, aut cruditate, aut otio congestus, uerum uetustate in articulis crassescit, & glutinosior euadit, sit ut in duritiem contumacissimā, quam Latini topium, <sup>10</sup> Græci poron appellant, occalleat. Interim uero diuersa humorū colluuiē, uitium contrahitur, ob quod ægre dignosci, & difficulter medicamentis elidi potest, uel etiā pene nullo remedio sanescit. Cæterū hoc mali frequenter antecedit improbus labor, uehementis ambulatio, equitatus creber, usus ueneris intēpestius, insueta frigida potio, frigidorumq; uel multorum <sup>15</sup> noxiorum uel ciborum usus, multus uini usus. Iam aliqui prolapsu, uel de turbatiōe, uel propulso, uel luxatione, uel id genus aliis, prima morbi fundamenta iecerunt, sic quidē ut etiā tunc materia in corpore defesse processerit, sed euidentis causa eā ueluti author proritarit. Mæiores autē, curæ, per uigilia, & reliquæ animi affectiōes, non hanc modo suscitauerunt, sed ipsæ <sup>20</sup> noxios quoq; succos, siue primario, siue ex accidenti procreauerunt. Variæ igitur, ut à me dictū est, affectus causæ habentur. interdū tamen cæca ipsius origo est. Sed deprehendi facile humorum noxam infertentiū discrimina possunt, tum suis coloribus, tum iis quæ superueniunt denotata. Siquidem biliosam defluxionē collor suppallidus, & subrubens testatur. Item <sup>25</sup> caloris sensus, dolorisq; lācinantis modo aeris, item humor in cutē subito, sine euidenti tumore erumpēs. Inflammatio, ad motis rebus calidis, cōtensus incandescit, sicut iis quæ refrigerāt appositis sopitur. Hoc sane cū aliis omnibus magna ex parte, tum maxime iis qui à bilioso humore originem habent euenire consuevit. Subinde febris in ipso accessionū statu <sup>30</sup> accedit, ualidaq; siti conficit. Pari modo si atra bilis in articulis delituerit, color partis nigrior reddit: si pituitosus incubuerit, exalbidus & aquæ subter cutem similis apparebit, ubi dolor quadā tenus demulcetur, & tardius in tumore materia sese attollit, quemadmodū si sanguineus humor redundet, cruentus color emergit. Verum ut singula exactius dinoscas, superior uictus ratio reliquaq; consulenda tibi ueniunt.

## CVRATIO BILIOSAE DEFLVXIONIS

articulis conceptæ.

Initiū curatiōis si flaua bilis articulos exerceat, magisq; ipsius qualitas, uacuatione noxii humoris tentabitur per medicamēta, quæ flauā bilē excrementum, quale est maxime quod ex rhodomelite tēperatur, tum quod malis <sup>40</sup>

cotoniis constat, item antidotū ex hiera picra, & ex aloē catapotia. Per accessiones uero à foris utendū rosaceo cum oui luteo, & uini momēto, quibus particula sensim infricata, manu demulceatur: herbę admo uētur quę refrigerant, ut solanum, portulaca, altercū, semperuiū, palustris lenticula, seris, papauer, polygoniū, rosarum folia, & consimilia. Et nūc hęc illinētur, nunc micę panis posca imbutę adhibētur, uel hordeacea farina cum rosaceo superaccomodatur. At si inflāmatio sic excādescat, ut erysipelatis naturā induat, manifesto lenietur cucurbitę recētis cortice imposito, aut peponis, aut cucumeris carne, & per se, & ex pane. item perdicii foliis & hederę frondibus cum pane uel polēta. Ad hęc psylliū farinę hordeaceę incoctū, flagrātes aestu inflāmationes mirandū in modum solatur. simili modo & rosaceū cum quibusdā refrigerantibus succis illitū. cōfert etiā sequens medicamentū quod fabarū lomento cōponitur. habet autem hoc pacto: cerę quincūx, chamemēlini, rosacei, singuli sextātes & dimidi-  
 15 us, fabacei lomēti semūcia, ouorū lutea quinq̃. A L I V D cataplasma. uirētes maluz coctę terūtur, psylliū priuatim in uiscum redactū, admiscetur: atq; cū ouorū luteis, oleoq; chamemēlino subacta affectę parti illinūtur. Si uero tātus urgeat dolor, ut laborās par esse ferēdo nequeat, medicamentum ex croco, glaucio & opio uti cōueniet, quę in posca trita sublinētur, aut  
 20 eisdē intincta panis mica superponitur. Galenus aut, ut ipse memorię prodidit, lachrymę papaueris drachmas quatuor, croci drachmā cū bubulo lacte, uel caprillo, uel panis mica excipiebat, rosaceoq; subactis utebat, aut opiū crocumq; pariter trita in lacte, cerato rosaceo excipiebat. Cōtulerit etiā in accessionibus ceratū ex turpēna pisce confectū, irē oleum ex eodē  
 25 expressum. Persimilis est efficaciaz, micā panis aqua maceratā, uel posca imbutā cū succo semperuiui, uel portulacę, uel solani uel palmularū carne & papaueris semine, pari portione, adiectis ouorū tostorū luteis cū rosaceo delinere. Verū his quę membris torporē inducunt, narcotica Gręci uocant, diutius non erit insistendū, q̃ ut doloris uehementiā solum lenierint. siquidē largior ipforū usus, sic insertū constringit humorem, ut in  
 30 tophaceam duritiem occallescat, ac diurnas motus difficultates pariat. Ab eorum igitur usu quę dolorē arcant uel medicamento ē succis herbarum factū, diachylon uocant, ex chamemēlino resolutū utendū erit, uel eo quod dialtheas appellant, uel huius generis alio. Posteaq; uero partem affectam quę refrixerit recreaueris, roboranda erit palmulato medicamine quod diaphēnicinen dicunt, cū oxyrhodino, uel rosaceo uino subactū. At si emplastra detrectent grauenturq; concretum acacię succū ex posca, uel lycium adiecto croco & glaucio, aut succo perditii cum posca, delinere cōuenit. uictus ratio refrigerās humidaq; erit, ut hordei cremor, ex chō  
 40 dro sorbitiones: ex oleribus, malua, lactuca, intybus: auium cohortalium pulli, & earum quę in domibus oberrant: piscium saxatiles, erinacius pe-

etines, & eius notæ reliqui. Vitanda oīa calfacientia, & quæ pallidā, aut flauam bilem generant, uinū uetus, fuluū, uel nigellum, & cibi repletio. balineis utendū aqua potulenta factis, si nihil prohibet, cum defluxiones intē duntur, & cum ablunt. hæc ad causam pertinet. Temperandū ab ira, furore, inedia, accrementorū esu, temulentia, immodico labore, & ueneris usu. 5

CVRATIO SI SANGVIS ARTVS INFESTET.

In quibus sanguineus humor redundat, protinus sanguis mitti debet, qui tamen in pituitosis, aut atra bile infectis detrahendus non est. Siquidē in his succus uenis plurima parte conceptus residet, qui copia sua potius q̃ qualitate offendit. Verum statim cum quis morbū experiri cōperit, sanguinis missio erit tentanda. qui uero iam sæpius huiusce modi defluxionibus sunt cōflictati, plus noxæ, q̃ auxilii ex sanguinis detractiōe sentiūt, præsertim qui corpore sunt imbecillo frigidoq̃. Post sanguinē detractū, nisi solus ille superauerit, momento temporis interposito, purgationē ex hiera antidoto moliemur, aut Iuliani oxymelite. quippe hæc magna com 15 moditate purgant: qui uero ab huiusmodi medicamentis uacuātibus abhorrent, catapotia quæ sequūtur deuorabunt: aloës, colocynthidis, id est, cucurbitæ syuestris, ueratri nigri, scammonia, singulorū unciam, euphorbiū, nitri, singulorum semunciam, succi brassicæ, quod ad ea capiēda satis sit. Dantur singulis pro uiriū ratioē: melius proficiet, si cotiniorū succo excipiātur. Aliud genus catapotii quod & in accessionibus, & cum dolor inflatioq̃ remiserint, integritasq̃ facta est, exhibetur, qualiscunq̃ etiam humor articulos affligat. Recipit aloës selubram, agarici, croci, singulorū semunciam, costi, spicæ, nardi, iunci odorati rotūdi, floris, opoballami, casia 25 singulorū unciam, scammonia sextantē, epithymi quadrantē. Modus leuior instar duorū scrupulorū, summus quaterni scrupuli. Iam uero ex armeniao lapide catapotia, mirifice uentrē subducūt, ac proprie articulariis doloribus cōgruunt, cum inter fluxionū principia, tum in incrementō, ubi dolor uehemēs urget, tum in remissionibus, ubi in totū cōquieuit, sed quoniā nonnulli scammonia ceu stomacho noxiā fugiunt, dabūtur ipsis, 30 præsertim cū pituitosa subluuies torquet, hæc catapotia, colocynthidis medullæ, ueratri nigri, bdellii, gūmi, aloës, singulorū uncia, nitri Alexandrini, euphorbiū, singulorū semuncia, dantur quaternis scrupulis. Ego in uicē gummi epithymū adiiciebā. Sūt qui in omnibus articulariorū uitiorum accessionibus, ipsis etiā exhibitis hermodactylis aluū purgatione sollicitauerint sed attendendū est, quoniā hermodactylus stomacho facessit negotiū, cibi fastidiū ex repletiōe, & uētriculi redūdantiā mouet. Quapropter in his uti consiliū est, qui obeūdā actionū necessitatē habēt. ete 35 nim post unū, aut alterū diē plurima ex parte defluxionē ex toto finiūt, sic ut cōsuetis muniis obeūdis sint idonei. Notus mihi est q̃ nō hermodactyli substantiā, sed herbæ ipsius decoctū citra quācunq̃ misionē, nō secus q̃ 40



apii aut anisi decoctum potui præbuerit, ac mirum est quod resoluta sæpe al-  
 uo defluxionem sedaret. uerum quemadmodum nuper retuli, stomacho  
 inimicum est. Quare his postea quæ stomachum confirmant, uiresque eius re-  
 colligunt, mediocriter offensum os uentriculi, corrigere licebit, ut à uicio  
 5 quod hermodactylus intulit, stomachus sese uindict. Multo laudatius  
 esse medicamentum Alexander prodidit, quod ex coronopodio temperaretur,  
 quod & eandem deiectionem, & dolores omnes discutiat, nullamque stomacho  
 noxam inferat. Cæterum piritosis, si mediocris dolor afficiat, ea de-  
 bêt à foris illiniri, uiridis brassica, apium, cunyla, uerbenaca recta : sin acris  
 10 dolor affligat, farinæ scenugæci parteis treis, pollinis loliacei, farinæ cice-  
 rum, singulorum partem unâ . ex aqua mulla, aut uino tenui cum modico  
 cyprino, uel nardino conuenit illinere, maximè per hyemem, item cinis ere-  
 mæ radice brassicæ, eiusque colliculorum cum axungia illitus, multis fuit  
 præsidio. Sed finiendis doloribus recens adhibenda axungia, discutiendo  
 15 aut humori uetus salsa auxilia rur, bubulum stercus cum hordeacea farina in  
 aqua mulla coctum prodest: uel per se recens & liquidum, uel ex foliis brassicæ si-  
 militer caprillus simper se, uel cum hordeacea farina coctus in posca. Quo-  
 niâ uero nonnulli quadam contrietatis lege remedium senserunt. (etenim di-  
 uerforum humorum nonnullam medicinarum distinctionem postulat) com-  
 20 memoranda iam harum materia est promiscua. Itaque syluestris atriplex &  
 fatiua cum pane commodè illinitur, aut uerbasci folia cum bulbis, & pane tri-  
 ta, uel ex polenta, uel cataplasma ex hordeaceo polline. At in quibus ob-  
 scura morbi est origo, hæc semel experiri abundè fuerit, modò ad consimi-  
 lia transgrediendum est, modò contrariis pugnandum. Neque tamen eis-  
 25 dem diutius immorari consilium est, si nullum ex eis iuuamentum perce-  
 perint. Hæc quotidie in artis operibus fieri uidemus, ut idem medicamen-  
 tum uni articulo profuerit, alteri in eodem ægrotanti inflammationem  
 excitarit. quin etiam non modo opituletur, sed confestim (quod maxime  
 est mirum) offenderit. Quippe unus idemque sæpe articulus ex eodem re-  
 30 medio nunc iuuabitur, paulo post eiusdem appositu, inflammationem  
 concipiet. Nunquam igitur aliquis cum glutinosus crassusque humor  
 superat, calidioribus leuabitur auxiliis. Verum cum acer, aut feruidus hu-  
 mor præcellit, tum refrigerantibus solatium inflammationis paratur. Nec  
 miraculum est si materies natura frigidior inflammationis tempore, & feruo-  
 35 re æstuet & incandescat, ubi flauæ bilis miscellâ admiserit. Porro tophos  
 in artubus impediri coalescere lupinos: farina cum oxymelite, uel posca, uel  
 laserpitio, aut brionæ radice cum pane. Iam hoc quod sequitur citra no-  
 xam mitigat, & mediocriter discutit, lycii, ammoniaci, thymiamatis singule  
 uncie cum uino ueterrimo & oleo acerbis oliuis expresso, rrite coquantur è lo-  
 40 mēto fabarum, quod sufficit, adiciunt, coctæ mediocriter illinunt. Post infla-  
 mationis statum, reliquias tumoris discutunt illiti bulbi per se, uel cum pol

line polentæ, ad uellicatum usq; suffricti. hoc enim modo efficacē usum  
exhibet. Quod si nihil hisce cataplasmatibus leniuntur, soribus & liquoribus  
ab alto deturbatis erit certandum, maxime si tumor extrema occupet. fi-  
unt autē hæc, charnemzli & meliloti, aut centaurei decoctis. Nonnullis  
etiam capparis decoctū abunde fuit auxiliū, hoc tamen quod infra scribi-  
tur, omnibus præstat efficacia. Thymus, organū, satureia, & calamintha,  
in aceto quā acerrimo cocta, eiusdem aceti imbre affectæ partes, non se-  
mel, aut iterum, sed frequenter in die fouētur. Hoc præsidio permulti pri-  
stinam ualitudinem recuperarunt, quibus non pituita solum, sed flaua eti-  
am bilis fuit infesta. Non desunt qui & subsequens medicamentū salutare  
sint experti, ilicis glandes in farinā detritæ diutissime percoquantur, hoc  
diluto extremi artus per fluxionum initia longo tempore proluuntur. At  
quæ interius partes habent, spongiis foueri debent. hoc enim liquore ma-  
terię impetus auertitur. Idem & bile uitiosis artubus cōuenit, quemadmo-  
dum calida sine aliquo decocto partibus superfusa. Porro doloribus qui  
intēso frigore, aut humoribus inter articulorum ossa demersis contrahū-  
tur, ualens hoc est remedium. Olei ueteris, niri alexādrini, resinæ terebin-  
thinæ singulorum pondo libra, euphorbii pōdo uncia, iris pondo sextās,  
scenugræci farinæ sextarius unus. his autem ea quoq; quæ aduersus coxen-  
dicum cruciatus scripta sunt, pulchre nimirum opitulantur. multi siqui-  
dem aduersus huiusmodi perfrictiones cū morbus sese remiserit, sinapi  
cū pinguibus fisis usi sunt, tum aliis quæ extrinsecus ruborē pustulosum  
excitant. Alii uero medicamentum ex cantharidibus admouent, uerū hæc  
in posterum officiunt, nisi aliquo etiam molliente utantur, ut ē radícula  
composito, diastrutheon uocant, & basilio, & arbore populo cōfecto, po-  
puleum dicūt, aut ex elate, aut ex nigra populo, aut bromio, aut lysiponio  
aut ualentioribus acopis. Vbi autem neruio consensu, aut confortii iure ar-  
ticuli laborant, aut si humor intra ipsorum compaginem coaluerit, mu-  
lz lotio in morbi statu potissimum, & in frigidis defluxionibus fouere cō-  
modum est. Pariter conuenit etiam ex utroque ueratro pastillus cū mol-  
lis & fungosus tumor articulos implicat, & fomentū ex sale torrido, aut  
etiam aliter ē marina calida per spongas artus perfudisse uincit, item em-  
plastra ex sale præparata, uel ex myrrha stillaticia, statē dicunt, & nitro,  
hisq; consimilia cataplasmata, post uigorem morbi auxilio sunt, uictus ra-  
tio siccior minimeq; excrementitia competit, item inedia, uel parciores ci-  
bi: frequentibus balneis abstinendum. At si lauent, nitrum aliāq; frictioni-  
bus adiciant. Vbi dolor inclinauerit, exercitiis se credent, articulos maxi-  
me perfricabunt, in naturales, balineas descendant, in sabulo, uel arena sa-  
burra buntur. Vomitus à radícula cibisq; assumptis mouebit. Qui ad hoc  
se commode habent, etiam ueratro nigro uacuabuntur per uomitum, uel  
etiam per aluum inferiorem deiciant.

QVOMODO SANGVINE INFESTATI AR-  
tus curentur.

Qui ex sanguine dolorem articularium conceperunt, post prima morbi rudimenta sanguis statim detrahendus est, mox remedia loco dolenti sunt inducenda, si biliosior acriorq; sanguis redundet, eisdem quæ in flaua bile diximus, certadum, si frigidior, pituitosiorq; aut arra bile deprauatus humor coaluerit, iis quæ postea subdidimus præter illa quæ maiore prædita sunt acrimonia, curationem tentabimus: at si uitium in uetustatem incidit, his quoq; locus erit. iam hoc cataplasma in principio proficiet. Malicoria, & baccæ rhois cum polenta ex uino detrita illinuntur. ALIVD. Brasicæ folia cocta accuratè conteruntur, aceti floeces cum duobus coëtorum ouorum luteis, & rosacei momento, adiiciuntur, leuigataq; simul loco iniiciuntur. sed hoc medicamentum subinde mutandum est. cibi assumentur qui extenuant & parum nutriunt: carne igitur & leguminibus, & uino copiosiore nigro: abstinendum. si autem fieri possit, etiam ex toto uinum circuncidendum. Plurimos siquidem noui, qui prorsus abstemii omnes fanitatem consecuti sint. Alii siquidem per morbi initia omnino liberati sunt. alii in posterû rarius & minori dolore accessiones perceperunt. Quapropter nisi quid obstat, aut futurum inde aliquid metuant, perpetuò uitam agent abstemiam. A quibus per imbecillitatē, aut per frictionem aliquid subsecuturū opinentur, ad bienniū usq; abstemii, inde ad pristinā cōsuetudinem reuersi, modicum dilutumq; continenter bibent. Oportet autē abstemios in uicem uini decocto anisi, aut aliculus consimilis seminis utri, fructibus fugacibus reliquisq; refrigeratoriis abstinere, tum ueneris usu.

Qui uero per medicamenta, quæ per annum bibuntur, morbum prorsus tollere uoluerunt, multis sanè quibus pituitosus & excrementitius humor articulis incubuerit, opitulati sunt. uerum qui calidioribus siccioribusq; constarent naturis, hos in subitam mortem præcipitarunt, quod materia ad interaneum, aut renes, aut costas, aut pulmonem, aut principem quandam partem se contulerit. Satiùs itaq; est biliosiore prædis habitu, aut copioso sanguine refertis, uini usu interdicere. Sic enim commemoratis uitæ periculis, minus erunt opportuni: frigidiore asit & rectementis pleni, facta ex uiperis theriaca uti debent, hyeme frequentius, per æstatem rarius. Sed crudi minus eam assument. uel enim morbo liberabit, uel certè leuiorē reddet, nulli ex prædictis particulis officiens, sed quoniā nonnulli etiā commemoratis uti antidotis cogunt, non re lateat id quod ad Agapetū, uel Proclū authorē refertur, tū quod damassoniō dicitur, itē quod atactō & octoidon, item quod ex scordio, aut corallio componi solitum est, alia pleraq; non mediocriter proficere, nec non omniū tamen securissimū est lōgōq; usu probatissimū, diacorallion. siquidē cōcretas iā in tophū duritias tumores que callosos discutit. horum omnium uires & modum usus,

*Si dicitur abstemiam  
mij aniam.*

*ponitur i podagra  
ubi i principis part  
et mat. i. dicitur*

*uino et theriaca  
h. i. i. r.*

uolumine, quod compositis medicaminibus dicatū est, offendes, similiter aduersus articulares dolores, medicaminū quæ pilothra uocant, misturā usumq; in eodem habitu, nepe pituitosiore. Alii uero qui à toto se morbo uindicare uolūt, integras uulpes oleo tantisper incoquunt dū intabuerint, quo articulariis morbis medetur. Non desunt qui uiuas lebetibus immergunt. alii tantū emortuas coniciunt. Pari modo etiam hyenas percoquunt, oleū hinc conficientes, quod discutiēdi uim habeat. deinde co balnei solia complent: in quæ postquā descenderunt, immorari ibidem diutius eoq; articulos cōficare præcipiunt, unde sæpe factū ut non modo artuum tumores, sed etiam uniuersum corpus euacuaretur.

#### DE TOPHIS, QVOS GRAECI POROS VOCANT.

Quoniam & tophi subinde in articulis creatur modo ob humoris qui ad eos decubuit crassiciem, terrestremq; duritiā, modo propter immoderatos discutiētiū resiccantiūq; medicinarum usus, sine earum mistura quæ emolendi uirtute pollent, sciendum uenit ea esse conuenientiora, quæ molliētem simul & discutiētem naturā sortiuntur. itaq; emolliunt adipēs uetusti, medullæ, ammoniacum, bdellium, oleum bene uetustum & styrax. Digerunt autem & resiccāt, nitrum, sal myrrha stillaricia, adarce, euphorbium & consimilia. uerum ad cōcretos in articulis tophos propriē facit uetustissimus acerrimusq; caseus cum suillæ carnis præpinguis ac ueteris decocto contritus & superimpositus: siquidem sua sponte topho dehiscēte quotidie humor qui intus coierat, eructatur. Valet etiā medicamentum diapernes, probatūq; quod duplici modo præparatur. item quæ ex stillaricia myrrha confiunt. iam hoc peculiariter facit quod recipit spumæ nitri, resinæ terebinthinæ, myrrhæ quæ primum sua sponte stillauit, propolis, singulorum pondo triens, ceræ pondo bes, colophoniz libra, olei fescuncia: mixtis utitor, tum in tophis, tum in abscessibus: iam quod ex cynabari temperatur, mirificum est ad tophaceos tumores, aliaq; complura: sed ægrè paratur. Quod uero ex leptocaryis conficitur, præter quod salutare, etiam facile conquiritur, non solum ualentioribus, sed teneris quoq; corporibus accommodatum, si assumat medicamenti, ex melle, uel ex anemone confecti partes duas ad illius partem unam: quæ si desiderentur, etiam eius quod cerussa constat, subinde equalis modus ipsi miscetur. A L I V D ad tophos, sandaracha contrita quæneo uisco excipitur, usuiq; est. A L I V D. Proficit etiam ad fistulas & zgilopas, olei sextarius, spumæ argenti \* do drans, auripigmenti semuncia, argenti spuma, oleumq; tantisper incoquitur dum manus non inquinat, postea tritum auripigmentum aspergitur, & priusquam uestionem senserit medicamentum ab igne tollito, ac utitor. Ex asii lapidis flore cōfecta, ubi morbus intermiserit, imponunt, quæ ad omniū articularū nodos concretos accommodata toto morbo liberare, nonnulli ueterum testatū nobis reliquerunt. At ex sa-

\* Alii uero  
decocto  
et s.

lis flore præparatum medicamen si in morbi declinatione similiter imponatur, tumorum reliquias digerere experientia fidem fecerunt.

QVOMODO QVIS A' PODAGRA SE TVE-  
atur asseratq;.

- 5 Podagram quæ iam constiterit, articularium' ue dolorē, sine prædicta mendendi ratione aboleri longè difficilimū est. At quæ nondum radices egerit propulsare, aut ea tētaros à recidiua tueri, haud fuerit difficile, si quis cibis demat, & eis utatur quæ promptè in membra digeruntur, extremētisq; nacant. itē uino moderatiore & exercitationibus satis se cōmittant. Quod
- 10 ad præsidii partē attinet, sal minutim in oleo tritus & articulis affrictus, omnes qui se ab hoc uitio uindicare uolunt, magnificè iuuat, nisi præter modum sicca intemperie sint præditi, eoq; illitu, & mane & uesperī per totū uitæ curriculum, saltē ubi inflammationes inclinauerint, utendum est.

AD PERNIONES QVI TVM PEDVM PLAN-

- 15 tas tum calces infestant. Cap. LXXIX.



- Erniones ulcera sunt, quæ ex frigore hyberno in digitis manuum pedumq; contrahuntur, Græci chimethla nuncupāt. Itaq; egeliidā aquam marinū superfundere oportet, uel betæ decoctū, uel lēticulæ, uel erui, uel regiz radices. A' superfusio
- 20 ne, lenticulæ coctæ uinoq; detritæ admouentur, uel ficus ex oleo leuigata imponit, uel alumen cū farina pari modo, in uino pertrita applicatur, aut floeces uini subaridæ, aut bulbus recens uino tritus adglutinat, aut alia in oleo fricta, tritaq; uel cera oleo mediocri liquefacta imponitur, aut malicorium incoctum uino, & in tenuem redactum puluerem, cerato rosaceo exceptum inducito, prius locum decocto lupinorum irrorans, aut
- 25 mannam, sulfurq; ignem non expertum, cum melle cocto iniicito, at alterci succus continenter illitus, ab inflammatione & doloribus uindicat.

MARCELLIVM AD PERNIONES.

- Rapæ satiaz radice excauata, coniicitur in capacitatem ipsius ceræ sextans, olei lentiscini quantum sufficit: cocta in æneo lebetē ex marinā aqua, aut muria, aut lupinorum decocto, partim loco superfunditur, partim ceratum in rapa liquefactum frigidum imponitur. At in exulceratis pernionibus, thuris, aluminis scissi, minii, resinæ terebinthinæ singulorum par modus: adipe suillo diluta inducuntur. Verum si inflammatio exulceratos perniones male habeat, medicamento utendum hexapharmaco quod recipit olei, uncias nouem, taurini adipis & fellis, singulorum libram, argenti spumæ, uncias sex, colophoniz, uncias quatuor, mellis uncias sex.

AD DIGITORVM RIMAS TOTOTORVM' QVE PEDVM

- 40 quæ rhagades dicuntur.

Pice liquida delinūtur, aut cācro fluuiatili, aut marino super carbones cre

mato, testa abraditur, & cum oleo trita ut mellis spissitudo sit, absterfis prius scissuris instillatur. Proficit etiā scillæ medulla oleo feruefacta, item terebinthina contrita, necnon cornu caprillū ustum, exceptumq; adipe caprillo, sed callos circumpurgare oportet, & sic medicamentis uti.

AD SCISSVRAS CALCANEORVM ET PLANI

pedum, anthera.

Calcis uiuidæ drachmæ decē, cerussæ drachmæ uiginti, ceræ tantundem, aut triginta, porcina pinguedinis recentis uncia septem, colophoniz uncia nouem, succi lini seminis cyathus, olei dulcis uncia quadraginta: tene ram plantam efficit ut aliud nullū. ALIVD. Adipis caprilli, ceræ, olei singulorum pari mensura utitor. ALIVD. Malicorium aceto incoctū diebus quinque applicatur, deinde loco undiquaq; purgato calx uiua cum oleo aut sordibus imponitur. ALIVD. Scilla cocta oleo, ipsa quidem fricta proicitur, oleo uero terebinthina liquefacta admouetur.

AD ATTRITVS CALCANEI EX LONGO DECVBITV.

Ceræ, olei, argenti spumæ, mellis, pares modi, proficiunt in omni exulceratione, plani pedum, calcanei, supernæ partis, & internæ digitorum, magisq; si ulcus ungui sit propinquum.

AD SORDIDA PLANTAE VLCERA EMMOTON, FA

cit etiam genitali exulcerato.

Amurcæ cyath⁹, aceti cyathus, cocta uase æreo donec melleā spissitudinē habeāt, & trita separatim, profunt. Itē squamæ æris drachmas duas, mānæ tantundē, lanarum, succidarū mollium, quantū manu cōprehendi potest, contectarū teda ustarūq; cinerē totū excipito & utitor, in uulneribus quidē uiuo diluens. in naturalibus & pedū plantis passo. ALIVD. Amurcæ, mellis despumati, paria pondera, hoc etiam cicatrices tollit.

AD INTERTRIGINES, EX CALCEAMENTIS.

Pulmo agninus, suillus & caprillus benefacit, uerū coria ex ueteribus calceamentis combusta, si inflammatio urget, nihil quidem adferunt præsidii, sed illa finita, multum: uel cepa cum gallinæ adipe copiosior adicitur, uel galla combusta inspergitur, uel acacia aceto diluta illinitur.

AD CLAVOS CALLOS QVE. Cap. LXXX.



Lavis prius undiquaq; purgatis, inducitur medicamentum quoddam ex edentibus, quæ septica Græci uocant, aut ærugo rasilis, aut sandaracha, aut syringiacum aridum, aut collyrium syringiacum loco gummi, ammoniaco exceptum. Est autem clauus teres figura callus, colore candidus, clauorum capiti similis, toto corpore, sed pedum solo digitis que præcipuē nascens, quem dolor sequitur & incessus impedimentum. Tollitur autem longiori tempore, etiā si quis excedentem clauum partem continuē abradat scalpello, aut pumice affricet, similiter etiā tallos. Proficit lupinorū crudorum concrematorū ci

nis cum melle, aut misy, liquida pice exceptū, melanthion cum urina pueri impuberis, uel oui luteum, fabarū lomenro cum aceto incoctū. At hoc subinde expentū est, cantharidū, atramenti sutorii, castorii, par modus singulorū, excipitur terebinthina, ut emplastri fiat spissitudo, clauoq; prius circunciso imponitur. ALIVD. Fœculz, calcis uiuæ, uisci, singulorum partes portiones, cum stillatitia lixiua, uel urina pueri impuberis.

AD VNGVIVM VITIA, ET PRIMUM de reduuiis.

Cap. LXXXI.

**R**eduiæ, Græci paronychian appellant, abscessus est qui ad reduuia unguium coit, cum parua adhuc est & prima habet rudimenta, galla cum melle eam reprimat & confirmari prohibet, uel Musæ pastillus, uel iris ex aqua. At ubi caro iam præter naturam excreuerit, eò curatio dirigenda est, ut per rodenria medicamenta absumatur, rumpaturq;: ualet autē ad reduuias, tum auritū sordes, tum lycium, suppuraras autē reduuias, acu adacta humorē emittere, spongiāq; aqua imbutā imponere oportet, uel lēriculam illinere cum aqua rritam, aur palmularū cum uino, uel rosas uiridibus, uel siccis, aqua respersis rritisq;: uel polenram cum aqua, efficax est reduuiis etiam lupinorū farina melle, uel mulso macerata. Exulceratis reduuiis opitularur hoc medicamenrum. Aeruginis, argenti spumæ singulorum drachmæ quatuor, sarcocollæ rantundē, super linamentum ex uino & spongia imponitur. Conuenit autem carnem undique ab ungue diducere.

DE PTERYGIIS.

Pterygion carnis incrementum est, aliquam unguis partem operiens. fit autem in pedis & manus præcipue pollicibus. In pedibus quidem ex illorum offensione plerunq;: in manibus autem ex neglecta reduuia, aut alia huiusmodi causa, aduersus quam auripigmētum & manna pari pondere spargitur, super autē, linamētum ex uino spongiāq; imponitur. ALIVD. Chalcitidis, squamæ, malicorii æquales partes. Excipiuntur sico rosta & melle, parte effecta, spissamentorum decocto prius delibuta. Quod autē siccum est in ungue, circuncidito.

AD DIGITORVM PTERYGIA PVTRIDA,  
item ad pudendorum ulcera.

Lachrymæ rhuris drachma, squamæ drachma, æruginis rasæ drachmæ quatuor, mellis cyathus, rerūtur in sole donec sublauescant. Et loco uino prius deliburo per splenium inducuntur.

MEDICAMENTVM QVOD SVBITO PTERYGIA desiccat, persanatq;.

Soryos combusti drachmæ duæ, rhuris rantundem, æruginis rasæ drachma, cum melle contrita, ipsi pterygio inducuntur. Valet etiam ad reliqua maligna horum locorum ulcera, nigririas & putredines. ALIVD.



Squama zris, palmularum carne excepta, aut ficorū utitor. ALIVD. Columbe stercus cum polenta ex passo coctum pertritumq; calens imponitur, item squama per se inspersa, pterygia deficcet. Oportet autem crebro, angulum unguis pterygion pungentem, ne increfcat, scalpello superimisso, adimere.

## AD VNGVES CONTVSOS.

Myrti & mali Punici foliis teneris unguis illinito.

## AD CRVENTOS VNGVES.

Farina pice mista imponitur.

## VT VNGVES QVI LABORAVERINT ABSCEDANT.

Sulfur tritum adipe suillo exceptum iniicitur.

## VT SCABRI VNGVES ABSCEDANT.

Visci quercini, sandarachæ, fœnugræci singulorum pondo sextās, cantharidum, thapsiæ singulorum uncia, aceti quod satis est. ALIVD. Propolis Atticæ, ceræ, bituminis, singulorum drachmæ duæ, sulfuris igne non experti drachma, oleo non inquinentur, in usu calefactum unguibus illinitur. ALIVD. Picis liquidæ, ceræ, colophonis, terebinthinæ, guttæ ammoniaci, sulfuris uiui, aphronitri pares portiones. ne manus inquinent. ALIVD, quod separat scabros unguis sine exulceratione. Bituminis, auri pigmenti, sandarachæ, sulfuris uiui, singulorum drachmas quatuor, resina excipito & utitor, dissoluens per dies septenos. ALIVD. Erui farina, felle ouillo, uel urina ouilla imbuta utitor, uel calce uiua cū oleo, uel chia cum opobalsamo, uel uisco, atramentum futorium, sulfurq; uiuum quod satis est, exceptum, pelli illitum superinducito, uel herba pedicularia, cum aceto trita utitor, uel resinæ terebinthinæ drachma, sandarachæ duplicata portio simul radici unguis imponitur, diligētīq; fascia illigatur. Cum autem unguis exciderit, ceratum myrteum cui medicamentū ex resina paululum adiectum sit, superaccommodatur.

## LIBRI TERTII FINIS, IOAN-

ne Guinterio Ardernaco

interprete.

# PAULI AEGII

NETAE LIBER QVARTVS, IOAN

NE GVINTERIO ANDERNA-

co medico interprete.

DE ELEPHANTIA.

Cap. I.



ECTE MEA SENTENTIA CAPPA-  
 dox Aëtius memoria prodidit, auxiliorum uim mor- *Areferus*  
 bis fortiozem esse oportere, eoq; elephantiam nun-  
 quam curari, ut qua nulla superior medicina reperia-  
 tur. Si enim cancer ueluti elephantiasis quædam uni  
 oborta particulæ inter morbos insanabiles uel ab ipso  
 Hippocrate relatus est, quanto magis elephantia ceu totius corporis can-  
 cer alicui, ab omni abhorrebit remedio: Cum enim atra bilis, ex qua huic  
 affectui origo est, duplici modo generetur (uel enim ex melancholico san-  
 guine, sæculentiorēq; & ueluti eius limo: uel bile flaua, utriq; nimium uis-  
 nascitur) rubicundam quidē elephantiasim mitiorē quodammodo, uerius  
 dixeris minus malignam, prima ipsius differentia procreat: reliquam ue-  
 ro, & maligniorē, quæ totum corpus sædat ulceribus, & summa squamis  
 exasperat, altera flauæ bilis supra naturæ modū adustæ soboles, producit.  
 Quapropter morbo iam uictis manus admoūda non est. At si recens ad  
 huc malū est, ut nihil ex summis deciderit, nulla infestari exulceratio, ne  
 que tumores plurimū emineant: sola uero facies quodammodo sit deco-  
 loratior, sed ira ut nō admodū deformis appareat, curationē experiemur.  
 Nonnulli siquidē iūq; haud pauci, sola capitis adustione plerosq; hoc uitio  
 rētra tos, ne uincerētur, inhibuerūt. Protinus ergo inter initia sanguis mit-  
 ti debet, & magis uere, in quo potissimū hæc lues & nascitur, & intenditur.  
 paucis diebus interpositis, nouē decem uel, pulre diaolocynthidos ipsos  
 purgabimus, nō semel, uerū subinde, ex proportionē quantitatē medica-  
 minis adaucturi. Item ex hiera purgatio his est idonea. Rursus interposi-  
 tis circiter decē diebus, lactis fissilis serū dabitur, neq; minus tribus hemi-  
 nis, neq; amplius quinq;. Insequenti tēpore non fisso, sed recēs multō la-  
 cte nutrietur. Ob quæ si morbus remittat, eodē uti cibo debet: si remanet,  
 lacte abstinēbūt. Acremento autem uomitus cietur, à radiculā assumpta,  
 aut cibis. Proficit & ex albo ueratro post hæc purgatio: bis quidē, si fieri po-  
 test, uere, semel per autumnū adhibita. Malo uictis neq; sanguis mitti, ne  
 que ueratrū exhiberi debet, cum materia neq; ex cute in altum detruari, ne  
 que hinc etiamnum minui possit, sed ad uentrē, & intestina deducēda est.  
 Medicamētis recorporariis urendū, metasyncritica dicūt, quæ summā  
 cutem desiccant, astringantq;. Leues igitur cucurbitulæ uentris orī & præ

cordiis agglutinabuntur, eadem membra etiam dropace delinentur. Mo-  
 dico temporis processu tursus ad superiora reuertendum est, à purgatio-  
 ne quam præstat hiera, incipiendo, prætermissa sanguinis detractio-  
 ne quæ plus noxæ, quàm præsidii esset allatura. Atque hoc circuitu ad ternas  
 uices quaternas uel per annum uti expedit, uere potissimum & autumnò. 5  
 potare his prodest acetæ cyathum, cum cedrini liquoris cyatho, & brassicæ  
 crudæ succi cyathis duobus, mista dantur mane & uesper. Vel syderitidis  
 herbæ folia torrida denarii pōdere in uini cyatho, uel cornus ceruini drach-  
 ma, & scillitici acetæ quantum cyathus implet, quotidie post matutinam  
 obambulationem potui exhibetur. reliqua uero pro ratione temporis his  
 offeruntur, uel scillæ lotæ denarii quinque in mulla, uel melle, eclegmatis 10  
 modo: uel liquoris cyrenæici ad crui magnitudinem, melle & butyro suba-  
 sti, uel eboris ramenti drachma semissis cum uini cyathis duobus, uel cur-  
 mini Aethiopici drachmæ tres cum melle, instar eclegmatis. His ampli-  
 us iuuat theriacorum pastillorum denarius in uini primæ notæ cyatho le- 15  
 uigatus epotusq;. Similiter etiam scilliticorum pastillorum drachma bi-  
 bitur. Et calaminthæ succum ceu efficacissimū poru auxilium commen-  
 dant. incipiendum dicunt à cyahtis ternis ad usque fenos. Cæterum omni-  
 bus his efficacior est theriace ex uiperis, tum potui data, tum extrinsecus  
 illita. Cum autem bestiarum copia datur, nihil æque proficit, ac uipera- 20  
 rum carnes comestæ, albo iure ex copiosiore aqua, sale, porro & anetho de-  
 coctæ, usque dum spinæ dissoluantur, sed capribus ipsorum caudisq; digi-  
 tos quatuor prius amputatis, interancisq; ipsorum cum cute exemptis.  
 Item theriaci sales eadem per se promittunt, cum obsoniis assumpti. Ta- 25  
 li enim ipsorum usu accidit, nōnunquam squamas, uel ceu scabiem quan-  
 dam ex cute elephantiorum decidere.

#### VICTVS RATIO TALIS ERIT.

A somno manu molliter permulceri debet, aluoq; deiccta gestationibus  
 cōmitti, & clamore exerceri. deinde frictionibus, & uario exercitationum  
 genere uti, nūc saltu, nunc halteribus & coryco. Postea sudore, quem illinc 30  
 contraxerūt, absterfo delinētur adipe ursina, aut uulpina, aut hyrcina, aut  
 auis alicuius, aut butyro recenti. pauxillo temporis interposito in lauacro  
 perungentur succo scængræci, aut ptisanæ cremore, aut ammoniaci mo-  
 mēto, quod aceto subegeris. A balneo deterfi implebūtur oleo lētisci, aut  
 ænanthæ, aut myrti. Vinoq; modico cū alumine, uel ammoniaco, ut for- 35  
 didum sit spissitudo. Rutus teneris pāniculis deterfi dimidia hora conque-  
 scent. Inde potu aquæ ad uomitū sollicitabūtur, digitis in os, aut pinnis de-  
 missis. post uomitū datur potui uinum absinthites, aut ex origano confe-  
 ctum. Cibus erit panis hordeaceus, uel offa ex polētis. Inter olera, beta, la-  
 tuca, radícula, porrū, brassica aquis binis edulcata. adde his capparim. Ex 40  
 marinis ostrea sumuntur, pelorides, erinacei, pestines, tellinæ betis inco-

5 Et, Salfamentū uetus ceu in medicamento uicem adhibetur. uino per to-  
 rum morbi curriculum, & uenere abstinendū. At cū uires recreantur, quod  
 fit à purgationibus, paucillū duntaxat uini tenuis & diluti assumitur. quā  
 do & actia sine periculo ingerūtur. Recteq; ipsis datur pīfana, oua, chon-  
 10 drus elorus, lac, mel cum pane, malua, lapathum, sisarum, piscis molli prē-  
 ditus carne. Ex iis quæ uolatu fidunt, probis donata succis. Inter fructus  
 fugaces, ficus, & uue. In dulciariorū genere, quæ pini nucleis, aut amygdal-  
 lis frictis cōstant, & enico, iis cōferunt qui bis quotidie cibum capere so-  
 lent, quibus graue est molestumq; semel duntaxat cum assumere. Interio-  
 15 rum cura habita, smegmatis in balneo utendū ex decocto betæ, aut fœnu-  
 græci cum aphronitro, aut sapone, aut myrobala no: interim & pīlothis.  
 Abstergit itidem portulaca cum aceto detrita, tenue semper uiuum, lapa-  
 thi radices aceto incoctæ, alumen cum sale. Item sandarachæ par modus  
 ex uino, & oleo lentisci. Huc spectat medicamentū, ad uiliginis speciem  
 20 quæ alphas dicitur, accommodatū, ex aleyonio, nitro, \* myrto, sulfure, fi-  
 ci agrestis foliis siccis, cum aceto tritum, si illinitur. idem præstat quod ex  
 sepiæ testa concremata fit, pumice, nitro, terra cimolia extorrefacta, gum-  
 mi, galla immatura pari pondere siccū inspersum, aut ex aceto infiscatū.  
 Hoc aut mirabiles habet effectus: Lapathi radicū fasciculus qui manu cō-  
 25 prehendi possit, nitri drachmæ quadraginta, thuris uigintiquinq; sulfuris  
 tantundē, ex aceto Aegyptio illinitur. Similiter hoc efficax est, quod reci-  
 pit auripigmenti drachmas decem, sulfuris ignem nō experti drachmas  
 octo, costi drachmas duodecim, calcis uiuæ drachmas quatuor, ceræ tori-  
 dem, baccarū laui aridarū drachmas duodecim. Hæc macerātur populi  
 30 albæ foliorū succo, aut crasso decocto. Vbi mellis spissitudo est facta, illi-  
 nūtur. ALIVD. Radicū lapathi fasciculi duo, aceto incoquantur, & in pi-  
 lam coniecti conteruntur. Deinde alcyonii pondo libra, aphronitri pon-  
 do uncia octo, sulfuris ignem non experti pondo libra, cochleæ testarum  
 cōbustarum pondo triens, chamæleontis cū radice pondo triens. Omnia  
 35 simul leuigātur, donec sordū fiat crassitudo. Deinde illinuntur per æsta-  
 tem in solē frequenter, hyeme in balneo usq; ad desudationē. Item Aescu-  
 lapii aridū smegma pulchre his cōueniet, ac oīa quæ cōmuniter explica-  
 bimus smegmata, uel etiā dicata alphis proprie huc pertinēt. quæ admo-  
 dum & quæ nunc aduersus illa prodidimus. At turgida corporis tubercu-  
 40 la si inflammatione tententur, aut exulcerata sint, delinentur lycio Indico,  
 uel glaucio, uel aloē, uel Andronii pastillo, aut polyidæ sphragide. Cata-  
 plasma ipsis aptabitur chondro cum succo polygonii, uel arnoglossæ, uel  
 parietaria trita. Insuper melissæ herbæ uiridis folia cum axungia tinsa, il-  
 litaq; mirabiliter proficiunt. Etenim partes ruborē contrahunt, sed ex fa-  
 cili subsident pane applicato, aut cerato ex amygdalino, coloremq; natu-  
 ralem recipiunt. Exulceratis recte accōmodantur emplastra, tum ex di-

\* Aldimū ex  
 emplar ba-  
 bet myrto.

phryge præparatum, tum ex uino melinum. Adde supradictis Coracion, quodq; cōstat oxymelite & pastillū Andronii, pompholigē, & cadmiā. indicium uero est totū morbum miterere, si prima ulcera cicatricē recipiant. Ad spirandi uero difficultatem eorū qui elephātia laborant, aselli humetis in locis degētes, quinq; aut sex, ex aquæ mulsæ cyathis tribus potantur. Iam uero quædā ex iis quæ ad ægre spirantes inscribuntur, ipsis quoq; cōmuniter competunt. Aquarū naturalium usus adhiberi debet, ceu maxime necessarius, præsertim aluminosarū, ferrumq; resipientium. & fieri potest, frigida rum. Cōfert & ipsarū potio, tum marinæ arenæ usus. Eandem habent efficaciam omnia quæ defudationes mouent. Quoniā uero affectus hic, non minus ac pestilentia cōtagiosus est, quam longissime ab urbibus ad loca mediterranea & frigida ablegare ægrotos conuenit: ubi pauci homines uersentur. siq; fieri poterit, inde rursus ad confinia migrabunt, tum ipsorum causa, tum illorum, qui, ut uero simile est, ipsis incident. Quippe sic aëre fruuntur commodiore, & alios hac luc non inficient.

DE LEPRO, ET SCABIE, QVÆ PSORA DICITVR Cap. II.




Terq; affectus, cutis alpitudo est pruriēs, in qua corpus paulatim absumitur. Originem ex atra bile ambo hæc uitia trahunt: sed lepra altius, circularibusq; erosionibus cutem depascit, & pisciū modo squamulas ex se remittit. Psora uero summam illam corporis cutem exedit, uarias figuras habens, fursurea magis quam squamosa ex superficie descendunt: in quibus sanguinis dimissio adhibenda est, si corpus succis redundare uideatur. sin minus purgatio certe ex iis quæ atræ bili uacuandæ sunt. Extrinsecus autem utere communiter utroq; ueratro, calcemq; clorā torridamq; in ipso usu, aqua diluens ad sordium spissitudinem illinito. ALIVD. Saluæ, oleæ Aethiopice lachrymæ, singulorū denarii octo, capparis radice corticis, gummi, singulorum denarii quindecim. Inunguntur ex aceto ad solem, proprie uero lepras disiccat anemona applicata, item uitis albæ radix. Cōposita uero hæc, lolii farinæ chænix, cardamomi albi denarii quatuor, nitri spumæ drachma, atramēti sutorii drachmæ octo, hastulæ regię radice mediæ drachmæ quatuor. Aceto pertrita, & in cerati spissitudine coacta illinuntur, patti prius nitro deterfæ: ubi soluetis (solues autē tertia die) & frigida aqua clueris, rursus inunguntur. ALIVD. Hastulæ regię radice succi uncia sex, sulfuris ignē nō experti, manne, singulorū drachmæ decē, nitri drachmæ octo, aceto subacta illinuntur. Ad psoram peculiariter facit ex simplicibus herba pedicularia, staphis agria dicitur, lupini amari, cardamomū cū aceto, lilii radix cū melle, resina terebinthina, sulfur, cicer, caprillū stercus. Inter cōposita, misy & chalcitis pari modo ex uino humidiores psoræ delinuntur. ALIVD. Rhododaphnæ tenera folia in olei sextario simul incoquito, donec tabescant. Ac ubi proieceris, oleo adiunge ceræ tractæ uncias tres.

postquam soluta refrigerataq; fuerint, sulfuris uiui unciam inspergito. ad solem, uel in balneo perungito. nonnulli simul cum rhododaphne etiam scillam coquunt. ALIVD. Medicamenti *ρίζα χαλκίς*, hoc est, ex succis herbarum confecti uncia duæ, ceræ tantundem, rosacei uncia, argenti spumæ uncia tres, cerussæ totidem, liquidæ picis uncia sex, helcysmatis uncia duæ, sirici tantundem, aceti quod siccis leuigandis sufficit. ALIVD. Cerussæ uncia semissis, amyli tantundem, plumbi uncia, lotariæ rubræ uel anchusæ, uncia duæ, ceræ uncia sex, rosacei uncia nouem. Anchusa probe cum rosaceo coquitur, deinde reliqua adiiciuntur. ALIVD. Oua decem, uel quot ad usum opus est, aceto quamacerrimo macerantur, quousque putamen ipsorum tenerascit, lutea in eodem aceto coquuntur, leuiganturq; rosaceo, & reliquo aceto etiam argenti spumæ modicum ad sordium spissitudinem coactum illinitur. ALIVD. Ouorum quæ in aceto commaduerint, lutea tria, rosacei uncia sex, sulfuris uiui uncia tres, leuigatis prius cum aceto luteis & sulfure, cerarum adiicito. Argenti spuma oxyrodino detrita, ut emplastri crassitudo fiat, aciores pforas exterit. Iam uero ex lapatho smegmata, & ex iis quæ elephantice faciunt, plura communiter tum ad lepras, tum ad pforas conueniunt.

## DE IMPETIGINIBVS.

## Cap. III.

 Impetigenes ex tenui acriq; sanie crassioribus aliis mista contrahuntur, celerrime in scabiem, & lepram transeuntes, quæ propter remedia ualide siccantia requirunt. Corpore igitur toto, si opus fuerit, euacuato, simplicia quidem ipsis conferent, cicer, ueratrum, erinaceus saxatilis, pix cerato, resinæq; mista, crocodili terrestris stercus, atque sturnorum, cum oryzam sola mederint. Plerique hoc solo impetigines mentum infestâtes aliam uel particulam, abolerunt. Tricici multum capitur, incudi quæ ignitæ cuiquam imponitur, & quicquid inde humoris defluit, calens adhuc impetiginibus illinitur. Puerorum impetigines, hominis saliuâ continue defricantur. His opitulatur pruni gummi illitum. In uetustatem incidentibus uiticis folia cum aceto detrita applicantur, uel capparis folia similiter. Composita uero hæc sulfur cum thuris lachryma, aut cum ammoniaco, subactum aceto illinitur.

## PASTILLVS AD IMPETIGINES.

Glutinis figlini denarii quatuor, thuris denarii tres, aceti \* cyathi dimidium. aceto soluta illinuntur. ALIVD. Chalciridis, gummi, singulorum drachmæ octo, sulfuris ignem non experti, misyos, singulorū drachmæ sex, squamæ aris, acaciæ, singulorum drachmæ duæ, aceto delinuntur. ALIVD. Sulfuris uiui, nitri spumæ, singulorū drachmæ quatuor, cachrysos grana sexaginta. leuigantur ex aceto. Sola uero pars uitiata, inungitur, sed ita, ut quæ integra est, non coinquinetur: exaracta, aqua frigida eluit.

\* Blouscri-  
ptum habet  
hemina.

\* Hic deest  
aliquid in  
Græcis.

ALIVD. Vcr tri albi singuloꝝ drachmæ octo, farinæ lupini, buccinoꝝ  
cōbustorum, nitri, singulorū chœnix. Arido derergentur. Porrò impeti-  
gines, quas *trypis*, id est, feras appellant, mediocriter siccanribus remediis  
non discutiuntur, acrioribus autē irritantur. Adhibere igitur oportet me-  
dicamenta abunde quidē effica cia, sed quæ nō ualenter erodū, quale est i-  
stud: Glaucii, rhuris, alcyonii, bituminis, sulfuris, gūmi, singulorū uncia,  
aceto inungitur. ALIVD. Picem Aphricanam cum aceto coctam liqua-  
tamq; illinito. ALIVD ad impetigines & pruriturum: Arramēti futorii, sul-  
furis uiui, nitri, thuris, pari modo, in impetiginibus quidē, aceto adiecto,  
in pruritu autem, uino utitor. ALIVD Leichenion, ab impetiginibus cu-  
randis nuncupatum. Guttæ ammoniaci, erui farinæ, lupini farinæ æqua-  
les portiones aceto illinuntur.

## DE PRURITU.

## Cap. IIII.



Ruritus qui senibus accidir, ex toto nunq̃ cōsanescit, uerum  
lenitur infra positis remediis. in reliquis eratibus, si ex prauo  
humore contrahitur, qui nimirum biliosus, aut pituitosus,  
putris falsus ue est, per ipsius uacuationē tollitur. Porrò a-  
gnoscitur ab ætate, temperamēto, uictus ratioe, anni tēpore, regione, & re-  
liquis his consimilibus. Si igitur in uenis simul cum sanguine redū dare uī  
deatur, à sanguinis dīmissione auspiciandum est. Sin autem qualitate ma-  
gis uitiosus extiterit, similibus eo medicamētis uacuato, ad externam cu-  
rationem diuertemur. Lauādum itaq; prorsus ieiuno est, nonnunq̃ & mo-  
dico cibo sumpto, iterum lauandū: quippe uitium uix inhumescit, deter-  
gitur autē, scœnugræci decocto, aut betarum, aut furfurū, aur maluæ agre-  
stis & satiuæ, aur ptisanæ. Præter hæc, farinæ etiam sabaceæ, uel lupini, uel  
glādis unguētariæ, uel smegmatis ex pepone præparati, quod *πρόμας* ap-  
pellār, si inueterauerit, lauatio similiter quidē cōuenit: fortis aut ex saluiz  
decocto, myricæ, herbæ mercurialis, origani, pulegii, baccarū lauri, cucu-  
mis syluestris radices, capparis, cineris lixiui stillatitii, muriæ acetosæ. Dein  
de respergunt arido nitro, uel cum scœcula aceti, uel quod recipir nitri spu-  
mæ sextarium, thuris lachrymæ, sulphuris uiui, singuloꝝ libram, cimoliæ  
libram semissem. Vel hoc, Aphronitri, sulfuris uiui, alcyonii combusti, pa-  
ri modo. siccis utitor, uel cum quodam ex supra dictis decocto. Si autem  
placet, etiam ueratrum siccum inspergito, sine pingui addito. Illinitur au-  
tem cum oxelzo herba pedicularia contrita, uel sulfur, uel sandaracha,  
uel omnia, uel sinapi, cum myrobalani expresso, & oxelzo, uel utere co-  
chleis combustis, leuigatisq; melle, uel lapathi radicibus, uel smegmaris  
inde confectis, ut in capite de elephantia comprehensum est, aur quibus-  
dam ad scabiem efficacibus. Si autem exulceratio partes exercuerit, pary-  
gro, uel diapompholygos appellato medicamine utendum, uel ceræ  
uncia liquefacta in cyprini o hemina, cui sulfuris adiecta sit uncia.

© Impres-  
sum, cybalis.



ALIVD AD PRVRITVS. Nucum magnarū cutis uncia, sulfuris tantundem, apii succo leuigatis utitor in balneo, membra affatim defricans. Hoc solū multis tum scabiosis, tum alio pruritu detētis, abundē fuit. Item apiū per se uiride tusum infricatumq; in balneo uehēmēt auxiliatur. Similis effectus est perdicion, & acerna resina cum rosaceo soluta, illitaq;.

ALIVD. Oryzæ puræ & nimis candidæ, unciz tres, tusæ cretęq; aceto gacerrimo lauigantur, donec sordū fiat spissitudo, adiciatq; priuatim sulfuris uiui detriti uncia. mixtis perbelle in balneo utitor, diutius defricans. At in iis qui superfluitatibus magis redundant, pari portione illorū temperata, præstantius remedium reddetur.

## DE LEUCA.

## Cap. V.



Euce, cutis quædam ad albidius mutatio est, quæ uiscosa glutinosaq; pituita contrahitur. Quoniam uerò non quælibet leuce curationem recipit, notas ipsius tales habeto. Acu per summam leucæ puncta, sed cute non penitius, si sanguis emanauerit, sanabilis est: sin lactea humiditas, desperata est. Vel panniculo laneo asperiore infricata cutis, si quidem rubicundior euaserit, medicinz locus est: sin idem color remanet, non confanescit. Et quæ plura corporis loca obsider, leuce, difficilius tollitur, q̃ quæ pauca deturbari, item uetustior, quàm recens minus in medicina spei habere cēfenda est. Nonnulli igitur adustionem, quæ ferramento candente administratur, in leuca probant, sed ita, ut hæc uel sola ualitudini sufficeret. Alii uerò dolorem inde cicatricemq; securam ueriri, ut quæ non minus ac leuce indecora sit, medicamentis crustam inducentibus, qualia & cicatricem aiunt cōcolorem efficere, usi sunt. Alii & horum inefficiam repudiantes, tincturis uti maluerunt, imposturæ potius q̃ auxilii rationem habentes, quæ sanè omnium maxime uitari debent, quòd affectus celeriter renascatur. Itaq; subiectis uti medicinis, consiliū est. adarce, cachryos, sulfuris uiui, singulorū paria pondera, tusa & incerniculo priuatim creta, deinde simul cū aceto in pollinē sat multis diebus detrita, in sole illinuntur, nō uniuersa, ne cutis exulceretur. Procedente autem tempore, ueratri, & gallæ similiter momentum adicitur. ALIVD. Fici nigræ surculos, aceto imbutos, contritosq; misceto, aphronitri, sulphuris ignem non experti, myricæ fructus, pari singulorum modo. ubi nitro cutem defricaueris, in sole perungito, animum attendēs ne exulceretur. Archigenes autem fici foliis, calcis uiuæ quod satis est, mixto, similiter usus est, uel infricatas, inquit, leucas, albo ueratro, donec sudore diffuentes reliquo corpori cōcolores fiant, illinito synopide, uel meadiade, uel acu transfixa punctas quoad cruor emanet, illinito synopide, cū aceto, uel prius absterfis, ut est comprehensum, perungito, fici liquore recenti, & folio eiusdem affatim infricato.

## DE ALPHO ALBO, ET NIGRO.

## Cap. VI.



Lphi cognato leucis modo generantur, sed hæc altius cutem  
 murant ut pilos quoque sibi similes procreent. Alphis sum-  
 mam cutem infestant, quanquam & ipsi cum uetustate sen-  
 tiunt, penitius recedunt in eis que albi pili nascuntur id que  
 humoris qui subest ratione. Etenim ex pituita albi ducunt originem, ni-  
 gri ex atra bile. utrique igitur commune prodest auxilium, elota calx a-  
 qua soluta, aut dracunculi radix, cum aceto illita, simili modo utrunque  
 ueratrum eisdem efficax est, item lupinorum amarorum decoctio super-  
 fusa, eorumque farina, ex aceto, uel oxymelite inducta, iam capparis radice  
 cortex cum aceto, liliique radix cum melle, cepa ex aceto in sole peruncta.  
 crocodili terrestris fimus idem præstat, pari efficacia & sturni excremen-  
 tum, cum oryzam duntaxat dederit, sepiæque testa concremata. Composi-  
 tum uero hoc præstans est, Alcyonii, nitri, singulorum pondo sextans, ue-  
 ratri albi, sulfuris uiui, singulorum uncia. Nonnulli uero & floeces uini co-  
 bustas adiiciunt. ALIVD. Sulfuris ignem non experti, nitri spumæ, singu-  
 lorum denarii quatuor, cachryos grana septem, teruntur cum aceto. solū  
 uero alphum perungito, sed ita ut integram partem non attingas. sicca-  
 tum medicamen aqua frigida cluitur. ALIVD farinæ lupini, buccinorū,  
 & nitri, singulorum chœnix, ueratri albi, drachmæ octo. Arido pars defri-  
 catur. ALIVD. Erui farinæ pondo duo, erucæ seminis, amygdalarū ama-  
 rarū, cucumis sylvestris radice, singulorum pondo: mulso simul leuigata deli-  
 nuntur, & hora interposita per spongiam abluuntur. facit etiam ad epheli-  
 das, uaros, & clauos.

#### AD ALPHOS ALBOS EXPERTA.

Sulfuris ignem non experti, sextarii duo, calcis uiuæ candidæ, uncia quatu-  
 or, albumina ouorum, quinque olei nardini, & aceti momentum. sulfur pri-  
 mū in pollinē cogit, mox oleū nardinū ei superinfunditur, rursusque leui-  
 gatur, deinde acetū instillatur, & iterum teritur, calcē uero priuatim lotam  
 semel, bis, rer uel sulfuris adiicimus, unā cum ouorum aquato, & denuo co-  
 terimus. collectus humor effunditur. pauxillum uero relinquētes, ut un-  
 guen queat illini, in hunc modum utimur. ALIVD Archigenis. Sulfure  
 uiuo, fici foliis aridis, aphronitro, alcyonio, terra cimolia, myrto, ex a-  
 ceto utitor. ALIVD Archigenis, fici foliorum quæ in umbra exarue-  
 rint, sulfuris, aluminis singulorum æqua portio cum aceto inungitur, aut  
 foliorum fici, denarii quatuor, nitri denarii duo, alcyonii combusti tantū-  
 dem, aceto in balneis illinitur. Priuatim nigros exterit efficaciter sanda-  
 racha cum sulfuris dimidio, sed cute nitro prius defricata, in sole perūgitur.  
 albos uero tollit atramenti futorii, æruginis, æqualis modus, nitri duplica-  
 tus sine pingui infricatur, perūgiturque, uel cachryos, sulfuris uiui, adar-  
 cæ æque portiones, ex aceto infricantur, illinunturque, cum inaruerint ablu-  
 to, locum perfricans. Idem facit & leucis.

## AD STIGMATA, EX COMMENTARIIS

archigenis.

Cap. VII.



Tigmata curabis, si quod matulę adhęrescit, aceto quā cerri  
mo illinas, uel calcis uiuę partē unā, nitri tosti sului dimidi-

am, cū aqua in sole illinito. At ubi exulcerationē fuerint ex-  
perta, cicatricē tanq̃ ulceri inducito. Critō uerō iubet cōfri-  
cata nitro prius cuti terebinthinā illini resinā, linamentisq̃ colligatā sex  
diebus relinqui, septima deinde solui, & acu pūgi stigmata, & sanguinē qui  
fluere spongia detergi, interieciōq̃ breui tēporis spatio, tenui sale confri-  
care locū. Tum imponi ad dies quinque medicamentū quod recipit, thuris,  
nitri, cineris lixiui, calcis, cerę singulorū denarios quatuor, mellis octo so-  
luto enim medicamento, quod est nigrū, in eo deprehendes. ALIUD un-  
guen. Piperis rutę, singulorū drachmę duę, sandarachę, drachmę quatu-  
or, auripigmēti drachma, mellis quod satis est, cuti prius nitro infricatę il-  
linitur, itē aliis priori consimiliter peractis, per triduū soluitur, & nigritie  
absterfa, rursus inungitur. Exerit enim (inquit) diebus uiginti, tā integrē,  
ut nec exulcerationē, nec cicatricē relinquat. ALIUD quod Criticon di-  
citur. Thuris drachmę quatuor, nitri drachmę duę, atramēti sutorii dra-  
chmę quatuor, cerę drachmę sex, piperis drachmę tres, calcis drachmę  
tres, thapsię totidem, auripigmēti drachma una & semis, sandarachę dra-  
chmę tres mellis quod sufficit, utere quemadmodum superiore. Oribasi-  
us traditranūculum illitum, uel capparis folia stigmata exterere. At si al-  
tius fixa non discutiantur, leuiter autem ad cutem pertineant, crusta fer-  
ramento frigido excitata tolluntur.

DE PITUITAE ERUPTIONIBVS, QVAE EXAN-  
themata uocantur.

Cap. VIII.



Ituitę eruptiones, quas Gręci exāthemata uocāt, ex crassis in  
cute cōcretis humoribus, magisq̃ quā superior pellicula dē-  
sior est procreant. In quibus igit, si altius humorū copia sub-  
stiterit, primū purgatio tētanda est. Nā si hoc neglecto, prius  
discutere aggrediari, obstrues ipsos potius q̃ per cutē euacuabis. Sin autē  
nullę in alto deliteant, humorū colluuię, per cutē uacuare oportet, nec  
procul attrahere, si aluo, aut uomitu uacuatio nē moliare, sed humorū qui  
cuticulę impaēti sunt, curationē medicamētis experire, quę exutūt cal-  
faciūtq̃; maxime quā late sunt eruptiones, siquidē tam frigido, crassoq̃; hu-  
mori, huiusmodi dedicata sunt. Laui igitur tenerorū foliorū, rutę & mā-  
nę, æqualē, singulorū portionem detritā & lachrymā thuris oleo subactā  
delinito, uel betā tenerā incoctā tritāq̃; inducito, aut cerę drachmas octo,  
sulfuris, tantundē, salis drachmas sex. Arida in pollinē coacta, & olei cya-  
tho dimidio superfusa, omnia simul incoquito, factōq̃; emplastro uritor.  
Sed coctioni sedulo assistendū est, quod uehementer efficax remediū sit.

Manferi  
piu exi pter  
cōbaber.

Cap. IX.

DE PVSTVLIS. QVAE GRAECE PHLY-


Cap. X.



AD EPINYCTIDAS ET PVSTVLAS.

AD AMBUSTA IGNI.

Cap. XI.

 Mbuila igni medicamentis indigent quæ modicè abstergāt, non euidenter calefaciant, aut refrigerent. Itaq; terra chia, cimolia, cretica, omnisq; leuis illita cum aceto non admodum acri, uel aqua, præclare facit, prohibetq; pustulas excitari. itē ouum integrum crudum statim impositum, lana molli exceptum. etenim refrigerat leuiter & citra rosionem desiccatur. idem efficit atramentum scriptorium illitum, uel lachryma thuris aqua diluta, uel lenticula cocta tritaq; uel crocus iniicitur. At ex aqua calente ustiones priusquam pustulæ oriantur, oliuarum halmadum aqua continue superfunduntur, ipsæq; halmades cum polenta contritæ inducuntur, aut alumen scissile, pertri-

tum cum aceto illinitur, aut fel taurinum cum aqua copiosiore liquatum  
 inungitur, aut lixiuium stillatitium superfunditur garo, aut muria foue-  
 tur, aut bulbi liliorū, aut hyacinthi, aut narcissi cum rosaceo triti & in for-  
 5 tum spissitudinem coacti delinuntur. Marcellus autem hoc composi-  
 tum tradit. Panniculi melle imbuti & hordei succo irrigui combustiꝫ ci-  
 neris mittuntur drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, butyri drach-  
 mæ octo, ceræ, seu capilli, rosacei, singulorum drachmæ sedecim. At pu-  
 stulis iam excitatis, rhus cum polenta tritum aceto applicatur, aut lixiui-  
 um cum calce uiua cerato mixtū illiturꝫ; linteolo imponitur, iam quod  
 10 spherion dicitur medicamentū, ambustis utile est, partes exulceratæ por-  
 tis contritis obducuntur, aut portulaca contrita cum polētis, aut colum-  
 bæ fimi linteolo inuoluti cum combustiꝫ; & oleo diluti cinere utitor. Mirifice  
 proficit & piceæ, aut rhedæ cortex, aut adiantū aridum, leuigatumꝫ; aut  
 myrti folia combusti, pertritaꝫ; insperguntur. efficax autē unumquodꝫ  
 15 horum est & si cum cerato componitur, item quod rubrę anchusæ radice  
 siccat & in leuorem confusæ pondo trientem recipit, ceræ tractæ pōdo dō-  
 drantem, rosacei uncias duodeuiginti, iam quod cerusæ constat cum mo-  
 dica cerui medulla, laudatum est remediū.

AD EOS QUI FLAGRIS CAESI SVNT. Cap. XII.

20 **E**rusæ, argēti spumæ æqualis portio, ceræ quadrupla cum su-  
 fino, aut rosaceo, emplastri modo inducitur, primo die pri-  
 uatim susino solo utitor, uel croci drachma, tragacanthi tan-  
 tundem, ouum integrum, sine cruis unita cæsis imponitur,  
 item pellis ouis recens excoriatæ calens adhuc circumdata, quolibet effi-  
 25 cius die uno & nocte perfanat.

QVO MODO PILI ADVSTIS RENASCANTVR. Cap. XIII.

30 **P**ili ambustis nascuntur, si fici folia in fictili tosta, cum cerato  
 in emplastri modū imponas, aut fici pinguis drachmis octo,  
 samplici drachma, tritis cum oleo donec cerati fiat spissitu-  
 do, utitor, uel detrimento lapidis drachmas centum, æris squa-  
 35 mæ drachmas decem cum aqua subactas in pastillos cogito, in usu partē  
 unam cerati partibus octo diluito.

AD ABRASA, QVAE APOSYR-  
 mata Græci dicunt.

Cap. XIII.

35 **B**rasa & superficiē infestantia ulcera, primū aut uino aut ace-  
 to, aut muria acetosa astringes. Deinde medicamentis, ad cicā-  
 tricē ducendā, utere, tum liparis, tū ex albis emplastris triphe-  
 ris. Summe autē facit quod cerusæ partē unam recipit, ammo-  
 niaci, dimidiam, myrtei quod satis est. Ammoniaco ex aqua in leuorem tri-  
 40 to cerusæ miscetur, myrteumꝫ; superfunditur. utitor lipara. Vel lapidis  
 detrimento probe eloto, squamam æris admisceto, & myrteo in leuo-

rem coactis utitor, aut cimolia, & atgēti spuma, ex uino, ricininoq; & myrteo trit is utitor.

AD ABRASA, INTERTRIGENES, INVETERATA ulcera, senilem teneramq; cutem.

Argenti spumæ chrysitidis drachmæ quinquaginta, ceræ drachmæ uigin  
ti, resinæ siccæ ex teda drachmæ duodecim, olei selquihemina. Argēti spu  
mæ oleo incoctæ reliqua adiiciuntur: rudicula agitaris, uel etiā in pila emol  
litis utitor, sed eutē abrasam ab ulceribus nō oportet amputare, sed medi  
camentū ei inducere: sic enim glutinabitur uel nigrescens. At ulceri, quod  
eroditur sordidumq; est, si carne nudum hiat, uix cicatrix obducitur. Cæ  
terum abrasa tuetur ab inflammatione, rhu rubrum, si illinatur leuigatū,  
cum melle, aut iunci rotundi coma cremata, & cum melle imposita.

AD ABRASA, FLAGRIS CAESA, ET ARTICV  
lorum contusiones medicamentum, quod dolorem  
leuet anodynō appellatum.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorū uncia decē, ceræ uncia sex, olei puri, aut  
rosacei selquilibra, amyli uncia duæ. Ad eadē ualet Pelarion quoq; ex hel  
cysmate quod est sterco argēti, item medicamentū quod ouis constat.

DE FORMICA, ET VERRUCA.

Cap. XV.



Trunc; uitiū, cutis excresecētia est exigua, callosa, & plerunq;  
figura teres: sed formica, quæ Græce myrmecion dicitur, la  
tiore basi, & sessilis est, similē mordētis formicæ sensum indu  
cit. Verruca autē, quæ Græcis uocatur acrochordon, angusti  
ore, & pētilis est, ut chordæ nexu suspēsa pendere uideatur. Hos igitur tu  
mores, elateriū cum sale infriatū tollit, thuris lachryma cum aceto, gros  
si cum aceto, farina, & nitro, liquor fici illitus similiter facit, tithymalli,  
smaridis caput salsum concrematū, ærugo cū sulfure ignē nō experto cō  
busta, ocymi folia cū attamēto sutorio, sarmentorū adhuc uiridiū ustorū  
quod distillar, simus ouillus cum aceto, hircinū fel illitum, heliotropii ma  
gni fructus, cum uino applicatus, ruta cum nitro & pipere, nitrū cum uri  
na pueri uenerem non experti, sterco bouis gregarii in aceto.

DE GANGLIO.

Cap. XVI.



Anglium neruorū concretio est, ex ictu, aut lassitudine obo  
riens, in pluribus quidē corporis partibus, præcipue uero mo  
tui dicatis, nempe manu summa, & pedibus. Quo in uitio Ar  
chigenes calēcē uiuam unā cum adipe anserino, & terebinthi  
na, imponendā censet. Sæpe uero medicamine, quod lapidē achatem reci  
pit, utitor. At Oribasius, eo quod subsequitur, cerusæ, resinæ picæ, olei ue  
teris, singulorū uncia, ammoniaci suffuminis, galbani, singulorū tantun  
dem, ceræ uncia quatuor, aut pilā pensilē plumbo confatā, inquit, crassio  
rem uertebrae modo, ganglio ampliorem imponito, deligatoq; pondere

siquidem longiori temporis spatio ipsum dissoluit, atque hoc nos utimur.  
DE INFLAMMATIONE. Cap. XVII.



Mnes ex aequo tumores calidos, quibus dolor, feruorque ad-  
est, nostri inflammationes, Græci phlegmonas appellare cō-  
suerunt. Verum pro diuersa quæ ipsos facit, materia, hi quo-  
que euariant. Cum enim sanguis probus & crassitie medio-  
cris, in particulam aliquā uniuersim confluerit, ac propter copiā im-  
petus inhaerit, inflāmatiō proprie appellata nascitur. Cum uero flaua bi-  
lis in parte aliqua substiterit, herpetē uocant, ubi uero & sanguis, & bilis fla-  
ua simul incubuerint, erysipelas excitatur. At cum sanguis, qui influit, ca-  
lidus impēse & crassus fuerit, carbūculos mouere solet. Itaque ab inflamma-  
tione quæ peculiariter phlegmone dicitur, & multis semper accidit, incipi-  
endum esse iudico. Tumor rubēs, doloris plenus, tangenti renitens, & cali-  
dus ex sanguine, ut à me dictū est, probō originē trahit: qui, sanguinē dico,  
nunc ex toto fertur corpore, nūc in aliquā particulam copiosius incūbit,  
sic ut à uasis nequeat contineri, exciditque aliquid roris modo in ampla par-  
tium quæ intecedunt, spatia. Est cum uitium hoc uulneribus, fracturis, ulce-  
ribus, aliisque pluribus externis causis superuenit. Cum itaque inflāmatiō re-  
pente euestigio particulā quampiam sine manifesta causa præcedēte ob-  
federit, totū uero corpus, parti contagiū transmittat, uniuersum quidē id,  
sanguinis dimissione, uacuari oportet. quod autē inflāmatiōnē experi-  
tur, superfundete ac illinere medicamētis, quæ nō calefaciāt, humectentque,  
sed illuuiē humoris repellere sint idonea. At quod iam in affectū partē  
se receperit, euacuatur. Itaque illinitur cataplasma quod constat semper ui-  
uo, mali Punici cortice, uino incocto, cera, & polēta. hoc & similibus cum  
dolor uehemens non urget utendū est. Vbi uero particula fluxionē cum  
dolore ampliore senserit, ne sic quidē calens aqua oleum uel adhiberi de-  
bet, aut ex farinis cataplasmata, ut quæ fluxionū uitii omnia sint inimica,  
doloris tamen uehementia lenire eo quod constat passo rosaceo, ceraque mo-  
dica, & lanis sordidis quæ ægypti multū contineant. Per æstatē quidē frigi-  
da, hyeme egelida excipiuntur, applicanturque, sed ita ut superiores quoque  
affectis partibus locos, spongia uino austero imbuta, aut posca frigida cō-  
prehendant. cæterū miscentur cum cataplasmatibus utiliter etiā herba. Pa-  
rietaria igitur ad omnē inflāmatiōnem accommodata est, tum per initia,  
tum in augmento, consimiliter glauciū, atriplex, malua, lactuca, cucurbi-  
ta, calidis illita, benefaciunt & tribuli utriusque inflāmatiōnibus ex influxu  
concitatis. brassica uero durescentibus ualet. At ubi immutatio his obori-  
tur, nec pus subsidet, curationē tētabis emplastro, quod ex chalcitide con-  
ficitur, aut quodā per simili fluxionibus dicato, lanam uero purā uino au-  
stero imbutam extrinsecus medicamento superaccommodabis. Atque hac  
ratione inflāmatiōnibus ex humoris defluxu contractis medeberis. Eas



aurem quæ occasione cuidam feruntur acceptæ, si calefacias humectesq; nō offenderis, ac si usus quādoq; postulauerit, scarificare ipsas, conueniens erit. At si ob defluxionē ortas inflāmationes scarificatione diuideris, præsertim per initia, malū quoddam haud mediocre ægrotanti accerfes.

## DE EXTERIORIBVS CORPORIS

abcessibus.

Cap. XVIII.



Vod si fieri non posse tibi uideatur, ut puris eruptionem impedias, panem hydrelæo incoctum delines, aut farinam hordeaceam consimili præparatam modo. particulam iure radiceis althææ incoctæ fouebis. At si tumor ad suppurationē con-  
tumax est, aut ægre discutitur, cataplasmate ex ficis siccatis utere: oportet autem ficus dulces pinguesq; incoctas aqua eliquescere, ac ius ipsarum in tenuis mellis speciem cogi, farinamq; hordeaceam adici, & si quidem tumor subsidet minus ac conuenit, ficus incoques hystopum, origanum uel: sin uoles magis intendere, salem decocto iniicies diligenter animum ad-  
uertens, ne ex siccitate nimia pars in duritiem occallescat. Tale si quando uideris, cucumis syluestris radicē, aut althææ, aut bryoniz aqua simul decoques. ualentior autem & discutiendo promptior, dracunculi radix est, ipsumq; medicamentū, quod dracūculo constat, ualide huiusmodi uiria dissi-  
ciat. Nonnunquam igitur solum hūc decoques, nonnunquam & ficus siccatas admiscebis, farinamq; simul cum adipe. Iam anethinū oleum crudos humores, incoctosq; tumores, & concoquit, & discutit. Item pix du-  
ros ac crudos tumores uniuersos cataplasmatibus indita concoquit, magisq; li-  
quida. **MEDICAMENTVM COMPOSITVM**, quod abcessus iam coctos expellit, ut subinde pus in splenio reperiatur: nōdum uero coctos in totum digerit. Lapidis pyritis drachmæ duodecim, ammoniaci triti tantundem, lomenti drachmæ sex, exceptum pice liquida, pelliq; illitum imponitur. Splenium uero non prius aufertur quā sua spē deciderit. sed medicamentum non multo ante præparari debet, ut quod confestim siccescat. In his autem si tumor nō dissipatus fuerit, & pus sub eo delitescat, parte scalpello diuisa, id ipsum uacuabitur, cura deinceps adhibita ne oleum, aut aqua admoueatur, uerū si uulnus abluere interim oporteat, aqua mulsa, posca, uino & mulso utendum est. Si uero inflammatione consistetur, ex lenticula cataplasma inducitur. ubi illa caret, alio quodam medicamento, quod illini queat in huiusmodi sectionibus utemur, quin etiam eo quod constar chalcitide. Cæterum super ipsis iniicitur spongia lana uel uino austero imbuta, uulneri autem nullum pingue medicamentum accommodatur, quale est tetrapharmacum, nam uehementē postulat siccescere.

## QVAE ABCESSVS RVMPANT.

Quoniam nonnulli abcessus ferramento diuidi non sustinent, tentanda sunt & medicamenta, quæ ab extrahendo dicta sunt epistastica: narcissi

radix in pollinem detrita, & in mulsa cum irino cocta illinitur, uel tenera calami radix, minutim detrita cum melle. quod si dura fuerit, mulsa prius incoquetur: uel aristolochiam cum melle applicato. rumpit autem picis arida & propolis Cretica par modus, cicatricemq; inducit.

5 DIONYSIA AD ABSCESSVS MIRABILIS, ITEM  
ad mammas & inguina, epispastice, quæ per  
latentes meatus discutit.

Olei ueteris, aquæ singulorum pondo libra, hydrelzum incoquitur, mox, aphronitri pondo uncia sex adiciuntur, misyos pondo uncia una uel duæ,  
10 incoquuntur donec manus non inquinent. Deinde miscentur manæ, thuris, ceræ, terebinthina, singulorum pondo uncia sex.

AD NERVICOS ABSCESSVS.

Ceræ, colophoniz, butyri singulorū libra, picis arida, mellis, singulorum libra duæ, æruginis uncia tres. ALIUD epispasticum. Suffiminis ammoniaci selibra, ceræ, terebinthina, singulorū triens, sulfuris uiui quadrans:  
15 nitri quadrans. Smilion autē medicamen appellatum, & quod porris constat, ualde tumores iam mutatos rumpit. Quod lini seminis succū recipit, percōmode discutit, mutat, rumpitq;. At mitioribus abscessibus medicamenta cōgruent etiam ad parotidas inscripta. Atq; hæc de abscessu, qui  
20 ab inflāmatione emanat. Galenus autē memoriz tradidit abscessum nulla præcedente inflāmatione constitui, quæ ex probo sanguine habeat originem. Statim siquidē ab initio, inquit, humor aliquis aliâ specie alius in parte quadā collectus, uicina illi corpora excoriat tempore, & à subiectis dirimit. Sane inueniuntur in huiusmodi abscessibus cum scalpello sunt di-  
25 uisi, omnigenæ, tum humorū, tum solidorum quorundā corporum species. Etenim stercori, urinæ, grumo, humori mel referenti, mucosq;: ad hæc ossibus, unguibus & pilis, consimilia corpora reperiuntur, imò & animalcula subinde inuenta omnibus prope quæ ex putredine subnascuntur simillima. Præterea in abscessibus potissimum inueteratis, qui ex humoribus  
30 decubitu prouenerint, colligi tradit, quæ lapides, arenas, testas, ligna, carbores, lutum, sordes, amurcam & facem representent. Quare absolutior exteriorum maxime corporis abscessum significatio compēdiose tradenda est, tum eorum qui medicamentis discuti non possunt. Abscessus itaque est carniū seu partium carnosarum, nempe musculorum, uenarū, arteriarū corruptio, mutatioq;. In genere abscessuum nonnulli tunica cō-  
35 prehenduntur, ut atheromata, steatomata, melicerides. Alii sine tunica cōstituiuntur, quæ generis uocabulum usurpant, unde sermo hic noster procedit. Potrō abscessuum generationem plurima parte inflāmatio præcedit, de qua disceptatum est. Interim protinus ab initio, quemadmodum  
40 nuper dicebamus enascuntur. Comites abscessuū sunt, igneus loci feruor, tumor eminēs, ruberq; magis ac antea, durusq; cū dolore punctorio, pul-

du & grauitate, ut aliquid ex particula suspensum esse uideatur. Quod si uero locus insignis extiterit, febris accedit & rigor inordinatus. noctu potissimum dolor fatigat, & febricula. Est cum inguinis inflammatio, proximis in glāulis excitetur. Vbi uero abscessus in totū fuerit absolutus, magna parte decreuit, punctus obueniunt pruriginosi, & leuiter stupidi, tumor in mucrone magis fastigiatur, tactu lenis, cedensq; superficies in uertice auellitur. Dico autē hāc de his qui foras rumpuntur. Si igitur uel medica mentis, uel sua sponte rupti fuerint, emmoto medicamine, curationē ten tabis, parte iam pure uacuata: sin aliter accidat, aperire ipsum in cum mo dum oportet, quem in chirurgica explicabimus.

## DE GANGRAENA, ET SPHACELO.

Cap. XIX.



Vm inflammatio, neq; discutitur, neq; in pus mutatur, saepe in gangrānam, & siderationē, quā Græcis dicitur sphacelos, inci dit, de quibus iam sermonē instituimus. Gangrānas enim ap pellant, cū membrū aliquod ob inflammationis, qua conficta tur, magnitudinē emoritur: neq; iam cōfirmatas sic dicunt, sed quæ etiam num sūt. Eius mali uis est, ut nisi celerime succurras, facile affecta pars, quatenus uicina cōprehendit, mortis habitū reptāsentet, & hominē iugu let. Vbi uero membra sic uitiata in totum sensu fuerint destituta, affectū non amplius gangrānam, sed iam siderationem nuncupant. Quin & ossi bus hoc mali accidit, cum caro ipsis circumdata, praua scatens sanie, ipsa hac imbuerit, ac putredine consumpserit. Cum itaq; membrū ex toto, ui ta, sensu, motuq; priuatum est, confestim præcidi oportet quam proxime sanę parti. Gangrānam uero curamus, sanguine ex parte uitiata affatim emissio, uel enim uena incisa sanguis corruptus, cum uena amplior in ipso membro appareat, detrahendus, uel cute totius corporis diuisa, multis al tisq; plagis. ubi uero sanguinem emanare pet miserimus, medicamētum aliquod putridis consecratum induci debet, quale est, farina erui, aut lolii, aut lomentum ex melle acetoso. Quod si ualentius imponere cogites, sa lem adiucito, aut pastillum Andronis, aut eius generis aliquem. Faciūt ad gangrānas, & uetustæ nuces: cortex aut ipsas expurgat: item liquor richy mali tēpestiue & medioeriter adhibitus. Opitulatur ipsis & lupinoꝝ ama rorum decocti ius inspersum. Nonnulli uero ubi putridam partem præ ciderint, quò securius mali radicem euellant, candens ferramentum adi gunt, in quibus sale cum porro utendum est. Ut autem crustæ citius deci dant, cataplasma deinde accōmodatur ex pane, uel hordeacea farina uel triticea ex hydrelzo incocta. Item cephalicū aridū ex melle, tetrapharma cū, & Macedonicū ut appellāt, utiliter imponit. Iā panis cū apio trit⁹, aut ocymo, sic iris, uel panax, uel aristolochia, uel acorū cū melle, uel thus cru stas probe separat. Idē præstat Macheriōis medicamētū, & Ius linamēto illita ex melle. In teneris aut corporib⁹ abūde est etiā erui farina ex melle.

## EX ORIBASII COMMENTARIIS AD GANGRAENAS

Aeruginis rase, tubrice, aluminis scissilis, singulorum par modus, aqua detritus gangranis illinitur, scalpello undique exasperatis. Item lolii farina cum radícula & sale, nonnunquam etiam aceto, uua passa acinis uacua, cum cortice ex sale & oxymelite. Ad hæc nucum iugladium medulla, myrti folia uino incocta, tritaq; ex melle, radícula cum aceto, crustas etiam ad ossa usque rumpit.

## DE HERPETE.

## Cap. XX.




10 **C**um bilis flaua nullo infecta humore excreta in particulâ quâpiam decumbit, malum herpes nuncupatur. Si quidē substantia crassior sit, acriorq; totam cutem adusque carnem subiectâ exulcerat, uocaturq; herpes exedens. Si uero tenuior & minus acris calidaq; pustulas exiguas, per summam cutem milio similes excitat, ob quam similitudinem, herpes miliaris dicitur. At Oribasio autho  
15 re, pituita cum flaua bile mista, miliarem herpetem creat. Corpore igitur toto medicamine quod ducendæ bili est, euacuato, loco affecto refrigerantia siccantiaq; inducuntur, principio capteoli uitis, rubi & plantaginis applicantur. postea uero lenticula his miscetur interim, & mel & polenta. Item cataplasma sine semper uiuo, quod ad inflammationes ex confluxu  
20 inscriptum est. Verum exulcerata pastillis inunguntur passo, aut uino tenui & austero non ueteri, aut posca diluta subactis. inducitur & glaucium, eiq; consimilia ex aqua. nihil autem remittente morbo, aceto dilutū admouetur. succo autē plantaginis, aut solani, aut uino soluta medicamina magnifice auxiliantur: aut lini semen torridum oleo uinoq; incoctum, inq;  
25 leuiorem redactū imponitur: aut terra cimolia, solani subacta succo perungitur: & argenti spumæ unciz quatuor, porri succi septem cyathi, betæ succi tantundem, leuigata illinuntur: at inueteratis iam huiusmodi ulceribus, Musæ pastillus & Andronius efficax est. ALIVD Ad herpetē pustulosum. recrementum plumbi ex uino austero leuigatum illinitur, superiniiciuntur betæ folia uino incocta, uel ceræ triens, myrtei unciz sedecim, stercoris plumbi triens, uino diluta illinuntur: at ubi id quod serpit repressum fuerit, cerato ex recremento uitior, aut lente cocta cum melle partem repleto. Ad herpetem uero qui sub cute affligit, recrementū plumbi, rutæ leuigatæ succo excipitur, aut ceratum myrteum in uicem rutæ. ALI  
35 VD. Lanz ueteris illotæ, circa tedam cōbustæ drachmæ duodecim & semissis, ceræ drachmæ uiginti quinque, recrementi plumbi drachma, seui cæprilli curati lotiq; ex aqua drachmæ uiginti quinque, myrtei unciz quinque. ALIVD ad herpetas acute depascentes, corii mali Punici dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantundem, lanz illotæ tedæ combustæ adhærentis  
40 drachmæ tres, ceræ drachmæ duodecim, cerussæ drachmæ octo, thuris, aluminis scissi, singulorum drachma, uino aut myrteo excipiuntur.



Alenus tumorē ex feruente & tenui sanguine conflatum priuatim quidē & proprie erysipelas, qui sacer ignis Latinis dicitur, appellauit. Cū uero nec plane biliosa, nec sanguinea fluxio est, sed ex ambabus mista, utiq; ab eo quod in mistura superat nomen uitio indidit. Etenim ubi sanguis excelebat inflammationem erysipelaceā, ubi bilis flaua præpollet, erysipelas inflammatū dixit. Vtro autē modo dicas, nihil adeo ad præsidiorū uſum interest. Id uero ſci re oportet erysipelata quæ capiti potiffimū oboriuntur, plus faceſſere negotiū, adeoq; eſſe periculosa ut niſi efficax cōſequantur auxilium, interim quoq; affectos ſtrangulent. Quod ſimul ac fuerit deprehēſum, protinus ab initio uena in cubito præſertim humeraria debet incidi. ſin autem hæc non appareat, ea quæ ſe conſpectui obiiicit. At ſi quid ſanguinis dimiſſionem impediāt, purgatione utendū ex medicamēto quod bili ducēdū eſt. Hac ſane & in alijs partiū eryſipelatis uti, uel clyſteriis efficaciorib; oportet, tum iſiſ illinere, quæ influentē materiam refrigerantiū uirtute repellunt, collectā uero, calefacientiū mediocriter & humectantium digerāt, priuſq; particula liueat, aut nigreſcat, adhibita ſemper cura ut perliquida inungantur, ita ut frequentius immutentur, primis per ſpongias bene tinctas ablotis, ſiquidē multus particulæ feruor celeriter in uaporem erumpens, hæc deſiccet. Cæterum requirunt eryſipelata per initia, ut dixi, quæ refrigerent cum humiditate, non aſtringant: quale eſt ſemperuiuū, portulaca, pſyllion, lenticula paluſtris, ſeris, cucurbita, ſolanū, altercum, laſtūca, glauciū, item apium, & rhamni folia per ſe uel cum pane illita. item ce ratum ex aqua admodum frigida. His miſcetur etiam opii aliquid, laſchrymæ papaueris, cicutæ & mandragoræ. Iam cōpoſita medicamenta inducūtur, hetq; ceratū, cera tracta roſacei quadruplo admixto ex oleo immaturo ſine ſale conſectō: his in pila emollitis, aquæ frigidæ ſuperfunditur, quantū poteſt recipi. Si uero aceti tenuis & pellucidi momētum tēperes, præſtantius medicamētū habiturus es. Item polenta cum herba quadā frigidiore ex iis quas enumerauimus aſſatim membrū refrigerant. Idē efficiunt palmulæ pingues cum horum aliquo mixtæ. Ad hæc pars etiā de linetur ceruſa, uel terra cimolia, aut figulari cum ſolano, aut argēti ſpuma cum roſaceo, aut chalcitide cum oleo paſſoq; aut ceruſa cum aceto & lycio, item acacia cum aceto. Cum feruor remittit utendū ſimplicibus quidem, ſulfure uiuo & menta cum oxyrhodino, aut ruta cum abſinthio, aceto & oleo, aut argēti ſpuma cum porri & betæ ſucco. compoſitis autem, priuatim in capite hoc paſtillo. Argēti ſpuma, ceruſa, croco, ſulfure ignē non experto, opio que cum paſſo. Cōmuniter autem omnibus, minio ſi nopicō, chalcitide, miſy roſto, ærugine, atramēto ſutorio, alumine ſciſſili

pari pōdere ex aceto utitor. A L I V D. Sulfuris uiui, cerusæ, opii, acaciæ pa-  
ribus singulorū portionibus, ex aceto. Cataplasma ad sacrū ignem, herpe-  
tas, abscessus, parotidas & ambusta. A lthææ nouellæ foliorū tenerorū pon-  
do: cocta in hydrelæo perbellè teruntur, adiectoq; rosacei triente, argenti  
5 spumæ, cerusæ singulorū uncis duabus & semisse, iterū leuigantur cū sue-  
co coriani, aut semperuiui, aut solani: deinde micis panis adiunctis ut em-  
plastri formā induat, illinitur. Hoc autē emplastro utitor quod recipit re-  
cinini pondo, myrtei pondo, unguenti quincuncē, argēti spumæ trientē,  
eruginis rasē sextantem. Aerugo & argenti spuma aceto leuigantur. Cera-  
10 tum ad erysipelata & ambusta. Ceræ tractæ pondo triens, rosacei pondo  
quadrans, oua sex, perdicis herbe pondo triens. Vbi uero inflammatio mē-  
bri conquieuerit, aut uetustatem experiatur, cataplasma illi, priusquam li-  
ueat, ex cruda polenta est imponendū. Quōd si liuor iam occuparit, aut e-  
scarificatu incisa, cataplasma induci, locusq; perfundi plurimū ex aqua ca-  
15 lida dulci debet, sed & marina & muria interim cōducet, quinetiam ipsi ca-  
taplasmati talis aqua, uel acetum, uel acetosa muria misceatur. Deinde cō-  
memoratis medicamentis compositis cura adhibita uti licet. Nam si inflā-  
matio remaneat, aut in pus, aut in putredinem conuertitur.

## DE PHYMATE, BVBONE ET PHYGETLO Cap. XXII.

20  Vthore Galeno, bubo, phyma, & phygetlon, glandularū affe-  
ctus sunt: bubo quidem inflammatio, phyma autem glandu-  
larū inflammatio ad suppurationem spectans. Aliorum uero  
quorundam sententia communiter omnes, qui à natura ab-  
horrent, ceu timidi abscessus, quamcunq; corporis partem obsideant, phy-  
25 phymata urinarium meatum exercent, hi abscessu in uomicam erumpen-  
te liberantur. At bubones qui prolapsu, aut aliis ulceribus, aut doloribus  
contrahuntur periculo uacant: febribus autem superuenientes, qui pluri-  
ma parte ex pestilentiali lue solent incidere, deterrimi sunt, siue femora, si-  
ue alas, aut ceruicem inuaserint. Verum priores initio, quemadmodum in-  
30 flammatio quælibet, auxiliis repellūtur, quæ refrigerant, astringuntq; uel  
spongiis ex posca impositis, uel lanis oleo crudo uinoq; imbutis, uel rosa-  
ceo, uel melino, uel lentiscino, uel myrteo, deinde iis quæ digerunt uten-  
dum. At si corpus uniuersum succis æquabiliter redundet, prius ipsum ua-  
35 cuari conuenit ubi iam inanitum est, ulceris in quo id prouenerit, cura ha-  
beri debet, sicuti in capite de ulceribus explicabitur. Glandula si inflam-  
matione tentetur, lanis oleo quodam laxante, irriguis, rectè lenitur totum  
q; ipsis membrum inuoluitur. Cum tumor ad suppurationem spectau-  
rit, non promptè diuidere, sed medicamentis quæ cerati speciem refe-  
40 runt, digerere nitimur, cuiusmodi potissimum est ex apyrano confec-  
tum. Item quod ab herbis dicitur botanicon, si per hæc non discutitur rū

pere adgrediemur, aliorum abfcessuum modo, similiterq; illis mederi. In  
 iis autem qui ob febres aut omnino humorum abundantia procreantur,  
 caueri debent repellentia, ne materies penitus detrusa cursum repetat, sed  
 ab iis que digerunt, statim curationem incipere consilium est. Si aut nihil  
 prohibet, nempe aut ætas aut uirtus, sanguis prius è cubito dimittetur. de  
 inde loco fomenta inducetur ex decocto chamæmeli aut anethi, aut eius  
 generis alicuius. Reliqua medicamentorum sylua, maxime ex iis que ter-  
 tio uolumine ad parotidas dicta sunt, transferenda est. Item ex illis que nu-  
 per contra inflammationes prodidimus, quemadmodum etiam phyge-  
 thli curatio, tum hinc tum ex remediis crysipelati accommodatis pete-  
 tur. Aster atticus herba quam & bubonion, quasi dicas inguinariam, ea  
 ipsa de causa uocant, non solum illitus sed etiam alligatus, bubonibus au-  
 xiliari creditur. Phymata autem priuatim discutit adiantum, si illinatur,  
 atriplex, parietaria, althææ radix uino incocta, ammoniacum cum mel-  
 le mollitum inductumque, uiscus cum resina ceratoque. Rumpit au-  
 tem abfcessum propolis, lupini amari ex aceto illiti, cucumis syluestris  
 radix, terebinthina excepta, capparis radix similiter, nitrum cum fer-  
 mento aut ficis.

#### DE FURUNCULO, QUI DOTHIEN

appellatur.

Cap. XXIII. 10



Vrunculus, tumor est abfcessum præ se ferens, qui ex crassis  
 humoribus in carnosus plerumque partibus concipitur, mitis  
 quidem, cum in sola cute coit: peruicax autem, malignusque,  
 ubi subter actis radicibus in superficiem erumpit. Dissipat  
 autem furunculum ac conequit triticum commansum & impositum: ma-  
 stiche ægyptia, uux passæ quibus acini sint exempti cum sale trita, ac illa-  
 te, hunc diluunt aut rumpunt, uel sicæ ficis hydromelite incoctæ imponun-  
 tur, uel resina ficis mista inducitur, uel ipse ficus cum fuerint, pingues dis-  
 sectæ, uel fermentum cum nitro, uel lini semen cum melle, uel alterei fo-  
 lia, trita cum butyro. Composita uero hæc proficiunt, quod ex fermento  
 quod polline farinaceo constat, & quod priuatim à furunculo Græce dici-  
 tur dothienicon, fomenta autem adhibentur ex spongiis mollibus conti-  
 nue calenti aquæ intinctis, deinde sic medicamenta iniiciuntur. 15

#### DE TEREBINTHO.

Cap. XXIII.



Ribasius terebinthum sane phymatis speciem esse asserit, su-  
 per quam pustula nigra emineat: hæc rupta id quod subiacet  
 desquamato simile apparet. ubi scalpello diuiferis, pus depre-  
 henditur. Dioscorides autem Alexandreus literis mandauit  
 terebinthos cutis esse excrecentias, rotundas, nigrouirides, terebinthi fru-  
 ctum referentes, atque has aliis phymatum tumoribus similiter curari cen-  
 set: auxilia ex supra comprehensis huc transferenda. 40





Vm sanguis in atram bilem conuersus inferuescens que ali-  
 qua se parte receperit, carbunculus fieri solet, quod utiū ple-  
 runq; à pustula ambustis consimili, interim uero & sine hac  
 incipit. Cæterū inter initia, quibus hoc malū instat, particu-  
 lam omnino scabunt, unde pustula, nunc una oritur: qua rupta, ulcus cū  
 crusta gignitur: nunc plures erūpunt, milii seminis modo exiles: quibus  
 perruptis similiter crustaceum ulcus prouenit, quale ferramenta canden-  
 tia excitant, modo crusta ipsa cinereum colorem, modo nigrum præferē-  
 te, sic ut inferiori carni continua adhærescat, & quodam modo affixa sit,  
 cum erosione. Reliqua autem caro circumposita, in feruidā peruenit in-  
 flammationē, quam Græci phlogosim appellant, & colore nigrescit, splē-  
 detq; bituminis & picis modo. talis autem est bilis exactē atra. Verum car-  
 bunculi, qui in carne radices egerint, confestim circumscribuntur: qui mē-  
 branas, neruosq; occupant, diutius remanent, luemq; subiectis corpori-  
 bus impartiunt, ut etiam inflammationes quæ erysipelatis naturam resis-  
 piant, in ipsis excitentur. plerisq; itidem in suppurationem conuersi sunt,  
 multris febres accedūt. Iam uero carbunculi ex causis popularim grassan-  
 tibus excitantur. Curatio ipsorum, nisi admodum fuerint exigui à uacua-  
 tione sanguinis è uena ad animæ defectionem usq; dimissi, tentanda est;  
 mox scarificatus rectē accommodatur plagi ob lucci crassitiem altiori-  
 bus: particula laboranti inducuntur, quæ modicò reprimunt dissipantq;  
 tale est cataplasma, tum quod ex plantagine conficitur, tum quod ex dil-  
 cocta lente constat, scilicet, mixta panis furnacei mica. Esto autem panis,  
 nec omnino à fursure purus, nec nimium eius habens, super ipsum uero  
 ulcus ualens aliquod medicamentum imponitur, cuiusmodi est Andro-  
 nis, Pasionis, & Polyidæ, diluiq; id uino aliquo dulci, ad fordium spissitudi-  
 nem debeat. Item massalioticum aridum, uel & ipsum similiter dilutū.  
 Item radix dracunculi, uel aristolochiæ, uel liquor silphii, uel cirenaici, sin-  
 gula ex aceto probe delinentur. At quæ erysipelatis naturā referunt, suprā  
 cōprehensis ad id uitii remediis perungētur. Quæ uero partes cōsortii le-  
 ge affici purantur, succidis lanis ex ænelæo madefaciendæ sunt. Vbi iam ar-  
 dor acquieuerit, carbunculis iniiciūtur cetata cephalica, animenæ, emmo-  
 ta. generosissimū est quod herbis, tum illud quod nitro cōstat, itē arida ul-  
 ceribus depascentibus dicata, per se, & cum rosaceo. Cum autem durities  
 remanet, utemur melino Seta piōis, operam adhibētes, ut quāmeleerrime  
 carbunculi in uomicam erumpant. Quod quidem fiet, si diebis, noctu se-  
 mel, tū cataplasmata, tum medicamenta mutes. At quo radicitus carbon-  
 los diuellas, dirimasq; ab adiacentiū cōmercio, malū Punicum, acidum,  
 minurarium concisum in aceto coques: ubi intabuerit, in leuorem detetes,  
 linteos que illurum induces: cum siccescit, aceto humectabis. Item nucis

auellanz ueteris, uel etiam non ueteris medulla carbunculos maturat rū  
pitq; . Hoc præstant & cupressi folia, tum germina, nouelli & molles gal-  
buli cum polenta, uua acinis uacua, ficus siccz uino incoctz, pa paucri ce-  
ratidis flores, liquor silphii, cum ruta & mellis momento, pix liquida cum  
uiuis passis, & fuillo adipe.

#### AD CARBUNCULOS VEHEMENTER EFFICAX.

Arēgi spumaz libra, olei ueteris libra & semissis, auripigmēti uncia. Olco  
cū argenti spuma dum manus nō inquinēt incocto, sublatōq; ab igne, au-  
ripigmentum adiicitur, rursusq; medicamentum coquitur donec nigre-  
scat, tritis in pila utitor per linamenta filiatim carpra.

#### AD GANGRENAS, VLCERA VETERA, CHIRONIA

strumas, podagram: priuatim uero ad carbunculos, ac  
eos qui palpebras infestant.

\* Aldus ha-  
bet drach-  
mas duas.

Opii, acaciæ, misyos tosti, squamæ aris, singulorum \* drachma, atramen-  
ti lutorii drachma, alterci seminis drachma, tritis ex aqua utitor, probè fac-  
it & tetrapharmacum quod quintam thuris partem contineat. Aduersus  
naturalium carbunculos, chalciridis atramenti furorii, singulorum dra-  
chmis octo, aphronitri drachmis duabus, ex aqua tritis uritor. Valet ster-  
cus quoq; ouillum, rorridū cum melle. In Alexādia Serapiade quod or-  
chis & rriorchis dicitur uiridi, cum micis panis, cataplasmatibus modo uti-  
tur ad carbunculos, omniaq; crustosa. Vbi crusta exciderit, communis ul-  
ceris modo curabis.

#### DE CANCRO.

#### Cap. XXVI.



Ancer in qualibet corporis parte oriri consuevit, siquidem in  
oculis, & uulua, quemadmodum in ipsorum capitibus expo-  
situm est, aliisq; pluribus particulis, sed præcipuè in femina-  
rum mammis accidit, quoniā natura fungosa & inanes, cras-  
sissimam atrā bilis, unde hoc uicium coartrahitur, materiam possunt exci-  
pere. ex eo enim humore cum referbuit, prima uirium hoc rudimenta ac-  
cipit. atq; si acrior illa fuerit, cum exulceratione. Quapropter colore ma-  
gis quàm inflammationes nigricant, sed ita ut tantam caliditatem non ex-  
periantur. Venæ autem quæ circa sunt intumescunt, intendunturq; can-  
cri animantis pedum modo, unde & appellationem hanc uirium est forti-  
rū. Nonnulli uero inde sic nuncuparūt, quod difficillimè ab his partibus  
quas obsederit, euellatur, quemadmodum cancer aquaticus animās. Hoc  
malum planè propter succi crassitiē non confanescit, utpote quod nec re-  
pelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat, tamq; malefi-  
cum, ut mitiora negligens remedia, uehementioribus irritetur excande-  
scatq;. Prima sane cancri rudimenta prohibere, ne augeteant, licet, si melā  
cholici humor prius uacuetur, quàm in affecta particula radices subter  
egerit, impactusq; sit. uacuatio quidem primum tentanda est, sanguinis

causa ob qua plerūq; can-  
ci feminaz, maminib; accidit.

in cancri rudimentis necesse  
est, ut  
p. 666.

dimissione, mox purgatione, per initia quidem ex simplicioribus petitz,  
 quale est epithymon,\* quatuor uncis & S. in sero lactis, aut mulsa exhibi-  
 tum. Deinde ex hiera, quæ nigrum ueratrum recipit. Loco autem dolen-  
 ti inductum subsequens remedium, sine dolore facit exulceratis: solani suc-  
 cus linteo molli duplici in eum tincto imponitur. Extrinsecus lana mol-  
 liuscula & ipsa succo imbuta circumdatur, cura adhibita, ne hæc siccescât suc-  
 co, continentius superfuso. Iam uti diutius poteris in cancris exulceratis  
 medicamento quod pompholyge constat. Nec inepta sunt, quæ tertio vo-  
 lumine de uulua cancris prodidimus.

\* Forte  
 dra chmis  
 quæ ut  
 solani succus. (Galenus)  
 quæ ab Antiocho.

Galenus lib. cap. 67

AD CARCINODE, MALIGNA QVE VLCERA,  
 tum ad sedis eminentiam, naturaliumq; uel  
 testiculorum, uel mammarum  
 inflammationes.

In plumbea pila cochleario plumbeo lemniam sphragidem ex posca, &  
 mulsa, uel lacte cõterito, ut nigrescat: uel rosaceo, uel immaturo oleo, suc-  
 co uel semperuiui, uel coryledonis, uel lactuæ, uel psillii, uel acoris trita si-  
 militer inungiro. Crebrior uictus egro dabitur, prisa hæc cremor, lactisq; se-  
 rum, ex oleribus malua, atriplex, bletû, cucurbita, piscium saxatiles, omnis  
 generis aues præterquam palustres.

ARCHIGENIS AD CARCINODE, ET CACOETHE VLCERA.  
 Cancrorum fluuiatilium crematorû, & cadmiæ par modus in pollinem  
 coactus inspergitur, aut cancrorum cinis unâ cum cerato inducitur, item  
 erysimi semen detritum cum melle accommodatur.

DE MOLLI ET LAXO TVMORE, QUI  
 œdema Græcis dicitur.

Cap. XXVII.



Vm de tumoribus qui succis calidioribus contrahuntur, di-  
 sputatû sit, iterum de contrariis agemus, ab eo quod Græcis  
 œdema dicitur, exor si. Quemadmodum enim ex biliosa flu-  
 xione, erysipelas, ita ex pituita, œdema latus quidam atq; in-  
 dolens tumor excitatur. Equidem scimus aliter quoque œdemata proue-  
 nire, nempe in pedibus, in subter cutē aquæ affectibus, habitu corporis cõ-  
 tabescente, qui phthoe Græce dicitur, & malo, qui cachexia. Atque in illis  
 quidem tumor hic ① affectus qui hominem premit accidens est, nullam  
 leorsum, curationem propriam postulans. Satis enim est, si quidem cura-  
 tione egebit ipsa tum crura perfricare oleo cum sale, aut etiam oxyrhodi-  
 no sal habere. At si ex pituitoso humore in particulâ influente œdema cõ-  
 stitit, abunde quandoq; est spongia posca imbuta, cum ligamento leuiter  
 stringente imposita, quæ ab inferiori parte incipiens, supra finiat. Esto au-  
 tē spongia, modo conductura sit, recens, si huius copia non est, eam, cuius  
 erit, detergebis, expurgabisq; nitro, magisq; aphronitro, & cinere lixiuoq;  
 distillauerit. Quod si per hæc tumor nō subsideat, paululû aluminis ini-  
 u-

① Metho-  
 dus Galeni  
 pro nescio hæ-  
 bet nâs, sed  
 uelut stru-  
 latio cum  
 Paulo con-  
 uenit.

*Id Paulus  
nō habet, sed  
est apud Ga-  
lenum.*

cies L nouamq; spongiā ad mouebis, si noua non datur. Commodum est molliissimum ellychnion, posca madens impositum: bonum est, & glaucium. Quod si in uetustate ædema inciderit, parti oleo prius inuncta spongia ex lixiuio imponitur, eiusq; uioletiore arctatione curatur. discutit autem, ac comprimit tumores laxos cedetesq; quælibet terra illita, magisq; Aegyptia, tum ifatis fatiua.

## DE INFLATIONE.

## Cap. XXVIII.

*\* Non est a-  
pod Paulū,  
sed ex Gale-  
no adiectū.  
† Galenus.*



Inflatio ex flatuoso spiritu nunc sub cute, nunc sub membranis, quæ ossibus circumdantur, & musculos, aut uiscus aliquod includit, collecto, enascitur. Porro is colligitur non paucus L aliquando in uentre & intestinis, itemq; in medio horum spatio & membrana, quæ peritonæos dicitur, ut in aqua subter cutem genere, cui nomen est tympanias. Differt quoq; hæc ædema, quod pressa digitis non retinet uestigium, & sonitū tympani modo edat. Membrorum autem densitas, tum spiritus simul crassities efficit, ut idem spiritus non dissipetur. Vnde curandi ratio huc dirigenda est, ut membra rare facias, crassioresq; spiritum extenues, quod medicamenta tenuissima & potestate calida præstant: atque in uentre quidem & uisceribus oleum tenuius quod rutam habet incoctam, aut aliquod ex calidis seminibus, qualia sunt: cumini, apii, & petrosilini. Interim uero & cucurbita iuxta magnitudinis citra cutis incisionem umbilico bis ter ue defixa, inflationem discussit. Musculis autem ex contusione, quemadmodum appulsu inflatis particulas calidis nimium, & acerbis excādescere contingit. Quare per initia medicamenta quæ magis leniant adhibenda. Vbi facta est inclinatio, ea quæ digerunt. Utendum igitur decocto illorum, cum olei momento, quod lanis succidis calentibus excipiantur, uel etiam ceratum ex æsypo admisceat, cura adhibita ut caliditas permaneat, frigus enim non conducit. Vbi iam æger lenitus sopitusq; est, acetū admisceatur & nitrum, aut aphronitrum. deinde & cinis lixiuæ qui distillauerit. Postremo emplastris utendum quæ discutiendi uim habent, quo inflatio subsidat, quale est quod sequitur, sordes gymnasiarum subferuefactæ percolantur primum, ut puræ euadant, & rursus lebeti iniiciuntur, tritaq; calx L restincta ⁊ farinæ modo etiam inspergitur, dum luti fiat spissitudo, ac in usum cōditur. Hoc efficacius est medicamentum ex lycomorō compositum.

*† Galenus,  
uinc.*

## DE LUXATIS ET CONTUSIS.

## Cap. XXIX.



Reticulis luxatis contusisq; faciunt lanæ succidæ, aut spongia oxelæo imbuta impositaq; itē bulbi elixi, uiticisq; tenera folia cum melle, sal, nitrum tostum, leuigata cum cerato inducuntur. Iam superfusio aquæ dulcis, aut marinæ calentis utiliter adhibetur. Vbi uero inflammatio, & dolores conquerint, eluxatæ partes etiam recte perfriquantur.

## DE CARNE CONTUSA, ET SANGVINIS SVBTER

cutem coitu, quod Græce ecchymoma dicitur. Cap. XXX.

**C**Arne à graui quodam corpore, quod extrinsecus superinciderit contusa, uenisq; exiguis indidem diuortium expertis, sanguis profunditur, ut solet cum tunica uenarū rarefacta transcolat, quæ diapedesis Græce dicitur. unde id quod ecchymoma uocatur, sub cute collectum nascitur, cute inquam, integra, tanquam tumor tactu mollis & cedens comitatur liuidus, & magna ex parte indolēs. eò igitur animū tendimus ut sanguinem qui continetur dissipemus, idq; confestim priusquam nigruerit. Per initia sane non nihil ex astringētibus, iis quæ digerunt, admiscere oportet, eo quod tunicæ uenularū cōtusæ denfationem requirāt: inde etiam solis digerentibus utemur, ac scarificatis initio ecchymomatis, ita subsequētem curationem accommodabimus. Ad inueterata autem ecchymomata, radícula illitu prodest. Quippe discutit ea ubi erodere inceperit, aut radiculæ succus, cū micis panis inductus. Cæterum ecchymomatis species sunt, sugillata, & liuores ex ictu, hyposphagmata dicuntur. item sanguinis inter ungues concursus ex percussu proueniens, de quibus priuatim tertio uolumine dictum est. Verum de unguium uitiis, in parte chirurgica differemus.

## DE RVPTIS ET CONVVLIS. Cap. XXXI.

**R**Vptio cum ecchymomate prorsus accidit: curatur autē medicamentis mediocriter calefaciētibus, quale est ex nigris populis acopon, aliaq; huic cōsimilia. At altioribus rupturis magis acria, magisq; incidentia ac L dissipantia recte accommodantur. Talibus sane & cucurbitulæ usus proficit. Ergo si euocatum celeriter per halitum ecchymoma totum est, facile dehiscens ipsa caro coalescet. Sin longiore spatio sordes copiosa succreuerit, ruptum deinceps coire non potest, sed rantum prope ipsius labra admoventur. quo fit ut leui momento ea facile separentur, & medius inter ipsa locus superuacuo humore repleatur, nihilq; aliud, quàm assidue nouum quodammodo ecchymoma creetur, primo persimile, nisi quod ex tenui magis sanie nunc constat, cum per initia è sanguine ecchymoma esset, ideoq; facilius nūc quàm prius, digeritur. Cōuulsum autem fibris quibusdam laceratis distractisq; leniri tantum desiderat, quoad dolor sopiatur, quippe cōglutinari nequeunt. Itaque aristolochia rotunda ruptis conuulsisq; si quid aliud, idonea est: similiter cētaurei maioris radix eiusq; succus, rheum, costus, bdellium cum oxymelite potum.

Galenus  
dissipantia.

## DE SCIRRIS.

## Cap. XXXII.

**X**actus quidē scirr<sup>o</sup>, tumor est præter naturā, sensus expertus & durus: non exactus autē uix sensibilis est. ac qui sensu uacat sanari nō potest: qui ægre sentitur, uix sanescit, si quidē hu-

Scirrhus Tumor quæ  
sensibilis non est.

mor unde huiusmodi uitium cōtrahitur glutinosus crassusq; est, qui particulis induratis impactus solui contumaciter repugnat. Est cum statim ab initio prima rudimēta concipit augeturq; plerunq; uero à medicis qui erysipelata & inflammationes uehementē refrigerauerint astringerintq; originem sortitur. Quod si quis ea quę ualenter trahunt digeruntq; medicamenta, partibus scirro obductis admoueāt, huic paucis primis diebus, manifestō scirrus de creuisse uidebitur. ceterum quod de affectu restat, id reddit insanabile. siquidem toto quod in eo subtilissimum erat dissipato, quod reliquum est desiccatum, ceu lapidosa concretio relinquetur. Quapropter nullum uehementer excalfaciens siccansq; medicamentū est idoneum, sed ea tantum, quę præter quod molliant, digerere etiam commode possunt. Huius autem generis sunt medullę omnes, magisq; ceruina & uitulina. Ex adipibus commendatur, leonina, pardalis, ursina, deinde taurina. Inter aues anserina & gallina cea & phasianica, sicciorq; caprilla & hircina. Ad hæc ammoniacum suffimen, bdellium maxime scythicum, styrax qui humētiore est & pinguis, ac Aegyptiaca mastiche. In aliis sane particulis scirrum expertis his seorsum utendum est, tum iis quę inde componuntur. uerum in tendonibus & ligamentis in hunc modū, lapis igni candens, aceto acerrimo extinguitur, & siquidē haberi potest, pyrites: sin eius copia non est, molaris, in quo pars affecta commoueri debet, ut uaporem ascendentem recipiat, atq; inde rursus medicamen quod emolliat imponitur, oleo tamen tenui non aqua quotidie ab initio. per totum morbi curriculum pars affecta perfunditur. Interim oleo althęe radix ac syluestris cucumeris incoquitur. A balneo autem in totum xgria abstinebunt, uel certe copioso, sed posteaquam scirrus emollitus fuerit, ammoniacū pinguiissimum aceto quāmacerrimo liquatū particulę sat multis diebus inungitur. Deinde rursus emollienti medicamine utēdum, quod receperit galbanum, & opopanacem, eaq; pinguiissima. eiusmodi uero sunt potissimū, ex petasone confectum, & quod ad Amythaonem refertur, & strumis dicata medicamenta.

## DE STRUMIS.

## Cap. XXXIII.



Trumę glandulę sunt indurate, quę in cervice, alis & inguinibus maxime nascūtur. Curatio earū, cum illa quā in scirris tradidimus cōmunis est. Priuatim uero lupinorū amarorū farina ex oxymelite cocta illinitur, ea quoq; phymatis proficit: uel bouillū sterco aceto incoctū delinito, id etiā tumores scirrofos oēs dissipat. probe autē discutit strumas calx, melle, uel gymnasiorū sordibus excepta, uel oleo, uel adipe suillo: aut calcis nitriq; par modō, cardamomi & fœnugręci quadruplus cū melle, malagmatis modo impositus duritias digerit, in pus cōuerfas rumpit loliacea farina cum fimo colūbæ & semine lini uiuo incocta, grossi syluestris, aut satiui, aut cardamū album detritū

cum pice liquida malagmatis forma applicatur, aut cucumeris sylvestris  
 radice sicca, lauri foliorum siccorum concrematorum cinis cum terebinthi-  
 na inducitur, aut pedicularia, & nitri æquale pondus, cruce duplum cum  
 resina iniicitur, aut stercus caprillum bouillum uel aceto incoctum, aut er-  
 5 uer farina in urina pueri impuberis macerata excepta; pice, cera, & oleo  
 liquefactis, aut anguem mortuum in ollam coniecito, gypso; oblitâ in  
 fornacem mittito, concremati cinerem equali sœnugreci pondere misce-  
 ro, melle excepto utitur, item quod aspidibus constat medicamentum, mi-  
 10 rificæ uirtutis est, tum quod ex struthio conficitur, tum quod cucumere  
 sylvestri, tum quod cedrio liquore conficitur: strumas ad suppurationem per-  
 ducit, aut diffundit hoc, myrrhæ drachmæ decē, ammoniaci thymiamati  
 drachmæ septem, uisci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ qua-  
 tuor, propolis drachma, in pila contunduntur. Ad strumas mammarum  
 duritias; proficit subscriptum medicamentum, uisci elaborati, resinæ sic-  
 15 cæ, ceræ, singulorum pondo, galbani quadrans.

\* Exemplar  
 Aldinianha  
 bes duas

#### AD STRUMAS EXVLCERATAS, ET SINE VLCERE.

Ceræ, resinæ pityniæ, adipis suilli insulsi, marrubii, æruginis rasæ, singulo-  
 rum selibra.

#### MEDICAMENTVM AD STRUMAS,

20 quod dicitur cheradicum.

Olei ueteris pondo dua, ceræ pondo, colophonis triens, nitri tantundem,  
 allia duodecim membranis detractis in oleo per triduum macerantur. de-  
 inde cocta cum intabuerint, proiciuntur, eliquatis oleo postquam ab igne  
 amoueris, nitrum tenuissimum inspergitur: tunc etiam abscessus. A L I-

25 V D. Cineris est ficu uncia dua, aluminis scissi uncia, aphronitri tantundem,  
 picis liquidæ uncia septem.

#### EXEDENS CHERADICVM.

Aluminis scissilis, sandarachæ, singulorum drachmæ quatuor, squamæ  
 æris drachma, auripigmenti tantundem, arido strumas conspergito, at si  
 30 cancri naturam induerint, rosaceo maceratis bis die utitur.

#### DE STEATOMATE, ATHEROMATE,

& meliceride.

Cap. XXXIII.



35 Vm hæc quoque inter abscessus, quemadmodum in illis dice-  
 bamus, habentur, singula propriam appellationem à similitudi-  
 ne terum quæ in tumoribus continentur, sortita sunt. Alii siqui-  
 dem ipsorum ueluti pingue quiddam seu adeps subest, alii melli si-  
 mile quippiam, alii quasi tenuis pulicula. Consilium igitur curationis est e-  
 40 mune, ut quod tunica illa contineat, discutiat, aut medicamentis totum ex-  
 curret, aut sectione auferatur. Quidam enim ex iis tumoribus, triplici hac ra-  
 tione curantur, ii nimirum qui liquidiorum humorem continent, qualis est meli-  
 ceris: aliqui duplici tantum ut atheroma, quod & sectione auferitur, & medi-



ca mentis exeditur, steatoma uero nec discuti, nec exedi potest, sed manu duntaxat curatur. Quomodo autē unumquodq; horum agnoscas, in parte chirurgica edocebere. At medicaminū, quæ dissipandi uim habent, materiam, ubi actum est de strumis, reperies. Priuatim uero meliceridas hoc dissipat, uix passæ acinis exemptis \* uiginti, squamæ drachmæ ④ quatuor, parte fomentis prius nutrita imponitur. ALIVD. Ladani, bdelli, galbani, ammoniaci, thymiamatis, propolis, rerebinthinæ, singulorum æqualis portio in pila contunditur: facit etiam strumis, parotidibus, furunculis, phymatis. At Archigenes contra meliceridas cōmendat aphronitrum & ueratri partem duplam, cum cerato duriore impositā, exedentibus autē, cute tuberculis circumdata, uti nō licet. Hac igitur prius meliceridas athe-  
 10 romata, uel etiā strumas medicamētis adurētibus de regere oportet, simplicius illorū est, quod recipit calcē uiuam, saponē & cinerē lixiuæ stillatitium. Variū autē magis, quodq; reconditū seruari potest, capir calcis uiuæ denarios quatuor, scēculæ uini cōbustæ, nitri liquidi rosti, singulorū denari-  
 15 os duos, minii denariū, cinere lixiui stillatio trētur: ubi mellis liquidioris crassitudo facta est, ter seruefacito, ut medio crē cōsistētiam habear, pixide plūbea rēponito, lixiuiā super distillans ne subito exarescat. ualet quoq; ad uerrucas, myrmecias, pterygia, clauos, callos, cicatrices supercre-  
 20 scentes, scēcula bimestri nō uetustiore cutē delinito: ubi arefcere in ceperit, sponsia clorā rursū impetungitō. ubi nigruerit, denuo abluēs medicamē-  
 25 ris crustā inducētibus: postq̄ aut crusta deciderit, exedētia adhibētur. Medica mentū exedens ualide citra rōsiōnē. Squamæ aris drachmæ quatuor, sandarachæ drachmæ duæ, ueratri nigri rāntundem, cum rosaceo utitor. ALIVD. Squamæ, sandarachæ, urticæ seminis torrefacti pari mēlura cū  
 30 rosaceo utitor. ALIVD. Erynaceorum combustorum, sepiz restæ, auripigmenti, æquale pondus ex rosaceo: quæ ambiunt partes orbiculatim oēs, prius delinito cerusa cum oleo. Item efficax est cōpositio ex calcis uiuæ il-  
 laboratæ partibus duabus, chalcitidis parte una, auripigmenti parte una.

## DE FAVIS.

Cap. XXXV. 30



Auus qui Græcis ceriō diciſ, tumor est qui in cute foramina habet, per quæ humor crassitudine mellis referēs excernitur: recte igitur ipsi imponuntur uix passæ cū ruta, aut fici folia mollissima cū melle, aut cardamū cum lini semine ex melle, aut cucumis domestici radix cū melle, aut sulfur uiuū cum cerato, uel re-  
 35 rebinthina. Cæterū uariā magis fauorū curationē molire, si quæ tertio uolumine de manātibz capitis ulceribz dicta sunt, in hūc locū trāsferat.

## DE SIMPLICI VLCERE.

Cap. XXXVI.



Voniā simplex ulcus cōrinue solū est diuortiū, si quis partes diductas fascia orbiculatim circumdata cōmittat, utiq; cū  
 40 tra aliquā aliam molitionē coalescent. Cum uero alterū ul-

\* impressū  
 exēplar ha-  
 bet octo.  
 ④ impressū  
 sum Aldi  
 exēplar ha-  
 bet tres.

teris os in obliquum spectauerit, inde deligaturam tentare & in contrariū ducere oportet: eum utraq; illius labra cō uergant, & duobus principiis incipiendum est, & ora sic adducenda. Nam cum nihil intra oras inciderit, nempe pilus aut arena, aut oleū, aut sordes, aut id genus aliud, omnino uel  
 5 cus cōrescet. quod si magnū sit, adeo ut diductæ partes in torū prædicta deligatura cōmitti nequeant, futuris ipsæ adducentur, deinde sic deligatæ, glutinatoriis, ut uocant, præditiis utemur, quæ collectam humorum subluuiem desiccate & consumere queant: aliam, ne influat, prohibere.

## QVAE VLCERA GLVTI

10 nare possint. Cap. XXXVII:



Oboris folia illita ulceribus glutinādis sunt. Item salicis, bracticeæ, oleaginis fruticis quæ chamæla dicitur & fructus & folia & cortex, succusq; austerioris plantaginis, papyrus posca aut uino imbuta & in orbem circumdata. Recētia ulcera glutinā  
 15 nant piceæ & tedæ folia, cortexq; recens ligamenti modo circūdatus cum aqua aut posca aut uino, caseus recens leuigatus: extrinsecus imponūtur, folia lapathi, aut uitis, aut betæ, aut lactuce. At ex acido lacte caseus qui oxygalactinus dicitur, uulnera quoq; ampliora cōmittit: pira syluestria quæ achrades dicuntur fluxionem reprimunt. equisetum si illinatur, ner  
 20 uos quoq; præcisos iungit, ifatis fatiua in duris corporibus ulcera etiam si musculorum capita affligāt, idem præstat. cupressi folia, germinaq; & nouelli galbuli mollesq; duris corporibus proficiunt, sed miscendus est ataneus, qui circa molas agens farinam euolantē exēpit, in pollinē detritus, myrrha cum aqua illita, uel lachryma thuris, terraq; lumbrici uel neruo  
 25 rum præcisiones glutinant, pentaphyli folia cum melle, allia cōbusta illita. Inueteratis ulceribus e contrario prodest hordeum cōbustum eum ce rato. Cerusa autē cum myrtei cerati triplicato pondere. Ad capitis ulcera ualet, myrrham aridam inspergere non madefactam, quippe celeriter cō trahit, uel aloē aridam, uel aristolochiam tritam & melli & uino incoctā  
 30 dum mediocris fuerit spissitudo in linteum illinens applicato. Composita autem ad glutinandum sunt Barbara, Chryse, medicamentum Nicolai. Item quod salicibus, quodq; dictamno constat, atq; alia his consimilia, quæ magnis potissimum uulneribus glutinandis sunt.

## SI DOLOR ET INFLAMMATIO

35 ulcera exerceat. Cap. XXXVIII:



Idolor & inflāmatio uulnera obsideat, usus est medicamēto rum, quæ desiccant, atq; inflammationē arect. Ex liquidis igitur laudatissimū est uinum, deinde posca. Si uero sordes quo  
 40 que cum inflāmatione occupent, mulla diluta conuenit. Ex iis autē medicamētis quæ siccandi potestate prædita sunt, cōmuniter qui dem cōferent, inflāmationibus dicata, si oleosa acriāq; excipias: priuati  
 t iiii

hoc proficit, malum Punicū dulce uino incoctum tritumq; illinitur, mirabile nimirū & multiplici usu cōmendatum est remediū, facit enim tum ad capitis, tum naturalium ulcera, tum ea quæ toto corpore exerceant, oculorumq; inflammationes. At si erysipelas, aut eiusmodi quippiam ulceri accesserit, iis utendum præsidii, quæ aduersus illa inscripta sunt.

SI MATVRARI, ET AD SVPPVRATIO.

nem perducinequeant.

Cap. XXXIX.



Ecentia quidem ulcera, & quod inflammatione adhuc occupetur, non suppurantia, concoquit maturatq; ex simplicibus, aqua temperata superfusa, farina triticea, uel chōdrus, uel panis, uel glutinū librarium, cum terebinthina illitum, item cera, crocus, lachryma thuris, pix, rosaceum, adeps suillus, uitulinusq;. Inter composita uero tetrapharmacum quod linteolis illinitur, rosaceo subactum. Vetera autem & callosa maturant, simplicia quidem uua passia domestica, styrax, galbanum, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrum, mastiche Aegyptiaca, & hyssopum. Composita uero ex recinino, dictum acceron, id est, absq; cera, quod ad Galenum authorem refertur, si linteolis illinitur, oleo ueteri aut recinino solutū, item quod à duplici colore dichromon dicitur, pari modo & basilicum, similiaq;.

DE CAVIS VLCERIBVS.

Cap. XL.



Auum ulcus carnem quæ periit restitui postulat. cuius generatæ materies opifexq;, sanguis moderatus est, & probus. Huius igitur medicritatem ex alimento sufficienti conciliabimus, temperiem uero probam ex bonis ciborum succis, & proba particulæ in quo ulcus est temperatura. At ex recremento tenui, humidum ulcus redditur, ex crasso, sordes coalescunt, eoq; medicamentis eget quæ modice siccāt, putgātq;. Eiusmodi sunt lachryma thuris, hordeacea farina, eruorumq;, fabarum lomentum, iris, aristolochia, cadmia, panax, & pompholyx. Quod si nihil medicamentum ad creandam carnem indutū proficit, ad aliud sic digrediendum est. At si plusculum sordis sit, humidiusq; ulcus, sciendum uenit medicamentum intra modum desiccasse, intendendumque esse ipsum mellis mixtura: sin purum & absque humore cernitur, ultra, ac conuenit oleo pleniore dilutum cetatum inducere. Accidit nonnunquam carnem à medicamento ualentiore consumi, ut sordidum humidumque ulcus appareat, quemadmodum ex iis quæ minus ac par est, desiccant. Verum hoc ulcus dum consumitur, cauum magis euadet, labris prætumidum, rubens præterea & inflammationis particeps. sæpe uero æger manifestam erosionem percipit. Alterum illud quod à parum siccantibus remediis humescit, nihil horum succidaneum habet. Putrida igitur ligna, & potissimum quæ moderata astringendi abstergendi que uirtute donata sunt, quemadmodum & ulmus, pur-

gant ulcera, puraq; iam facta, carne replent, uel anemonæ appositæ. item piceæ cortex deraus, tritusq; cū cerato & linteolis illitus, cauis ulceribus auxiliatur, & præsertim recentibus, ut quæ carne destituta reficiat, repleat q;. Composita uero, ubi pura quidem sunt ulcera, accommodantur, quod ostreis cōstat, quod Manathoni adscribitur ex uini sæcula, quod ex aloë conficitur, quod melitera appellatur aridū, & quod amyli, mannæ, alicæ, erui, pares portiones recipit. similiter quod è thure confit, & aphroditarium. Sin autem sordibus magis scateant, cephalica appellata arida conueniunt, & quæ linteis illinuntur, ut Trophos dictū, Ius, Athene, ex attritili de præparatum, Italicumq; & quæ experientia comprobauit.

QVAE SORDIDA VLCERA PURGENT. Cap. XLI.



Ordida ulcera siue caua, siue plana fuerint, probè purgata aristolochia cū melle, terebinthina cū pari rosaceo & melle, uel loco rosacei butyro, iris illyrica ex melle, oliuæ colymbæ des illitæ. Ad ea uero quæ neruosis obueniūt, terebinthina cū butyro liquefacta: sordidis nimium & depascentibus benefacit marrubium cum melle. hoc etiam crustas deiicit. Composita autē remedia hæc sunt, amurcæ coctæ, mellis despumati, aluminis phorimi, hoc est, liquidi, paria pondera. ALIUD. Serapiadis herbæ, quæ & triorchis dicitur, siccæ, iridis illyricæ, marrubii sicci, aristolochiæ, singulorū drachmæ octo, erui farinæ drachmæ decem, arido utitor & cū melle. Insuper ad sordida ulcera facit tū Aegyptia, tum ex sale cerata liquefacta, tum Indice, tū Athene, tum uiridia diluta. Ad hæc, quod pumice cōstat, & ex eruo sicca, pastillusq; nigro uiridis similiter etiam Criogenes appellatus.

AD VLCERVM VERMES. Cap. XLII.



Uermes qui in ulceribus procreantur arcendos, primum quidem est ut humiditatem putredinemq; eorum opificenti tollas. Cæterum necant uermes communiter quidē, omnia quæ ad aurium uermes inscripta sunt. Ad eos autem qui ulcera infestant, Archigenes commendat cerulam poliumq; pari modo cum pice liquida illitum.

QVOMODO CARO VLCERIBVS SUPERCRESCENS EXEDATUR. Cap. XLIII.



Supercrescens ulceribus caro medicamentis quæ ualenter exiccat tollitur, cuiusmodi est diphryges inspersum, squama griseis, omniaq; testacea combusta, & erinacei concremati utrique cum toro corpore. Verum hæc modicè purgant, & supercrescientia continēt. Asiæ uero petræ flos, ualidior est, hoc magis fori, chrysocolla, chalcitis, misy: cōbusta minus rodūt: itē æris flos, similiter ærugo omnibus est ualērior, sales autē cōcremati, humētes cum infirmitate carnes cōsumunt, sic etiam linamenta carpta è panniculo, muria acriori imbuta,

& reficcata, quæ si imponantur, mediocres carniū supercrescentias excidunt. Aerugo, cum æris squama inter ea refertur quæ ualide reprimunt. Composita rhodia (ut dicitur) arida, psaron, ad hæc xanthon, sine morfu retinent. At maximas carniū excrescentias, adusq; penitiora crustis obducunt, pastilli Faustiani, triti inspersiq; & medicamentum, quod à solis æstu heliocaes dicitur, aridum. Adde his quod recipit calcis uiuæ, squamæ æris, & mannæ, pares modos. Idem ea quæ nimium excreuerunt, fungisq; respondent, cum melle, purgat: cum cerato, carne replet.

ARIDA COMPOSITIO AD CARNEM COMPESCENDAM. Argenti spumæ, chalcitidis, æruginis, plumbaginis, singulorū æqualis portio. ALIVD uehementer reprimens citra rosionem, ualet quoq; ad pascētia ulcera, & præsertim gingiuarum uiria, quas epulidas uocant, necnon ad dentium candorem. Calcis uiuæ pondo, auripigmenti selibra, hoc auripigmentum, inquam, ex aqua detritum calcis uiuæ, cadmiæ modo lotæ ad iicitur: in puluerem redactis siccis uritor: ex pastillis aut, tum qui Pantolmius dicitur, tum qui ad polypum inscripti sunt, pulchre coercent, sic emplastra uiridia & præcipue id quod ex sale cappadocico præparatur, simili ter, & istis summe carnem supercrescentem in ulceribus continet.

DE VLCERIBVS SERPENTIBVS, ET PV-  
tridis, & phagedæna.

Cap. XLIII.



Vperfusiones utiles sunt ulceribus depastis, purridisq; ex aceto, posca, aut uino astringente, aut aqua frigida, aut marina, aut decocto lēticulæ, malicorii, balauftii, lentisci, myrti, spinæ ægyptiæ, aut aliquo ex istis quæ astringunt & siccant. Cataplasma his ipsis exhibetur ex farina erui, alumine liquido, panis silignei mica, gobio ueteri, aut alio salsamento ueteri carnis illotæ, terebinthina liquida pari pondere detritū, uel aristolochia, uel reciniorum foliorum succus æqualis, æruginis pars dimidia, ex aqua ut mellis sit spissitudo illinitur: si crusta non deciderit, elaterii parem modum ærugini admisceto. purridis efficax est fori sitritum inspergatur. Et super linamenta carpta arida, uel aristolochia rotunda, uel gallæ, æquo pondere cum oleo illinuntur, uel cum syluestris radix, uel brassicæ, uel betæ, uel lapathi folia illigata calidis cineribus reconduntur. Vbi uerò emollita fuerint, cum sale trita imponuntur, ualenterq; repurgant: uel oleæ summitates in uino decoctæ cum melle illinuntur, uel chalcitis applicatur, uel apii semen contritum, uel lini semen leuigatum, cum atramento furorio inducitur, uel thymum, uua passa, & ficus incoctæ applicantur, aut fici folia in læuorē trita cū melle, aut nitrū, cuminū, & farina ex melle, aut cucumeris syluestris radix, aut scilla cocta ex melle, aut foreos drachmæ duodecim, chalcitidis drachmæ decē, misyos drachmæ quatuor, cū dimidiā aceti acerrimi hemina, leui gant donec arescant: exceptis uteris, specillū intingens, ac ulcere circumadigens su-

perq; duplex linteolum ex ceneleo imponis: sin inflammatione sint occu-  
pata, altercum cum polenta, aut brassicam cum melle delinito.

AD PVREDINES QVAMLIBET PARTEM OCCU-  
pantes, & ulcera quæ depascunt.

- 9 Calcis uiuæ, chalcitidis, singulorum denarii duo, auripigmenti denarius:  
hoc quoq; ad digitorum pterygia & phagedænas efficax est. Item natura-  
lium carbunculis cum melle utiliter adhibetur. In reliquis uitius arido uti-  
tor, super, splenium ex resina inducito.

- 10 AD OMNIA QVÆ DEPASCUNT VLCERA, QVÆ  
q; os infestant, item sanguinis profluium, & carnē excre-  
scentem, aridum compescens, longēutilissimum.

Chalcitidis, misyos, utriusq; crudi, denarii uiginti, squamæ ferri denarii \* *¶ In exem-  
plari manu-  
scripto, sex  
decim.*  
sex, gallæ irumaturæ denarii octo.

AD SERPENTIA VLCERA ET PVTRIDA.

- 15 Salis drachmæ duodecim, aluminis qualiscunq; combusti drachma, squa-  
mæ, pumicis combusti, singulorum par modus: ualet & ærugo rasa cū mi-  
sui combusto, pice liquida excepta, squamaq; ferri cum oleo.

AD VLCERA PVDENDORVM DEPASCENTIA.

- Hæc & meliterion, nomis proficient. Item ex acuta myrto, ex charta me-  
dicamen aridum omnibus nomis efficax est. Accedit huc coraciō ex oxy-  
melite, pastillus Andronis, & qui huic respondent. Eadem uero hæc me-  
dicamenta phagedænis quoq; cōgruunt: nam & ipsa ulcera sunt quæ depa-  
scunt, exeduntq;.

AD FLACCIDA ET CVM INFIRMITATE

- humentia ulcera fœtidaq;.  
25 Lemnia sphragis ex aceto, uel oxymelite, uel posca, uel uino subacta, ad lu-  
ti spissitudinem illita benefacit, aut cupressi folia, germina & galbuli tene-  
ri, aut cucurbitæ aridæ concrematæ cinis, aut platani corticis combusti,  
aut anethi cremati similiter, aut lanarum sordidarū ustarum, aut planta-  
go, aut isatis per se, uel cum polenta, uel peucedani radix arida.

QVOMODO CICATRIX VLCERI

inducenda sit.

Cap. XLV.



- 35 Vmma ulcerum caro cuti similis efficitur, induciturq; ei ci-  
catnix, si illam desiccemus astringamusq; , adeo ut non so-  
lum id quod præter naturam redundat discutiat, uerum  
etiam quod secundum naturam est, attingamus. Idonea ad  
hoc sunt, galla immatura modicè exiccans, tum quæ citra astringentem  
rosionem quæ siccant: eadem quoque cicatricem inducunt, ueluti myr-  
rha, argenti spuma ostreaq; coneremata. hæc namq; si inspergantur, arida  
sepe cicatricē inducūt: piceæ cortex cū cerato myrteo, hederæ flos cū cera-  
to, lilii radix cum rosaceo, resina ex picea arida, pumex tostus, squama cris-

pari portione, siccis utitor, idem etiā reprimat: uel pumici trito, manna & diphrygis singulorum miscens paululum, utitor: uel argenti spumę partem unam, diphrygis dimidiam cum cerato instar splenii impones. Vetera autem ad cicatricem ducit uiscus, cum lachryma thuris, ærugo cum diphryge æquali, ceratoq; myrtico: uel centaureum minus recens illitum. At humidiora cyperi radice illinito: sedis aut naturaliumq; ulcera, præsertim si inflammationem experiantur, aloë persanat læuigata arida: uel ex aqua: aut squama æris, aut chrysocolia in sole cū cera emollita inducitur.

#### ARIDVM AD CICATRICEM INDVCENDAM.

Ostreorū drachmę duodecim, mānę drachmę sex, cadmię drachmę quatuor: facit & nomis. A L I V D. Aristolochię, drachmę sex, picę corticis drachmę sex, manna tantundem, pumicis, colophonię, iris, singulorū drachmę quatuor. A L I V D. Cornus ceruini cōbusti drachmę quatuor, picę corticis uncia sex, cerusę uncie quatuor, æruginis rasę uncie nouę, cadmię drachmę octodecim. A L I V D. Cytinorū, atramenti furorii, singulorum drachmę sedecim, squamę eris, aluminis scissi singulorū drachmę octo, gallę drachma. A L I V D. Cerusę, argenti spumę, singulorū \* drachmę octo, recrementi plumbi, gallę, myrti aridę, singulorum drachmę quatuor.

#### AD CICATRICEM INDVCENDAM.

Aluminis scissilis uncia, trita in aqua sextario maceratur: ubi solueris, aqua linamenta imbuis, & siccatis uteris.

#### EMPLASTRVM AD CICATRICEM INDVCENDAM ex simplicioribus.

Cerę denarii quadraginta, argenti spumę denarii triginta quinque, diphrygis denarii octo, myrti hemine dimidiū: efficax est his quoq; palmulatū, qđ phœnicine dicif, itē ex cadmia, tum myrsinatū, & cōsimilia. Ad ea uerō quę cicatricē uix recipiūt, cerę, myrti, singulorū drachmę sex, cadmię uncie sex, plūbi, thuris, singulorū drachmę duę, aluminis scissilis, æris cōbusti singulorū \* drachma, æruginis rasę drachmę duę: die interposito soluit.

D I V I N V E T E R A T I S E T A E G R E A D C I C A T R I C E M uenientibus.

Cadmię, chrysocolle, aluminis scissilis, singulorū drachmę octo, æruginis, squamę eris, singulorū drachma, resinę pityinę drachmę quadraginta, cerę drachmę centū, myrti quod satis est. A L I V D. Cerę, resinę pityinę, singulorū \* uncia sex, cadmię tantundē, chalcitidis crudę uncie tres, myrti quātū satis est: uino læuigat cadmia cū chalcitide, cū canicula sidus oris: latio re utere splenio, quod platysma dicitur: super id linamentū carptū & spongiā ex uino inducito. A L I V D. Actis cōbusti, aluminis scissilis, singulorū uncia duę, salis ammoniaci drachmę duę, cerę uncia sex, colophonię tantundē, myrti uncie duę, arida in sole diebus uiginti ex aceto leuigantur, ubi mellis facta fuerit spissitudo, cera eliquata refrigerataq; emolliendo miscetur. Valet etiā ad hæc medicamentū ex pumice, itē Isus, & id genus alia.

\* Aldus habet uncia octo.

\* Aldus unciam legit.

\* Exemplar scriptū habet uncia tres.



DE MALEFICIS VLCERIBVS DOLOSIS QVE, CACOE  
the Græci uocant, aliàs chironia & telephia. Cap. XLVI.



Nucterata & quæ uix cicatricem recipiunt ulcera, aliî chironia  
appellarunt, ceu Chirone medicinæ peritissimo indigêtia: aliî  
telephia, quòd in tali ulcere Telephus consenuerit. Inspicien-  
dum igitur uenit, num & totum corpus uitioso redundans suc-  
co, huiusmodi fluorem ulceri transmittat, ac qui superat humor, conueni-  
entibus uacuari debet remediis. Si uero uarix cruribus ulcere infestatis il-  
lum impetiat, etiam hic auferri debet, sicut in patte chirurgica explicabi-  
tur: aut uenæ sectione ipsos uacuabimus, abunde sanguinis detrahentes.  
deinde loco inducemus auxilia, quæ sine morfu reficiendi uim habent. sim-  
plicia igitur ex pumice, diphryge, squama, ærugine, calce mediocriter lo-  
ta: alumen scissile tritum inspergitur: hyssopi drachmæ quatuor, uux pas-  
sæ tantundem, nitri drachmæ duæ, loco prius melle illito applicantur: qua-  
mz æris drachmæ decem, aluminis drachmæ duæ, cum ceræ drachmis de-  
cem emollitis in sole, imponuntur.

COMPOSITA HAEC SVNT, EMPLASTRVM AD CHIRONIA.  
Cerusæ unciz octo, aluminis scissilis unciz duæ, squamæ æris drachmæ  
duæ, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasæ, malicorii, singulorum unciz  
duæ, calcis uiuæ uncia, ceræ libra, myrtei libra una & semis, arida uino te-  
runtur: hoc medicamenti protinus ab initio callum excindit, & recondi-  
tum seruatur, postremo autem in usu emollitum myrteo, cicatricem in-  
ducit. ALIUD. Argenti spumæ pondo, olei pondo duæ, chamæleontis ni-  
gri, radices aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorū uncia, galbani, guttæ,  
ammoniaci, lachrymæ thuris, singulorū unciz duæ, præparato radicibus  
uiridū atundinū agitās. Archigenis ad chironia, tū malefica ulcera quæ ti-  
bias mamasq; obsidēt, itē strumas & parotidas. Adipis bouilli libræ tres, te-  
rebinthinæ quincūx, mannæ septūx, terræ sardæ dictæ, qua scriptores utū-  
tur quincūx, his quæ liquari possunt in arida cōiectis unitisq; utitor. ALI-  
UD Archigenis, ceræ triēs, olei omphacini, mānæ uel thuris lachrymæ, di-  
phrygis, squamæ, singulorū drachmæ quatuor, arida cū aceto leuigas, ubi mel-  
lis spissitudo facta, cerato misces, & uteris diluto qd linteolis possit illini.  
ALIUD ad mulierū dolosa ulcera, & aliorū q tenera carne pediti sunt. Ceræ  
tyrrhenicæ drachmæ octo, adipistaurini, terebinthinæ plūbi cōbusti lotiq;  
singulorū \* drachmæ quatuor: utitor per lina mēta ex rosaceo uel myrteo.

\* Albes-  
cent habet.

AD CICATRICES NIGRICANTES. Cap. XLVII.



Icatrices nigras tollit oleū in quo bryoniæ radix candida & ni-  
græ incocta sit, dum succū reddat, impositum: calamintha ex  
uino cocta, argenti spuma cū rosaceo albo lota: ex impetigini-  
bus cicatrices, tū alias concolores efficit asini adeps illitus: eru-  
cz semen ex felle caprillo, bubulo, & ouillo, perunctum cum argenti spu-

ma ouillus talus cōbustus, ex uino a uſtero tritus, gutta ammoniaci cū ſuilo felle illita. Cōpoſita uero, argēti ſpumæ, mētæ, lachrymæ thuris, pates portioes cum melle. ALIVD. Nitri, ſuſſiminis ammoniaci, ſulſuris uiui, myrrhæ, paria pōdera, ex aceto albo, aut uino, aut aqua, minutim detrita modice illinūtur, ne exulcerationē excitēt. ALIVD. Cimoliz cretæ, colūbarum ſimi, ſaponis, thuris, æquales modi ex aceto. Smegma ad cicatrices nigras. Cimoliz cretæ drachmę octo, aphronitri drachmæ quinq; ueratri albi drachmæ quinq; glandis unguentariæ expreſſi drachmæ quatuor: in balneo cicatrices abſtergito. DE SINIBVS. Cap. XLVIII.




Vm adiacēs ulceribus cutis, diutius ſubiectis corporibus nō coaleſcit glutinaturq; noſtri ſinū, Græci colpon nomināt. Si igitur ad ſuperiorē partē porreſtus ſit, facile ſanies per os emanat, atq; ideo prōpte cōglutinatur. Si inferius ipſe ſpeſter, ſanies uicinā aliquā partē intus erodit, ac niſi emiſſariū quoddā collectiōis ſcalpello prius feceris, nihil promouebis, neq; carne ipſum replēdo neque cōglutinando. Quōd ſi artus aliquos nēpe cubitū, aut femur ſiaus occupet, poterit utiq; decliuiſ figuratus citra diuiſionē ex aduerſo factū coaleſcere. Etenim in cubito cū oræ gibbero uicinæ ſunt, ſummā manū elatiuſ protēdēs, ſinū ad deſluxionē incitabis. At in femore ſi propter genu ſinus deſinat, decliui figura poſito, iuxta poplitē mollē puluinū ſubiicis, quo inguina genu humiliora ſint. Si igit ſinus carne impleri nō deſideret, ſtatim fiſtula quadā recto peruia foramine cui ueſica illigata ſit, ad ſaniē quidē quæ ſinui inhiaret abſtergendā dilutiore muſſa potabili, elui debet: uerū ut coaleſcat, uino aut muſſo: deinde ad glutinās medicamētū trāſeundū. Sincauus ſinus carnē requirit, primū medicamētū, quod charta conſtat, aridi paululū cū multo roſaceo inferi cōuenit. deinde carpto linamēto os obturari. Inde emplaſtrū Iſis aut Machæroniſ, aut ſimile quoddā unā cū roſaceo cerato liquidiore ſolutū iniicitur. Vbi uero carne mediocriter ſin⁹ fuerit repletus, cōglutinās quoddā medicamētū impones, quæadmodū & recēs cruentū uulnus curabas. Huius aut generis ſunt: Barbara, Dichroma, & rubia appellata. Maxime uero oīm quod ex recinino, & metallicis ſine cera præparatur rubrū Galeni emplaſtrū cōueniet. Poſt medicamētum, ſpōgia recēs ex muſſo aut uino circūponitur, & q̄ fieri poteſt, molliſſime, deligatura à ſinus fundo incipiēs in ipſius os deſinet, linteorū uero circūductus fundū ſinus ſine dolore cōſtringat, paulo poſt ſoluat uſq; ad ſinus oras, emplaſtro extrinſec⁹ ſinui circūdato, ſed ita iuxta oras deſciſſo, ut ſanies queat excerni: qđ fiet paruo quodā alio emplaſtro ſupimpſito ex eodē medicamēto ob effluxū laxo: ſines id aduſq; ſolutionē, qua tertio quoq; die facta idipſū auferes mutabiſq; qđ toti ſinui circūdatū ē relinquiēs. Nota uero erit an ſin⁹ ima coaluerit, ſi ſanies probe emanet pauca & cōcocta, aut ſi nequaquā effluat: in ſup eodē in ſinu ſi neq; dolor aliq; ſenſibilis, neq; tu

mor, sed tota regio submissa, sicca, & doloris expers appareat. At si pus eti-  
am maturū in ore modicū cōspicias, multo magis de sinu conglutinando  
spectandū est. At si primo altero uel die sanies quēdā tenuis ē sinu excernat,  
nihil adeo de glutinatiōe despera, quippe medicamēti uirtus humorē tenuē  
5 ex subiectis partib⁹ frequēter extūdit, unde partes sicce mediocriter factę  
coēūt & glutinātur. Tertio uero die aut quarto ab initio si cruda per os sa-  
nies euaserit, scito sinū nō coīisse, eodēq; medicamēto nō insiste, nā cū pro-  
pter humiditatē quāpiā, ut uerisimile est, à parte decidat, nō alienū fuerit  
DE SINIBVS QVI AB ATTRITIS VE- (ctiā mutare.

10 stium fragmentis rhacodes dicitur.  
Vbi abscessus tarde sectus fuerit, uel medici imperitia, uel eius qui curatur  
timore, & cutis sinui obducta tenuis, attritisq; uestiū laciniis similis fuerit,  
quod Græci rhacodes dicūt, fieri non potest, ut prædictis collutiōibus adī-  
matur, ob quod glutinātē utendū medicamine, tēperatura liquido, uirib⁹  
15 aut arido. tale est palmulatū dictū ex chalcitide, ueteri dilutū oleo, ne ad-  
modū indure scat, neq; manus coinquinet, deinde uino mediocriter uetu-  
sto maceratū, postea orbicularim cū decēti deligatura impositū. Conue-  
nit aut attritę uestiū instar ut cōprehensum est, cuti, potissimū mel, quoad  
emplastri spissitudinē habeat coctū impositūq; Præstitit aut post illirio-  
nem lacero in sinu factā, myrrhā ei in pollinē coactā, cribro suspenso in-  
20 spergere, uel aloēn, uel thus, uel simul oīa. Expertus aut sum, tenue centau-  
reū in hūc usum mirabile esse medicamentū. succedit huic symphytū, de-  
inde iridis illyricę radix, postremo crui farina. Nōnunq; uero inter coquē-  
dū ea melli inspergūtur, cū cacab⁹ ab igne tollēt. Melius aut fuerit, si lebe-  
25 te iam à flāma amoto hæc fiāt, deinde diligēter agitemus: ubi medicamē-  
tum egelidū euaserit, sinui imponatur, illigeturq; sicut expositum est.

## DE FISTVLA.

## Cap. XLIX.

30  Istula sinus est callosus, qui magna parte ex abscessibus na-  
scens, ab arudinearū fistularum tralatiōe appellatur. Si itaq;  
in os desinat, curari sine manu haud potest, nisi tēporis spa-  
tio, squama ultro uel os deciderit. Si uero in os finiat, medica-  
mētis quæ callos elidūt & cōglutināt per sanabitur. Itaq; callos excidunt  
hæc quæ subiungā. Spōdiliū radix \* feruefacta impositaq; fistularū callos  
eximit, itē ueratrū nigrū duobus tribus uel diebus insertū idē præstat. Ad  
35 hæc amurca cocta & in collutionē adhibita. Iā sory crudū uel cōcrematū  
cū uini diluti momento iniectū: itē sory & crocomagna cū hydromelite,  
uel elateriū terebinthina exceprū in collyria cogito, imponitoq; uel lafer-  
pitii radice succū infundito. Id qđ sequitur callos cōsumit: & ruginis drach-  
mę duodecim, ammoniaci drachmę duę, excepta aceto in longū inducūt.

\* Transcri-  
ptum habet  
in spodio,  
quod est car-  
num.

40 COLLYRIVM QVO FISTVLIS EXTERENDIS VTOR.  
Guttę ammoniaci, atramēti futorii, & ruginis, misyos, chalcitidis, gummi

pari modo excipiuntur aceto. ALIVD ex his, quæ in Heliodori chirurgica scribuntur. Cadmiæ, misyos, atramenti sutorii, æris combusti, gummi, singulorum drachmæ quatuor, chalcitidis crudæ drachmæ tres, excipiuntur pueri impuberis urina & finguntur collyria, ex quibus uno fistulæ imposito, panis mica aqua madens extrinsecus superaccommodatur, sed ita ut illud mutetur sæpius donec inflammatio cōquiescit, & crusta exciderit. ALIVD quod in Alexandria accepi, Anchusæ radicem, misys tosti, chalcitidis, æruginis, aluminis scissi, atramenti sutorii, aloës, singulæ unciz, cantharides quinque, aceto trita in collyria coguntur. ALIVD. Atramenti sutorii denarii duo, chalcitidis, æruginis, singuli denarii, excipiuntur gummi usuiq; sunt. Cum autem callus fuerit extricatus, ærugine cocta cum melle purissimo oētuplo in collyrii formam redactis, repurgatur. Vbi uero callum eliseris, iis quæ carnem procreant uti opportunum est.

\* Impressu  
habet melle

#### COLLYRIUM AD CARNEM GENERANDAM.

Aloës, myrrhæ, ammoniaci, ouorū putaminū cōbustorū cineris, æquale pōdus, aqua detritis omnibus collyria formantur, imponunturq;. ALIVD. Myrrhæ, aloës, thuris, malicorii, æqualis modus aqua excipitur, quidā uero taurino felle, carnes etiā olco quod immaturis uuis expressum est eluitur. Notus mihi est, qui cedrino liquore fistulas collueret, ac mirū quanta res felicitate successerit. Postq; uero carnes produxeris, glutinatorio utendum medicamine, quomodo in aliis sinibus præcipitur. At cum fistula artior, longaq; fuerit, Galenus ait, neq; callum adhuc, sed sorditiem tantummodo contraxerit, primum lixiuiam demissi, deinde eandem tantisper inibi permittens dum sordes excidisse sperasset, medicamentum applicaui. Est autem id quod resinino oleo constat superius commemoratum.

#### DE VLCERIBVS DIRVPTIS.

Cap. L.



On nulla ulcerū cicatricē obducta, frequēter haud magno temporis intervallo, iterū inflammatione tētantur rumpunturq; siquidē ossē quodā affecto, interdū caro circūdata ex facili cicatricē recipit, ac sana ex toto esse uidetur: uerū cursu humoris ualido paulatim ex ossē in alto cōtabescente, tum inflāmatio, tum pus oboritur, quod cicatricē deradit. Curatio igitur cuiusmodi ulcerū, tantā requirit siccitatē, ut os affectū decidat. Huius autē sinus concauos prompte replebunt papaueris syluestris ficiq; folia cum polenta leuigata, atq; ex uino illita, uel alterci semen, & atramentū sutorium pari pondere cōtrita imponentur, uel peucedani radix desubito squamas ossium separat.

#### DE ARTICVLORVM VLCERIBVS.

Cap. LI.



Vm articuli carnosus partibus siccioris existat, exulcerati sic ciora medicamēta requirunt. Probe igitur facit pastillus Polyidæ ex uino subactus donec sordium fiat spissitudo. Itē quæ similiter huic desiccāt medicamina. Itē marina, muriaq; fre-

quenter irroratos, melius affici conspeximus. Quare in articulis iis utendum est quæ maiori etiam siccandi uirtute pollent.

QVAE SPICVLA, SVRCVLOS, SPINAS,

& consimilia educunt.

Cap. LII.



Culeos, arūdines, in super spicula & spinas extrahit utrunq; a-  
nagallidis genus, aristolochia rotūda, ammonia cū cū melle,  
alterci fructus leuigatus in spargit, arūdinis radix cōtusa, mel  
liq; mista in linteolū largū illinit, imposita de subito educit.

SI EX VENA ARTERIA VE ET NARI-

bus sanguis profluat.

Cap. LIII.



Articulis sanguinē fundētibz, figura ei quam in sinibus ex-  
posui cōtraria, recte adhibebitur, nepe quæ sursum uergat, ne  
que id tamē immodice, nam periculū est, ne dolore oborto,  
uas rursus sanguinē profundat: cū nihil æque sanguinis pro-

fluuium excitet, inflammationesq; augeat, ac dolor. Cum itaq; sanguis o-  
rumpit, statim digitū ori ulceris uasculi iniicito, innitēs leniter premēsq;  
citra dolorē, nam simul & sanguinē cōtinebis, & grūm uulneri induces.

Quinetiā si altius deliteat uas quod sanguinē emittit, diligētius perdiscees,  
& sitū ipsius, & magnitudinē, item uena sit, an arteria: deinde si exigū uas

existat, aliquo ex his quæ sanguinē reprimūt utendū est. Optima uero eius  
generis sunt, quæ obstruēdi uim obrinēt, unde Græcis emplastica dicun-  
tur, ex resina fricta, farinae triticeæ polline, gypso cōposita, similiaq; oui cā-  
dido macerata, & cū leporinis pilis impolita: at si amplū uas existat, hamo  
ipsum attollere conaberis & mediocriter circūages, sanguine represso, si

quidē uena extiterit sine funiculo sanguinē hispidis medica minibus siste-  
re tētabis: sin arteria, alterū ē duobus facies, aut funiculo circūposito, aut  
toto uase præciso sanguinē coērcebis. Est, cū magnis quoq; uenis funicu-  
los circūdare cogimur, quemadmodū nōnunq; easdē totas trāsuerim ni-

mirū dissecate, in cuius rei necessitatē uenitur, in uenis quæ à penitionibus  
recte sursum ferūtur, præsertim per arētum quoddā spatiū, aut principes  
particulas, sic enim utraq; pars utrobicq; reuellitur, & uulnus à uicinis cor-  
poribus occultatur cōtegiturq;: tuti⁹ aūt fuerit utrūq; facere, funē quidē  
radici uasis circūdare, quod aūt inde procedit abscindere, his sic peractis,  
uulneri celetrime carnē inducere, priusq; funiculus à uase decidat, si enim

subito carnē cōtraxerit, & locus alibi inanis reperiatur, id quod Græce uo-  
catur a neurisma sequitur. Dignosceas autē num uena an arteria sanguinē  
profundat inde, quod huius flauior tenuiorq; sanguis existat, & percussu  
uacuetur, illius aūt nigrior, & sine pulsu. Optimū igitur oīm quæ nonim⁹  
ad carnē inducendā medicamentoz, quo etiā ad cerebri membranas hęc

morrhagias uti securissimū est, itē ad colli uulnera, ipsarūq; uenarū ingu-  
lariū quas sphagitidas Græci uocāt, etenim & harū sanguinē citra uincu-

lum cohibet. Recipit autē thuris lachrymæ pinguiſſimæ partē unam, alo  
 es in mollioribus quidē corporibus partē ſemiſſem, in durioribus equalē,  
 ac in uicē lachrymæ thuris, mānæ tantundē, cū oī albo ſubigitur, dū mel  
 lis fiat ſpiſſitudo. deinde leporis pilo molliſſimo excipitur, mox ualū ipſi,  
 tū ulceri uniuerso liberaliter imponitur. Deligandū uero extrinſecus eſt  
 fascia ex tenui linteo, cuius fascia primū quatuor aut quinque amplexus ſuper  
 ipſum uas quod profluit, iniiciuntur. hinc ad radicē ipſius diſtribuētur,  
 poſtea ubi tertio ſolueris die, ſi tuto adhuc medicamentū ulceri adhæreat,  
 aliud rurfus ſuper ipſum accōmodabis, ac ueluti id quod ex pilis factū, de  
 ligabis quemadmodū prius. at ſi ſpōte ſua primū reiecerit linamenrū, ua-  
 ſis radicē digito leniter cōprimens, ne uidelicet quippiā cōfluat, hoc quia  
 dem ſenſim auferes, alterū uero impones, atq; hoc modo quoad carne ob  
 dueatur uas, curabis, ira ut ſemper particulā ſerues ſupinā, cūſtodito tñ ſi-  
 ne dolore in hac ſitus figura modo. At quæ cruſtas generāt, quoties deci-  
 dūt, nudā magis partē q̄ naturaliter eſſe debet, relinquū, multisq; iā ex iis  
 qbus cruſta decidit, ſanguinis profluuiū quod egre ſupprimi queat ſuper  
 uenit, q̄q; & his utēdū eſt cū magna urget neceſſitas. Maximā uero neceſ-  
 ſitatē uel cruſtā inducētibus medicaminibus, uel ignitis ferramētis utēdū  
 puto, ubi ex eroſiōe putreſcētis alicuius profluuium ſanguinis eōcitatur.  
 Quinetiā cū in huiusmodi affectib⁹ totū quod putredinē expertū eſt exci-  
 derimus, tutius eſt uel ipſi⁹ quaſi radicē adurere uel medicamētis quæ cru-  
 ſtā faciūt, uti, hoc aut maxime tū in pudēdis, tū in ſede ſieri cōſueuit. Id au-  
 tē quod cruſtā generantiū medicamentorū uim dirigas, erit calor cū aſtri-  
 ctione, quēadmodū in chalcitide, miſy & atramento ſutorio. Quæ aut ex  
 calce uiua cōficiunt, uehemētiora quidē his ſunt, cæterū q̄a calx nō aſtrin-  
 git, cruſtæ citi⁹ ab ipſis decidūt, hæcere aut ipſas lōge eſt utilius, quippe ad  
 baſim earū caro ſupetnaſcitur, efficiturq; uas profluētibus ueluti opercu-  
 lū, at huiusmodi ſanguinis profluuiū iſatis ſatiua ſi inſpergatur probe co-  
 ercet, uel gallæ cōbuſtæ. Porro ipſa ferramenta ignita ex aceto aut uino re-  
 ſtinguere oportet. In uniuerſum ſanguinis profluuionē ſiſtūt, ſimplicia  
 quidē, aloē, thus, māna, terra ſamia, ærugo ſerri, lanarū crematarū cinis te-  
 nuiffimus ſimiliter, ſtercus aſini aut equi, bitumē modicū, malicoriū, di-  
 phryges, galla, myrtus atida, alumē omne, tū crudū tū cōbuſtū, reſina fri-  
 ctā, uitis cortex. aut folia arida, platanorū galbulorū pollen tenuiffimus,  
 maxime cū humore cōcretū depoſuerit: priuatim aut ex narib⁹ profluuiū  
 impoſita reprimūt iūci acuti fructus, urticæ foliorū ſuccus, chalcitis, an-  
 thyllis cōcremata, pili leporis, ſerulæ mediū uſtū cum aceto, ononis ſicca  
 uel humida, ſuccus porri cum thure, ellychnio except⁹: cōpoſita uero ad  
 quodlibet ſanguinis profluuiū hæc quoq; faciūt, ſpōgia recēs in liquida pi-  
 ce tincta & bitumine circūlira, olla recēti cōcrematur, cineris partes duæ,  
 miſcetur plūbi & ſtimmeos, ſingulorū parti unā. ALIVD. Thuris lachry-

ma, mānz, sulfuris ignem nō experti, æqualē modū inspergito. ALIVD.  
Chalcitidis drachmæ uiginti, lachrymæ thuris uel mānz drachmæ sede-  
cim, resinę frictę, gypsi cōbusti, singulorū drachmę octo. ALIVD crustas  
inducēs sanguinēq; reprimēs: Chalcitidis, æris cōbusti atramenti sutorii,  
misys rosti paria pōdera, itē Rhodia dicta, & Xāthe probe saguinē cohibēt.

## DE NERVIS CONVULNERATIS.

Cap. LIIII.

- N**eruis uulneratis aut punctis, ex sentiendi quod obtinent, ac u-  
mine, inflāmatio & dolor immodicus accidit. Quare & febres  
& cōuulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium ob ner-  
uos cerebro continuos. Interim uero in aliis quoq; particulæ  
affectæ locis inflāmationes, & abscessus super ipsum neruum cōuulnera-  
tum, quod cohzreat solent accidere. Ratio igitur est, cutis uulnus a petri-  
inglutinatumq; relinquere, quo per id sanies effluat. At si punctus in con-  
spectum nō ueniant, etiā duabus lineis sibi continuis incidere præterea o-  
portet. Remedio autē est, si corpus succis scatet & magna urit inflāmatio,  
primū à sanguinis demissione auspicari: si uero uitiosis repletū sit humo-  
ribus, etiā purgatione utendū est. Medicamenta uero uulneri applicētur  
quæ dolorē sopiant, & effluxum saniei patefaciant, nō facta præsertim di-  
uisione. Itaq; aqua calida, quanq̃ reliquis inflāmationibus sit accommoda-  
tissima, uulneratis tamen neruis est inimica, ac præstiterit eos oleo subtili,  
quod astrictiōis sit experti, ad sensum calido irrorare, neq; enim frigida ne-  
quē egelida admodū tuto adhibetur. Verum ex medicamentis idonea est  
terebinthina resina, per se quidē, in pueris & mulieribus & summatim iis,  
qui molli sunt carne, cum euphorbio aut emollita, in duris corporibus: &  
si nonnunq̃ duriora contigerint, cum oleo quodā subtiliore. Cataplasma  
ta uero in neruis, qui in flāmatione tentantur & putrescunt, adhibebis hor-  
deaceam farinā, aut fabaceam, aut eruinam, in stillatitia lixiuia, cum oxy-  
melite coctam. Si putredine careant puncturæ neruorū, recte cerato ute-  
ris, quod recipit ceræ quadrantē, euphorbii uncia, aut colūbz sumi in duris  
sculis corporibus, olei sextantē, interdum etiā terebinthinæ uncia: ut autē  
emplastri figurā induat medicamentū, uncie euphorbii, sex singulorū se-  
quentium, ceræ, resinæ frictæ, olei, picis liquidæ uncias, iniicies. At si in ui-  
cem resinæ propolim pinguisimā indideris, multo id reddes præstātius;  
atq; hoc ad neruos punctos laudatū est remedium: idem & a rabioso cane  
morsis efficax est. At acetī sextarius, picis pinguis pondo, opopanax qua-  
drās (opopanax aceto solutus magis leuigatur, pix liquefacta mixtaq; co-  
quitur) medicamentū cōpunctis neruis idoneū est, ut quod os puncturæ  
nō sinat cōnuete, quemadmodū nec in his, qui à rabido cane morsī sunt,  
ulcus in cicatricem coalescere: sed efficax solis duris corporibus: sin autē in  
pueris, aut molli carne præditis, pūctura affectis, uti cogites, licet ipsum ex-  
digerente quodam amaracino, aut opobalsamo, aut oleo ueteri liqueface-



re. Conuenit etiam medicamentum basilicum quod nitrum recipit, aut calcem uiuā, aut euphorbiū, aut sulfur uiuum, aut syluestris columbæ fimum, aut opopanax, aut sagapenum, aut liquorē cyrenaicum, aut castoreum, ac in medicamenti libram, dictorū alicuius uncia debet iniici. Facit autē bene neruorū uulneribus & præsertim puncturis: quin & in agro ubi nullus copia datur, propolim recentem pinguemq; uulneri poteris inducere, aut fermentum maxime uetustum, per le aut cum propoli mixtum, uel cum liquore tithymalli: cataplasmatibus utendum ex oxymelite factis, aut lixiuiio stillatio, cum lomento fabarum, aut eruorum farina, aut cicerum, aut lupinorū amarorū, aut hordeacea, aut polenta, idq; non solum dum inflammatione cētati sunt, sed iam inde ab initio protinus. Cæterū quæ relaxant cataplasmata in neruorū uulneribus semper uitare oportet. At si neruus nō punctim, sed plane cæsim uulneratus fuerit, cute etiā quæ interueniebat diuisa, ut nudus appareat rectusq; nō trāsuersim dissectus, cōmemoratis ex euphorbio & tam acribus nullis urere, quippe nudus cū sit neruus, uehementē ipso uim ferre nequit. Quare calcem quæ sæpius æstiuo tempore lora sit, & oleo liberaliore intincta, assumes. Proficiunt hic & quæ ex pompholyge confecta sunt, item quod melle constat, rosaceo largiore liquefactum. Sed ea adhibenda cura est, ne quid ex his uulnus cōtingat, quandoquidē neruus ipse & sensilis maxime est, & tēperamento suo frigidus, & principū corporis partiū primati continuus, imō ne oleo quidē eiusmodi ulcus irrorare cōuenit, hinc enim circumuoluta. Quod si omnia ex animi sententia processerint, etiam uino dulci madefacere citra periculum licebit, sed in robustioribus Polydē pastillo in linamētum illito cum sapa calida uti. postq̃ neruum denudatū contexeris, linamenta extrinsecus circunducere oportet ex medicamento quod angustis uulneribus faciat, nempe eo quod euphorbio præparatur, aut limo columbarū: sed ita ut etiam sanas partes ampliter cōprehendat. Quum uero transuersum nerui uulnus est, maior conuulsionis metus impendet, ac quæ ad curationem uulneris spectant, hic quoq; sunt eadem, quanquam nōnulli in uulnere adhuc recenti futuris usi sunt, ac medicamento aliquo conglutinatorio: uerum futuras non summæ nimium cuti, sed alius moliri conuenit, ne quæ in imo sunt incōglutinata dehiscant: rursus cura adhibenda est, ne ab acuo neruus compingatur. Cæterum in summa sciendū erit, in neruorum uulneribus medicamentū natura calidius quod puncturis medetur, diuisionē nerui nō posse curare, ut qui rosionē ipso feruorēq; sustinere nequeat: neq; quod diuisionibus medetur, pūcturis cōuenire: nō enim uirtus ipsius alre quā angusta est cutis diuisio, penetrat. Viētus itaq; adhibebitur tenuior, lectus mollis, oleūq; calidū alis, capiti, & ceruici superfunditur, at si in crure neruus uulneratus sit, in guinibus, pubi, & locis uicinis:

istud galienus lib.  
neruoli

oleo immixtum in  
istis uulneribus  
uino dulci madefacere  
licet.

med. ex euphorbio  
ad uulnera angustis

Med. ad puncturas  
neruorum apertarum diuisio  
nō est cōueniens neq;  
pūcturis cōuenit  
angustis uulneribus  
admodum sunt eis quæ  
uulneribus usi adhibentur.

balneo in totū donec inflāmatio inclinauerit, abstinendū est, quum aqua  
 contactus nequaquā, ut dixi, ipsis conueniat. Quoniam uerō nonnulli citra  
 id manere consuetudinis gratia nō sustinent, siquidē lēsa particula in ma-  
 nu fuerit, cauendū est quatenus fieri potest, ipsam aqua seu calida, seu mul-  
 5 to magis frigida irrigare. Si pes uulnus acceperit, quoniā fieri nequit ut nō  
 madescat, ubi lauatū ingressuri sunt emplasticū aliquod medicamentum  
 uulneratā parti superaccommodabis, iterū extrinsecus linteolos multiplica-  
 tos plutes oleo imbutos iniicies, iterū fasciā ex linteo a foris deligabis, dein  
 de tutus in ipso balneo fasciā oleo prius superfundes, cū æger in soliū de-  
 10 scendet: ubi lauerit, omnia quæ imposita sunt abicies, ac prædicta totius  
 curatiōis ratione uteris. Cōtusi uero nerui ubi simul cū his cutis contusa  
 exulcerataq; fuerit, cataplasma ex fabarū lomēto & oxymelite postulant,  
 nonnunquā adicitur erui farina & iris. At si dolor contusioni adest, picē li-  
 quidā admisce, sin aut citra cutis contusionē euenerit, magis digerēs adhi-  
 15 bebitor, nepe oleum calens, anethinū dico, superfluum continuē aut ruta-  
 cēū, aut irinū, aut amaracinū. Quod si totus neruus præcisus sit, periculū  
 quidē nullum sequetur, uerū particula debilis manebit. Curatio autē eius  
 cōmunis est cū ea quæ aliis ulceribus accommodatur, hæc quidē ex simpli-  
 cioribus remediis in neruis conuulneratis curatio abunde est. quidā uerō  
 20 cōpositis uti cōsueuerunt, cuiusmodi sunt, ex metallicis cōfecta, Barbara  
 appellata, Cissinū, ex senecione præparatum, melanchlōton, Indice, Har-  
 monia, & Athene, quorū & compositionem, & utendi modum sēptimo li-  
 bro reperies. Sed quia nōnulli præpotentium etiam sumptuosius ad neruo-  
 rum uulnera remediis uti uolunt, Galenus literis prodidit, ad puncturas  
 25 neruorum, hæc: cinamomi, dictamni, feniculi, singulorum uncia, amara-  
 sextans, ceræ bes, opobalsami dextans, terebinthinæ uncia. ALIVD. Lique-  
 ris cyrenaiici uncia, ceræ quadrans, opobalsami pondo. Ad denudatos ner-  
 uos hoc ualer. Ceræ unguentariæ quadrans, unguenti spicati aut foliati,  
 aut nardini pondo, pompholygis, spicē nardi, amomi, phylli, singulorum  
 30 uncia, atq; hæc supra spem respondere Galenus pronuntiauit.

DE ARTICVLORVM CONTRACTIONE SEV LI-  
 gatione, quæ ancyle dicitur. Cap. LV.



Articulos ex humoribus infarctis ac neruea quadam tensio-  
 ne contractos, detentosq; ancylas & ancylōses appellare con-  
 35 sueuerunt. In quibus facultate opus erit, quæ emolliat relaxet  
 q; Communiora igitur his remedia conueniunt, quæ in parti-  
 culis scirro induratis ac adeo quæ in resolutis cōmemorata sunt, propria  
 uerō magis, irrotatio ex hydrelzo, in quo decoctum sit lini semen, scēnu-  
 græcum, althea, laurus, cucumeris agrestis radix, ipsumque sicyonium.  
 40 Vbi his artus irrorati fuerint, accommodantur primum acopa simplicio-  
 ra, cuiusmodi ex nigra populo, ex abiete. Bromium, Basilium, Pyxis, de-

*aqua dicitur  
 i p[ro]p[ri]a m[en]tione*

*Non de neruo  
 solo p[ro]p[ri]o.*

*Gal. in m[en]tione ad p[ro]p[ri]um*

inde Aristophaneū, & quod ad Aſanitū refertur. Validiſſima, Liſoponiū  
 appellatū, & Pœcilum: emplaſtra, quod Amythaoni aſcribitur & Anice-  
 tum. Laudatiſſimum uero quod recipit bdellii, adipis uirulini, ſuffiminis  
 ammoniaci, iris illyricæ ſingulorū denarios ſedecim, opopanax, galbani,  
 cachryos, ſtyracis, thuris ſingulorū drachmas octo, piperis grana centum  
 ſexaginta, ceræ libram ſemiſſem, refinæ terebinthinæ tantūdem, irini ſedi  
 mēti quod ſatis eſt, & uini quantū ſufficit: copton hoc eſt medicamentū.  
 Eſt acopon non inefficax diſſolutum irino, aut cyprino, aut laurino. Inter  
 acopa uerò & emplaſtra, medicamentū eſt diapternes uariis conſectū mi-  
 ſturis. Verum acoporum uſus molli adhibebitur & continua friſtione: ita  
 tamen ut affectum articulum ſimul tentes ſteſcere & extendere.

## DE ARTICVLIS RELAXATIS.

Cap. LVI.



Axantur ſubinde articuli ob longos febrīū morbos, colicos,  
 & reſolutorios, præſertim ubi calidior ipſos humidiorq; intē-  
 peries occupauerit, atq; motus inde impeditur. Succurrit his  
 acaciz ſuccus aqua dilutus & ex alto in partē deturbatus: aut  
 rubi, aut myrti, aut lentisſci, uel ulmi radicū cōrticis decoctum congruet,  
 aut malicorium illitum, aut myrti folia, cum cerato myrteo impoſita. Nā  
 colligantes nerui firmari deſiderant facultate quę astringat deſiccetq; hu-  
 iuſmodi igitur medicamenta articulis imponi debent, cuiuſmodi ex ſali-  
 cibus eſt & oxyra, & palmulatum quod uinū astringens, aut acetū aſſum-  
 pſerit. Multi uerò cuiuſmodi impotentiam à frigore fieri putantes, deinde  
 calidioribus uſi præſidiis, maiorem noxam intulerunt.

## DE LUMBRICIS.

Cap. LVII.



Reſunt uniuerſæ lumbricorum differentiæ, prima teretū,  
 altera latorum, tertia eorū quos aſcaridas huncupant. Ori-  
 go omniū generū eſt ex cruda, traſſa, pituiſoſa; materia &  
 putredini accōmoda, qualis in pueris aliisq; uoracibus colli-  
 gitur: non autem ex calida, acri, aut melancholica ſubſtantia. Hæ ſiquidē  
 alimenti naturā egreſſæ, lumbricis procreādis ineptæ redduntur. e contra  
 rio, bilioſa potiſſimum recrementa etiam hos perimunt. At ſi quando fla-  
 uabilis unā cum lumbricis inſrā, aut etiam uomitu eruperit, ipſos qui-  
 dem inſteſtina obſidere, humorem uero bilioſum uentriculi os aut aliam  
 quampiam particulam occupare ſcito. Cuiuſque igitur ipſorum diffe-  
 rentiæ ſpeciem, generationem, locum, notas, curationemq; exequemur,  
 rotundis exorſi.

## DE ROTVNDIS LUMBRICIS.

Teretes igitur lumbrici ſpeciem habēt omnibus perſpicuam, quod ſanē  
 aliis frequēiores ſint, in gracilibus plerunq; inſteſtinis conſiſtunt & ſupe-  
 riorem uentriculum ſubeunt, ideoq; frequēter per os reiiciuntur. quibuf-  
 dam & è naribus redduntur: atque hoc genus infantibus peculiare & pluri

*Impressus est  
in inguine  
et in dorso*

ma parte cū febricula: sed per febrīū initia orti, substantiā ex subiecta diffi-  
rentia retinēt: in statu, ex malitia morbi: in declinatione, ex toto corpore  
ad melius mutato. Etenim Hippocrates memoriæ mādauit bonū esse indi-  
cīū teretes lūbricos prodire cū morbus ad iudicationē tendit, qui subito  
etiā intereunt. Sequitur autē eos qui rotundos lūbricos cōtinent, rosio in-  
testinorum & uentriculi, tussis exigua cū siccitate irritantes: nōnullos co-  
mitatur singultus quoq; somnus cū cōuulsione, & qui his occupātur, si-  
ne ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamore expergesciunt, & iterū  
sopiantur: pulsus inæquales & febres augescunt inordinate, quæ cum ex-  
tremorū perfrietiōe, tertiā, interim quartam, die uel nocte accessionē sine  
ratione habent. Infantibus autē & conquassatio lingua temerē exerta, & den-  
tiū stridor oritur, luminibus conuiet, uoluntq; cōquiescere, excitātibus  
ipsos indignant, oculi apparēt, genæq; rubescunt, ac rursus liuent: atq; hæc  
paulatim ex interuallo. Quibusdā nausea & rosionis causæ stomacho pe-  
culiaries creantur, atq; ægri cibū respuunt, compulsi autē ad cibum nausea  
bundi uix quod assumitur deglutiunt, uel etiam reuomunt, plerisq; uero  
alius descendit corruptos cibos egerens, & tympani modo inflatur. Reli-  
quum corpus sine ratione contabescit, neq; esurie, neq; euacuatione mo-  
dica suborta. Atqui non in omnibus omnia quæ iam commemorauimus  
signa inquirere oportet, sed nonnulla ex eo quod præpoller, interim & plu-  
rima. Hæc autem eueniunt, dum animalia per intestina serpunt roduntq;  
febris autem calor uapores sursum cerebro transmittit prauos, ex putrida  
in uentriculo collecta humiditate exhalantes, in quibus amborum par-  
tim similiter curam habere conuenit & febris & lumbricorum, partim  
de febre parum solliciti, lumbricos de corpore eximere conuitemur.  
Multi siquidem nulla lumbricorum cura habita, exesi ab ipsis sunt, & con-  
uulli interierunt. Alii produnt se lumbricos uidisse, qui ex inguinibus  
ægri eruperint. Cæterum occisos hos omnes prius, educes: occides au-  
tem, amaris potissimum usus remediis. Cum igitur febris & lumbrico-  
rum communis sit curatio, conuenientia auxilia simpliciora: potui igitur  
dabitur L. chamæmelorum decoctum uel myxariorum, ut appellant, L.  
uel ipsa myxaria decocta esui dantur: item sereos succus, aut coriani semē  
cum aqua calida uel cum posca, uel myosotidos herbæ decoctum, uel cor-  
nus ceruini ramentum, uel minium, synopicum tenuissimum, ac olei  
immaturo amarissimi paulatim cochlearia duo absorbeant, quæ enim  
amarum est, lumbricos occidit: quæ lubricum, detrahēs ipsos cum sterco-  
re reddit. At si inflammationē distentionēq; uiscera experiantur, cataplas-  
mate utē dum est, quod lini semine, farina lupinorū, absinthio & bryonia  
radice cōstat, ex hydromelite, uel etiā humido fotu ex oleo chamæmelino,  
uino absinthii fructu, & aloë, præcordiis accommodato. Vbi uerō nō uehemē-  
ter febres molestant, miscēda est myxariis mētha & exhibenda est. Cū ad

\* Impressus  
est p. ar. ba-  
bet u. a. u. u.  
hoc est palpi  
laseris

L. Impressus  
nō habet.

integritatem uentū est, efficaciora quoq; usurpantur, quale est decoctum  
 seriphii uel calamintae, uel preteos herbarum, uel cardamomi semen, uel ma-  
 li Punici acidi radicis ius ad tertias redactū, uel fricti cumini, uel nitri sul-  
 ui singulorum scrupula tria, uel sandonichū, uel abrotanum, uel etiā ambo-  
 simul, cum melle in catapotia coacta, uel lupinorum amarorum scrupuli ter-  
 ni uel brassicae, uel erucæ semen leuigarū, uel absinthinū, quod etiam solū  
 frequēter abūdē fuit. Dant autē & terna lotē aloēs scrupula, quod remediū  
 est laudatissimū: in ualidioribus illota quoq; aloē utimur, quia ueto infan-  
 tes aloē nō admittunt, supinis fasciola ipsis detētis ore adaperto per cly-  
 steriū quoddam ualido munitū canali, inuitis aloēn q̄penitūlime trāsmil-  
 sam iniicimus. Atq; hæc mirifica medēdi ratio in pueris est, qui difficulter  
 possunt tractari: quibus etiā cibos subinde sorbiles, quemadmodū iis qui  
 cibū auersantur, infundimus. Ceterū & cyphi & masuaphiū rectē dabitur,  
 itē cornu ceruinū combustum cū pipere & melle uel oxymelite, reliqua q;  
 ex oxymelite ipsis dare conabimur: præstiterit autē si acetū scillinū fuerit,  
 præsertim ætate prouectioribus, aut sinapi cū oleo & aceto ad cochlearis  
 magnitudinē. At qui lūbricis, cū alui profluuiū infestant, præbēt plāta-  
 ginis succū, ipsamq; plantaginē aridā assumēt, ex æquo enim utriq; & fluo-  
 ri & lūbricis efficax est. Cataplasma his accommodabitur ex polēta cruda,  
 periti, absinthio, farina lupini, sandonicho & abrotano. Iā uero & malicori-  
 um, acacia, galla, uel balaustiū admiscebit. Quoniā uero nōnulli subinde a-  
 maras potiones ceu ingratas respuūt, ex iis quæ modo cōprehēsa sunt dabū-  
 tur nō manifestō amara. His accedēt insuper chamæpitys, marrubiū, hele-  
 niū, bacca lauri, acacia, thymus, pulegiū, carpesiū, iūcus odoratus angulo-  
 sus, polypodiū, iris, enicō, crithrodanon, spina ægyptia cū pipere, singula  
 sex scrupulorū instar: itē ius mēthæ, mori radicis succus decoctū ue, petrosē-  
 lini, reliqua q; odorata semina, extrinsecus autē inducitur aloē cū melino &  
uino. hoc & appetentiā excitat, quæ uix magno negotio recipitur: miscetur  
 autē sepi<sup>us</sup> aloē absinthiū: aut felle taurino, cū amaris qbusdā prædictis um-  
 blicū impleto: aut oleū ex rhododaphne factū liberaliter delinetur, aut li-  
 quor cedrinus & solus & cū cerato, tori uētriculo imponitur, aut pix arida  
 trita inspergit, uel mentha, uel melanthiū cum rosaceo, uel etiam seriphii  
 ius ipsis admiscebitur, uel fraxini persicæ folia in pollinem detrita delini-  
 mus. Utendū uero est & medulla cetui, unguinis modo, in umbilico, pube  
 & lūbis: ceratūq; adiūgetur, si res postulet, hoc, Aloēs, absinthii, farinæ lupi-  
ni, seriphii, melāchii, singulorū scrupula sex, ceræ uncia & semissis, chamæ-  
melini qd̄ fatis est, felle taurino arida leuigātur. Porro ab inferioribus par-  
 tibus mulsam iniicere copiosior expedit, quō lūbrici mellis dulcedine il-  
 lecti deorsum, descendāt: si autē putrefacti in alto corporis nō excernātur,  
 sed potius uapores sursum mittāt, educēdi sunt, aut aloēs aut medicamētū  
 amari ex ea confecti potione, quandoquidem etiam in aliis mediocri alui

*hæc propinadi  
 & sunt.*


uacuatio non expers est praesidii.

DE LATIS LUMBRICIS.

Latus lūbricus mutatio est, ut ita dicā, adnatā in interiori intestino membranae in materiā animalis modo mobilē, quā saepe tota redditur longitudo incredibili, uel pars ipsius excernitur: dissolutus uero, nō coalescit: & nūc in iis etiā qui febris carēt, abūdat: nūc febricitantibus accidit ex longo morbo cōtinuas stomachi rōsiones inferēs, ac impotentē ciborū appetētiā. Nam quod animatū euasit, in intestinis obiectū rapit alimētum, ut alio statim opus sit, & nisi assumpserit, intestina rodantur. His occupatos comitatur corporis gracilitas, & impotētia, cum inaequalitate: at quod certissimū est indicium, cū recrementis nōnulla semini cucurbitae similia excernuntur. Curatio cōcordat, porio enim ex acremētis petita, & aliorū esus, tū pteris uel centaurei decoctū & potū & ab inferioribus partibus inditū, uel calaminthae uel dictāni, uel pulegii: dabitur autē in aluū & muria. Praebibere uero hoc medicamētū quod sequitur, neq; iis qui aliis lūbricis infestātur, inutile est, si febre potissimū uacuauerint. Nitri rubri, piperis, cardamomi pares portiones: dātur terni scrupuli, cū uino aut aqua calēte. A L I V D eclegma. Piperis, baccarum lauri purarū, cumini Aethiopici, mastiches, pares modi, mellis quod satis est: datur cochleare unum mane, & dormituro. At si efficacius id fieri desideres, nitri quoq; rubri parē portionem adiiicias. A L I V D. Helenii, suffiminis ammoniaci, L piperis, singulorū denarii quinq; cū oxymelite calido: tempore interpolito dabitur euphorbii drachma, uel duae prouectioribus. A L I V D. Pteris acetabulū, nitri denarii duo, datur unū cochleare aquae euacuatiōe prius facta: satius autē erit si etiam amēmonii momentū assumat. A L I V D. Mali Punici acidi radicū corticis in summo decorticati denarii quatuor, piperis tantūdem, cardamomi denarii sex, martubii denarii duo, melle dātur, porro prius assumpto. Verumur ex toto affectus discutiatur, theriacen quoque exhibebis.

DE ASCARIDIBVS.

Cap. LVIII.

30  Scarides, ut modo etiā diximus, specie lumbricorū continentur, uermibus similes quē in extremo longanone & ani fibule initio reperiūtur, uehementē locorū horū pruritū excitātes: generant speciem hanc praua alimēta, perfrictio, & ciborū corruptio. Vacuari igitur debent in infantibus, glandibus ex melle, cum salis momento, uel nitri: in prouectioribus, acri muria, aut decocto centaurei, cum nitro & melle, aut cucurbitae syluestris, aut absinthii, aut chamaeleontis, aut anchusae, aut enici, aut hyssopi, aut pulegii, aut calaminthae, aut lupi norū: secundū clysteres sublinetur lōganon, simplicibus quidē, acacia, aut hypocyrtide cū nitro, aut rhu syriaco cū alumine liquido: at quibus aluus 40 astricta est, lemnia sphragide, cum uino: compositis autem, Andronis pastillo, similibusq;. Cedrinus autem liquor ipsis iniicietur per clysterem

Exemplar  
aliud habet  
pteris.

multis peruium foraminibus, quales ab utero metrenchytræ appellantur: aur carnem falsam commode impositâ deligamus, quandiu sustineri possit, ea m̃q; frequenter murare oportet. Cæterum communiter omnes quos lumbrici male habent, pili ichneumonis iuuant, suffiri. Cibi præscribentur ipsis pro bi succi, & qui facile in membra digeruntur, nec lumbricorum effectricem causam adaugēt, nec uires superari permittunt, propter quas & uinum aquosum exhibebimus: liberalius autem nutrire ipsos ob hoc ipsum oportet, ne alimenti expertes lumbrici rosiones patiant. dabitur autem, cum præcipue quum nō inaniti fuerint. Ar si alui profluuium fuerit, sciendū est lumbricos magis abundare, cibo non distributo, ac iam 10 sorbiles ægris cibi dantur, admixtis quibusdam etiam astringentibus, uer bi graria, piris, aut pomis, aur malis Punicis, præcipue acescentibus: a foris autem uentriculo remedia continentia inducuntur, de quibus supra dictum est.

## DE DRACUNCULIS.

Cap. LIX. 15



**N** India & superioribus Aegypto locis dracunculi generantur, ceu animalia quædam lumbricos imitantia, in partibus musculosis, puta brachio, femore, tibia: in pueris etiam larera sub cute perreptant & palam mouentur, deinde cum diu extremū ali quod dracunculi remanserit, locus suppurat, & cute ipsius ad aperta, in iū 20 ipsius progreditur: cum trahitur, dolores mouet, præcipue abruptus. Qua propter nonnulli dicunt plumbeam molem ex dracunculo suspendendam ne uniuersim, sed particulatim molis pondere decidat. Alii uero hos damnant quod nihilo magis pondere molis plumbeæ dracunculus abrupatur, & dolores uarios conciter. iubēt partem in aquam dimitti ealidam, 25 quod dracunculus reperfactus foras prorepat, deinde digitis ipsum membratim extra here. At Soranus neq; animal prorsus, sed neruosi cuiusdam substantiam esse putat, quod opinionē motus solum præbeat, siue autem hoc sit, siue quod prius dictum est, Sorano & Leonidæ, aliisq; uisum est, calida superfusione & earaplasmatis concoquentibus in his uti ex mulla, farina 30 triticea, aut ordeacea. Est cum emplastri usum eiusdem potentie probat. Conuenir autem & quod ex baccis lauri & quod ex melle constat: emortui siquidem horum usi dracunculi, nimirum quod continetur corpusculum ex eisdem. Supputatione aurem facta, nisi exciderit, cutis diuidenda est: ubi denudaueris, quod continetur, auferes: & cutem linamēto penetrabis, 35 ac deinceps eam curandi rationem adhibebis quæ puri sit maturando.

LIBRI QUARTI FINIS, IOAN-  
ne Guinterio Andernaco  
interprete.



co medico interprete.

QVOMODO QVIS AB OMNIBVS COMMVNI-  
ter uirulentis bestiis se tueatur. Cap. I.

E VIRVLENTIS BESTIIS PRAECIPIENTES,  
ab iis quæ in omnibus huiusmodi communiter profi-  
ciunt, exordiemur, ita, ut quomodo quis ab illarum iniu-  
ria se uindict, prius expediamus. Si igitur aliquis ne-  
cessitate quapiam coactus, loco feris frequenter obdor-  
miat, ubi potissimum salamandræ aut phalagia aut ser-  
pentes aliqui abudent, horum cauas latebras alio in

aqua detricto, aut aliqua ex herbis quas exponemus, obturare conuenit.  
Suffitus autem recte excitantur ex cornu ceruino, caprarum ungulis pi-  
lis uel lapide gagate, birumine, bdellio, galbano, cupressi aut cedri rasura,  
melanthio, peucedano, uiticis foliis, nepita, sagapeno, castorio, cachrys ra-  
dice, cunila bubula, aut ex reliquis grauiter olentibus aliquo. Culices aut  
proprie persequitur suffitus ex atramenti sutorum, melanthii, syluestri cu-  
mini seminis, paribus modis. item firmus bubulus eosdem fugat. Ad hæc  
etiam ignes incedere crebriores uincit, fugiunt enim magna parte feræ eo-  
rum splendorem. Cæterum torum substernere ex hastula regia, nepita, ui-  
tice, pulegio, polio, cunila bubula, abrotano, expedit. At si toto huiusmo-  
di toro uti non datur, stratis saltem imponenda sunt. Iam uero animum  
adhibere oportet iis quæ coquuntur, aquæ & uinorum cadis, ut exacte sint o-  
perculati. Focus autem non sub arboribus quibusdam excitabitur, præsertim pi-  
no aut picea. in his enim salamandræ & erucæ lethales crebre uersantur,  
quæ ab ignis tepore calefactæ, decidunt in obsonia aut alia uasa, si non fue-  
rint operta. Qui uero tutiores esse uolunt, iis conuenit etiam ceratum cor-  
pori oblinere liquidius, ex cera, rosaceo, galbano modico, scobe ceruini  
cornu exigua, uel etiam Aethiopico cumino. peculiariter autem maluz folia cum  
oleo detricta si illinantur, ab apum & uespærum morfu præseruant.

COMMVNIS OMNIUM QVI A VIRVLENTO QVO-  
piam morfi uel icti sunt, curatio. Cap. II.

Vod si feriri aliquem aut morderi a uenenato animali contri-  
gerit, homo adhibendus est qui uulnus exugat. non tamen  
eum ieiunum esse oportet, uerum etiam uino os colluisse, &  
oleum in eo continere. Deinde particulæ commorsæ, si ad-  
mittit, cucurbitulam cum multa flamma adhibere oportet, sic ut uicinæ

etiam partes scalpello exasperentur. Nam uirus unā cum sanguine & spiritu ita extrahitur. Item exulcerata adurere ac cruſta obducere, adeoq; præcidere conueniet, ſi fera quæ momordit, lethalis fuerit, quales alpis, cerastes, uipera, ſimilesq; aliz ſunt. quemadmodum Galenus memoriz prodit, uinitorem quendam à uipera morſum, ubi feram cognosceret, ſalce leſum digitum abſcidiſſe, atq; in totum periculo liberatum. At ſi uenenum per corpus fuerit diſperſum, ſanguis ſtatim demittendus eſt, præcipue ſi is, qui percuſſus eſt, humorum æquabiliter omnium plenus, Græci plethoricum dicunt, appareat. exhibere cum cibis edendum conducit piper aut allium: potui, uinum ualidum: recentibus uaporibus, & conuenienti natura caliditate, corporis tẽperamentum replere, deinde iis oblinere, quæ cõmorſam partẽ poſſunt calefacere & uellicare. Imponetur itaq; cinis braſſicæ aut ſici aceto miſtus, aut lixiuia, aut garum, & cepe cum polenta aut panem item porra abũde cum ſale, aut pix liquida cum ſale, calida: aut cedrus, aut ſimus capillus. Conuenit autem iſtis acetum calidum quoq; ſuperfundere, in quo nepita ſit incocta: aut acetum & aquam marinā, aut oxalmen. Cæterum locis affectis gallinæ, & magis galli gallinaei, alia' ue animãtia per medium diſſecta calidaq; imponi debent. Nam uirus tranſſumunt euocantq; & dolores mitigant. Emplaſtra quoq; utiliter applicantur, quæ ſale, cachry & a darce conſtant: in totum, quæ acrioris ſunt potentiz. Omnes tandem communiter & morſi & ic̃ti à uirolẽto animali, modo interiora omnino offenſa ſint, ex uino potabũt intybum, quod ſerin dicũt, aut ericen, aut aſtragalon herbam cum aceto, aut bitumen, paliuri ſimiliter aut ueteris rhu decoctum, aut muſtelæ inueteratæ denarii duo ex uino ſumpti, præſenti ſunt remedio, uel marinæ teſtudinis ſanguis, aut caſtorii drachma cum diluta uini potione, aut roris marini tantundem, aut ſicyoniz radicis, aut porri ſuccus, aut chamæpitys, aut ſmyrnum, aut cinnamomum, aut ariſtolochia, aut uiticis ſemen, aut cupreſſi pilulæ, aut ſefeli, aut piper, aut trifolii ſemen, aut baccæ lauri, aut cancer fluuiatilis toſtus aut elixus: item compoſita hæc Theriace utilis eſt.

#### THERIACE ADVERSVS VIRVLENTA ET LE

thalia uenena, uiperæ morſus, & ſcorpionis ic̃tus.

Bryoniz, opopanax, iridis illyricæ, roris marini radicis, zingiberis, ſingulorum denarii quatuor, ariſtolochiæ denarii quinque, lachrymę thuris, rutæ ſylueſtris, ſingulorum denarii tres, farinæ erui, denarii duo: ſinguntur paſtilli uino, danturq; ſinguli, qui treis obolos pendeant, ex eodem uino. Cæterum purgatio omnibus conueniet, deſudationes, & theriace ex uiperis aſſumpta.

DE RABIOSI CANIS MORſV, ET  
metu aquæ, quæ hydrophobia dicitur.

Cap. III.



Xordium sermonis à rabiosi canis morfu accipere, quàm ab aliis maluimus, quòd animal & fecundum prouentu, & cò tubemale homini existat, rabieq; sc̃pius corripatur & ægre caucri possit, ac periculum ab eo sit inuitabile, nisi multis aliis

5 liquis & conuenientibus usus fuerit præsidiis. Rabiant canes plerumq; in æstu uehementiore: ut autem Lycus memoriz mandat, interim etiã per frigora maxima: rabidi autem & potum & cibum auersantur, siti premuntur, neque tamen bibunt: anhelant præterea non parum, aures inclinant, saluam & copiosam & spumantem edunt, muti in totum sunt, & uelut in-

10 sani, ut ne domesticos quidem agnoscant: insiliunt sine latratu omnibus pariter & bestiis & hominibus, mordentq; . ubi momorderint statim quidam nihil molestiæ adferunt, præterquam ex uulnere dolorē: postea uero aquæ metum, hydrophobiam Græci appellant, faciunt, qui cum conuulsione, totius corporis rubore, præsertim in uultu, sudore, & sui fastidio

15 accidit, aquam fugiunt, & dum uident, & dum admouentur: nonnulli etiã omnem humorem: alii canum ritu delatrant, & obuium quenq; dentibus appetunt, morfū que suo in alios eandem affectionem transferunt. Porro accidentium, aliorum quidem causa manifesta est, occupatis scilicet ueneno partibus uniuersis: metum uero aquæ nonnulli ex immodica

20 fieri siccitate dixerunt, quasi humida ipsorum substantia in cōtrarium penitus habitum mutata. uerum Rufus insanix ex atra bile speciem, eam esse testatus est, ueneno humorem illum imitato: quemadmodum alios atra bile insaniētes, nouimus alia timere. quæ causa superuenit etiã iis, qui dicunt canis qui momorderit imaginem in aquis opinari se uidere.

25 At ex iis, qui hoc uitio sunt occupati, nullum, præterquam unum aut alterum superuixisse, ex historia didicimus, eosq; non à rabioso cane morfos, sed ab homine quodam morfu uitium adeptos. At ante affectus huius operationem multi etiã quos canis momordit, seruati sunt. hinc igitur curatio auspicanda est. Quoniam uero subinde, eò quod tunc aquæ metus

30 non inuadat, (magna enim ex parte circa quadragesimum ferè à morfu diem solet ingruere, quibusdam & post sex menses, proditum est nonnullis post septem quoque obuēnisse) nonnulli canem qui momorderat non rabire arbitrati sunt, properarūt uulneri cicatricem inducere: unde ipsi causam huic affectioni dederunt. hanc autem probatione usus deprehendes,

35 morfus rabiosi ne canis fuerit, an non. Iuglandibus nucibus concisis uulnus diligenter obstruitur, sequenti die ablata gallinaceo, aut gallinæ in cibo apponentur: ac primum sane non attingent, fame autem urgente se cadant, rem considerato. Nam canis qui momordit si non fuerit rabiosus, uiuent: si rabidus, sequenti die peribunt. atq; tunc ad uulneris dilationē

40 properandum est, iterumq; post paucos dies eadem indicatione utendū, & si non perierint gallinacii, tunc ulcus ad cicatricem perduces, nullum

ueritus periculum. Hanc itaque indicationem Oribasius tradit: Quod si ex commemoratis indicis accurate canem rabire cognouerimus, statim iis medicamentis quæ aperiundi uim habent, utemur. Primum igitur ex aperiuntibus est, quod pice, aceto quàm acerrimo, & opopanace constar, in capite de neruorum uulneribus explicatum: at si qui morsum accepit delicatiorem cutem habeat, dilui ipsum irino debet, aut balsamo, aut eiusmodi aliquo: uel ulcera prius fomentis adiuta, allio oblines. hoc quod sequitur etiam crustam facit.

#### ARIDVM AD CRVSTAM IN CANIS

rabiosi morfu excitandam.

Salis fossitii denarii octo, chalcitidis denarii sedecim, scillæ tantundem, rutæ uiridis denarii quatuor, æruginis rasæ totidem, marrubii seminis denarius: uritor primum arido ut crustam inducat, deinde cum rosaceo, ut crustæ excidant. Cæterum partes affectæ ad dies quadraginta duos, ut minimum, sine cicatrice seruentur.

#### CATAPLASMA QVOD ORAS VVLNERIS LATAS

in rabidi canis morfu seruat.

Cepæ cum sale & ruta illinuntur, aut silphium cum sale, aut salsamētum uetus, aut cinis sarmētaceus cum oleo, aut allia, aut sambuci folia, aut mētha, aut apiastrum, singulatim, aut cum sale: aut iuglandes nuces, cum alio, sale, & melle, aut cinis fici cerato exceptus. uulnus autem aqua ablucitur, in qua decoctum sit chamæmelum, & syluestris lapathi radix. Nonnulli & ferro candenti ulcus adurunt. Cæterum potui assument commorfi, simplicia quidem, lycium, absinthium, liquorem silphii, chamædryn, scordium, & polium: composita autem hæc, cancrorum fluuiatiliū, sarmen-  
torum uitis albæ, in cyprio uase, aut zreo combustorum, cochlearia duo, gentianæ radice leuigatæ cochlear unum, cum uini meri ueteris cyathis duobus, ad dies quatuor potui dato. aliqui uero & perdicis sanguinis duo cochlearia addunt. Capiēs autem canctos, dum luna increscit, priusquam sol exoriat. iis autem qui eodem die non biberunt, duplicem por-  
tionem exhibeto, interim & triplicē. Iam theriaca ex uiperis recte datur, Purgare expedit medicamēto ex cucurbita syluestri, ita ut quotidie id exhibeas, cum decocto elelisphaci, aut sideritidis heracliz, quam & dialyson appellant: nonnulli uero & iecur canis qui momordit, edendum dederūt. Cæterum uictus ratio talis adhibenda est, quæ simul ueneni uireis hebetet extinguatq; simul & descēsum ad interiora prohibeat: quæ duo præstare potest, uini dulcioris uetusti & meraci, lactisq; portio. idem efficiunt allia, porri & cepæ in cibo sumpta. At si per initia ob impedimentum ali-  
quod non præsumpra, quæ retulimus remedia fuerint, sectio uel cucurbitulæ uel ustio nō adhibenda est, ut quum iā ueneni penitus secesserit, me-  
dicamentis autem quæ euocent, Græci metafyncritica uocant, uti consue-

Quædam enim  
medicamenta non sunt,  
sed præparata sunt  
ex his. Hæc sunt  
A. Dispositio lib. 6. cap. 96. et 97.

lium est, aquæ metu uidelicet non oborto. purgatio ex hiera & scissili lacte petetur. item sudoris euocatio, dropacismus & sinapismus, toto corpore particulatim adhibebitur. omnium tamen efficacissima deprehensa est purgatio quæ fit per ueratrum.

AD MORSVS CANIS NON RABIOSI. Cap. IIII.



Anis non rabiosi morsus, quum & ipsi uirulentæ cuiusdâ substantiæ sint participes, statim aceto irrorans, lata manu morsum ferito. insuper nitrum cum aceto tritum desuper deturbato, deinde spongiâ recentem aceto, aut ipso nitroso aceto madidam imposito, triduo id ipsum superfundens, tandē enim consanescet: uel erui farinam oleo maceratâ imposito: aut spongiâ recentem, aut lanâ succidâ aceto & oleo imbutâ accommodato, aut rubi folia cū aceto tinsa illinito, aut cepam tritam cum melle, aut origani comæ, salis, cepe, pares singulorum modos cum melle: uel marrubium nigrum, quod & baloten dicunt, cum sale. ad feruidos autem iam morsus, erui farina melle macerata admouetur. peculiariter enim his efficax est: inflammatione confictâ res argenti spuma trita ex aqua oblinito.

DE VESPIs ET APIBVS.

Cap. V.



Pium idtu dolor sentitur, locus rubescit, propinquæ partes tumen incrementq; aculeus in uulnere relinquit. In uespis autē similia quidē, sed intēsiōra omnia sunt, nec aculeus relinquitur. Remedio sunt aduersus utraq; lutum, & bubulus firmus, illita: & lac ficulneum, aut cōcisa mori arboris folia, aut maluæ: aut farina ordeacea ex aceto imposita. quinetiā muria aut marina aqua fouere cōducit.

DE PHALANGIIS.

Cap. VI.



Halangiorum morsu, locus ipse quidem rubescit, & ueluti aculeo punctus apparet, non autem tumet neque incalescit, sed leniter rubidus, frigore & pruritu uexatur. Comites notē percussorum sunt: perfrictio, tremor, corporis grauitas, sudor frigidus, labor ualidus, pallor, continua urinæ excernendæ incitatio: quibuldam & urinæ difficultas, colis intensio, lumina humentiora: inguina & poplites contenduntur rigentq; conuulsorio modo, ualida stomachi rosio urget, lingua sermonem manifesto non explicat, uomitus aquæ uel araneorum textis similiomerumpit. sunt etiam quibus per urinas, & aluum eadem descendunt. demissi igitur in aquam calidam dolore liberantur, ac rursus ualide indolent. Auxilio est, si extrinsecus cinerem ficulneum cum sale leui ex uino maceratum, imponas: aut radicem syluestris puniceæ tritam, aut aristolochiam, cum farina ordeacea aceto demersam. Iam & ulcera fouere marina aqua calidiore, aut apiastri decocto cōducit, eiusdemq; folia imponere. ad hæc balneum frequentius utile est, atq; his positionibus medicis uti: abrotani semine, anetho, aristolochia, agresti cicere,

cumino Aethiopico, cedri baccis concisis, platani cortice, trifolii herbe semine, myrice semine, singulorū drachmis duabus cū uini cyatho & uiridiū cupressi pilularū decocto, uino tēperato. Ferunt nōnulli & cancerorū fluuiatiliū succum cum lacte & apii semine datum, periculo subtrahere.

## DE ARANEE ICTV.

Cap. VII. 5



Si quoddam etiam aranearum genus quod percussu ualidos dolores circa niedia præcordia excitet, item ruborem, & urinæ difficultatem, nonnunquam & strangulatum. Leuantur autem isti hisce remediis: cumini syluestris thebaici, aut uiticis seminis, aut albæ populi foliorum potu, uel aliis solis assumptis & uino meracior superbibito iuuantur. 10

## DE SCORPIONIS ICTV.

Cap. VIII.



Scorpione ictis locus quàm primum inflammari incipit, duratur, rubet, & cum dolore supra modum rigescit, nunc feruor, nunc frigus uicissim inuadit, acceditq; dolor qui itidem modo decrescit, modo intēditur. comitatur ipsos sudor horroris lenis, tremor, extremorum perfrictio: inguina his attolluntur, par ticula intenditur, sæpe etiam flatus cum sonitu per sedem erumpunt, pili rigent, cutis fit discolor, dolorq; tota cute affligit, ceu acus spiculo excitatus. His auxiliatur protinus, lac ficulneum instillatum uulneribus, ipseq; scorpio qui percussit minutim cōtritū, uulneriq; impositus, sibi pulcherimum medicamentū est. post hæc sal tritus cum lini semine salutariter imponitur, item altheæ herbe, qui hibiscus est, semen succurrit, & sulfur uiuum resina terebinthina exceptum: similiter etiam galbanum splenii modo dilatatum impositumq; nepitaq; concisa & applicata, & ordeacea po- 25 lenta uino confecta & in ruræ decocto exhibita: auxiliatur his etiam trifolii herbæ semen leuigatum iniectumq;. Ad hæc, potiones hæc conueniūt: aristolochiæ denarii duo, præsertim corticis radice cum uino. gētiana tusa, pulegiumq; abunde decoctum, item baccæ lauri numero decem leuigata, nepita cum posca largiter incocta, cyperis cum uino, ruta similiter, lac ficulneum & silphium, si adsit: si desideretur, parthico liquore utendum erit. benefacit etiam trifolii ocimiq; semen epotum. idem præstat argenti spuma subito ictui præter opinionem imposita. omnibus his addatur balnei continuus cum multo sudore usus, uini potio temperatura meracior. Porro composita hæc potari debent: sulfuris uiui fabæ Aegyptiæ instar 35 cum piperis granis octo, in dimidia uini hemina: uel liquor silphii cum cæcro detricto in uino: aut melanthii, cumini Aethiopici, uiticis seminis, pares portiones cum uino.

## AD SCORPIONVM PERICVLOSORVM

&amp; phalangiorum ictus.

Fecis drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ quatuor, rutæ syluestris semi- 40

nis drachmæ tres, castorii, erucæ seminis, singulorum drachmæ duæ: excipiuntur sanguine testudinis marinæ. dantur quaterni oboli cum uini meraci uel aceti cyathis tribus. A L I V D. pyrethri, aristolochiæ, singuli trientes, piperis denarii duo, liquoris sulphurii denarius: exhibetur ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem.

## DE SCOLOPENDRA TERRESTRI

&amp; marina.

Cap. IX.

**A** T si scolopendra momordit, communiter quidem locus affectus in orbem liuescit, at tolliturq; aliquando feci similis, rarius autem ruber apparet, exulceraturq;: sumptu à morfu ipso initio, laboriosa ac curatu difficili exulceratione. præter hæc etiam toto corpore pruriginis sensus percipitur. peculiariter autē iis qui à marina scolopendra impetiti sunt, aquosus pellucidusq; tumor interim efficitur: à terrestri, rubens. Plagæ igitur imponi debet sal bene tritus, uel ruta concisa, aut cinis aceto maceratus, aut scilla, fouendus locus est oxalme. Archigenes autem oleo calido liberaliore fieri id iubet & prædicta sic imponi. Potui dabitur aristolochia cum uino, aut serpillum, aut nepita, aut sylvestris ruta, aut trifolium, aut succus radices asphodeli dimidiæ hemina mensura cum uino.

## AD STELLIONIS TRANSMARI

ni morsum.

Cap. X.

Esamo trito illinito.

## DE FELE.

Cap. XI.

**V**ia fele mordentur, ualide quidē dolent, & locum affectum liquidum habent: sed statim cepæ & allia ictui applicata auxiliantur. insuper eorundem esus, uino meraco superassumpto, remedio est.

## DE MVRE ARANEO.

Cap. XII.

**B**i uero mus araneus nocuit, sequuntur dolores pulsátiles, & in singulis dentium eius animalis ictibus, rubores: pustula insurgit sanioso humore plena, propinquæ partes oēs liuentes: cute pustulæ dirupta, albū ulcus apparet. nam ad membranas, neruofas deraditur. ad hæc, excidunt etiā partes depastiōe oborta, his quæ serpunt simili: præterea etiam intestinorum tormina comitantur, urina difficultas, & frigidi sudoris undiq; eruptio. Auxiliatur ipsis galbani splenium per se impositum, uel tritū cum aceto, uel ordeacea farina, cum oxymelite applicata, ipsæq; mus araneus qui momordit dissectus admodusq; sibi est remedio. aduersatur etiam pyrethrū illitum, uel mali Punici dulcis coriū incoctum, uel malua sylvestris, uel allia cōtrita, uel sinapi leuigatum cum aceto: item ex calida muria fatus conducit, deinde ordeum ustum ex aceto applicatū. Potui propinabitur abrotanū ex uino coctum,



aut silymbrium, aut serpillum, aut eruca, aut galbanū, aut eleliphacum, aut teneræ cupressi pilulæ cum oxymelite, aut pyrethrum cum uino, aut chamæleontis radix, aut hædi agni ue coagulum, aut gentianæ radix, aut uerbenaca, quæ etiam imponitur: ipsumque murem, qui momorderit ex æte detritum cum uino bibunt. Efficax hoc etiam quod sequitur: myrrhæ drachmæ sex, aristolochiæ corticis drachmæ quatuor. porro ad muris aranei & scolopendræ morsum, sal cum liquida pice recte applicatur, aut cedria cum melle, aut allium cum fici foliis & cumino, aut nepitæ folia, uel ordeum etiam cum aceto.

## DE VIPERA TVM MARE

tum fœmina.

Cap. XIII.



Nuiperæ, tum maris, tum fœminæ morsu, similitum ue animalium uirus relinquentium, dolor loci statim ab initio sequitur, mox totius corporis: apparêt etiam in morsu duo foramina paruo inuicè spatio discreta, fluitque ex his sanguis humorque saniosus, deinde oleosus, postremo etiam æruginosus, quem nonnulli uirus bestiarum esse dicunt. præter hæc tumores iuxta morsum subrubri liuidique assurgunt, corporis color perit: uertigines oculorum, stomachi resolutio, & animæ defectus oboritur, quibusdam etiam uomitiones biliosæ, urinæ angustia: insuper pustulæ in commorsa parte erumpunt, ueluti in ambustis: item depastio ipsam inuadit. ad uiciniam procedens, gingiuarum his cruentantur, accedit etiam tremor, sopor, & frigidi sudores, minori autem cum periculo liberari, quos uipera mas, quam quos fœmina momordit, uidentur: ex his ipsis minus periclitantur qui cibum præsumpserunt. In curatione autem præstantissimum remedium est, allii esus, & uinimeraci potio, adeo, ut si aliquis uti sustineat, nullum præterea remedium desideret. eduntur etiam utiliter & porra & cepæ & salsamentum quæcerrium. Sunt qui & ranas in cibo elixas dederunt. benefaciunt & hæc quæ sequuntur cum uino singulatim pota: testudinis marinæ sanguis rescicatus cum cumino syluestri, coagulum leporis aut hinuli tribus obolis, ceruini genitalis sicci denarius, anchusa tenuifolia tota, hanc autem nonnulli etiā collo suspēdunt, porri succus dimidiæ heminæ mensura ex mulsa, apia stri foliorum succus, syluestris ruta, gallinæ coru cerebri, panacis radix cum uino incocta, agarici drachma, iuniperi baccæ, hastulæ regiz radix pistacia trita, uiticis semē, mustelæ inueteratæ siccaturque denarii duo, echini radix succusque, cæcri fluuiatiles aut marini per se, cumque uua passa syluestri, sale & polio: aristolochiæ radix cum myrrhæ, gentiana, baccis lauri, æquali modo melle excepta. atque hoc quod subiungam mirifice efficax est.

## ORIBASII AD VIPERARVM MORSVS.

\* Videtur  
aliquid de  
esse.


Anisi acetabulū, pipерis, singulorum drachmæ quatuor, aristolochiæ corticis, opii, castorei, myrrhæ, singulorum drachma: passo leuigata in pastillos

- instar fabæ Græcæ cogito, & pro uiribus cuiusq; exhibeto, cum ternis dilu-  
 ti uini cyathis. ALIVD ex Lyci commentariis medicamentū uiperæ mor-  
 sibus efficax. Myrrhæ, castorii, piperis, sandarachæ, singulorum drachma,  
 anethi seminis acetabulum: leuigata ex passo dantur. ALIVD ex Archi-  
 5 genis commentariis. Cancros uiginti cum farina triticeæ quod satis est,  
 in pila diligenter contundito, admixtāq; nepiræ & salis momento, pastil-  
 los fingiro & siccato: in usu, cū lacte illinito, unumq; cum mulla potaro.  
 At si fluuiariles cancos desideres, marinis utitor. extrinsecus autem pla-  
 10 gæ delirus caprarum limus ex uino strenue auxiliatur: aut lauri folia cum  
 oleo incocta, aut bacca lauri, aut nepita, erica, ruta, apium, abrotanum,  
 galbanum in splenio adhibitum, origanum uiride concisum, gallinacci  
 pulli dissecti, & protinus calidi impoliti: farina erui cum uino macerata  
 crebro illita, radiculæ cortex concisus, scilla tosta, cruda polëra ex oxyme-  
 15 lite, cucumeris syluestris folia cum renuissimo farina ordeacea polline,  
 fex uini similiter cum farina polline, rura cum sale & melle furfures in a-  
 ceto cocta, cinis cum aceto, cedrinus liquor cum sale, pix liquida cū sale.  
 Fouere debent trifolii decocto aut pulegii, aut oxalme. Quum autem sub  
 cruentæ pustulæ euaserint, ipsas scarificabis, ita ne excories. deinde mulra  
 aqua foueto, lenticulam coctam cum melle oblinito, dum consanescant.  
 20 At ex uiperis antidorum proprie his & potum & plagæ imposurum effi-  
 cax est.

## DE AMPHISBAENA ET

scyræ.


Cap. XIII.

- 25  Onsimilia ex horū moribus eueniūt, eademq; ipsis auxilian-  
 tur: quare peculiarē aliquam descriptionē fornita non sunt.

## DE DRYINO. GALENI HAEC

præfatio.

Cap. XV.

- 30  Ryinus in quercuū radicibus uitā agens, tam malefica para-  
 taq; ad nocēdum ui est, ut calcatus solū, pedes hominis eue-  
 nudo relinquat: totisq; cruribus tumorē laxum quē œdema  
 uocūt, copiosum exciret. Ad hæc quod multo magis est mira-  
 bile, ferūt omnes eorū pariter manus excoriari qui curationē uitii admi-  
 35 strauerint: & si quis ulciscēdi studio interemerit, grauius oleret bestiā, illo-  
 q; suo odore omniū aliorū odorū sensum auferre. Istis ab hoc animali tū-  
 mor circa locum uitiatū cum rubore excitatur, pustulæ in circuitu assur-  
 gunt: aliquādo aquosus humor emanat: stomachi erosio uexat, & tormi-  
 na. Cōgruit ipsis aristolochia uino pota. itē trifoliū herba, radixq; hastu-  
 læ regiæ cōsimiliter assumpta, profunt & cōcisæ potæq; cuiuscunq; quer-  
 40 cus glādes, iudē ilicis radices tūlæ, & loco admotæ dolorem leniunt.

## DE HAEMORRHOO, ET PRESTERE,

hoc est, diplade.

Cap. XVI.



Vi hæmorrhoi istum fenere, grauibz cruciatur doloribz, iisq; crebris, admodum breuia angustaq; redduntur corpora, multus ex plaga sanguis erumpit: & si cicatrix toto corpore inducta fuerit, rumpitur, funditq; sanguinem. cruenta excernuntur recrementa, sanguis qui distillat, in grumum cōcretus est: tussis ex pulmone sanguinem reiciunt, euomentes sine remedio intereunt. A' dispade percussos ardor intolerabilis urget, sitis tanta excruciat, ut nec extingui nec intermitteri possit: copiose potum ægri hauriunt, eadem tamen siti conficiuntur, tanquā nihil plane hausissent, *similisq;* ex continuo, licet poculorū hauſtu habitus subsequitur. unde preſter ab urendo, dipſas à ſitiendo ſerpens appellatur. Multi autem ueterum ab hæmorrhoo & dipſa de commorſos ceu deſperatæ ſalutis & conelamatos eſſe putauerunt. Porro ſi ſpecialia aduerſus ſæram præſidia deſideremus, cōmunia tentare oportet, ac protinus ſcarificationem uſtionemq; adhibere: & ſi liceat, partē uitiatam præciderē. deinceps autem acria cataplaſmata imponi debent. 15  
utilia ſunt omnia ciborum acrementa ad uomitionem quæſita, præſertim quæ ex ſalfamentis petuntur, uini meraci potio, & lauacrum. hæc autem continuè, & exiguis temporum interuallis ſubinde adhibenda, priuſquam morbi accideſtia corripiāt. nam ubi illa ſemel emerſerint, nulla medicorum opoſuiuantur. Cæterum remedia quæ loco inducuntur, contra 20 morſus inſcripta reperimus, dipſadis quidem, dipſadis quidem, portulacæ folia concifa ex aceto, polentam, rubi folia cum melle læuigata, plantaginem, hyſſopum, allium album, portum, rutam, urticam: hæmorrhoi, præter iam dicta etiā hæc benefaciunt, uitis folia cocta cum melle concifa. per os autem hæmorrhoi ipſius caput crematū potui datur, aut ſcordion herba cum irino oleo: 25 eſui dantur etiam uuæ paſſæ.

## DE NATRICE, QVAM GRAECI HYDRON

dicunt.

Cap. XVII.



Natricis morſu ulcus factum dilatur, & liueſcens augetur, ſanies ex eo nigra, copioſa, & ſædi odoris, qualis ex depaſcēte ulcere, excernitur. Curatio mali, temporis proceſſu, & uix procedit. imponetur itaq; morſibus organum læue, ex aqua maceratum. confert & cinis quercus, oleo temperatus: uel ordeacea farina cū melle deliquato bibitur, item ariſtolochia drachmis duabus, uel in poſcæ duobus cyathis: deinde marrubii fuccus aut decoctum cum uino, aut naſturtium ſylueſtre, aut ſemē aſphodeli ſeu flos, aut ſceniculi ſemen cum uino: item recens fauus cum aceto comeditur. 35

## DE CENCHRO.

Cap. XVIII.

QVod ſi cenchrus nocuit, morſus eius uiperæ ſimilis eſt, putredo comitatur & carnes intumeſcēt prius, ut in aqua inter cutē, decidunt, inexpugnabili dormiēdi neceſſitate premuntur, ſopi- 40

unturq;. Testatus Erasistratus est, iecur ipsis, uescam, & colon affici: re-  
fectis siquidem ipsis, partes quodammodo corruptæ inueniuntur. His igi-  
tur lactuca semen cum lini semine illitum auxiliatur. succurrit & satureia  
concisa, ruta sylvestris; serpillum cum hastula regia leuigatum: potui ue-  
ro datæ protinus, centaurei radices drachmæ duæ cum ternis uini cyathis:  
aut aristolochiæ radix similiter. nasturtium itidem & gentiana, potu con-  
ducunt.

## DE CERASTE ET ASPIDE.

## Cap. XIX.



**P**ria aspidis genera Galenus prodit, primum eius quam cher-  
siam quasi terrestrem uocant, mox eam quæ chelidonia di-  
cta est, tertiam pyada appellarunt, quæ omnium est pern-  
ciosissima. siquidem erecto in priorem partem collo ex inter-  
uallo quod satis esse coniciat, uenenum in hominem iaculatur. hanc me-  
moræ tradit, reginam Cleopatram, quum Antonio deuicto Augustum  
uictorem timeret, sinistræ mammæ admouisse, morsamq; ab ea interiuisse,  
ut quæ longe celerrimam mortem inferat. Porro cerastis morfu locus cū  
duritiæ & pustulis intumescit, emanat ex uulnere sanies, modo nigra, mo-  
do subpallida & porraceo colore: totū corpus uaricum modo attollitur,  
genitale arripitur, mente alienantur, oculi obscurescunt: postremo, con-  
uulsione rigentium instar pereunt. Verum aspidis morfus æcus puncturæ  
similis, omnino exiguus sine tumore apparet, sanguis nō copiosus, sed exi-  
guus & niger destillat, subita oculorum hebetudo inuadit, dolor corporis  
multiplex admodum, sed mitis, nec sine uoluptate comitatur. Quapro-  
pter recte Nicander cecinit:

Et uir perit absque dolore.

Mutat color & uirescit, stomachi rosio exigua infestat, frons continue  
contrahitur, palpebræ sine sensu ueluti in somno commouentur, atq; in-  
ter hæc motusprehendit, ne tertia quidē diei parte dilata. His itaq; utrisq;  
membri affecti mutilatio mox à morfu facta, succurrit: eoq; sine mora, si  
fieri potest, præcidendum est. aut in his & propinquis partibus omnē car-  
nem circumsecare statim, & radicitus usque ad os excindere oportet. dein  
de reliqua ferro candenti adurenda sunt. etenim uenenum hoc, quæmad-  
modum & basilisci, bubuli lactis instar, sanguinem in arteriis & spiritum  
congelat.

## DE BASILISCO.

## Cap. XX.



**H**æc bestia raro quidem hominum oculis occurrit. Erasistra-  
tus autē hæc inquit: quum basiliscus momorderit, plaga sub-  
flauo quasiq; aureo colore tingitur. conducunt ipsi, inquit, ca-  
storii drachmæ tres potz. similiter etiam papaueris liquor.

Nos autem hæc experti non sumus.

## DE PASTINACA MARINA, ET MYRAENA. Cap. XXI.



**P**N marinis nempe pastinaca & muræna, agnitio manifesta est, pisces enim hi ab omnibus cognoscuntur. Auxiliantur ipforū mortibus lactis ficulnei guttæ quatuor aut paulo plures, cum cicutæ, scipilli tribus aut quatuor, & quæ ad uiperas commemorata sunt.

## DE DRACONE MARINO.

Cap. XXII.



**M**Arini draconis ictum, plumbo infricato, aut serpillio conciso illinito, aut lente elixa, aut sulfure cū aceto, aut dracone ipso dissecto. foueri locus urina humana debet: absinthium cum diluta uini porione bibi: aut eleliphacus, aut furculi ficulnei, in dulci uino dilurum, aut piscis ipsius cerebrum.



## DE SCORPIONE MARINO. Cap. XXIII.

**S**Corpii marini ictū sanat mullus piscis dissectus impositusq; sulfur uiuum cum aceto infrictum, baccæ lauri tres concisæ poræq;.

## QUOMODO TESTVDINIS MARINAE SAN-

guis præparetur.

Cap. XXIII.



**T**Estudinis marinæ sanguis in hunc modum præparatus, reponitur. In ligneo aut fictili uase resupinata testudine, caput ipsius celeriter amputato. cōcretum autem sanguinem in multas partes arundine diuidito, impositoq; operculi instar uasi cribro, in sole reponito: siccatum excipiens utitor aduersus uiperarum morsus, ut prædictū est, drachmis duabus cum uno aceti cyatho: tertio die, drachmis duabus cum tribus aceti cyathis.

## DE CROCODILI MORSV.

Cap. XXV.



**A**D crocodili morsus nitrum cum melle tritum usque dum ulcus repurgetur, imponito: deinde repleto melle, butyro, medulla ceruina, adipe anserino. Galenus autem tradit se cognouisse qui à crocodilis commorſi, adipe ipforū imposita uulneribus, exacte fuerint adiuti.

## DE HOMINIS MORSV.

Cap. XXVI.



**N**On extra institutum fuerit, cum uirulentis bestiis, etiam hominis morsus conscribere. siquidē maligniores multo aliis ulceribus apparent, præsertim si ieiunus momorderit, prius leguminibus usus, & præsertim lenticula. Communiter itaq; quæ in aliis uirulentis commemorata sunt, etiam in his extrinsecus per initia morsibus applicare cōueniet, præter ea quæ nimium acria adurentiaq; sunt. peculiariter autem oleo morsum prius illitum, sceniculi radice cum melle oblinito, aut lomento cum posca & oxyrhodino, frequenter immutās. Emplastro autem hoc utere, quod recipit squamæ æris, galbani, æruginis, singulorum unciam, ceræ libram, plumbaginis libras duas, olei sextarium:

plumbago cum oleo prius incocta assumet æruginem & squamam: ubi coierint, quæ liquari possunt, adduntur. Finita autem inflammatione, communis ulceris modo etiam hæc curabis.

## DE VENENIS.

## Cap. XXVII.



Vum de uirulentis bestiis succincte tradiderimus, proximū fuerit, ut de uenenis sermonem aggrediamur, simplicia quidem referentes eorumq; notas & remedia, tum communia, tum specialia: composita autē ex studio omitemus. etenim nonnulli uariorum medicamentorum lethaliū compositiones exposuerunt, quæ nocere magis, quàm iuuare legentes possunt. neq; enim exacta horum indicia in his qui assumpserunt, inueniuntur, ut etiam congruum ipsis remedium queas adaptare. Quum igitur hæc uaria ex superante in ipsis ui appareant, id etiam aliquis recte quod exhibetur, uarium adaptas, nonnunquam ex æquo, nonnunquam ut excellat medebitur. Incipiemus itaque & hic rursus à præcautione.

## DE VENENORVM

præcautione.

## Cap. XXVIII.



E uenenosis medicamentis disciplinæ ea pars quæ præcauere illa & declinare præcipit, longe difficillima est. propterea quod ii qui huiusmodi insidias homini clam machinatur, tanto id astu faciunt, ut uel peritissimus quisque decipi possit. si quidem amaritudines uenenorū dulci aliquo admixto, obtundunt, grauemq; odorem odoris additis operiunt. interim seu ad sanitatem, salutisq; gratia in morbis hæc propinare crediti, quod genus est absinthium, abrotanum, opopanax, castorium, uenena ipsis admiscunt, tum in cibis, puta durioribus, uel obsoniorū uarietate adumbrantes, ipsa offerunt. unde cui in suspitione huius doli uita fuerit, uitare cum oportet condita elaborataq; cibaria, omneisq; in gustu qualitates intensiores, exempli gratia, dulcis, acida & salsa. potissimum uero aquæ quod satis est præsumere oportet. restincto enim hac appetitu, postea qualitates aliæ à stomacho non apprehenduntur. ueruntamen alia quædam ratio asserendi hominem ab iniurijs uenenorū, est efficacior. Cōuenit enim quum suspicio mali medicamenti accepra fuerit, præcomedisse aliquid quod obtundere uenena possit, & inefficacia reddere: cuiusmodi sunt caricæ cum nucibus iuglandibus, ruta, salis grumo, & quæ mala medica dicuntur: item naporū semen denarii pondere cum uino, aut nepitæ folia, aut rubrica, quæ lempnam sphaigidē uocant, aut ruscæ folia uiginti: nullumq; nocebit uenenum, iam uero antidota cum uino quotidie fabæ Aegyptiæ instar assumpta, tu to admodū præseruāt, quale est quod terrestri crocodilo constat, dia scincucudicitur, & quod à uariorū animalium sanguine dia hæmaton uocatur, & Mithridatium. hoc aliquādo etiam ipse rex Mithridates usus est, quo-

tidie præsumens, ut à lethali medicamento se uindicaret præseruaretq;. Quum igitur à Romanis captus, bis lethali medicamēto eporo, mori nō posset, gladio sibi ipsi uitam ademir. Quoniam uero etiam citra insidias propter necessitatem aliquando locis desertis, nociuis uersantes, forte sub arboribus, exempli gratia, picea aut pinu cibum assumunt, diligenter attendendum est, ne ex his aut superioribus locis mortifera labātur animalia, & uasa, tum quibus hauritur uinum, tum quibus aqua, tum quibus obsonia incoquuntur, exacte operculentur, quemadmodum in uirulentorū animalium præcautione expositum est.

## COMMVNIS VENENORVM QVOMODOCVNQVE

assumptorum curatio.

Cap. XXIX.



T si nonnulli lethale uenēnū sponte sua, ut mortē sibi cōsciscant, assumpserint, qualia multa in hominum uita solent accidere, aut etiam aliquorum insidiis, si quidem nobis constet quod ueneni genus potatum sit, prorinus ad conueniēs ei remedium descendemus, ut in horum enumeratione dicitur: ac si medicamen exhibitum tunc nobis fuerit incertū incognitumq;, conuenit statim ad ea quæ cōmuniter ad quæcunq; uenena sumpta congruunt, diuertere. Nam indicia quæ comitantur si expectes, nihil plane in medicina spei est, ægris propter moram iam deploratis desperatisq;. Actutum igitur nulla mora interposita, oleo calenti per se, aut etiam cum aqua exhibito, uomere cogendi sunt. Si eius copia non est, butyrum cum aqua calida ingeri debet: aut maluz, linū ue seminis, aut tragi frugis, aut scenugræci, aut urticæ seminis decoctum. Non enim solum uomitionibus euacuabuntur, sed aluum quoque subducent & uenenorum malignitati aduersabuntur, acrimonias ipsorum hebetantia, præsertimq; oleum. quod manifeste inde licet cognoscere. Si nanque cutis exulcerandæ studio cantharide aut calce uiua aut eiusmodi quodam acri utaris, corpus oleo prius oblitum, non exulcerabitur. imò neque corpus spissare porueris, oleo præunctum. Præterea uomitus non modo quod nociuum euacuar, utilis est, sed interim haustum uenenum odore, concretis grumis, aut colore prodit. odore siquidem & amaritudine, cicutam: colore, cerussam uel gypsum: concretis grumis, lac, aut recentem sanguinem: halitus grauitate, uirus qualitate & odore, leporem marinum & rubetam ranam ostendit, ut per hæc ad accommodata singulis remedia uia non sit difficilis. Admiscebitur autem oleo maluz decoctum, aut anserinus adeps, aut ius ex carnibus pinguiissimis, uel gallinaceorum: aut ex lignorum cinere facta lixiua. Facit etiam huc nitrum detritum cum hydromelite potum, uinum copiosum & uetus: & quæ adipe aut butyro constant. Verum iis quæ in aluo hærent, per uomitum ablatis: quod intestinis illapsum est, clystere acriore euacuabimus. Post hæc lac potui dabimus. nam ab hoc



quod afficit, & uenenosum est: facile immutabitur. Iam uero medicamen-  
ta omnibus communiter conuenientia offeruntur, quale est, rubrica le-  
mnia, abrotanum, agaricum, erysimum, cryngii radix, pastinacæ erraticæ  
scmen, uel nepitæ, nardum gallicum, castoriū, medulla uiridis ferulæ, ne-  
rii, quod rhododendron est aut rhododaphne, flores, marrubii succus, fili-  
phium aut liquor ipsius, sagapenum, opopanax, puccedani liquor & ra-  
dix, aristolochia longa, ruta syluestris semen, folia cestri, quæ betonica di-  
citur. danturq; singula denarii pondere cū uino. Efficax in id est polii her-  
bæ decoctum, & picis liquidæ linctus. generosissime etiam opitulatur an-  
tidora superius comprehensa, magisq; ex uiperis rhēriaca. non autē eas-  
dem uireis habent, si post medicamētā lethalia assumantur, quas præsum-  
pta, quæ enim ipsorum quantitas præsumpta ad affectum cauendum est  
sufficiens, hæc si quadruplo auctior, aut quinruplo, post præsteretur, adiu-  
uar: idq; non semel dic, sed bis etiam. sic enim & Galeno illi admirando  
uifum est.

*Quali m. p. s. a. u.  
quod m. p. s. m. i. b. s.  
dando est in uino  
no efficitur.*

# ENVMERATIO SIMPLICIUM VENENORVM. Cap. XXX.

**I**nter uenena, animalia quidem sunt uitæ noxia hæc, cantha-  
ris, buprestis, salamandra, piceæ cruce, lepus marinus, rana ru-  
beta, & mutescens palustris rana, hirudines deuorata: ex semi-  
nibus, altercum, coriandrum, psillium, cicuta, melanthium:  
ex liquoribus, opium, opocarpasum, thaspiæ succus, elatricium, mādago-  
ra: ex radicibus, chamæleon, aphronitrum, thapsia, ixia, ueratrum, agari-  
cum nigrum, ephemerum, quod nonnulli colchicum dicunt, quod in col-  
chide nascatur: ex ramosis & olcibus, smilax, quam nonnulli thymium uo-  
cant, Romani taxum. solanum furiosum, quod etiam dorycnion appe-  
lant, sardoë herba, quæ species est ranunculi, papauer corniculare, phari-  
cum, toxicum, ruta syluestris, fungi: ab animalibus autē, sanguis tauri re-  
ccns, lac cui coagulum sit admixtū, uel quod ad Heracliam nascitur: me-  
tallica, gypsus, cerussa, calx, auripigmentum, sandarachæ, argenti spuma,  
adarce, plumbum, & quod uocatur argentum uiuum: ex iis quæ domesti-  
ca & in quotidiano uitæ usu sunt, uinum copiosum raptim à balneo potū,  
aut passum, aut frigida aqua similiter.

## DE CANTHARIDE.

## Cap. XXXI.

**I**ncantharidem assumpserunt, eos notæ grauissimæ comi-  
tatur. sere enim à stomacho usque ad uesicā cuncta illis mor-  
deri sentiuntur, gustum similem pici aut cedrino liquori ha-  
bent, dextra præcordiorum parte inflammationem expe-  
riuntur, urinam difficulter, sæpe etiam sanguinem per eam reddunt: item  
per aluum ipsis excernuntur, qualia in torminibus intestinorum cgeri so-  
lent. præterea animo linquantur deficientq;: nausea ex ciborum repletio-  
ne, & uertiginibus laborant: tandem uero mente alienantur. Succurrit ipsis

uomitus ex hydrelæ potitus, & lactis potio, terræ cimoliz denarij quattuor cū mulla, nuclej pinci, cucumeris semē. Adiuuat bene & ius pingue ex bubula factū, aut anserinū, aut ouillū: carnesq; gallinaccorum, aut agnæ aut ouillæ, aut porcellorū, omnesq; flaccescenres coctura longiore, & pingues cū lini semine elixæ: uinū itidē dulce & copiosum, thuris corticis denarij quatuor. Post cibū iniicietur per clysterē cremor oryzae aut chōdri, aut tragi, aut ptisanæ, aut maluæ, aut lini seminis, aut altheæ, aut fœnugræci. interim etiam mulla cum nitro intestino absterfo, cōuenit hæc rursus inferere: postea uero inflāmatione occupata medicamentis ex lini semine & ordeo lenire. per initia enim offendunt. deinde & lauacris aquæ dulcis utendum est, item unguentum irinum rosaceumq; potui dabitur.

## DE BVPRESTI.

Cap. XXXII.



Vpresti portione ingesto, in gustu nitro quippiam simile percipitur, dolor stomachi uentrisq; uehementer comitatur, eedēq; parres in specie hydropici intumescunt: extima totius corporis cutis intenditur, urinaq; cohibetur. Profunz ipsis quæcunque aduersus cantharides opulantur. priuatim autem conducunt, post euacuationes & uomitu & clystere factas, ficus aridæ, earumq; decoctum cum uino, aut lacte, aut mulso. prodest & pirorum omne genus, lactisq; mulieris potio.

## DE SALAMANDRA.

Cap. XXXIII.



Vibus salamādra data est, eis lingua inflammatur, sermo impeditur, tremor cum torpore quodam & resolutione urget, partes quædam corporis in orbem liuoribus uariātur, ut subinde permanēte ueneno, putrefactæ defluant. Ad quæ omnia faciemus, quæ in cantharidibus dicta sunt. proprie autem refinam è picea, aut pinu, uel galbanum cum melle offeremus, aut nucleos pinceos cum de cocto chamæpityos: aut urticæ folia cum liliis in oleo decocta, resti udinis marinæ uel terrestres oua elixa, ranunculorum ius esculentum, incocta simul ipsi eryngii radice.

## DE PICEARVM ERVCIS.

Cap. XXXIII.



Icearum eruca pota, statim sequitur oris palatiq; dolor, ualida linguæ inflāmatio, stomachi, intestinorumq; cruciatus, quæ cum pruritu circumtendi senriantur: seruior in idem toto corpore affligit, tum nausea ciborum ceu ex repletionem infestat. Succurri debet non aliter quàm his qui cātharidas biberunt. priuatim autem in ipsis loco simplicis olei melinum adhibebimus.

## DE MARINO LEPORE.

Cap. XXXV.



Eporis marini potum, gustus sequitur piscibus nō absimilis, uirosusq; tempore procedente aluus indolet, urina supprimi tur: si quando autem eruperit, purpurei coloris cernitur. præ

terea qui illum assumpserunt, auerfantur oderuntq; pisceis omnibus: sudor  
 fetidus erumpit, biliosusq; uomitus, nonnunquam sanguine mixtus su-  
 peruenit. Adiuuari autem debent hoc malo circumuēti, lacte asinino aut  
 passo continue exhibito, aut maluz radice & foliorum decocto, uel peus-  
 cedani radice cōcisa ex uino, aut ueratri nigri, aut scammoniz liquoris de-  
 nario ex mulsā, anserisq; sanguine recenti adhuc calido. item caneros flu-  
 uialeis solos, si sustinent, adferre oportet. Nota autem salutis est, quum pi-  
 scem quoque possunt comedere.

## DE RANA RVBETA, ET PALVSTRI. Cap. XXXVI.

**R**ana rubeta, aut palustris hausta, corporis tumorem inducit,  
 palloremq; intēlum, buxo similem: ægre spiritus trahitur, os  
 fœtet, singultus infestat, aliquando etiam lemen sine uolun-  
 tate prorumpit. facile autem post uomitum resciantur, mul-  
 ta meraci uini portione assumpta, arūdinis radice denariis duobus, aut cy-  
 peri totidem. Cæterum cogendi sunt obambulare celeriter & currere, ob-  
 torporem, qui ex hoc malo contrahitur: ad hæc quotidiana lauare.

## DE HIRVDINIBVS. Cap. XXXVII.

**H**irudines potas cum aqua & adhærescētis faucibus, inde adeo  
 dignoscēs, quod uētriculi os uellicatur mordeturq;: atq; hæc  
 etiam nota est hirudinis deuoratz, nonnunquam & sangui-  
 nem floridum, hoc est, uiuum excreant, hirudinibus gutturi  
 affixis, quas mutiæ sorbitio expellit, aut betæ folia cum aceto, aut nix cum  
 posca epota. gargarizandum quoque nitrum cum aqua, & atramētum su-  
 torium cum aceto. At si gutturi adhæserint, in calidam aquam descendē,  
 item lupinorum farinam assument: frigida in ore retenta eximētur. quip-  
 pe frigida aqua appetentiores, ad eam festinant, profiliuntq;. Nonnulli  
 cimices iis, quibus sanguifuga epota erat, exhibuerunt. ego autem, inquit  
 Galenus, aliis in his utens, cimicibus nunquam opus habui.

## DE CHAMAELEONTE. Cap. XXXVIII.

**C**hamæleōte nigro assumpto, ualida superuenit uētris erosio,  
 dolor, cū totius corporis peruersione, tremor, mox cōuulsio  
 incidit: itē uomitiōes pituitosæ & spumantes: quibusdā etiam  
 singultus aduenit: uox nihil sonat, facies distortæ. His autē  
 cōuenit cremor tritici pinguis, calidus epotus: item dulce uinū aquosum  
 calidum, uomitus, lactis potio, mollis clyster, fomētāq;: ex cataplasmatis.  
 ad eum uero, qui suffocationē parit liuoremq;, absinthium bibitur, aut ni-  
 trum cum oxymelite, uel radiculæ: fatusq; præcordiorum congruet.

## DE ALTERCO. Cap. XXXIX.

**A**ltercum aliquis, aut ebibit, aut comedit, mēte abalienatur  
 ebrii modo: facilem tamen curationem recipit, mulsā libera-  
 lius pota, & lacte, præcipue asinino: sin minus, caprillo, aut

uaccino : ficornmꝫ; siccarum decocto. benefaciunt ipsi & nuclei pinei, & cucumeris semen cum passo assumptum, præterea uinum falsum cum recenti adipe suillo & passo: urticae semen similiter, uel nitrū cum aqua con-  
ducit: insuper cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepe, & alia, singula cum uino sumpta. Caterum conuiescere cogendus est qui altercum  
hausit ut id, sicut, qui uinum biberunt, concoquat.

## DE CORIANDRO.

Cap. XL.



Oriandrum latere propter odorē non potest: potū uero rau-  
tatem facit & mentē mouet, cōsimiliter ebriosus. Loquūtur ita  
que qui id sumpserunt turpia, toto corpore in ipsis odor coriā  
drū indicat. Aduuant, ubi id oleo aut irino unguēto, ut supra  
monstratū est, eduxerint, uino meraciore cū absinthio, & per se potō: ouis-  
q; uacuatis in sese detritis, cū muria sorptis: ad hęc muria ipsa bibitur, & ius  
falsum, & gallinaceum & anserinū: postremo passum, cū luxuria sumitur.

## DE PSYLLIO.

Cap. XLI.



Syllai potū totum corpus refrigerat stupetq; inualidumq;  
efficitur, cum resolutione & animi tristitia. Præsidio sunt om-  
nia, quæ contra coriandri potum commendantur.

## DE CICUTA.

Cap. XLII.



Icutam potā caligo uertiginesq; insequūtur, ut nec minimum  
ē lōginq; uidere liceat: itē singultus, mētis alienatio & artū  
perfrictio comitatur: ultimoq; cōuulsi qui eam sumpserunt,  
præfocantur, cessante à motu omni arteriis spiritu. Per initia  
igitur, quemadmodū & in aliis, uomitu eam eliciemus, deinde hac euacua-  
tione usi, quod in intestina delapsum est, excernemus: ac tunc, ad uini me-  
raci potione ueluti præsentissimū remediū transibimus, per interualla eā  
exhibentes: in quibus interuallis lac uaccinū, aut asininū, aut absinthium  
cum pipere cōmuni & castorio, rutamq; & mentam cum uino exhibebi-  
mus: præterea cardamomi, aut styracis drachmā, aut piper cum urtica se-  
mine ex uino, aut tenera lauri folia: similiterq; silphium, aut eius liquorē  
cum uino & passo. Item passum per se potum, præclare opitulatur.

## DE PAPAVERIS LIQVORE,


quod opion uocant.


Ca. XLIII.





Apauers liquorem, qui opium dicitur, e potum, subsequitur sopor  
cum perfrictione & pruritu adeo uehemēti, ut subinde ueneno in-  
crudescēte tanta oboriatur prurigo, ut ab ea qui id biberunt, exci-  
tentur: ad hęc toto corpore opii odoris grauitas sentitur. Saluti est post  
uomitiones oleo factas, ac uti clystere. Item oxymel cum sale potū pro-  
ficat aut cum calido rosaceo, mel: præterea merum copiosius, cum absin-  
thio & cinnamomo: nec nō acetum calidum per se: insuper nitrū cum  
aqua: rutæ semen cum pipere, ipsumq; piper cum castorio & oxymelite,

uel fatureiæ, aut origani decocto, uino addito. Cæterum excitare ægros oportet iis, quæ naribus admouentur, & in aquam calidâ deducere, fomentisq; propter accedentem pruritum adiuuare: à lauacro, pingui iure, cum uino aut passo, uti. Iam medulla cum oleo pota ipsis opitulatur.

5  DE CARPESIAE LIQVORE. Cap. XLIII.  
Arpescia liquor potus, soporem & strangulatum præcipitem inducit. Eodem remedio, quo & cicuta, auxiliantur.

10  DE MANDRAGORA. Cap. XLV.  
Ceidit mandragoræ potu quamprimum sopor, languor, ualidaq; dormiendi necessitas, ut nihil à morbo, qui lethargus dicitur differat. quibus antequam horû aliquod eueniat, uomitus cõducit, post hûc, aqua mulsa, nitrû, & absinthii decoctû cum passo, aut uino dulci sumpta. caput rosaceo foueri & aceto debet, corpus excitari cõmoueriq; adhibenda itidem quæ odoratu excitant, piper, sinapi, castoriû, ruta cum aceto trita, pix liquida, lucernatû funiculi combusti extinctiq;. Quod si ægre excitentur: etiam quæ sternutamenta mouet, adducenda, aliisq; cõmunibus remediis in his quoq; utendû est.

15  DE ACONITO. Cap. XLVI.  
Conitum statim quum potum est, linguam edulcat & non nihil astringit: inde uertigines, præsertim in assurgendo, & oculorum humiditates inducit, thoracis grauitatem & præcordiorum, ita ut multi flatus per anum erumpant. In quo uitio uomitu uenenum educi debet, & aluus clystere subduci. Portiones contra aconitum hæc proficiunt, origani, rutæ aut marrubii cum uino, aut absinthii, aut erucæ, aut abrotani, aut chamæleæ, aut chamæpityos. Prodest ipsis & opobalsami drachma cum uino. item coagulum hædi, aut leporis, aut hihuli cum aceto, ad hæc ferri recrementum, aut uinum in quo ipsum ferri, aut aurum, aut argētum sit restinctum. insuper lixiuium cum uino, & gallinacei elixi carniui ue pinguium ius cum uino assumptum. Cæterum chamæpitys quæ peculiariter aduersus aconitum conducit, in Heraclia Ponti, ubi & aconitum nascitur, holocleros appellatur, Athenis, didonia: in Eubœa fideitis.

20  DE IXIA. Cap. XLVII.  
Xia, quæ & ulophonos dicitur, odorẽ habet & gustû quum sumitur ocimi, linguæ inflâtionem ualidâ inducit, mentem abalienat, neq; omneis naturalis exitus supprimit, strepitus tumultusq; alui elidit cum animæ defectu, nec quicquid tamen eicitur. Adiuuatur læsi ab ea, postquam uomitionibus fuerit educta maior ueneni portio, aut aluus soluta, absinthii diluto cû uino plenior, aut aceto aut oxy melite potio: itẽ rutæ syluestris semine, uel sulphû radi-  
ce: similiter hircinæ origani decocto cum prædictorû aliquo, aut lacte, aut

refina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut silphio, singulis oboli pondere. Profunt cum uino etiā nucis iuglandis nuclei leuigati, refina, castorio, & ruta additis, singulis denarii pondere. Proficiunt itidem chamæleæ denarii duo, aut thapſiæ succi totidem cum aqua mulsâ. utiliter & acetum calidum bibitur.

## DE EPHEMERO.

Cap. XLVIII.



Phemeron, quod nonnulli Colchicon, eò quòd in Colchide nascatur, uocāt aut bulbū agrestē, epotum, protinus totū corpus prurire facit, uelut urtica & scilla tactū irritatumq; interiora erodit, stomachū urit cum pōderosa grauitate. Inualeſcēte aut malo, cruēta strigmētis mista per aluū egerūtur. Succurrendum, ut salamādræ uomitiōibus & clysteriis: sed anteq̃ uireis sibi asciscat uenenū, dari debet foliorū quercus, aut glandiū, aut malicorii, aut serpilli decoctū cum lacte bibendū: aut polygonii succus, aut furculorū uitis, aut rubi, aut tenerarū ferularū medullæ, aut myrti cū uino. itē ipsæ myrti bacæ leues cōtusæ, & in aqua madētes, poto earū diluto, auxiliātur: benefacit itidem castanearū interior tunicula, si cum aliquo ē succis quos prædiximus, assumatur: organum quoq; cum lixiuia porum, in idem efficax est. Adeo uero exactū præsidium est lac uaccinū calidum potum, & simul in ore contentum, ut hoc præſente nullum aliud desideretur.

## DE SMILACE.

Cap. XLIX.



Milax, quæ à quibusdam thymion, à Romanis taxus nominatur, pota perfrictionē totius corporis & strāgulatum, mortemq; maxime præcipitem inducit: quibus omnia auxiliantur, quæ & cicutæ epotæ.

## DE SOLANO FVRIOSO, QVOD DORYCNION

à nonnullis dicitur.

Cap. L.



Orycnium potum, quod aliqui solanum furiosum appellāt, gustum quidem ceu lactis repræſentat, singultus crebros facit, linguę siccitatem, & cōſarētā sanguinis excreationem: per aluum mucosa feruntur, simillima torminosi. Auxilio sunt, anteq̃ horum aliquod fuerit securum, quæ in ephemete dicta sunt, uomitus dico & clyster, & quæcūq; potum uenenum possunt excernere. Proprie autem ipsi succurrit aqua mulsâ, aut lac asininum caprillum ue, & passum tepidum cum anisi modico potum: item amygdalæ, & elixa galinarum pectora, idem præstant conchulæ crudæ pariter & tostæ, in cibo, ad hæc carabi astaciq; & ius ex ipsis esculentum potui assumptum.

## DE SARDONIA.

Cap. LI.



Væ sardonias herba nuncupatur, ranunculi species est: pota autem, aut comesta mentem abalienat, conuulsionones adfert cum laborum contractione, ut risus imaginem præbeat, à

quo affectu etiam risus sardonius non laudabili dictorio inter homines iactatur. Cui uitio priuatim post uomitionem conducit aqua mulsa liberius exhibita, lactusq; porio: item corporis totius resperio inunctioq; ex medicamentis quæ calefaciunt petita. vincit item in hydrelæum calidum descendere, deinde corpus inungere & ualenter infricare. summam, ut in conuulsione rota curatio administranda est.

## DE PAPAVERE CORNUITO.

Cap. LII.

**P**apauer quod cornutum appellatur, esum potum ut, eadem quæ papaueris liquor inducens pericula, iisdem quoq; curatur remediis.

## DE PHARICO.

Cap. LIII.

**P**haricum dictum toto gustu nardum representat: potum uero resolutionem cum furore & conuulsione excitat. Aduersus quod, ubi uomitu fuit educit, absinthium tum uino propinatur: item einamomum aut myrrha, aut nardum Cilicium, quod nonnulli isatin uocauerunt: aut spicæ nardi denarii duo, myrrhæ oboli duo cum passo mistis aut iris, crociq; flos ex uino. Caput ipsorum derafum farina ordeacea cum tuta concisa & aceto oblinere oportet.

## DE TOXICO.

Cap. LIIII.

**T**oxicum inde nomen uidetur accepisse, quod barbari sagittas, quas roxeumata uocant, eo illinunt, ubi potum est sequitur laborum & linguæ inflammatio, mentis furor, qui coherceri non possit, uariis obnoxius imaginibus. eoq; difficile rationem recipit: raro etiam nonnulli qui id biberunt uitæ restituantur. Conuenit igitur continuis ipsos uinculis constrictos cogere: & uiadigere, ut passum cum rosaceo bibant, reddantq; per uomitum. Item raporum semen cum uino potum peculiariter ipsis confert, & quinquæfolii radix, hircinus caprillus uel sanguis porui datus. ad hæc, quercus cortex aut fagi aut ilicis cum lacte leuigatus potusq; proficit. Idem faciunt mala cotonea manducata, uel trita cum pulegio, ex aqua pota: præterea amomum, & balsami cum uino semen. Qui uero mali huius periculum euaserint, diu in lecto decumbunt, & quum surrexerint, attoniti ac stupentes reliquum uitæ tempus transigunt.

## DE FUNGIS.

Cap. LV.

**F**ungos alii genere, alii copia offendunt: integri sumpti stragulaturs laqueis simileis inducunt. his statim communi præsidio resistendum est, & qui eos hauserunt, oleo ad uomitum cogendi. Mirificæ his proficit lixiuium ex sarmetis aut ex syluestris puri cinere cum posca, sale uel nitro, potum: item pira ipsa syluestria aut folia simul incocta, uim strangulandi quæ fungis inest, tollunt: eademq; in cibo conferunt. ad hæc oua gallinarum elixa, & in posca pota, aristolochia denarius aut absinthii, cum uino: insuper mel delinectum potumq;



cum aqua. Prodest apiastrum cum nitro, panacis radix & semen cum uino, flocces uini combustæ, cum aqua, aut æris flos cum aceto: radícula itidem aut sinapi, aut nasturtia in cibo sumpta. Quoniam uero nonnulli fungi à uenenatis corrosi non modo strangulant, sed etiam intestina exulcerant, dari debet abfinthium copiosum & ficorum decoctum, origaniq; ad hæc ex aqua mulsa uomitum ciere confert, in calidam descendere, & crudam polentam præcordiis admouere.

## DE SANGVINE TAURINO.

Cap. LVI.



Anguis tauri recens occisi, spiritus angustiam & strangulationem procreat, dum tonsillarum & gutturis meatus cum ualida cõuulsione obstruit. Iam lingua iis qui sanguinem hauserunt rubens inuenitur, dentes erosi, & uestigia cruoris concreti inter ipsorum commissuras. In hoc malo uomitus uitari debet, grumis magis in stomacho cõcrescentibus, eò quòd uomitionis attractu ad superiorem partem efferuntur. Exhibetur quæ sanguinem cõuultem solvere, & aluum subducere possunt, exempli gratia, grossi liquore suo pleni cum posca & nitro. huc facit etiam omne coagulum cum aceto, & silphii radix cum suo liquore. similiter etiam brassicæ semen, lixiuumq; ex cinere ficulneo: item cunilæ folia cum pipere rubiq; succus cum aceto. Iam uero aluus recte & subducetur. Solent iis, qui seruantur inferiuscrementa foedi odoris egeri: stomachus & uenter ordeacea farina cum aqua mulsa foueri debent.

## DE LACTE COAGVLATO GELATO'QUE

Cap. LVII.



Ac coagulatum uniuersam multamq; strangulationem parit, eò quòd in grumos coit gelaturq;. Auxiliatur huic malo, antidoti modo, coagulum, si cum aceto frequenter bibere cõpellas cum, qui lac hausit. item conferunt nepitæ folia arida, aut succus ipsius similiter, aut silphii radix liquor'ue cum posca: idem præstat thymus cum uino, & cinis lixiua. salsum uero nihil offerri debet, nam hinc lac magis coit ac in caseum transit. nec uomitus in hoc malo conducit, nam in grumos concretum, dum ad stomachum assurgit, strangulat.

## DE MELLE QVOD IN

Heraclia nascitur.

Cap. LVIII.



El quod in Heraclia Ponti prouenit, aut esum, aut bibitum, eadem pericula, quæ aconitum, infert. quare & eadem utriq; cõueniunt remedia. Facillime autem curantur qui id hauserunt, continuo hydromelitis potu, cui rutæ folia sint admista.

## DE GYPSO.

Cap. LIX.



Ypsum potum strangulatum parit, in lapidem coalescens: unde transferre oportet huc præsidia quæ aduersus fungos conueniunt. datur etiam in hoc malo maluz decoctum loco olei.

pingue siquidem quum sit, & lubricas uomitiones procreet, corpora dera di non finit, quod lapidescens gypsus facit. Porro cōducit & oleum in mul fa, & ficorum decoctum, lixiuaq; ficulnea, aut ē farmētorum cinere facta cum uino copiosiore: item origanum, aut thymus cum lixiua aceto ue.

5 Clyster ex passo & maluz decocto in anum dabitur.

## DE CERVSSA.

## Cap. LX.



10

Erussa propter colorē facile deprehēditur, quoniā spēte sum pta palatū & linguā, dentiumq; cōmissuras albefacit: prate rea singultū, tussim, linguę siccitatem, extremorū perfriētio nem, cum mētis ab alienatione, & pigro corporis motu, indu cit. His prodest aquā mulsam, aut fīcorū, aut maluz decoctū propinare. item lac calidū, uel sesamū cum uino tritū, aut lixiuū ē uitū farmētis: aut oleum amaricinū, siue irinum, uel persīcorū ossa cum ordeī decocto: uel la chryma thuris, uel prunorū gummi, aut ulmi humor qui in folliculis ipsi

15

## DE CALCE, SANDARACHA

& auripigmento.

## Cap. LXI.



20

Abx, sandaracha & auripigmentum pota, uentris & intestino rum cruciatus cum uehementi rosione faciunt. quare omnia quz temperare & soluere ea possint, adhiberi debēt, item quz uomitiones facileis & aluum lubricam efficiant, qualis est hi bisci & maluz succus, decoctumq; lini feminis aut tragi, aut oryza: lac prz terca copiosum, aqua mulsā, iura pingua, boniq; succi.

25

## DE ARGENTI SPUMA.

## Cap. LXII.



30

Puma argenti pota, quam Graci lithargyron dicunt, graui tatem stomachi, uētris & intestinorum, cum torminibus ua lidis infert: nonnunq; & intestina pondere uulnerat, distum pitq; urinam impedit: corpus eorū qui eam biberunt, intumescit: & coloris plumbei fiunt: & deformitas circa faciem deprehēditur. Adiuuātur, secundū uomitiones, agrestis orminii semine cum uino: myr rz denariis octo, absinthii, hyssopi aut apii semine: aut pipere, aut ligustri flore cum uino: palumbium fimo arido cum nardo & uino.

## DE PLUMBO.

## Cap. LXIII.



35

Lumbi scobs aut lotura pota, similia inuehit argentispumę pericula: eademq; requirit przsidia.

## DE ARGENTO VIVO.

## Cap. LXIII.



40

Targentum uiuum potum, eadem cum spuma argenti in fert, atq; eisdem remediis qui id assumpserunt, adiuuantur. ad hęc prodesse ipsis uidetur lac copiose datum. ceterum & hi uomitionibus sollicitabuntur.

DE VERATRO ALBO, THAPSIA,  
claterio, agarico nigro, ruta syluestri,  
nigella, & pappis.

Cap. LXV.



Abenda cura est & corum, quæ iuuandi gratia exhibentur, sæpe uero non minora aliis pericula adferunt. cuiusmodi sunt superius commemorata, nempe ueratrum album, thapsia, claterium, agaricum nigrum. hæc enim strangulatus excitant, aut magis quam opus est, purgant: in quibus strangulationes, ut in fungis & similibus comprehensum est, curabuntur: nimias purgationes, iis quæ excretionibus cohibent, sistimus. Iam uero quæ paululum nocere uidetur, interim tamen pericula inferunt, negligi non debent, cuius generis est syluestris ruta, nigella, recentes pappi, qui flores sunt spinæ, quæ cactos dicitur. in quibus solus uomitus adhibitus laborantes sanitati restituit.

DE FAMILIARIBVS AC DOMESTICIS,

sticis, nempe uino & aqua frigida.

Cap. LXVI.



Qua frigida uniuersum pota, uinumque meracius copiosum, dulce, præsertim à balneo, aut cursu ualidisque exercitiis, strangulatus & dolores concitat, in quibus sanguinis dimissio protinus adhibita & inanitio, imminens periculum dissoluit.

LIBRI QVINTI FINIS, IOANNE Guinterio Andernaco interprete.

# PAULI AEGII

NETAE LIBER SEXTVS, IOAN-

NE GVINTERIO ANDERNA-

co medico interprete.

PROOEMIUM CHIRVURGICAE.

Cap. I.



10 **Q**VONIAM CHIRVURGICA IN PAR-  
tes duas diducta est, ut una sit quæ carnis vitia tra-  
ctet: altera, quæ ossium, tam in fracturis quàm luxa-  
tionibus speculetur, ab ea quæ carni seruit in præsen-  
tia exordiemur, consueto & hic usi compendio. Rug-  
sus igitur à superioribus auspicantes, quomodo ca-  
put, præsertimq; eius uertex uratur, exponemus.

15 **Q**UOMODO CAPVT ADVRATUR IN LIPPIENTI

bus, ægre spirantibus & elephanticis.

Cap. II.



20 **V**M humor oculis influit superne & difficilis utget spiratio,  
quæ humiditatis excrementi copiam à capite inferius in tho-  
racem transmissa, & particulas indidem consortio suo inse-  
stante contrahitur, caput per mediū hoc modo urunt: Ver-  
tex ad cutem prius ronderetur, cutis ad usq; os ferramentis mucronatis aduri-  
tur: quod, ubi crusta deciderit, raditur. Nonnulli uero ubi id ipsum os ad us-  
ferint, faciūt ut squama inde recedat exigua, quo facile humores illinc per-  
spiratu dissipetur euacuenturq; seruato diu ulcere, deinde sic ipsum ad ci-  
25 catricem perducūt. At in elephantiasi curanda, quinq; nonnulli crustas in  
capite excitant, unam in priori parte supra sinciput, alteram hac inferio-  
rem, paulo superius q̃ frons habetur, ubi fere pili desinunt: ac aliam in oc-  
cipitio, quod Græci opistho cranion uocāt, reliquas duas iuxta ossa à squa-  
mis dicta lepidoides, quæ superius aures conglutinant: unam ex his, parte  
30 dextra: alterā, sinistra: atq; ita pluribus squamis detractis, & copiam & cras-  
sitiem humorū euaporatu ex alto capitis deriuantes, lumina offendi pro-  
hibent. Iam leni quoq; aliud ferramentū adigunt, ut primo melancholi-  
ci recrementi opifici per crustam in cute excitatam medeantur.

**C**VM HUMOR CAPITIS CVTEM INFLAT, EA QVÆ

intumescit & prementi digito cedit, hy-  
drocephalon dicitur.

Cap. III.



40 **I** humor natura aqueus capitis cutem subit, uitiū propriè hy-  
drocephalon appellatur: accidit autē pueris, q̃ptimum in lu-  
cem eduntur, capite à nutricibus parum dextre preffo, aut ex  
causa latēte, aut ex uasis unius, plurimū ue ruptura & sangui-  
ne, qui emanat in alienam mutato substantiam, aut materia ob meatum

A

raritatem refudante, ac inter cutem & membranam quæ caluariam integrit, pericranion Græci uocant, erumpente: uel enim inter hanc, & cutem humor consistit, uel inter pericranion & os, uel inter os & cerebri membranas. Cum itaq; curi & membranz caluariam integrit, humor interiacet, tumor sequitur, ractu mollis, concolor, indolens, turgidus, puluino sublimi, exigua capitis parte digitis premētibus subsidens, facile cedit & rursus assurgit. Quibus pericranion & os inrecedit humor, reliqua sane respondēt, sed tumor durior multo est & lenre cedit, ut qui etiam pluribus locis sublabat, dolorq; magis urget. Si inter cerebri membranam & os humor se receperit, tumor quidē erit, sed qui prementi non cedit, neq; ractu sit mollis, tamen uiolenter pressus cedat, siquidē os infantium recens adhuc compactum facile cedat, præsertim cum futuris rarefactis humor foras euaserit: cognoscitur ex facili inde quod in humoris constrictione, in altū cum ex aduerso deducitur, recurrat. Dolor his acrior obuenit, caput rotum in diuersa agitur, frons ipsis foras producta est, oculis eernunt inconniuentibus, & crebrius illachrymāt. His igitur ceu desperanz salutis non est manus adhibenda, etsi maxime nonnulli chirurgicorum terebra perforatū os exemerint, ut in capitis fracturis dicitur. At si intra cutem & membranam quæ sub cute caluariam cingit, humor sit collectus, tumore quidē exiguō substāre, una linea per mediū transversa caput incidendum: si membranz caluariam inuoluēti & ossi culluiues interueniat magisq; caput inturgescat, duabus utemur lineis per medium se muruo secātibus: si magis adhuc sit turgidum etiam, rribus, ad similitudinē H literæ. Vbi manu humorem exemeris, infertis linamentis eommode partem deligabimus, & usq; ad tertium diem teneleo perfundemus, inde solutam medicamentum in linteolum illiro persanabimus. Quod si longiore spatio os carnem non recipiat, leuiter ipsum rademus.

#### QVOMODO ARTERIAE DIVIDANTVR,

arteriotomia dicitur.

Cap. IIII.



N longis oculorū defluxionibus, tum uertiginoso affectu, arterias post aures incidere cōsueuimus. Radenda igitur posterior capitis pars, & digitis noranda est. Nam arteriæ situs ex loci pulsū facile deprehēditur. deinde ipsam linea scriptorio prius attramento ducta, duos digitos longa, usq; ad os diuidere oportet. Quod si in conspectū ita nō uenit, incidendū circiter rriū digitorū inter uallum, atq; tūc manus iniiciēda, sic ut arteriæ trāsuer sim dissecctur, quousq; & pullatilis sanguinis fluor apparuerit, & instrumentū os propius accedat. Vbi fat fluxerit sanguinis membranula, quæ caluariā sub cure ambit, diuisa, ne ex rēfione inflammationē cōtrahat, rasoq; osse obturamentū ex pāniculo uulneribus debet insinuari & medicamēto quod lincolis illinif adhiberi, quod si remaneat etiā hoc os lenē, similiter hui⁹ rasura utemur,

QVOMODO LATENTIA CAPITIS VASA DIVIDANTUR, quæ angiologia dicitur, eorumq; adustio fit administranda.

Cap. V.



**N** quibus alterâ capitis partē dolor exercet, & calidus acrisq; pituitæ cursus, aut lōgus, aut acutus infestat, ut etiā tēporum musculi incalescāt, ac laxo rumore attollantur, omnes in his medici uasorū in capite latentū diuisionem probarūt. Deras igitur primū in temporibus pilis, digitis uasa notabimus, sic ut fomēta præcesserint, aut collum constrictū sit: ubi iam uasa oculis sese obiecerint, atramēto notabūtur, & cutis ex lateribus tum sinistræ manus nostræ digitis, tum ministri leuabitur, ipsumq; uas per summa, linea incidemus, dein de ubi totū penetrauerimus hamulis eleuatū & instrumēto quo mēbrang detrahūtur, denudatū suspēdemus undiquaq; liberū: & si tenuē fuerit per hamulū retusum, elato circūductoq; membranā detrahemus, ita ut partē quoq; ipsius apprehēdamus. At si magnū est, duplex acu funiculus subiicietur, aut linum crudū, aut aliud quoddā ualidum, ac q̃ primum uas in retum scalpello diuisum, sanguinis quantū satis est fuderit, in utroq; extremo quod denudatū est, lino ligabimus, quod intercedit excisum, aut protinus aut cū solueat auferre cōuenit. Nōnulli etiā candētibz ferramētis cl

tra sectionē uasa adurunt plagis satis altis, ubi iam ferro negotiū absolutū est linamētis carptis siccis uulnere oppleto, spleniū quoq; super accōmodatum deligabimus. postq̃ solum fuerit, medicamēta arida, quæq; carnem generāt, tum cicatrici inducēda apta, ad curationē absolūendam inducemus, nimirū ubi uincula deligaturæ cōputruerint exciderintq;.

QVOMODO FRONS INCIDATUR, HYPOSPATHISMUM uocant.

Cap. VI.



**I** nstrumenti species nomen administrationi dedit: utimur autem hypospathismo, in quibz fluor multus & calidus in oculis defertur, faciesq; rubescit, & in fronte sensus quidam & discursus ueluti uermiū, aut formicarū oboritur. Deras itaq; in fronte pilis iubebimus, ut inferior gena moueatur, cauētesq; musculorum ad tempora motionem, tres lineas rectas pari spatio distātes in fronte incidemus, longas quidē singulas duos digitos, altas ad usq; os, trium digitorū interuallo inuicē discretas. secundū sectionem, spatham subiiciētes à linea quæ in sinistiore tēpore ad mediā tendit incipiemus, totū quod interiacet exco

riantes, cum membrana quæ caluariā incingit, deinde rursus spatulā à media ad reliquam dimitemmus. Deinde scalpri quod scolopomachæ rion dicitur, aciem in primam coniicientes lineam, ut acutum ipsius latus externæ cutis carni accōmodetur, retusum uero, ossi propellemus ipsum ad usque mediam lineam, omnia à capite ad oculos descendētia, uasa præcidētes, non autē usq; ad cutis superficiem: rursus à media ad postremā ipsum

deducemus, similiter uasa amputantes. Vbi mediocriter sanguis effluerit, extusus grumis, tria linamēta tortilia singulis incisuris inferemus, panniculumq; implicitū aqua madentē superiniectū deligabimus. Postridie œnelzo nō solū ulceribus respersis, sed etiā temporū musculis auribusq; propter inflammationē, tertio die cū solueris, superfusione diu utendū, & basilico rosaceo soluto, linamētis insertis curationē quę restat, absoluem⁹.

QVID AGENDVM IN SINCIPITE SECANDO, PERISCYTHISMVM appellat Græci. Cap. VII.



N quibus multa, & in alto uasa fluorē copiosum oculis transmittunt, tribus lineis transuersis coronæ modo sinciput secatur, quæ ratio periscythismus Græce uocatur. Hoc morbo laboratium comites notē sunt tales: Primū oculi alimentū nō lentunt, exigui, & ad uisum impotētes, sunt anguli erosi, palpebræ exulcerantur, & pili ipsorū deflui, lachrymæ tenues admodū & acres cū calore defertuntur. Dolor in alto capitis acutus, & uehemēs urget, sternutamentū cōtinuū. Itaq; derafo capite trāuersam lineā sine musculorū in tēporibus, motus offensa, ut dictū est, incidem⁹, quæ à sinistro tempore incipiens in alterā desinat, habeatq; terminos, ubi mor⁹ nullus est, paulo superius q̄ frons habet, ducta: sic ut futura capitis à rotūditate dicta <sup>est</sup> uideatur, uideatur. Leonides per mediā frontē lineam deducit. Cæterū osse detecto, obturaminibus, aut linamētis pluribus inuicē ipsum separabimus, oras lineę uinciem⁹, œnelzo etiā ut prius dictū est, asperfas. A solutiōe cū inflammatio iam declinauerit, os radetur, quoad caro suppullulare incipiat, rationemq; carnis producēdę accommodabimus medicamētis aridis in id efficacib⁹ utētes, quale est, quod recipit farinæ triticeæ partes duas, colophonis resinæ partē unā. Itē quale est Cephalicū appellatū. Itē quod ex pumice ad carnē creandā cōficitur. Nam cicatrice crassiuscula cute defata, & occlusa, uasorū ora priorē pituitæ impetū in oculos deferri prohibent.

DE SUPERIORIS PALPEBRAE SV-

tura aliisq; modis.

Cap. VIII.



Vm sub ordine naturali pilorū palpebræ, alius ordo succrescit, uitiū Græce distichiasis appellatur, ex humoris cuiusdā in eam partē impetu cōtractum, cū is copiosus, sed rosionis expers & acrimoniæ fuerit. Nam acrior, aut falsus magis, aut alio quodā modo rodens, spatio temporis etiam naturales palpebrę pilos corrūpit. Interim igitur in hoc affectu, futura utimur: interim in ea dispositione, qua pilorū subnascentiū duplex triplexq; acies, uel in superiore, uel in inferiore palpebra prouenit, hoc est cum ciliū intrō spectat pilorū acies simul cū eo inuersa, phalāgos uocatur interdū etiam in palpebris relaxatis, quando naturales pili bulbū cōpungunt. Aeger itaq; in sedili collocatur, uel aduersus, uel à latere, superiorq; palpebra inuertetur: si quidem



longos habeat pilos, illos ipsos indice & magno sinistrae manus digito apprehendemus: sin admodum breues, acus filum ducens per medium cili-  
um & exteriorē partem transmittetur, deinde per filum sinistra manu sub  
lata palpebra, dextra, mucrone scalpelli, post filum eadē in sinum coacta  
5 inuertetur, & subrus linea interius q̄ pili pungētes habeantur per cilium  
ducetur, à maiori angulo usq; ad minorem pertinens. filo autem post in-  
teriolem sectionis lineā subiecto, pollice manus sinistrae exiguum quod-  
dam linamentum implicitū obiciētes, superciliū attollemus, aliaq; par-  
ua linamēta implicita summis angulis imponētes famulo posterius stan-  
10 ti iubebimus, ut palpebras per ea attollat, atq; tunc lineam ueru modo re-  
ctam, obeliazam Græci uocant, primū scalpello fibulis aptato incidemus  
paulo superius quā naturales pili existant, ab angulo ad angulū tenden-  
tem, altam ut sola possit cutis diuidi: post eam, lunatam adhibebimus, in-  
cipientes quidem unde & ueru similis linea inceperit, in tantam uero sub-  
15 limitatem tendētes, ut totam cutem quæ superflua est circumscribamus,  
desinentesq; similiter ubi & illa iam commemorata linea. Postea cum cu-  
tis duabus lineis circumscripta myrti similitudinem repræsentet, angulo  
qui ad dextram nostram spectet hamulo trāsfixo totam hanc cuticulam  
excoriābimus, deinde uibicibus spongia ter quater ue ablutis, oras uulne-  
20 ris contrahemus à media auspicantes, acum uero per ipsam interiorē se-  
ctionem transmittentes: porrò filum ex lana esto. Caterum quod eius su-  
perfluum est amputabimus nō prope fibulas, sed ut circiter trium digito-  
rum longitudo otiosa pendeat, eamq; per frontē exporrectam, cum em-  
plastro quodā conglutinanre applicabimus, palpebræ autem pilos à fibu-  
25 lis mucrone acus liberabimus. Hic igitur agendi modus & communis &  
securus est. Nonnulli excoriationem fugiunt, eoq; post ductam subrus li-  
neam, specillo palpebris cōtinendis accommodo, hoc est, ad palpebræ cir-  
cunductum figurato, id quod superest cutis, eleuatam scalpro amputār,  
ac fibulas, ut comprehensum est iniiciunt. At si in parte aliqua solum pal-  
30 pebræ ex pilis oriatur punctura, illi etiam soli manum adhibere cōuenit,  
deinde linamēta implicata posca, madida imponemus deligabimusq; im-  
buentes ipsam partem posca aquatica usq; ad tertium diem quo ligaturā  
soluemus, ac superflua fili parte abscisa oblinem\* palpebras, uel croco, uel  
glaucio, uel aliquo collyrio, quod inflammationem arceat, exempli gra-  
35 tia, crocode & ex rosis composito aliquo. At si inflammationē fibulæ in-  
tulerint, etiam emplastrum aliquod tenue ipsis superaccommodabimus,  
& ueluti lacte infuso oculum leniemus, rarefactas autem futuras amputā-  
do abstrahemus. Notus mihi quidam est qui palpebra, ut dictum, excoriā-  
ta, fibulis non uteretur, sed medicamento cicatricem inducente curatio-  
40 nem absolueret. Nam uulnere ad cicatricem ueniente, palpebram parti-  
cularim attollens pilos extrā inclinationem coëgit. Quemadmodum sgi

tur alius quispiā ne excorians quidē palpebrā neq; externis duabus utens diuisionibus, sed interiore solum adhibita, palpebræ rugas digitis uel hamo attollebar, item duabus arūdinulis aut hapsulis quibusdam palpebræ longitudinem æquāribus, latitudinem angustī scalpelli, quod uenis secandis adhibetur, superfluum totam cutem mediam prehensam constringebat, utriusque ipsius terminos deuineiens. Atq; hac ratione, tota posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emoriens, intra decimum aut plurimum quintumdecimum diem cum arūdinulis aut hapsulis excidebat, ita ut ne cicatrix fere aliqua appareret.

#### QVOMODO PALPEBRAE MEDICA-

mento urantur.

Cap. IX.



Stionem palpebrarū ex urente medicamento factam, oēs, ut uno uerbo dicam, ueteres damnauerūt, tum propter medicamenti aerimoniā oculis insidiantē, tum quod ex immodica ustiōe affectus nascitur, quē Græci lagophthalmū appellāt, in quo hīatibus palpebris qualicunq; de causa lumē offenditur. Quoniā uero multi à pilis semper punctiōne experiuntur, ne uocabulū quidē futuræ frequēter audire sustinētes, detinent plerūq; nos etiā inuitos, tanquam aliis destituti præsidiis ustiōne per medicamentū adhibemus. Compositio uero medicamenti hæc recipit, calcis uiuæ partes duas, saponis gallici uel cōmunis totidem (quidā etiam aphronitri partes quatuor) leuigatas cinere lixiuo, aut saponario, aut alio, ē sicu, aut quercu, aut urina pueri im-  
puberis excipientes mucrone scalpelli palpebrę iniiciemus, tantū in myrtacei folii figurā adurentes, quantū etiam in descriptione comprehendemus. ubi iam primo medicamēti imposu cutis fuerit adusta, eo spongia ablato rursus aliud iniiciemus, tam diu id cuti inhærere sinētes quousque nigrescat. Sin id nō affecuti fuerimus, etiā tertiō induetur. Postquā uero cutis nigruerit, & reliquū iam crusta oborta medicamentū ablueris, & balneis, & superfusionibus, quousq; crusta deciderit utemur. Inde rasilibus linamentis & collyriis teneris, cicatricem molimur.

#### SI OCVLVS CVTE NON CONTEGATVR, LAGOPHTHALMUM DICITVR.

Cap. X.



Agophthalmon uocāt cum superior palpebra sursum retracta est. Accidit autē hoc uitii, aut naturaliter, aut ex cicatrice uulneris, eiusq; uel sua spōre facti, uel ex futura, uel ustiōe, ut nuper dicebamus, parū dextre administrata: in qua etiā solū medioeris emēdario fieri potest si palpebra crassitiē notandā habeat, non enim cōuenit ipsa cicatrice diuisa, & oris per linamentū diductis, etiā deligatura prorsus usq; ad absolutā curationē uti, ita ut nō nimis sicca, sed relaxantia magis unguina adhibeantur: quale est scēnugræci succus superfus & basilicum tetrapharmacum quod linteolis illinatur resolutum.

## DE INFERIORIS PALPEBRAE SVTVRA ET VSTI

one per medicamenta.

Cap. XI.



5 Vot pilorū affectibus superior palpebra opportuna est, tot  
etiā inferior. Etenim ultra naturā suā modū excreſcens, in-  
uertitur & phalāgosim, & distichia, hoc est, sub ordine natu-  
rali pilorū, alium ordinē succreſcētē sustinet. Eodē igitur  
modo quo in superioris palpebrae futura, utendū est, ordine inuerso pri-  
mū lunata incidi linea debet, ut sanguinis fluor impediatur, deinde ueru  
10 instar recta. Subtus uitāda est sectio, quoniā palpebra inferior pōdere suo  
genuino prompte inuertitur. Cēterū reliqua curatio in alterius palpebrae  
futura tractata, hic quoq; cōueniet, prater quōd filorū excessus fronti nō  
sint agglutinandi. At si in hac etiā affectione manū extimescēs, uſtionem  
potius ē medicamento deligas, hanc quoque iam traditam habes.

## DE ECTROPIO.

Cap. XII.

15 **Q**uemadmodum superiori palpebrae uitium uocatū lagophthal-  
mon, ita inferiori ectropion oboritur: uerum id intercedit discrimi-  
nis, quod hoc non ē natura prouenit, sed nonnunq; ex rela-  
xatione, quam medicamēta in id efficacia, inflammatione pracedēte cōci-  
tarint: nonnunquam ex futura, aut inartificioſa uſtione palpebra inuerti  
20 tur. Acu igitur duo lina trahēte carunculā transſuemus, ā sinistiore an-  
gulo ad dextrū deducta. Deinde lino utriſq; ipsius extremis admoto, carū-  
culam per acū attollemus, atq; ipsam scalpello excindemus, auferētes si-  
mul cū ea & acū. Atq; si figurā palpebrae receperit, & aequaliter sit cōuerſa,  
satis manu profectū est. Sin autē postea quā caro fuerit ablata, adhuc in-  
35 uertat, auersum scalpellū quā partē Græci cyathiscū nomināt, iuxta mucronē,  
palpebrae sectē subiiciemus. ac in externa illius parte duas incisas li-  
neas, ā duobus factē sectionis angulis, auspicantes, in fastigiū mucronatū  
ducemus, easq; in figurā **Λ** literæ Græcorū similē cogētes, carūculam am-  
putabimus, ut acū ipsius infra spectet oculū, latitudo supra, ciliū appel-  
40 latum respiciat. Secundū hoc diductas oras acu ex lana filū ducēte cōmit-  
temus, duabus fibulis cōtenti. Quōd si uero futurae, aut uſtioni fertur acce-  
ptum ectropion, etiā sub inferioribus palpebrae pilis per ipsam primā ci-  
atricem lineam simplicem incidemus, labrisq; diductis linamēta infere-  
mus, ac aliis præsidiis, quæ in lagophthalmis comprehensa sunt, utemur,  
35 praterquam fomentis, usque dum futura fuerit conglutinata.

## QUOMODO PILI PALPEBRAM IRRITANTES EVELAN

tur, &amp; uſtio per ferrum adhibeatur.

Cap. XIII.



40 N quibus haud multi palpebrae pili habentur, qui oculū irri-  
tent, sed circiter unus, aut duo, aut plurimum tres, inuicē pro-  
pinqui, euulsionē quā anabrochismū uocant, probamus. eaq;  
fit hūc in modū: Per acus tenuissimā auriculā capillū mulie-

A iiii

bris, aut simplicissimū byssinum linū transmittitur, duobus simul extre-  
mis cōmissis, ut quod inseritur duplicē habeat ansulā, item alterū huius-  
modi filiū, aut capillus ansulā insinuatur: traductaq; aeu per ciliū ubi pili  
enati apparēt, pilū, pilos ue per amentū ansulā insertos detrahemus. Et si  
quidē palpebrā pilus prehensus est, ansulā attrahimus. Sin uero unus, aut  
plures exciderint per initū iniectū, rursus ansulā deorsum trahemus, ite-  
rumq; pilo, seu pilis in eā positis, attrahemus. At si unus dūtaxat pilus gra-  
cilis oculū pūgat, etiā altes ex naturalibus palpebrā pilis simul euellem\*,  
inunctū prius gūmi, aut alio quodā glutināte, deligabimusq; donec pilus  
coalescat. Nōnulli aut uisionē prāponūt euulsioni: palpebrā inuertunt,  
extra oq; uulsella pilo pungēte siue uno, siue duobus, uel etiā tribus, eā  
dens aut specillū, aut eiusmodi aliquod tenue instrumentū loco adigunt,  
unde pilus, pili ue sint euulsi. Sic enim cute densata, nullus pilus enascitur.

## DE HYDATIDE.

## Cap. XIII.



Ydatis pinguis quādam est substantia, palpebrā euti natura  
liter substrata. In aliquibus autem, & pręsertim pueris eeu na-  
tura humidioribus augetcēs, malorū superuenientium causa  
redditur, dum oculū pondere suo grauat, eoq; fluxionē exci-  
tat. palpebrā igitur in hoc uitio detentis infra supercilia aquam inter cu-  
tem repręsentāt, nec ut par est sursum possunt attolli. Si uero digitis ipsas  
deprimamus, inde digitos separem\*, quod mediū intereedit, inflatur. Ho-  
ris autē atelucanis potissimū defluxione tentantur, neq; cōtra solis splē-  
dore eernere sustinent, sed illachrymant, continuūq; lippitudinibus in-  
festantur. figuraro igitur commode a groto digiris duobus, indie & me-  
dio paululū distantibus palpebrā constringemus, collectionē quādam  
hydatidis ad mediū digitis interpositū molientes. Ministro autē posteri-  
us stanti eaputq; agrotātis firmiter cōtinenti iubebimus per medium su-  
percilii palpebrā modice attollat. Nos sumpto in manus se alpello, ipsam  
per mediū lineā trāsfuerſa diuidemus, nō maiore q̄ in sanguinis per uenas  
detractionē fieri solet. alra uero ut totam cutem diuidat, uel etiam hydati-  
dem ipsam attingat, sed cura omnino debet adhiberi. pleriq; siquidē alti-  
us demisso se alpello, uel membranā quā a cornus similitudine Ceratoides  
dicitur, uiolarunt, uel certe palpebrā museulos cōuulnerarūt. Atq; si  
quidē protinus ydatis in conspectum uenerit, ipsam extrahemus: sin mi-  
nus, iterum diuisionē leniter moliemur. Vnde si appauerit digitis eū lin-  
teolo molli apprehensam huc illuc nonnunq; etiam circumactam mouē-  
do extrahemus. ubi ablata fuerit implicitū panniculū posca madentē im-  
positumq; deligabimus. Sunt autē qui & leuigatum ſalem se alpelli capitu-  
lo diuisionibus inserant, ut si ex hydatide quippiā fuerit relictū, ipsam cō-  
sumat: postq; soluerimus si desit inflammatio tolyris quā illini possint,  
aut lycio, aut glaucio, aut crocco curationem expediemus. Sin inflāma-

tio urgeat, cataplasmatibus ad eam inscriptis, alijsq; præsidiis medebimur.  
DE PALPEBRIS COMMISSIS. Cap. XV.

**N**terim superior palpebra cum inferiori cilio coalescit, inter-  
rim cum membrana adnata, interim etiā cum ea quæ ob cor-  
5 nus similitudinem Græce ceratoides appellatur, ac morbus o-  
culum difficilē efficit. Cōuenit igitur uel specillo, lato palpe-  
bræ spatio subiecto, uel ea per hamulū eleuata commissurā dissoluere, cu-  
ra adhibita ne cornea membrana uulneretur, atq; inde procidentiz occa-  
sio fiat. Vbi inciderimus, succo in oculū infuso linamētis palpebras didu-  
10 cemus, ne rursus cōmissura fiat, lanaq; ouo madente imposta post tertiu  
diem extenuantibus & quæ cicatricem inducunt collyriis utemur.

## DE CHALAZIIS.

## Cap. XVI.

**H**alaziū otiosi humoris in palpebra colluuius est: quæ si ab  
exteriore parte palpebræ coaceruetur, scalpello extrinsecus  
15 trāsuerſa linea incidi debet: deinde specillo, uel aliquo huius-  
modi instrumēto chalazion auferemus. Quod si magna est  
diuisio, aut dehiscit, fibulis oras cōmittemus, ac emplastro utemur. Si exi-  
gua est, omiſſis fibulis, curationem absoluemus. Si ab interiori parte fue-  
rit, ut per cartilaginē ipsa pellucet, in uerſa palpebra & transuerſim in-  
20 tus diuisa chalazion tollitur: quo factō, muriam uulneri infundemus.



## DE VERRUCIS ET ENCANTHIDE. Cap. XVII.

Alpebrarum uerrucis, & in maiori angulo encanthidibus ap-  
pellatis uulsella prehēsis, scalpelloq; amputatis chalcitidem  
leuigatum imponemus.

## DE VNGVE OCVLORVM, QVOD PTERY-

gion à Græcis uocatur.

## Cap. XVIII.

**P**terygion neruosa membrana est, quæ ab oculi angulo maiore ini-  
tium capiens per minorem ad exteriora progreditur, officitq; ocu-  
culo, morum ipsius, & bulbi contractione impediens, & quod pro-  
30 grediens totam pupillam contegat. Cum igitur facilius curationem re-  
cipiant, quæ tenuia sunt, & albicant, hunc in modum ad mouenda manus  
est. Diductis palpebris, unguem hamulo mucrone intus recuruato exce-  
ptum attollimus. Acum uero, pilum equinum, aut linum ualidum du-  
centem, ac paululum inflexam per summa ad unguis dimidium traici-  
35 mus. Et lino quidem unguem deligatum sublimem eleuamus, pilo au-  
tem partem pupillæ proximam perradentes, usque ad terminum exco-  
riamus. Reliquam partem maiori angulo uicinā scalpello futuris dicato ex  
basi abscindimus, ita ut anguli carunculam relinquamus, ne ea ablata, hu-  
mor postea semper descendat, rhyada Græci uocāt. Aliqui lino unguem  
40 eleuatum, ut diximus, scalpello in id accommodato, totum illum exco-  
riant, cauentes ne à cornu dictam Ceratoidem tunicam attingant. Post

manus administrationē momento salis in leuorē detriti loco iniectione lanā ouo imbutā illigabimus. Ab huius solutione, muriā ipsis liberaliter instillabim⁹. Si inflammatio subsecuta fuerit, ad eā inscriptis auxiliis succurrem⁹.

## DE STAPHYLOMATE.

Cap. XIX.



Staphyloma est mēbranę corneę cū ea quę ab acino *ἰσχυρὸς* appellatur, infirmat⁹, aut uitio defluxionis, aut exulcerationis incuruatio. Admouemus autē huic uitio manum, nō ut uisum abolitū restituamus, uerum ut moderatum & grotātī decorē conciliemus. Itaq; acu ab inferiore parte sursum per basim staphylomatis traiecta, deinde alterā acum duplex linum ducentem ab angulo qui ad manum spectat, ad alterum per basim staphylomatis transmittere oportet, manētēq; prima acu, lini plexu amputato, staphylomatis aliam partē sursum, aliam deorsum filis deuincire: atq; tūc acu detracta lanam oui liquore imbutā imponere. Post solutionem blādis infusionibus oculum lenire, donec fila simul cum staphylomate decident.

## DE OCVLIS PURULENTIS, QVI

hypopyi dicuntur.

Cap. XX.



E oculis purulētis Galeni uerba apponere abunde est, quz in cum modū habēt: Nostra & tate medicus quidā oecularius eognomēto Iustus, etiā concussione capitis plerosq; hypopyos perfanauit. collocās enim eos in sella rectos, ac capita ipsorū utrinq; à lateribus cōprehendens, mox quatiebat adeo, ut pus ipsis descendere palām uideremus. mansit autē horum puris colluies infra propter grauitatē substantiā, tametsi hypochymatis nequaquā manentibus nisi admodum quis diligēter ea impingi cogeret. Ac progressus iterū idem Galenus, inquit: Frequēter autem multū simul puris uacuauimus tunica ea diuisa, quz cornus speciē refert, paulo supra locū quo uniuersa inter se tunica cōmittuntur. nominant autē locū Græci nūc irim, nūc stephanen, hoc est, coronā. Hoc quidē Galenus in cōmentario de morbis curandis prodidit. Cēterū post puris euacuationē, ulc⁹ ex mulla factis, aut apomelite infusionibus repurgātes, deinceps reliquā purgationē accōmodabimus.

## DE SVFFVSIS.

Cap. XXI.



Vffusio, pigri humoris in cornea mēbrana iuxta pupillā conereto est, quę uisum impedit, aut certe ne clare oculus cernat, efficit. Accidit potissimū ex perfrictione ac imbecillitate spiritus uisorij, eoq; senes magis & longo morbo confectos inuadit. fit etiā ex uomitu uiolētius cōcitato & ex ictu, aliisq; pluribus de causis. Verum de iis suffusionibus, quz nondū radices egerunt, nullā manus administrationē requirentibus, tertio libro cōprehensum est. In hoc autē eas, quz iam cōfirmatę sunt & ex toto cōcreuerunt, notis suis describem⁹. Omnes igitur suffusione laborantes lucē uident, aut multā, aut paucā,

eoq; difcetimine suffufiones ab hebetudine & glaucomate feparamus, tum  
 eo quod hebetudinē & glaucoma experti lucem omnino nullam cernūt.  
 Rurfus igitur Galenus docebit te suffufionum & coneretionē & differen-  
 tiam, item quomodo his manu mederi conueniet. Oculus suffufione ten-  
 5 tatus concluditur, & palpebra magno digito ad oculū premitur, eiq; addu-  
 citur, fimulq; hac illac exprimitur, deinde oculo aperto & mente ei adhi-  
 ta suffufionē confpicimus. In iis enim quibus humor nondū coaluit, fu-  
 fio quādam ex digiti imprefione oboritur ac primum latior apparet, rur-  
 fus in fuam & figuram & magnitudinē recurrit. At in cōfirmatis suffufio-  
 10 nibus nulla immutatio nec latitudinis nec figuræ ex imprefura obuenit.  
 Quoniam uero commune hoc eft indicium & eorum in quibus modice, &  
 illorum in quibus fupra modum humor concreuit, colore ipfos difcerne-  
 mus. Nam fi ferri aut marinæ aquæ aut plumbi colorem suffufio habeat,  
 moderate coaluit, & ad educationē idonea redditur: fi uero gypfo & gran-  
 15 dini fimilis color suffufionis eft, fupra q̄ par eft concreuit: Sed quia hæc à  
 Galeno didicimus, collocato ægrotante aduerfo lumine citra folem, oculo  
 fanū accurate deligabimus, & diductis alterius palpebris recedemus  
 ab iride appollata ad minorē angulum, quantū fealPELLI mucro fpatii conti-  
 net, atq; tum punctorii ftili mucrone locum designabis quem puncturus  
 20 es: in finifiro quidē oculo dextra manu functionē obiens: in dextro autē fi-  
 niftra. Atq; inuerfa punctorii fpecilli acie quæ ad extremum rotunda eft,  
 ualenter impingimus, & partem designatam ufq; ad uacuum intus finum  
 penetramus, idq; tam alte fiet, quā pupilla ab iride nuncupata diftat. Ex  
 fuperiori igitur parte uertici suffufionis ftimulū adigentes, (uidetur autē  
 25 confpicue ferrum, quod tunica cornea pelluceat) humoris colluuiem per  
 ipfam in fubiecta loca deriuabimus. Et fi protinus edufta fuerit, fiftemus  
 quiefcentes paululū. fin autem recurrerit, rurfus ipfam deducemus. Eua-  
 cuata suffufione, ftilum tollemus, leniter circumuertendo. Post hoc oculo  
 aqua eloto pauxillum falis cappadocici infillabimus, lanamq; oui lu-  
 30 teo madefcentē impofitam deligabimus, ita ut fanum quoq; oculū com-  
 prehendamus, ne unā commoueatur. Cæterū collocantes ægrum in do-  
 muncula fubterranea iubebimus prorfus ipfum conquiefcere, tenui uti ui-  
 ctu, adufq; feptimū diem illigatum nifi quid prohibeat. Post hunc folutis  
 ligaminibus uifum experiemur, oftendētes ei res quafdam uifibiles, quod  
 35 dum manu curamus, aut poftea, fieri diffuademus, quod ex cōnienti ad-  
 modum intuitu prompte rurfus suffufio repleatur. Si inflammatio urge-  
 at, etiam ante feptimū deligatura foluta, aduerfus hanc pugnabimus.

## DE AEGILOPE.

## Cap. XXII.



Egilops, tumens abfceffus eft inter maiorem angulū & nares  
 proueniēs. Vix curationem admittit, tum partium tenuitatis  
 40 caufa, tum periculi, ne oculus confortii lege indolefcant. Si igit-

*si p[ro]p[ri]o m[od]o a[ut] p[er] p[ro]p[ri]um*



tur per summa ruptus fuerit abscessus, totū id quod eminet usq; ad os excidendum. Et si ad malū sublumies deciderit, totā ipsam explicabimus. os autē cariem nondū sentiens, rademus. Quōd si iam carie uexatū est, ferro candēti aduremus, spongia frigida madēte, oculo imposita. Sunt qui post carūculā excisionē terebra usi, humorē, aut pus in nares deriuarint. Nos autē satis habuimus eousq; solum ferramenti ad ægilopem accommodatis adurere, ut squama abscederet. Ab uisione omphacomelle, uel sidioto, reliquisq; siccantibus præsidii utemur. At si ægilops serpat ad angulum summaq; inuadat nequaquam, tūc scalpello, quo aut prerygia, aut uenas secamus media anguli parte ad abscessum resoluta, carnes ex alto educemus, item mediocriter desicabimus. Vitri autē puluis tenuissimus ipsis insparfus, mirabiliter desiccat. Ad hæc aloē similiter cū manna. Reliquam uero ægilopum medicinam, tertio libro sumus executi.

SI MEATVS AUDITORIÏ NON

perforati sint.

Cap. XXIII. 15



le affectus à prima natali die contrahitur, mēbrana quadā auditoriū meatū obstruente, nūc per summa, nūc in alto. postea accidit facta exulceratiōe. siquidē caro supernasces ipsū ocludit. Itaq; si mēbrana auditū impediens alte inhærescit, difficilis erit curatio. Tentandum tamen est, tenui quodam instrumento ipsam incidere. si in summo fuerit, scalpro quod Græci scolopomacharion appellāt, hanc diuisam, ubi usus exigat, etiam auferemus. At si caro supercreuerit, hanc unguī scalpello aut spatula acutiore tollemus: deinde tortile linamentū ex uiliore panniculo spatioso meatus sinui aptatum aqua imbuemus: inuolutumq; chalcitide leuigata, aut huiusmodi quodā arido in meatū dēmittemus, ne rursus caro enascatur. Si inflāmatio male habeat, protinus id auferemus. Si fundat sanguinē, meatus, spongiā aqua frigida imbutam imponemus. aliisq; conuenientibus utemur remediis.

AD EA QVÆ IN MEATVM AUDITORIVM

inciderunt extrahenda.

Cap. XXIII. 30



Olet etiam in aurem incidere, non modo calculus, sed etiā uirum, faba, & siliquarū grana. uirū itaq; & calculus suam seruant magnitudinem: fabæ autē, & siliquarum grana, aliāq; id genus naturali madore corporis inflata, maximos cruciatus mouent. Conuenit igitur uel specillo, uel hamulo, uel uulsella hæc extraherē. Aut uiolenta capitis conuassatione, aure super circulū quendā imposita. Iam uero acu arundinea hæc subinde extraximus, exugētes etiam aquam auribus illapsam similiter, cera arundinis ambitū, quo auri iniicitur, obstruētes ne spiritui usquam sit exitu. Calculos & eius generis corpuscula, eduximus specillo lana inuoluto & in resinā terebinthinā, aut aliud quoddā glutinans demisso, eoq; in meatum auditorium coniecto leniter,

Sin ista nihil proficiunt, medicamēto quod sternutamentū prouocet, naribus indito, os & fauces obturato. Si ne horū quidem ulli cesserit prius q̄ inflammatio, conuulsio, & omnino periculū fuerit subsecutum, scalpello ipsa auferemus: figurabitur itaq; ægrotus, ut auris auersa sit ad basim ipsius retro appellatam fibrā, & lunata utemur diuisione exigua, retusaq; specilli parte corpusculū quod insidet, eximemus. Hoc ablato uulnus fibulis suemus, & medicaminibus ad cruenta inscriptis utemur.

## DE POLYPO.

## Cap. XXV.

**P**olypus tumor est præter naturā in naribus oboriens, ex martini polypodis similitudine nomen sortitus, tum quod illius carnem representet, tum quod suo complexu quemadmodū ille, caprantes ulciscitur, nares ipsorū comprehendens, ita & uiriū hoc laborantiū nares obstruit, id efficiens ut & difficulter respirent, & sermonē egre exprimāt. Duri igitur polypi, tactui renitētes, liuidi & maligni, seu cancri naturam inducētes, attingi non debēt. Friabiles autē magis, laxos, stupidos, neq; maleficos scalpello curare tentabimus. Figurato homine in scdili aduersus solis radios, & nariū meatu sinistra manu explicato dilatatoq; spatula ad id facta in myrtacei folii modū acuta orbiculatim polypū, aut carunculā dextra præcidemus, illic acie ferramēti imposita, ubi naribus adhærescit: secundū hæc auersa instrumēti parte quam cyathiscū appellari diximus, succisam carunculam foras eximemus. Et si quidē purū naris meatū uiderimus effectū, ad curationē descendemus. Sin reliquæ aliquæ polypi superfuerint, aliterius cultelli rasorii acie relictū corpus cū tēsiōne, agitatione & rasura ualētī auferemus. Malignos & peruicaces polypos candētibz ferramētis adurere consiliū est. inde remediis ustiōni dicatis uti. Postq̄ ferro satis effectū, spongiā exacte posca, aut uino imbutam in nares effundimus. Et si humor per palatū in fauces euaserit, bene se habēt munia scalpello obita: sin minus permeet, nota est carunculam polypi ossibus à colādo ethmoidibus dictis insidere, aut supremis narium partibus, quam instrumēta non comprehenderint. Linū igitur mediocriter crassum funiculi instar, seu duorū triū ue digitorū longitudinis in nodos constrictū, per specilli foramē transmittemus, alterumq; extremum specillo per nares sursum ad meatus colatorios inferetur: idem per palatū & os eiiciētes utraq; manu extrahemus, tanq̄ sarcomata nodis perforantes. Deinde funiculari linamēto meatū diductū habētes post tridū pastillo Musæ, & consimilibus, reliquias absumemus simul & locū exiccabimus. Postea uero pastillis cicatricem ducentibus utemur, plumbeas solenas naribus, si opus sit, per totam curationem accommodantes.

## CVRTA IN AVRIBVS, ET LA-

bris quomodo farciri possint: Græci uocant colobomata.

## Cap. XXVI.

B



Verita igitur in auribus aut labris, colobomata Graeci uocant, hac ratione curatur. Primum cutis ab inferiori parte soluitur: mox ora uulnerum contrahuntur, ac id quod in callum coaluit, aufertur. Deinde futura illis iniici debent, & conglutinantia.

DE EPULIDIBVS ET PARVLIDIBVS, QVAE SVNT  
gingiuarum tubercula. Cap. XXVII.



Pulis carnis tuberculum est iuxta dentium aliquem in gingiuis oriens. Parulis exiguus abscessus est, gingiuas infestans. Epulidem itaque uulsella, aut hamulo eleuata praecidemus. Parulidi in orbem excreta linamenta inferimus. Vidi autem subinde scalpello, quo uenas secamus, ipsam duntaxat punctam, & pure uacuato, cosanuisse. post ferrum, uino collui praecipimus. In sequenti die multa, tertio, anthera arida uulneri inducimus, usque dum curatio finiatur. At putredo gingiuis oborta si congruis medicamentis non curetur, candenti ferro ipsam aduremus.

QUOMODO DENTES EXIMANTVR. Cap. XXVIII.



Dens qui eximetur usque ad receptaculum suum circumdandi debet, inde forcipe paulatim concussus, extrahitur. At si exesus est, id foramen tenui linamento primum replendum est, ne confrictus sub forcipe confringatur. Eo exempto, sale tenuissimo insparso relietas carunculas consumemus. Postea uino, aut posca os collueatur dum consanescat. Quoniam uero superflui nonnulli dentes enascuntur, eos qui in naturali sinus inferti sunt, scalpris excindemus: qui non illis cauitatibus insinuantur, forcipe tollemus. Sin autem dens aliquis excreuerit, aut etiam confractus fuerit, nonnunquam rhinario, id quod excedit, superfluumque in eo est, consumemus. adiectasque ipsis, ut uerisimile est, squamas a uerso scalpello, aut rasorio, aut rhinario perpurgabimus.

DE LIGATIONE LINGVAE

quod ancylion dicitur. Cap. XXIX.



Ligatio linguae, quae ancylolossion Graecis appellatur, alias naturaliter accidit, membranis durioribus magisque: à prima origine curtatis linguam continetibus, alias ex acquisito ob cicatricem quampiam duriorē sub ipsa ex ulcere contractam. Qui igitur ex natura hoc uitium habet, eo quod tarde sermonem explicare incipiunt & uinculum sub lingua iusto magis appareat, exulceratione non praecedente, cognoscuntur. Qui uero ex acquisito, cicatricem manifesto conspicui habent. Collocari igitur debet & grotus in sedili ea figura ut linguam ad palatum suspēdeat, & nerueum illud uinculum transfusa plaga incidet. Quod si ex cicatrice aliqua ligatio prouenerit, hamulo transfixum, superiorē calum extrahemus, ac laterali facta diuisione ligationem soluimus, cura adhibita ne particulas alte latecres incidamus. Nam sanguinis profusio quae si sti nequeat frequenter inde secuta est. Post haec aqua frigida aut posca uul-

nus debet elui. deinde medicina utendum quæ relaxet & carnem inducat.

## DE TONSILLIS.

Cap. XXX.



5 Vemadmodum glandulæ induratz, strumæ appellantur, ita etiam tonsillæ inflammationē expertæ, aut supra naturalem modum auctæ, & ueluti desiccatz, cibi potusq; & spiritus iter impediētes, e regione utrinq; sibi inuicem oppositæ, eodem partis uocabulo, tonsillæ, Græce antiades uocantur. Quibus cum adest inflammatio, scalpellū admouere cautio est. ubi illa modice cōquie-  
 10 rit, num admoliamur, præsertim albis, cōtractis, angusta basi firmatis. Nam humiditate flaccescentes, rubicundæ, amplā basim habētes, facillime sanguinem profundunt. Collocato igitur homine aduersus solis lumen, iube-  
 20 bimus ut ore hiet, ministro caput cōtinēte, alteroq; linguā spatha ad id facta quam Græci glossocatochon appellant, inferiori maxillæ appri-  
 30 mus, ita ut non membranas simul euellamus. Deinde rotam ipsam ex basi amputabim⁹ scalpro ligationi dicaro *κακλότηρας* nuncupāt. Sunt enim duo eiusmodi instrumēta, aduersos acie inflexus habentia. Postq̃ una fue-  
 40 rit succisa, ad alterā eodem modo uice cōuersa ueniundum est. Functio-  
 ne scalpello obita, æger ex aqua frigida, aut posca gargarizabit. At si pro-  
 flutium sanguinis eueniat, etiam rubi, & rosarū, myrtiq; decoctio egelido  
 50 utetur. Si uero copia sanguinis prorūpar, plantaginis & symphyti succo:  
 item ex electro pastillo & lemnia sphragide posca soluta os collui debēt.  
 Cessante autē profluuio, proximo die rosarū flore, croco & amylo cum  
 lacte perungent ex aqua, uel oui liquore cādido, uel hydrosorato. Si sordes  
 60 ulceribus in creuerint, etiā ex melle & collutiōes & illitus cōmode adhibēt.

## DE VVA.

Cap. XXXI.



70 Vrgulio tanquam aliquod uocis plestrū subinde destillatio-  
 nem à capite recipit: idemq; præter naturā auctus, si oblongi-  
 or, tenuisq; fuerit, columella nūcupatur: si uero crassior in ro-  
 80 tunditatem creuerit, feraturq; deorsum, uua dicitur. utrinq;  
 autē nomen à similitudine factū est. Si igitur uniuersalibus, nempe & per  
 sanguinis dimissionē, & medicamento adhibitis uacuationibus nō abiga-  
 tur, neq; etiā remediis loco admotis, quæ astringāt, repellantq;, uel etiā di-  
 90 gerere possint, cesserit, ad scalpellū uenimus: ne cōtinuo irritatu, tussis, ui-  
 35 giliæ, interim etiā strangulatus subsequatur. Quæ igitur cōtractæ sunt, ro-  
 tundæ, nō oblongæ, cruentæ, uel subnigræ, non attingi scalpello debent.  
 Tenuēs autē, oblongæ, per summa graciles muris caudæ modo, remissæ,  
 sanguinolētæ non admodū, sed albicantes, eæ cūrandæ sunt. hæc siquidem  
 40 prōtinus inflammatione liberantur. Id autē ex uua præciditur, quod præ-  
 ter naturæ modū eminet. Etenim si ad finē illā præcidatur, extremani om-  
 nes thoracis regiones noxam percipiunt: & uox intermoritur. Itaq; si-

guratur ægrotus in sedili contra solis lumē, iubeturq; magnū hiare. deinde uulsella, aut specillo quod superuacū est prehenlum, inferioriq; parti adductū scalpello uuis accommodato, aut suturis, præcidimus. inde quæ in uasorū sectione cōprehensa sunt, agemus. Sæpe uero, aut propter laborantis timorē, sanguinis profluuii metū, medicamētū ue ariditatē, ferrū uirantes, adurēte potius medicamēto hanc absumimus. Conuenit igitur medicamento adurente quod in palpebrarū usthione dictū est, aut eius generis alio, uux ustæ sinus implere, ac homini magnū hiare iusso lingua per famulū forcipe constricta, instrumēto dilatato tantam uux partē comprehendemus, quantam etiā sumus amputaturi. Cæterū spissitudinē medicamentū habebit neq; liquidam, ne diffusē ab uua deerret subiectas autē partes adurat, ob quod ægro interdiciamus ne per totū usthionis tempus deglutiat, neq; omnino duram, quò facilius uux insidat, ac si ex uno ipsius iniectū summa uux pars nigruerit, abūde est: sin minus, etiā bis utemur, ægro per totū administrationis tēpus hiantē, ut salua eliquata simul cū medicamētū particulis extra os euadat, siquidem hora una emoritur. excidit autē tertio quarto ue die. Secundū usthionē, lana molli aut stuppa indice digito inuoluto quæ gurgulioni circū adhærescūt, extergemus, uel etiam aqua os collui iubebimus. At ceruicis regionē fomētis ex chamæmelino, tū in his tū in illis quibus tonsillæ ademptæ sunt ex confortii lege adiutabimus. Ad hæc gargarizationibus & perunctionibus similiter utemur.

QVOMODO SPINAE GVTTuri eximantur.

Cap. XXXII.



Euorantur subinde inter edendū spinæ, aut pisciū, aut aliorū quorūdam, diuersis in partibus. Quæ igitur in conspectū ueniunt, uulsella, quam Græci propriè appellāt acanthobolon, eximemus: quæ inferius ad ipsas fauces peruenerint, alio modo. Sūt qui dicant maiores moles esse deuorandas, exēpli gratia, caulē lactucarum, aut buccellā panis. Alii uero spongiā puram mollemq; exigue magnitudinis lino illagatā deglutire iubēt, linoq; apprehēso retrahi, idq; frequēter efficere ut spina impacta spongiæ educatur. Leonides autē iubet cataplasmatris uti quæ constoquant, cuiusmodi ex cruda polēta conficiuntur, quo spina in pus redacta sua sponte excidat. At si eadē hora aut etiam ante uētriculi concoctionē in ægrotū inciderimus, eo quod infixū est nobis non cōspicuo, uomere iubebimus digitis aut pinnis in os dimissis. Nō nunquam enim, id quod est infixum unā cum uomitu educetur.

QVOMODO GVTTVR INCIDI DEBEAT. Cap. XXXIII.




Hirurgicorum præstātissimi hæc quoq; administrationē literis prodiderūt. Antyllus itaq; hūc in modū scribit. In synanchichis quidē, ut in ea parte dicitur, quæ uisus rationē tradit chirurgicā improbamus, cū inutilis sit præcisio, in quibus o-

mnes arteriæ & pulmo affectus est. In ore aut & mēto inflammationē experiuntibus, aut etiam tonsillis faucibus, os operiētibz, incolumi quidē arteria, ratio est guttur incidere, quo periculum strangulatus euitetur: dein de cū infra gutturis caput spatio triu ipsius quatuor ue circulorū manu adegerimus, partē nonnullam arteriæ amputabimus, totam enim diuide re securū non est, tum quod hic locus excarnis sit, tum quod uasa procul à loco diuisa, sint dissita. itaq; cōcusso ægroti capite posterius, ut guttur red datur conspicuum, trāsuerfam scētionem inferemus, inter duos circulos ipsum statuētes, ne cartilago, sed mēbrana cartilagine inuoluēs, discinda tur. At si meticulosior aliquis inter agendū fuerit, hamulo prius cutē eleuatam diuidet: deinde sic ipsi gutturi incidēs, uasis, si forte sublabātur, præteritis, lineā ducat. Hæc quidē Antyllus, coniiciēs guttur præcisum, tum quod spiritus per id cū murmure quodam erūpat, tum quod uox intercisa sit. ubi uero de strangulatu metus amplius non est, oras uulneris tectas factas futuris cōmitteremus, ita ut sola cutis citra cartilaginē fibulis trahiat, utemurq; medicamēto quod cruētis facit. Sin minus cōglutinetur, præsidio quod carnē inducat insistemus. Simili uero curatione utendū etiam, si quis nobis obrigerit qui mortis desiderio iugulum sibi incidere.

DE ABSCESSV.

## Cap. XXXIII.

20  Vnde abcessus carniū, uel partiū carnosarū corruptela mu-  
tatioq; sit, quomodo generetur, quotq; eius sint differentia,  
quarto libro abunde tractatū est. Nunc aut̃ quemadmodum  
manu scalpelloq; ei medendū sit, exponemus: cū omnino in  
pus transierit. Hoc aut̃ deprehēdimus inde quòd dolores, febris, si præcel-  
25 serit, rubor, pulsus & reliqua inflāmatiōis signa minora tunc appareant.  
ubi iam tumor in mucronem fastigiatus est, & pus digitis innixis sublabi-  
tur, præsertim cū summa occupat abcessus, tūc ad scalpellū ueniendū est.  
Si uero neq; ad tactū substat, neq; fastigiatur, quòd in alto deliteat, aliis  
mutationis notis adtendētes, manū admolimur. Sciendum uero est cru-  
30 dos interim ipsos priusq; ex toto in pus mutati sint, incidi, si aut articulis,  
aut principibus particulis uicini sint, ne ligamentū, aut aliquod membris  
necessarium assidua putredine pariter cōtabelcat. Porro abcessus digito  
proximos crudos antequam in totū ematuruerint, diffecari Hippocrates  
præcipit, ueritus ne perforationē experiantur. Incidūtur ergo non omnes  
35 simili linea, sed naturali, ut in fronte: & pilosis locis, ut in capite, cura deco-  
ris quantū licet, habita. Recta uero linea artus secamus, uel uti in musculis,  
diligentiam adhibētes ne & neruos & arterias & principales particulas at-  
tingamus: interim in rectū, interim transuer sum abcessū prout cuiusq;  
usus exigit, diuiso. In minoribus unam scalpello sectionē molimur: in ma-  
40 gnis plures, iuxta amplitudinis rationem, ubiq; ea quæ tenuiora sunt & ef-  
fluxioni idonea, incidentes. Illos sane abcessus qui plurimū fastigiantur,

various other  
various other  
various other

qui erant in illis  
in abbatibus.

crudi, tenues, & emortui sunt, plaga in trianguli, aut myrtacei folii, aut al-  
 terius anguli figuram facta. diuidimus, cum circularis ad cicatricē recipi-  
 endam sit inidonea. Qui uero non in fastigiū attollūtur, eos simplici dun-  
 taxat linea diffecamus. At ubi magnū sinum inuenimus, si cutis superin-  
 iecta carnosa sit, & queat conglutinari, diuisione loci ea duntaxat utemur, 5  
 quæ humoris emissario conueniat. Sin tenuis admodumq; ex carnis, totā  
 in longitudinē simpliciter diffecabimus. Inde si corpora utrinq; sita graci-  
 lia ualde & non carnosa uideantur, ipsa tollemus. Administrato iam scal-  
 pelli munere, spōgia locus foueri debet: si paruus est abscessus, unaq; diui- 10  
 sio, simplex linamentū inferemus. Si magnus est & plures incisæ lineæ, im-  
 plicitum aliquod in longitudinē linamentum, lemniscum Græci uocant,  
 ipsis demitteremus, ipsas similiter plagas linamētis replētes. Quod si erumpat  
 sanguis, aqua frigida, aut posca utendum. si ita non substiterit, chalcitidis  
 pollinē inspergemus, eoq; frequēter ob flaccidam humore puri redi- 15  
 nem utemur. Splenia si hyems est, & partes sint neruosa, ænelzo imbuta  
 deligabimus: sin æstas, & partes carnosa, hydrelzo, aut ipso quoq; ænelzo  
 frigido tincta illigataq; sequenti die eisdem liquoribus superfundemus.  
 Post tertiu diem soluūtur, & per spongiā fortū adhibētes ietrapharmaco,  
 quod in linteola illinitur, utemur. Si inflāmatione caret uomica, idem fo-  
 mentū ex medicamine linamētis illito accommodabimus. Si inflammatio 20  
 adest, cataplasma quod concoquendi uim habeat, iniiciemus, superfusio-  
 nibus antea usi: ubi cessauerit inflammatio, medicina quæ pus maturet, &  
 carnem inducat, medebimur. Cæterum sinus glutinantibus remediis, ut  
 quarto uolumine de sinibus comprehensum est, curabimus.

## DE STRUMIS.

Cap. XXXV. 25



Truma, quæ Græce chæras dicitur, glandula est indurata, in  
 ceruice, alis & inguinibus potissimū enascēs. Nomē habet à  
 chæradis petris, aut suibus, quod numerosæ sobolis existant,  
 aut quod colla habeāt glādulosa. Oriūtur aut strumæ in prio-  
 ri ceruicis parte, aut in altera, aut utrinq; una, aut duæ, aut plures. Omnes 30  
 autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, athero-  
 mata, & melicerides. Quæ igitur indolent attactu, & medicamentis impo-  
 sitis deteriores reddūtur, malignæ sunt, quas etiam carcinodas aliqui dixe-  
 runt, notūq; est omnibus per manū curationi ipsas nō cedere. Morigeræ  
 autē ac blādæ tū tactui, tum cōgruo medicamentorū usui, hoc modo tra- 35  
 ctandæ sunt. Superficialiæ igitur, & in cutē erumpētes, simplici linea diuisæ,  
 ab incumbētibz dissoluūtur: orarū cute hamulis distēta, mēbranæ excori-  
 antur, ut in uasorū confectiōe, quam angiologiā uocauim⁹, expositū est,  
 ac paulatim eximētur. Maiores aut strumas hamis transfixas suspende-  
 mus, & similiter excoriatæ corporibus eas continētibus undiquaq; libera- 40  
 buntur, animo adhibito ubiq; ne arteriæ, quas carotidas uocāt, & netui re-



currētes uiolentur. At si uas aliquod diuifum opus adumbret, funiculo id excipietur, uel per mediū amputabiſ, niſi magnū fuerit: ubi in arētū ſtrumę baſis uenerit, dextre ipſa præcideſ: ac indice demifſo tētabimus nū & aliz ſinr ſtrumę adiectę quę eodem modo auferētur. Quod ſi magnū ali-

15 quod uas aut etiā plura ſubinde in ſtrumę fundo eſſe ſuſpicemur, non ex baſi ipſam excindere, ſed funiculo excipere cōuenir, quò particularim citra periculū ſua ſpōte excidat, quo tēpore medicamento in linolea illito, curatio rētabitur. Si uero inde excindātur, oras cōmittemus. omnino aut rectas diuiſiones adhibere oportet. Atq; ſi nihil ſuperfluū habuerint, inde

20 ſibulas iniiciemus. Sin ex ſtrumę rumore cutis ſit amplior, parte ipſius myrti inſtar ablata, ſuturis utemur, & medicamē cruētis aptū iniiciemus.

DE STEATOMATIS, ATHEROMATIS & meliceridibus. Cap. XXXVI.

15 **A**ec quoq; in abſceſſuū genere cōprehendūtur: ſed hoc diſcrimine ab illis uariant, quò abſceſſus proprie dicti inſlāmatio nē dolorēq; teſtētur, & acrē humorē, ac rodentē cōtineāt, nūla peculiari mēbrana, aut tunica incluſi. Cæterū illa inter ſe quoq; diſſerūt, quòd humor in ſteatmate contrētus, appellationi cōgruēter ſeuo ſir perſimilis. In atheromate, pulti frumētaceę. In meliceride, hu-

20 mor mel repræſentet. Agnoſces ipſa hūc in modū: Steatoma aliis durius eſt, tactui renititur, & baſim habet ſolidiorē. Meliceris laxi cuiuſdā corporis modo ſubſidet, & tardē quidē funditur: cito aut ruriſ ſuccreſcit. Curātur hæc quemadmodū ſtrumę, incifione, excoriari, ſuturis & reliqua curarione, id ſolū cauendo, ne mēbrana uulneretur, unde humor qui cōtine-

25 batur, profuſus operationē impediāt, & pars ipſius relinquatur. nam renaſcendi illius occaſionem plerunq; in brachiali malleolo & articulamētis motui dicatis exhibet, quemadmodum etiam ſtruma uel tota, uel portio ipſius relicta. quod ſi huiuſmodi quippiam fuerit deprehenſum, ſatius eſt non fuere, ſed exedentibus medicaminibus reliquias abſumere.

30 DE ANEURYSMATE. Cap. XXXVII.

**N**eurysma tumor blādus tactu eſt, digitisq; cedit, ex ſanguine & ſpiritu cōtractus. Galenus de eo hūc in modū ſcribit: Arteria aperta, affectus aneurysma uocatur. Fit autē eadem con-

35 uulnerata, quoties exterior cutis cicatricē duxerit, arteria uero ſine cicatrice remāſerit, nec coaleſcēs, nec carne obſtructa. Agnoſcuntur huiuſmodi affectus arteriarū pulſu, imò etiam prementibus nobis tumor quodammodo euaneſcit, ſubſtantia quę ipſum efficit, in arterias recurrente. Hęc quidē Galenus. Nos autē ipſos hoc modo inuicē diſcernimus. Qui a aperta arteria ſunt, prolixiores apparent, & in alto conſtitutur: digitisq; impreſſis ceu ſtrepitus quidā exauditur, cum nullus ſonus in

40 iis qui rupturę feruntur accepti percipiatur: illi uero rotūdi magis ſunt,

& per summa oboriūtur. Quæ igitur alas, inguina & ceruicē infestant, aliaq; loca eximie magnitudinis aneurysmata curare propter uasorum amplitudinem non tētabimus. Quæ uero summas partes, artus uel caput affligunt, hac ratione aggredi cōuenit. Si quidē ex arteria dilatata tumor ob uenerit, cutē linea recta in longū incidemus: deinde diductā orā sicut in uasorum dissectione dictū est, excoriātur, & scalpellis quibus membranz auelluntur circumpurgata arteria nudabitur: acu traiecta duobus funiculis deligatur, puncta prius scalpello per mediū: ubi cum ambiēti mēbrana unita fuerit, curatione pus maturante utemur usq; dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteriæ creatum sit aneurysma, totum id quatenus fieri licet, cum cute digitis apprehēdendum est, deinde acu duplex linum trahente, inferius eo quod exceptum est transsuendum. Et post acus traiectum ansulā forfici præcidere oportet, atq; sic duobus filis hic illic tumorem deligare, ueluti in staphylomate comprehensum est. At si metus sit ne fila circumuoluantur, altera etiam transmittenda est acus per totū quæ priorem premat similiter duo fila ducēs: amputata ansula ex quatuor ita tumorem deuinciemus, uel tumore per medium ad aperto post excretionem cutē adimemus, eam quæ ligata est relinquentes, ac splenium ex æne lāzo imponentes, remediis in linamenta illitis utemur.

## DE CERVICIS TVMORE QVI

bronchocele dicitur.

Cap. XXXVIII.



Randis in ceruice, & rotūdus tumor fit, inuento ab interiore parte nomine, quam bronchon Græci appellāt. Duplex eius tumoris differētia est. alius enim adipe tumet, qualia sunt in abscessuū genere, quæ iudem Græci steatomata dicunt: alius partium uasulā dilatatiōe accidit. Atq; hūc notabim⁹ ueluti & aneurysmata, desperatūq; fugimus: cū similiter uniuerſa aneurysmata periculosa habent administrationē: præcipue uero quæ circa ceruicē oriuntur, ob arteriarū magnitudinē. Qui adipe inturgescit, steatomatis similiter curari debet, discretis, præteritisq; uasis, eo nimirū modo quē in strumis exposuim⁹.

## DE GANGLIIS.

Cap. XXXIX.

Anglion, nerui est cōeretio, ex ictu, aut labore proficiscens: plerunq; uero in manus iunctura, quā cum brachio cōmittitur, talo, & articulamētis absoluitur, quanq̃ in aliis quoq; partibus proueniat. Hæ comites sunt notæ, tumor concolor, tenitens, indolensq;. At si uiolenter premas, stuporis sensum exhibet, non in alto, sed ipsa sub cute radices agēs, & ad latera spectās. sin autē ui adigas, tum antē, tum post, nequaquam id facit. Quæ igitur in cturibus aut brachiis aut summis partibus oriūtur, exindere tutū non est: periculum enim ne particula reddatur mutila. At quæ caput aut frontem inuadunt, cute scalpello diuisa curamus, & si quidē parua fuerint, uulscella cōprehenſa ex basi præciduntur:

si maiora, hamis transfixa exoriataq; tolluntur: oras futuris committas, medicamento ad cruenta apto perfanamus.

## DE SANGVINIS DETRA-

ctione per uenas.

Cap. XL.



¶ Tsi omnibus satis constet, quomodo sanguis per uenas mitteri debeat, tamē ne parti chirurgicā aliquid delit, & propter artificiosas ipsius distinctiōes, committendū non est, quin de ipso uerba faciamus. Primū itaq; uenā sectionis consiliū est, ut sanguis qui redūdat, euacuetur. Copia uero ipsius duplici modo capi demonstrata est, uno ad uires, uenā licet plenā non appareant: in quo statu homo protinus infirmatur & uiribus destituitur: natura ceu ad graue aliquod onus ferendū impotēte. altero uasa quāz in continēt in alia pondus loca trāsfundere spectātur: et si uirtus haud eū molestia ipsum tolleret. In quibus ruptis interdū uenarū cōmerciis sanguinis spurū, aut aliaz fluxiones acidiūt. Copia igitur, quāz ex uiribus aestimatur, corporis grauitas, nota est. Venarū copia tū extēsiōe, tū quōd illā plenā tument agnoscitur. utraq; autē uacuationē necessariā indicat. Itaq; per morbi initia sanguinem usu id exigēte demittes, sola in uētrieulo eiborū concoctione, aut etiā perfecta in iocinore sanguinis elaboratione expectata. At si inter initia ob eausam aliquam sanguinis detractio prātermissa fuerit, uel ultra se primanā eū mittere alienū nō est, si necessitas postulet, & uires non dissuadeant. Cāterū qui uenam in eisurus est, id habet inspiciendū, num multa stercoris retētiō intestina urgeat. Quod si ita deprehēsum est, molli clystere aluus antea uacuari debet: ne uenā putridam aliquam excrementorum colluuiē ab intestinis attrahant. Iis igitur qui ob morbi necessitatē, sanguinis detractiōē requirūt, quouis tēpore uenam incidemus, si particularium duntaxat in febribus accessiōnū uigorē seu statum excipiamus. At si continēs febris extiterit, maturinū omnino tēpus magis idoneū est. Qui uero nullo morbo urgente, sed prāeuidendi illius gratia sanguinis uacuationem postulant, his uer opportunum est. Porro in ætatibus usq; ad quartumdecimū annum sanguis mitti non debet, sicut etiam post sexagesimū, nisi necessitas quædam inuitabilis huc nos cōpellat. in summa imbecillis uiribus præditi, hanc uacuationē uitabūt. Cāterū in particulis recens inflammatione tentatis, ex opposito inanitionē moliri conuenit: in uetustioribus, ex propinquo: siquidē ex omni corporis parte sanguinem mittemus: frequētius autē ex interiori cubiti uena. Verum id considerandum uenit, interiori & alatiæ dictæ uenæ, per torū, arteriam subici: medig neruum: superior quæ & humeraria dicitur, periculi expers est. Ac in capitis morbis humerariam incidimus. In his qui infra ceruicem affligunt, alariam: media utrisque conuenit. ligamine igitur arcto partem aliquam circa brachii musculos deligare oportet, & frictiōe manuum alter-


nante, repletam uenam usui commodā intrepide per totam ipsius latitudinem solam diuidere. Etenim maiores hac plagē, egre cicatricem admittunt: arctē nimīū inflammationē experiuntur, præterquam quod crassioris succi transitū impediāt. In quibus autē & secundo & tertio die, interim uero & quarto sanguinē detrahendū esse metuimus, obliquius uena secari debet, quo manus inflexu dehiscēs nō protinus cicatrice obducatur, sic enim uisum est Anryllo. At quantū euacuabitur, ex uirium robore, & morbi magnitudine metiemur. Si humoris copia subest, & materia effruescit, una uice usq; dum anima deficiat extrahemus, uirtute uidelicet robusta, sic autē ut æger non ex humoris in uentriculum confluxu deficiat: ob quod etiā multi ante iustam uacuationē per initia statim animo destituuntur: uerum eius deliquiū his uacuati humoris ratione obuenire oportet. Iam uero si magnā uacuationem res postulet, uires autē sint inualidæ, distribuenda erit inanitio: ac primū parcius detractō sanguine denuo idē auferetur: si res exigat etiā tertio. Cæterum uacuare solemus corpus uersum non modo succis æquabiliter exuperantibus, quem statum Græci plethoricon appellāt ueluti & Galenus tradit, sed etiam propter affectus magnitudinē, quanquam totū corpus humoribus uideas commoderatū, quemadmodū in sanguinis ex naribus, aut alia parte profluitio, quod nō copia excitauerit: ac uacuare reuulsorio modo ex oppositis conuenit. Quinetiam in ualida inflammatione idē faciendū est, sicut in colicis & renibus calculosis, lippitudine, & iis quæ tā præcipiti modo urgent. Nam dolor & partis inflāmatæ calor defluxioni præbent occasionem, licet uersum corpus superfluitatibus careat. Quapropter parcius id tunc faciundum est, uacuatione adhibita, quæ potissimū laborantis ætati, & naturæ cōpetere uideatur: cōsiderato etiā anni tempore, loco, & ægrotantis cōsuetudine. Porro in quibus prope uenam quæ diuidetur magna quædam est inflāmatio, quemadmodū in pleuriticis & iocinorosis, optimū est expectare, dum color sanguinis, & substantia mutetur. Diuersus autē est in inflāmatione sanguis, à naturali: quoniā largius incalescēs, si quidē prius erat crudior, rubicūdior magisq; flauus euadit: si autē talis prius extiterit, in nigrū adustus mutatur. Non tamē ex toto mutationē ipsius expectare consiliū est. Est cum & ante illam cessare conueniat, idq; duplici de causa, aut ob uirū imbecillitatē, quam ex pulsuum tactu cognosces: sunt enim ipsi inæquales uehemētia, & magnitudine, uel etiā languidi, & tenor fluxionem rumpens imbecilles iam uires notat: aut propter inflāmationis malignitatem: nonnunq̃ enim nihil remittit, sed uehemēter impacta est. At si nihil horum obstiterit, ægerq; floridæ ætatis sit, expectanda est sanguinis mutatio, magisq; si ambiēs aër temperatus fuerit. Si uero sanguis ante cōgruam uacuationē fuerit suppressus, id autē accidit aut propter timorē, & animi defectū, aut sanguinis grumū, aut uiolentam constrictionē, cōtra

singula pugnabimus. Animam deficientē, odoratis naribus ad motis resco-  
 cillantes: constrictiōne, uinculo remisso soluētes: in grumū coactū sangui-  
 nem, uel olei infusione, uel digitorū foru dissoluētes. Reliqua sanguinis di-  
 mittēdi præparatio nulli non cognita est: uerū hæc in cubiri uenis fieri so-  
 lent. At ex fronte sanguis detrahetur in capitis doloribus ita: capite fomē-  
 tis adiuro, ligamine ceruicem uinciēmus, digitis super guttur interpositis  
 ne suffocatu ægri intereant: repleta iam uena in frōte, acie scalpelli diuidē-  
 tur. Eodē modo etiā circa guttur exrantes uenæ sphagitides appellatæ ob  
 uetustam lippitudinē aduersa scalpelli parte scindētur, ita ut sanguis erū-  
 pat. Itē uenas linguæ subditas, ueluti in anginis, transuersas incidimus, cui  
 tanres constrictiōne. Nonnulli uero in maioribus oculorū angulis uenas  
 eminētes, sicut in lōgis capitis, uel oculorū morbis, similē in modum diui-  
 dūt. In quibus internas quoq; nariū uenas uel mucrone scalpelli contun-  
 dētes, uel quibusdā asperis irritātes disrūpunt. itē post aures sitas ob capi-  
 tis affectus feriūt. Quæ uero popliæ perreptant, in renū cruciatibus aperi-  
 untur. Quæ extremas corporis partes intercurrūt, superiacētibus uinculo  
 exceptis & manu frictiōne, & pedū incessu repletæ diuidētur, in sinistra  
 quidē manu, cū liene male habet, uenā quæ inter paruū mediūq; digitum  
 porrigitur, præcipue incidemus. cū iecur affligitur, in dextra. Nam extre-  
 marum partiū inanirio, è lōginquo magis facta efficaciorē molitur reuul-  
 sionem: in pede, ueluti cum coxendicū dolores aut uteri uitia urgent, eam  
 quæ supra anteriorem malleolum eminet, dissecabimus.

## DE SANGVINIS DETRACTIONE PER

cucurbitulas.

Cap. XLI.

25  Cucurbitulis neq; per affectuum initia, neq; cum corpora sunt  
 plethorica, utemur: sed iis prius euacuatis, cumq; nihil particu-  
 larz influit. Vfus eius est mouere aliquid, agitare, & foras ex-  
 trahere. Leuis itaq; cucurbitula inflationes discutit, distillatio-  
 nes in stomachū suspēdit, sanguinē attrahit, & profluentē rursus sistit, ob-  
 30 iectis partibus admora: & quod alte conditū est, in summa rursus educit.  
 in torū humores traducit, spiritus euacuat. At quæ cum scarificatu adhi-  
 betur, efficacius ipsos per halitū egerit, sensibilibiter ex alto ea quæ nocēt eli-  
 ciens: quippe nō modo sanguinē, sed alios quoq; humores uacuat, præfer-  
 tim cum flamma ampliore adglutinata: uerū si à carnosis particulis detra-  
 35 ctionem moliri stauimus, primū curis scalpello exasperanda, deinde cu-  
 curbitula imponenda est. Sin excarnis magis pars fuerit, leuem prius cu-  
 curbitulam defigemus: ubi in tumorē particula eleuata sit, scarificatu adhi-  
 bito, rursus ipsam accommo dabimus: & si paululū uacuare cogitamus,  
 una diuisio abūde est: sin amplius, plures adhibētur. Item si tenuiorē qui  
 40 continetur sanguinem acceperimus, summa scarificari, si crassiorē, al-  
 ta debent: quando etiam concretū ex ictu sanguinem educere animus est.

Terminus autē moderatę diuisionū altitudinis est, sola cutis crassitudo. Nonnulli instrumentū ad hoc excogitarūt tribus scalpellis aequalibus simul iunctis, ut unica iniectione tres fierēt plagę, uerū hoc nos inutile putantes simplici scalpello contēti sumus. Alii cucurbitulis usi sunt uitreis, ut sanguinis qui uacuatur mensura in extractione pelluceat: uerū æneę cum maiorē sustineant flammam, multo sunt efficaciores uitreis, quę facile dirūpuntur. Quinetiam quę ex cornibus, ore sugentes trahūt, minus quidē inaniūt, non autē siceant, quemadmodū quę cum flāma si opus fuerit, adhibētur. Ceterū cum admoturi sumus cucurbitulam, particulā in rectū figuratā ex latere hanc defigemus. Si enim iacētibus ipsis desuper li-  
 10 namentum ex lucerna simul cum flamma inducamus, ex cute decidēs illa grauitur adurit, usu hoc non postulante. Est cum cucurbitulę magnitudo subiectę parti adequabitur, eaq; de causa permultū cucurbitulę & paruitate & magnitudine differūt, quemadmodū etiā collo prolixiores & spatio inferiori latiores aliis effeicius extrahūt. Cauēdum autem ne prope  
 15 māmillas cucurbitula applicetur. nam illapsę cucurbitulis nonnūquam māmę & inturgescētes ualde haud facile ipsas relinquūt, atq; tūc spongię ex calida cucurbitulis circundare oportet, sic enim remittūtur: sin minus hoc modo fuerint laxatę, perforari ipsas ratio est.

QVOMODO ALAE ADVRANTVR.

Cap. XLII. 20



Vmeri articulo luxato in nōnullis caput frequēter & cōtinuē excidit, uel humiditatis superantis uitio, uel quod cōtinuē luxationi opportunus locus euaserit, quando ad uersionē descendere oportet. Proinde egro, aut supino, aut in sanū latus inclinato, interiorē alę cutē quā potissimū articulus excidit, duobus sinistrae  
 25 manus digitis, uel hamulis tenuibus & oblongis eleuatā, candēti ferro adurere oportet, quousq; ferramentū contraflexū uno impressu duas crustas excitari, & si magnū intercedēs harum spatium fuerit, mucrone scalpelli per ipsas traiecto, aliam in medio crustam faciemus, adurētes usq; dū cauterium scalpello inciderit. Item alias duas Hippocrates iuxta utriusq; di-  
 30 ctę mediā fieri cōsultat, æquali illis spatio distātes quadrangulę figurę modo. Altius autē cute non penetrabimus, quod nerui, glandulę, aliq; ad inflammationem creandam procliuiā, difficultatemq; functionū, subiecta sint: curari adusta debent porro cum sale trito imposito, tum aliis præsidiis ad crustas inscriptis, postea manu operandum caute fuerit.

DE ADNATIS DIGITIS ET

sexto digito.

Cap. XLIII.



Adnascuntur digiti in manu nūc prope maiores digitos, nūc prope exiguos, raro autē uisi sunt iuxta aliorū aliquē. Eorū uero qui adnascūtur, alii per totū carnosī sunt, alii ossa in se cōti-  
 40 nent, nonnūq; & unguēs. Ossa habentiū, hi ab articulo pro-

cedunt, cuius commissurā alteri digito cōmunicant, illi ex naturalium digitorum fissura oriunt: atq; huiusmodi perpetuo sunt immobiles: reliqui mouentur nonnunq̃. Carnosorum expedita est praeçisio. nam scalpello quod superuacuū est una uice tollimus. Eorū qui ab articulo prodeunt difficilior est tractatio illis qui à digitorū fissura originē traxerunt: primū caro orbiculatim usq; ad os excindit, ipsumq; os excisum aut erasum, auferretur. Cæterum inter curandum radimus ipsa, & cicatrice obducimus, quē admodum etiam in ossium uulneribus declaratum est.

QUOMODO PURULENTIS ADV-

stio adhibenda.

Cap. XLIII.



Stio efficacissimū purulentis praeçidiū inuentū est. Cōuenit igit ferro candenti crustas excitare: unam inter clauiculā cōpagem cute sursum eduçta. duas aut exiguas iuxta mentū, sic ut ab arteriis quæ carotides appellantur, recedatur. Duas itē sub mamillis ampliores inter tertiam quartamq; costam: alias duas inter quintam & sextam paulū in posteriora spectantes: aliam, per medium petus: rursus aliam supra os uentriculi, tres posterius: per medium dorsum unam, utroq; spinæ latere duas, quæ in dorso factam crustā excedant non admodum extātes. Alii, ut tradit etiā Leonides ferro mucronato candenti per medias costas quā abcessus est, adacto, usq; ad pus uisionem moliti sunt. Nonnulli etiam hos curare ausi sunt, trāuersā lineā quinq; aut sex costis per mediū diuisis paulo infra cutē, atq; deinde scalpello mēbrana quæ costas succingit perforata pus excreuerūt. Atq; hi cum illis qui ferro usq; ad imum adurunt, aut statim mortem inferunt, uitali spiritu confectim unā cum pure euacuato, aut fistulas reddunt insanabiles.

DE CANCRO.

Cap. XLV.



Ancer, tumor est inæqualis, oris prætumidis, aspectu teter, liuidus, & indolens, interim sine ulcere, quē Hippocrates latente nominauit: is si curet, peior euadit: interim exulceratus: nā cū ex atra bile ducat originē, magna parte eroditur. Pluribus quidē corporis partibus accidit, præcipue scēminarū locis, & māmīs, quæ uenas undiquaq; turgidas habent, quemadmodū cancer animal pedes, unde etiam nomē sortitus est. Quæ igitur per medicamēta curatio adhibet, quarto uolumine abudē explicata est: eius autē canceri qui uulū infestat, tertio. Quoniā uero partes putrefactæ, aut quæ, ut simpliciter dicā, naturæ modū exceßerūt, ablationē sui postulant, uulūq; canceris, nec utiliter manus admouetur, nec potest quidē. Galenus autē solam administrationem quæ per sectionē fit, recipiēs, hoc modo scribit: Si quando cancerū scalpello curare audebis, incepisse uacuationē à melancholici humoris purgatione oportebit, ubi iam torū quod uitiatū est exacte præcideris, sic ut nulla radix supersit, sanguinē effluere finito, nec celerius eum cohibebis, uerum

C

It. pp. 166. d. 1. p. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Cancer purulentus in māmīs & scēminarū locis.

Cancer in māmīs & scēminarū locis.

supra 166. d. 1. p. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Gal.

purgatio melancholici humoris per sectionem & ablationem.

166. d. 1. p. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



etiam premendo uicinas uenas, crassiores ex ipsis sanguinem exprimes: deinde aliorum ulcerum modo curabis. Hæc quidem Galenus memoriz prodidit. Reliqua uero maligna putrida; ulcera, nempe phagedænas, granas, & conlimilia eodem tractare modo debes.

DE IIS QVIBVS MAMMAE FOEMINARVM

modo inturgescunt.

Cap. XLVI.



Vemadmodum fœminis, ita masculis quoq; pubertatis tempore, mamillæ modice instantur: sed pleriq; rursus subsidit: in nonnullis sumpto initio crescunt pinguedine subnascente. Cum itaq; indecora hæc corporis figura muliebris habitu-  
nis notā repræsentet, digna est cui manus admoueat. Lunata per imam mamillæ partē linea ducitur cute detracta: ademptaq; pinguedine, futuris committetur. At si forte mamilla partibus ipsius ob magnitudinē ad ima, ut in mulieribus, inclinauerit, lunatas duas plagas in extremis inuicē coeuntes iniiciemus, ut minor à maiore comprehendatur. Cute quæ intercedit cum pinguedine adempta, similiter fibulis utemur. At si aberrantes minus exciderimus, tunc eo quod superest rursus adempto, futuras iniiciemus, & medicamentum cruentis idoneum accommodabimus.

QVOMODO IECUR ADVRATUR.

Cap. XLVII.



I dolor cum grauitate iis oboritur, quibus iecur abscedit, carnea ipsius substantia uitiata ostenditur. Si acutus dolor magis urgeat, puris in tunica collectio: adurere hoc modo oportet. ferrū candens mucrone tenui, paulo supra inguen quæ iecur desinit, iniicitur: ut crustam unam excitet. Vbi uero totam cutem aduulserit & usq; ad tunicā penetrauerit, pus excernetur. Ab euacuatione omphalici cornel utiliter adhibetur, tum ea quæ mulla & speciebus ad carnem creandam componuntur: postea uero etiam cicatricem ducentibus utemur.

QVOMODO LIEN ADVRATUR.

Cap. XLVIII.



Vtis quæ lieni incumbit, hamo eleuata, oblongo ferro candenti per totū ipsa aduretur, ut unico impressu duæ fiāt crustæ, quod omnes crustas numero sex habeas. Marcellus autem tridentem, quam trixnam Græci dicunt, aut tridenti simili ferramento utens, uno adactu crustas excitaui.

QVOMODO STOMACHVS ADVRATUR.

Cap. XLIX.



Nlongis stomachi defluxionibus, recēiores usi sunt adustione. Alii ferro mucronato cādenti tres crustas molitunt, unā iuxta cartilaginē mucronatā quæ Græcis uocal xiphocides: alias duas inferius triāguli figura, altas ut cutē diuiderēt: Alii unam duntaxat adhibent, ampliorē supra ipsum os uētriculi. Sunt, qui ne ferro quidē utant, sed ifcis appellatis: sunt aut hæc spongiosa quædā corpora in quercubus & corylis nascētia, barbaris magis usitata. permittunt autē uul-

nera sine cicatrice diu manere, imò etiam prius diuidunt, ut maiore per ipsa diffilari os uentriculi ab influxionibus immune permaneat.

QVOMODO A QVA HYDROPLICIS  
emittatur.

Cap. L.



Vomodo aqua intercus contrahat, quot sint ipsius differenti-  
tiaz, quæ causa, quæ notæ, quodq; remediũ, tertio uolumine su-  
mus executi: ubi & demonstratũ est, illud solũ aquæ inter cu-  
tem genus quo in uterum aqua cõfluit, asciten dicũt, manus  
operã postulare. Atq; eam hoc loco explicabimus. Itaq; rectus homo sta-  
tuitur, sin minus, in sedili collocat: si ne hoc quidẽ fieri potest, attingi non  
debet, cum a deo sit inualidus. Stãte recto homine ministris retro assistẽti-  
bus, iubebimus ut rumorẽ ad pubẽ digitis premãt depellantq;. Nos scal-  
pello, si ex partibus iuxta intestina sitis originẽ contraxerit, sub umbilico  
tribus digitis interpositis abdomen adusq; tenuẽ membranã quæ perito-  
næos uocat, diuidemus. Sin autẽ primario iecoris affectui malũ fertur ac-  
ceptum, à sinistro umbilici parte dissecābimus. si à liene uicium trahit  
originẽ, in dextra. non enim in illa parte sectionẽ moliemur, cui incũbent.  
Ac cutẽ quẽ superiacet acie instrumẽti excoriata, membranã quẽ finit ab-  
domen, peritonæos uocatur, diuidemus, quousq; scalpellũ inania pẽntra-  
uerit. Deinde per foramẽ illius mẽbranæ zneã fistulã scriptoriis calamis  
acie similẽ demitemus, & per hãc humor effundẽdus est pro cuiusq; uiri  
um ratione, quam ex pulsus tactu deprehẽdemus. Deinde exẽpta fistula,  
humor sisti debet. sistet autẽ statim uicissim incisa linea. At nos securita-  
tis gratia linamẽtũ tortile per solã abdominis diuisionẽ dimittimus, & ego  
recumbente recreatoq; per insequentem diem rursus momentũ humoris  
quantũ uirtus exigit fistula euacuabimus, atq; ita deinceps faciũdum est,  
quousq; minimũ humoris supersit, ita tamen, ut ubiq; subitã uniuersamq;  
uacuationẽ uitemus, multi siquidẽ imperite manũ admoliti unã cum hu-  
more uitali etiã spiritu uacuato subito hominẽ iugularunt: qui uero secu-  
rius rem agunt, modico humore edueto, ut uirtus magno leuaretur põde-  
re, reliquum medicamẽtis aquam ducentibus, saburrarione in sabulo, sole,  
siti, & cibis desiccantibus consumpserunt. Iã uero uisione super stomachũ,  
iecur, lienem, imum uentrẽ & umbilicũ uisi sunt, quinq; crustas adhibẽtes.  
Alii ferro renui eandem: alii iscis nũcupatis, aut aliquo ex alia huiusmodi  
materia: & pleriq; hac curandi ratione magis consanuerunt, interim nullã  
in totum compunctionem (quam paracentesi uocant) experti.

DE VMBILICO PROMINENTE. Cap. LI.



Umbilicus in decore prominere solet, quod uitiũ Græce exom-  
phalon dicitur, interim mẽbrana qua abdomen finit, perito-  
næum appellauit, illic dirupta, ac procedẽte, aut omento, aut  
intestino, interim colluue otiosi humoris sub umbilico con-

tracta, interim uero carne subnata, aliquādo sanguine irrumpere, propter uenarum, aut arteriarum rupturam, ut in aneurysmatis, interdum non sanguine, uerum spiritu solū irruente. Si igitur omētum prociderit, circa umbilicū tumor cōcolor, mollis tactu, indolens & inæqualis apparet. Si intestinum prolapsū est, præter cōmemorata, etiam inæqualis magis tumor est, & digitis impetissus cedit, euanescentq; nonnunq; strepitū elidens, balneis, & distētiōibus magis increscit. At si humor collectus est, mollis similiter tumor apparet: pressus autē non cedit, neq; decrescit, neq; tamē augetur. Quod si autem accedat superioribus signis, ut tumor sit liuidior, carneq; subnata durior, etiam tactui renitetur, & eadē in magnitudine manet. Si ex inflatione eminet, tumor mollis ad tactū subsequetur, qui digitorū impulsu sonum quendā reddit, & pressus aboletur. Hunc in modū curabitur: erecto homini iubemus ut spiritū contineat, quō in omnē partem distendatur: deinde omnem umbilici excrecentiā orbiculatim atramento scriptorio notabimus, resupinatoq; homine scalpello tumorē, quā nota atramenti est exasperabimus: deinde mediū hamo eleuatū, lino aut neruo quā exasperatio est, circū astringemus (hoc enim pacto cōtinebitur ne deuoluatur) ansulā supra nodū ponentes, postea tumore cōstricto iuxta uerticē ad apertū digitum indicē demitteremus, tentabimusq; diligenter num intestini implexus, aut pars omēti simul fuerit cōstricta. Ac si quidē intestinū fuerit relictum laxata funiculi ansula, id introrsum pellemus: si uero omentū sit, eo retracto, quod superuacuū est amputabimus, uase quod (ut uerisimile est) coincidit, deligato: mox duplici acu simplex linū ducente, hiantia per incisionem cutis factā traiectamus, & ansulis linorū præcisīs, quemadmodū in aneurysmate dictū est ex quatuor initiis cōstrictionē moliemur. Vbi corpora lino deuincta cōputruerint exciderintq;, linamētis curatio absoluetur, si cauam magis cicatricē fieri semper cupiamus. Hæc quidē ad omētū, aut intestini affectū pertinet. At si caro, aut humor, aut sanguis uitium crearit, tumoris medio circularim præciso: deinde quod incidet extra peritonæum sublato curationē in umbilico carni generādē dicatā tētabimus. Porro si umbilicus emineat aut ex uenarum adapertione, aut spiritus interposito attingi non debet, quemadmodum etiam aneurysmata.

DE INTERIORE ABDOMINIS MEMBRANA CONVULNERATA, item de intestini, aut omenti procidentia. Vbi etiam tractatur, quomodo uentris uulnera sarciantur ex commentariis Galeni.

Cap. LII.



Vomodo interioris abdominis membranz uulnera optime queas manu curare, deinceps uenit considerandū. Si igit paruum adeo uulnus extiterit ut inflatū iam quod procidit intestinū remittere non liceat: necessariū est, aut flatū elicere, aut uulnus ampliāre. Satiū autem fuerit meo iudicio quod prius dixi agere,

si modo id cōsequi possis. At qua magis ratione id cōsequare, q̄ si causam unde intestinū inflētur, ē medio sustuleris: Quæ igitur ea est nimirū, ambientis nos aëris refrigeratio: quare etiā remediū ex calore petetur. Itaque spōgia molli aqua calida madēti, mox expressa calefacere intestinū oportet. Præparetur autē interea uinū austerrum calidū. etenim hoc magis q̄ aqua calefacit, ac robur intestino adiicit. At si per hæc intestini inflatio nō cesserit, tāta peritonæi pars incidi debet, quanta, id quod excidit, opus habet. Idonea uero ad eiulmodi scētionē habētur ea quæ Græci syringotoma uocāt, id est, quæ ad fistulas incidēdas sunt accommodata. Scalpelli uero qui  
 10 bus acies utrinq; est, aut quibus cuspis acuta habet, omnino uitari debēt. Situs laboranti appositus fuerit, cum in inferiori parte uulnus factū est, si fursum uergat: cum in superioribus, si deorsum, & si in dextris uulnus sit, in contrariā partem corpus incūbet, si in sinistris, in dextrā, atq; hoc tū magnis, tum exiguis uulnribus cōmune est. Cēterū cum intestina in propriū  
 15 um reponi locū debēt ex magno uulnere collapsa ministro dextro opus est: oportet enim ipsum, ubi manibus suis totū uulnus a foris apprehēderit, intro repellere, cōstringere ac exiguū semper suētū dēnudare: quinetiā id quod consutū est, mediocriter cōprimere, quoad totū persuatur. Porro quæ idonea suendi abdominis ratio existat, deinceps dicamus. Quoniam  
 20 coire abdomē cum interiori ipsius mēbrana nempe peritonæo cōueniet, incipiendum quidē à cute est, atq; ab externo introrsus acus demittitur: ubi iam & cutē & rectum musculū totum trāsierit, præterito quod ei subiacet peritonæo, per reliquā huius partem eam ab interno extrorsum, atque inde per reliquū abdomen traiectābis: ubi hoc penitus pertransierit, rur  
 25 sus ab externo introrsum, idem abdomē perforandū est: mox ubi peritonæum quod illi quoq; subest præterieris, & ad cōtrariū perueneris, id quoque ab interno extrorsum perpungi, unaq; cum eo totū ipsi cohērēs abdomen debet. Deinde ab hoc rursus incipiendū, atq; id cum cōtrario peritonæo cōsuendum. Ac rursus uicina etiā cute traiecta, iterū ab ea parte acus  
 30 introrsum est iniicienda, cōsuendumq; id cum contrario peritonæo, inibi quoq; uicina cute transmissa: atq; hæc iterū iterumq; facienda sunt, quoad totū uulnus similiter cōsuerimus. Interuallū uero suturarū quod ad cōpescenda ea quæ subsunt pertinet, breuissimū esse postulat. Quod autē ad firmitatem requiritur, inter futuras cutis ne alibi rūparatur, utiliter breue non  
 35 est, quare uitato utriusq; abscessu, eligēda mediocritas est. Iam hoc quoq; omniū ulcerum cōmune quodammodo est, sicuti etiā ipsius quo suūt, fili ratio. Quod enim durius est, cutem rumpet: quod mollius, confestim ipsum rūpitur. pari modo si proxime oras summas acū transegerit, quod reliquū est cutis, quoniā minimum est, dum uiolenter abducitur, rūpi cogitur. Sin plurimū ab iis recesseris, nō parū cutis inglutinatū relinquetur. Hæc licet omnium sint ulcerum communia, maxime tamen seruanda in  
 40

abdomine suendo arbitror. Porro ipsum abdomen, aut quemadmodum est  
 expositum, consuetur, huc diligentia adhibita, ut peritonaeum abdomini coa-  
 lesceat possit: quod uix sperare audeas, cum neruum existat: aut sicuti qui-  
 dam faciunt, qui quae cognatae naturae sunt, ea committunt, utpote perito-  
 naeum peritonaeo, abdomen abdomini. Id autem fieri in eum modum. A ui-  
 cino nobis abdomine incipitur, atque ab externo introsum per id solus acus  
 traieciatur post praeteritis utrisque peritonaei labris, ex obiecta parte a foris  
 introsum per utrumque eius labrum acus reuocatur: dein haec rursus reduci-  
 atque ab interioribus foras per aduersum abdomen transmittitur. Hic mo-  
 dus a communi, & ex prompto, quo nimirum uno adactu per quatuor labra  
 acus traieciatur, id differt, quod peritonaeum totum intra abdomen proius  
 recondit. Ceterum medicamenta ad haec idonea materiae esse debent, cuius  
 sunt ea, quae cruentis iniiciuntur. Vt autem nulla pars principalior consortii,  
 lege doleat, lanam conuenit mollem oleo mediocriter calido imbutam toti,  
 quod inter inguina & axillas est, circumdare. Praeterit autem si per clyste-  
 rem in intestinis aliud simile infundas. Si uero non nihil in ipsis quoque intesti-  
 nis conuulserat, si: quod iniicietur, uinum nigrum, austum & tepens  
 erit, eoque magis si totum usque ad interiorum meatum pertusum sit. Facile igitur  
 curacionem recipiunt intestina crassa: secus habent tenuia: ieiunium uero  
 omnibus insanabile est, tum propter uasorum magnitudinem multitudi-  
 nemque, tum quod tunica eius praerenuis neruosaque existat. accedit huc quod  
 etiam bilem syncera totam recipiat: adde quod omnium maxime iecori ui-  
 cinum habeatur. Ventriculi porro iuxta partes carnosae curari cum fiducia  
 debent, siquidem fieri potest ut res bene succedat, non solum quod haec crassio-  
 res sint, sed etiam quod sanantia remedia facile hoc ipsius loco subsistant. At  
 ulcerum quae os infestant curacioni sensu illius acumen aduersatur. Cum au-  
 tem peritonaeo rupto omentum prolapsum aut liuescat aut nigruerit, siue  
 exceptum antequam nigrescat, ne sanguis profundat, praecipere conuenit id quod  
 post uinculum habetur, atque ut in imo sine iam commemoratae abdomi-  
 nis suendi rationis uinculi fines pendeant, curabimus, quod scilicet facile  
 eos cum ex uulnere suppurantem eructentur, eximamus.

#### AD TE GENDAM GLANDEM COLIS SI NVDA EST Cap. LIII.



In quibus glans colis penuria cutis non cõtegitur, aliqui inde-  
 coris gratia duplicem administrationis modum excogitarunt,  
 nunc in superiore colis initio cutem orbiculatim secantes, ut  
 facto ipsius diuortio, inferior cutis attrahatur, donec glans oc-  
 cultetur: nunc subtus interiorum cutem a glandis radice scalpello excorian-  
 tes, inde interiorum trahentes, mox linteum quoddam molli ambiens praeparatum deli-  
 gantes, ita ut linteolum a liquo quodam cutis excoriata est, interponatur, ne pre-  
 putium cum glande coalescat. Hunc modum Antyllus magis recipit, Iohannes  
 re ipsum oratione exponens. Nos autem summam dixisse contenti sumus,

quoniam raro inter artis opera huiusmodi administratio requiritur, tum quod affectus nullam muniis obeundis difficultatē pariat, tum quod neque tantum indecoris afferat, ut eo magis glandē aliquā ex chirurgia deligas.

QUOMODO GLANS PENIS CONTECTA APERIRI POSSIT, uirum dicitur hypospadixon. Cap. LIIII.



Lerisq; glans ab origine non perforata est: uerū sub cane appellato quā glans suspensa est, foramē habetur: unde neq; uri nam facere antierius possunt, nisi particulam admodū pubē uer sus inclinent, neq; liberis dare operam, cum semen ipsorū  
 10 in uterum rectā non possit eiaculari. Omnium itaq; simplicissimus rurissimusq; curationis modus est, qui fit per abscisionem. Itaq; resupinato homine glans sinistra manus digitis ualide artolletur: deinde eadem scalpelli acie iuxta coronam præcidetur plaga non obliqua, sed sculpturæ simili, ut per medium eminentia quædam glandem repræsentā apparet. Quo  
 15 niam uero sæpe sanguis profundi solet, si fieri potest medicamentis ei retinendo dicatis sistemus, sin minus tenuibus ferramentis aduremus.

DE PHYMO.

Cap. LV.



Vplex phymi causa est: aliquādo enim sic glandē præputiū tegit ne nudari possit: aliquando retrorsum deducta reduci nō potest. Hæc species proprie periphymosis dicitur. Prior itaq; differētia, aut ex cicatrice quæ in præputio concreuerit, aut ex  
 20 carnis incrementō quæ illic coaluerit. Altera genitaliū inflāmationibus fertur accepta, quoties deducto præputio glās intumuerit, nec ultra deducto opetiri ea possit. Si igitur prima phymi causa fuerit, curationē hoc pacto retinamus figurato homine, ut par est, præputiū in anteriore partē attrahe-  
 25 mus, demissisq; in summū ipsum hamulis tribus, quaternis uel ministris continendum exhibebimus, iubētes, ipsum quantū fieri potest, diducāt aperi antq; deinde sic ex cicatrice exterior collectio fuerit creata, scalpello ab inferiore parte præputiū in tribus quatuor uel locis incidemus lineis directis  
 30 & æquali inuicē spatio distātibus, idq; intrinsecus: est aut duplex in glande præputium: os igitur ipsius ab interiori parte diuidemus, sic enim contractione quæ ex cicatrice coaluit, dissoluta, præputiū superinducemus. At si caro ab interioribus adnata phymū produxerit, carne tota ferro scarificata, præputiū nudabimus: carnem inter lineas eminentem rademus, postea  
 35 plumbeam solenam glandi uniueris circūdabimus, inuoluta ipsi papyro sicca. Habeat autem solena foramen undiq; æquale. sic enim huius circū positi præputium adductū rursus coalescere prohibebitur, dum & à plūbo & papyro inuoluta distentū seruaf: intumescēs enim ex deligatura magis adhuc curē diducet. Hoc igitur faciendū est, siue ob cicatricē, siue carnis  
 40 processum phymo generato manū adhibuerimus. Sin autem periphymosis appellata creetur, uetustate temporis cōmittitur, & curationē non

recipit, nisi quis eo modo uelit tractare quem ad tegendam glandem usurpamus. Sin aut nondum coaluerit, uibicibus super ipsum rectis tribus, aut quatuor, aut etiā pluribus circulatim excitatis, oleo copiosiore tepido superfuso extorsum attrahemus.

SI PRAEPUTIUM GLANDI ADHAERESCIT. Cap. LVI. 5



Lans & præputium inuicem cōmittuntur exulceratione præcedente. Conuenit igitur subtus cute, quantū licet, excoriata, acie scalpelli, aut spathula polypo accommodata, ea quæ resistunt, dissoluere id potissimum conantes, ut glandem purè à præputio adhærescente discernamus: quod si nō fuerit expeditū, glandis 10 potius nonnihil ad præputium assumere, q̃ e contrario: cum enim præputium tenue sit, facile perforatur. Vbi commissuram dissolueris linteum tenue aqua frigida madens, glandi & præputio interponendū, ne rursus coalescant, uno astringente cicatricem ipsis obducemus.

DE CIRCUMCISIS.

Cap. LVII. 15



ON de iis qui religioso gentium more circumciduntur, nunc uerba facimus: sed de iis quibus affectu naturalium oborto, præputium nigrescit. Itaq; in iis totum quod nigruerit, orbiculatim præcidi debet, deinde squama cum melle utendum, uel etiam malicorio, & eruo medicamētī instar quod linteolis illinit. Si ue 20 ro sanguis quādoq; profluat ferramētis lunatis utendū, quæ utrisq; simul iniiciant, & ipsi sanguinis profluuiū, & uulnere depascenti. At si tota interim glans absumpta fuerit, exiguam è plumbo solenam imponētes meatui, per ipsam ægrotum urinam reddere iubebimus.

DE THYMIS NATURALIUM.

Cap. LVIII. 25



Thymi camosa sunt tubercula, nunc in glande, nunc in præputio cōtrescentia. Ex his, alii cōtumacis, alii facili curacionis sunt. Mitiores itaq; scalpelli acie deradere conuenit, & chalcitidē ipsis inspergere: in malignis, eo quod uicia tū est, exciso adustione utendū. At si contra se mutuo in præputio fiant thymi, hū, intra 30 ipsum: illi, extra, oportet omnibus ipsis confestim manū admoliri, ne præputiū structura tenue, imprudenter pertūdāmus. Sed primum interiores auferre consiliū est, iisq; cicatrice obductis, tūc quoq; exteriores aggredi. Nonnulli uerò recentiorū forcice ipsos auellētes equino pilo deligatos curare solent, quemadmodum alii refrigerato ferro candenti eosdē deurunt. 35

DE RECTO SYPHONE QUI CATHETER DICITVR,

& clystere uesicz.

Cap. LIX.



VM urina non reddit, quod iter ipsius obstructū sit, aut cōcreto intus sanguine, aut calculo, aut alia quadam causa, recto syphone id quod superfluū est eximemus, quē modū Græci catheteris mō uocāt. Sūpro igit eiufmodi syphone, atari & sexui 40



cōueniēti, in rectū ita ipsum dirigemus, quod hoc modo fiet: lana exigua li  
 no deligata per mediū, linoq; ex acuto iūco per catheteris fistulā traducto  
 lanā foramini adaptabimus, iuxta catheteris mucronē, ac præciso forfice  
 quod ex lana eminet, ea theterē in oleum demitemus, ægro in subsellium  
 prius irroratū, si nihil prohibet, colloato, & catheterē in rectū inferemus  
 usq; ad colis basim: deinde naturalia ad umbilicū in torquebimus. etenim  
 ab hac parte obliquus uesicę meatus existit, deinde sic cathetera adigemus.  
 Quū uerō in pene propē sedē id euenerit, rursus genitalia imposito instru  
 mento defletemus, in naturalē reducentes figuram. (nam à peritonæo ue  
 sicę meatus sursum tendit,) propellemusq; catheterē usq; dum uesicę si  
 num penetrauerit: secundum hoc, linum catheteri iniectum retrahemus,  
 quò urina simul cū lana attracta subsequatur, quemadmodū in syphoni  
 bus accidit: atq; talis demittendi catheteris modus est. At quia subinde ex  
 ulecerata uesica collui desiderat, si quidē oricularii clysteres enema possint  
 trāsmittere, illis in prædictū modum utemur, in uesicā demissis: si fieri ne  
 quit, per catheterē pelle, aut uesica bubula adaptata, enema colluemus.

QVAE CURATIO CALCULOSIS ADHI  
 beatur.

Cap. LX:



Vm alibi demonstratū sit qua ex causa calculi generentur, tū  
 quòd pueris in uesica magis: prouectionibus, in renib; crescāt,  
 nūc rationē exponemus, qua exinde possint, ubi notas prius  
 eorū qui in uesica nascunt, designauerimus. Vrina igit aquosa  
 est, quòd in eis subsidet, arenosum: pudendū continuo uexat pruritu, laxa  
 tur sine ratiōe, rursusq; arrigit, erebro id contrectant irritati ægri, & maxi  
 mē pueri. eū calculus in ceruicē uesicę incidit, etiam repente urina suppri  
 mitur. Porro inter eos quibus calculus exeinditur, pueri quidem usque ad  
 quatuordecim annos propter corporū mollitudinem, facili curationē re  
 cipiunt: senes, quod corpus ipsoꝝ contumax sit, uix consanescunt: medicę  
 horum ætates etiam in hoc, medio quodā modo habent, ac rursus facile sa  
 nantur qui maiores caleulos habent, quòd inflammationibus assuerunt: qui  
 minores, difficulter sanantur, contrarias ob causas. Hęc cum ita se habeāt,  
 ad chirurgiam profecti, conuassatione uremur prius, interim per famu  
 los, interim ipso ægroto ex alto quodā loco defiliēti, quò calculus ad uesi  
 cę ceruicē propellatur, deinde figurari æger debet ceu rectus in sedili, ma  
 nibus subter femora porrectis, quò in angustū uesica compellatur. Si igit  
 tur contingentibus nobis calculus in penē procidat, quassatu exturbatus,  
 ferrum inde tentabimus. Sin minus sublabatur, indicē sinistra manus di  
 gitum, si puer sit qui ægrota, uel etiā mediū, si ætatis sit prouectionis, oleo  
 inunctum, in anum demitemus, & supinis digitis perquirentes, calculūq;  
 illapsum paulatim traduentes, in uesicę ceruicē impingemus: & digito u  
 no, plurib; q; propellētes ipsum in exteriora impactū, ministro altero ma

nibus uesicā premere iusso, alteri præcipiēmus dextra manu testiculos sursum teneat, sinistra penē extendat in alterā partē, quā sectionē moliemur: ipsi assumpto scalpello ad calculos aprato, inter anū & testiculos, non per mediū penē, sed in alterā partē iuxta sinisteriōrē clunē obliquā super lapidē qui parti secandæ supponitur, ducemus lineā, quā extrinsecus latū habeat spatium, intus non amplius, q̄ ut calculus per id queat excidere. Interim siquidem digitis super anum innixis, aut digito unā cum sectione sine euulsione calculus clementer exilit. sin minus exilierit, uulsella superiniecitā huic accōmoda eximemus. Calculo iam ablato, medicamentis sanguinem coërcentibus ex manna thuris, aloē, symphyto, uel etiā misy, & consimilibus sanguinis profusionem sistentes, lanas, aut linamenta implicita, cœnelæo madentia imponemus, & ligaminibus septē costarū ad calculos accōmodatis utemur. At si profluuii sanguinis metus sit, linamentū implicitū ex posca, aut hydrososato iniiciendū est, & ægro decubēte crebrius locū perfundemus. Postq̄ tertio die solueris, & hydrelæo copioso irroraueris, tetrapharmaco linteolis illito utendū, ita ut frequētius ipsos dissoluas, curesq; propter urinę acrimoniā. At si inflāmatio quēpiā superuenit, cataplasmatibus & superfusiōibus ad eā inscriptis adiuuabimus, ac in uesicā rosaceū aut chamæmelinum, aut butyrum nisi aliqua nos inflāmatio impediat, demitteremus. similiter etiā si ulcus pascendo aut alio quodā modo lepar, aut maleficū fuerit singulis congruentia adaptabimus. cum ulcus inflāmatiōe catet, lauacrū adhibetur, inde emplastrū dia chylon, tum lūbis tum imo uentri superaccommodat. Per totū uero curationis curriculum, femora simul conuenit deligare, & cum remediis requiescere. Sin exiguus calculus coli inciderit & per urinā reddi nequeat, præputium ualidē in anteriora attractū deligabimus supra glandis summitatē, item post pudendū colē uinciēmus, iuxta terminū ad uesicā spectantē restrictiōe adhibita: deinde infra calculū diuidemus, super lapidem qui illi excidēdo subiicitur. flexo autē colē illum eiiciēmus, solutisq; uinculis ulcus sanguine concreto uacuabimus. Posterius itaq; uinculum iniectum est, ne calculus retrorsum recurrat: antè, ne post lapidem exemptum præputiū soluti cutis in oppositum recurrens diuisionem contegar.

## DE TESTICVLORVM PARTIBVS.

Cap. LXI.



Aturæ testiculorū finitiones, cum ad ramicum incidendorū rationē conferant, priusq̄ ad illam ueniat, proponendæ sunt. Igit testiculus substantia quædā est glādulosa fragilis, ad genitricē seminis uim effecta. At nerui testii, quos Græci parastratas & cremasteras ab eo appellant, quod ex illis genitales partes dependēt, spinalis medullæ ex cerebri mēbrana propagines sunt, cū uenis arteriosis ad testiculos pertinētes per quos semē in naturalia pmeat. Seminaria autē uasa, uenę sunt à caua uena in testiculos sinuosis anfractibus pringētes un

de testiculi alimentū capiunt. itē tunica naturæ neruosa in orbes implicata, in gibba quidē patte, atq; antetiori, à testiculo libera est: in cōcaua & posteriore, ipsi adhærescit, ex interiore abdominis mēbrana originē trahens. Vocant aut partem hanc qua testiculo adnata est, posteriorem prophy-  
 5 sin, quasi dicas adnexū. Datti uero membranae sunt, quæ exteriorē testili cutem conglutinant, iuxta tunicā erythroidem dictā ei adhærentes: quibus partibus & illa post testiculos tunica adunitur. Hæc autē ipsa cutis exterior rugosa testibus circumdata, scrotum nobis, Græcis oscheon dicitur.

## DE AQUOSO RAMICE, HYDROCELE

dicitur.

Cap. LXII.



Vmoris otiosi in parte aliqua corporū scrotū implicatū col-  
 luuius, tumore excitans sensibilē hoc nomē sortita est. Collig-  
 git itaq; humor magna ex parte, in tunica erythroide appella-  
 15 ta, circa anteriorē testiculi regionē, quā potissimū mēbrana il-  
 la à testiculo separatur. Raro extra membranā hanc erythroidē uitium con-  
 trahitur. Subinde peculiari tunica humor comprehenditur, uocantq; hoc  
 mali chirurgici in superuenienti ortum. Quare si ob causam præcedentē,  
 exempli gratia, particularum imbecillitatē uitium oboriatur, sanguis ali-  
 20 menti ratione adductus, in aquosam fetosamq; substantiā mutatur: si ex-  
 istu, sanguinea, aut feculenta substantia comprehenditur. Cōmunis nota  
 est, tumor indolens, firmus, ac stabilis in scroto, quacunq; tandē occasiōe  
 non euanesceat, sed in iis qui modicum continent humorē, cedens: in illis  
 qui copiosum habēt, non itē. Ac in quibus erythroides tunica humore di-  
 25 stenta est, tumor rotundus paululum, & oui modo longiusculus apparet.  
 His testiculus in conspectum non uenit, ut qui undequaq; sit implicitus.  
 si extra erythroidem membranā sub dattis habeatur, per pauca corpora  
 sublabitur. At si humor ex superuenienti coierit propter contractionem  
 ex omni parte, & rotunditatem, tumor alterius testiculi imaginem exhi-  
 bet: & cum aquosus humor extiterit, tumor concolor pellucet: cum fec-  
 30 culentus aut sanguineus, aut rubicundus, aut liuidus apparet: cum autem  
 in utraq; scroti parte hæc nota apparuerint, duplicē ibi ramicē esse cogno-  
 sces. hoc modo scalpello curatur: derafa pube & scroto, nisi puer fuerit, æ-  
 grū super sedile resupinabimus, podici pāniculo multiplici subiecto, scro-  
 35 to aut spōgia iusta magnitudinis: ac sedētis à sinistra ægrotātis, ministro  
 qui ad dextrā sedebit, iubebimus ut genitale in alterā partem protendat,  
 & cutem scroti ad abdomē eleuet, nos scalpello scrotum à medio iuxta lō-  
 gitudinem usq; ad pubem ferē recta linea incidemus, quæ uicina sit lineæ  
 scrotum per medium secanti, diuidemusq; tunicam erythroidem. Porro  
 si humor ex accessorio in adnata membrana hæreat, quā uertex eiusdē tu-  
 40 nicæ eminet, illa cadiuisionem moliemur. Hamulo autem ora uulneris di-  
 ducentur, & cultro ad hydrocelicos aprato scalploq; membranā detra-

Etis tunica erythroides nudatur, mox eadem per medium scalpello findi-  
 tur, per illas potissimum partes, in quibus à testiculo recedit, humore iam to-  
 to, aut maiore ipsius portione in uase aliquo excreto, erythroidem mem-  
 branam hamulis eximemus, utpote tenuissimam ipsius partem. Inde uero  
 Antyllus futuris & medicina cruentis accommodata utitur: recentiores  
 ea, quæ quod carnem inducat, sarcotice appellatur. At si testiculus putre-  
 dinem expertus alio uel modo uitiatu deprehendatur, uasa cum neruo, qui  
 ab inguinibus dependet, cremastere dicto fune excipiemus, ipsoque crema-  
 stere præciso testiculus eximitur. Item in iis qui duplici laborant ramice, si  
 militèr bifariam curationem molimur utrinque per scroti partes ad ingui-  
 na lineas incidentes. mox specilli mucrone per diuisionem deorsum ad scro-  
 ti extremum demisso, ipsoque scrotum extollentes, acuto scalpello lineam qua  
 humoris est emissarium, incidemus, ut & sanguinem concretum, & pus per  
 eam excernamus, ipso uero scalpelli mucrone linamentum in longitudinem  
 implicitum superiori diuisioni inferemus, & ubicibus per spongiam de-  
 terilis lanam oleo madentem per inferiorem testiculum in sinuabimus, ex-  
 trinfecus alias lanas ænelæo imbutas scroto, imo uentri, inguinibus, peni  
 & lumbis superiniiciemus, linamentum triplex super hæc explicatum deli-  
 gamus uinculo in sex costas porrecto, congruisque ligamentis: deinde ho-  
 mo decubet lanis scroto subiectis, ut conquiescat, pellisque super ipsas mol-  
 li explicata, quod fomenta excipiant. Cæterum superfundemus oleum ca-  
 lens. post hoc ubi solueris tetrapharmaco linteolis illito in uulnere ute-  
 ris, linamentum ex farinaceo polline immutans, extrinfecus fomenta  
 rursus propter inflammationem usque ad diem septimum iniiciuntur, in-  
 de medicamento quod linamentum contineat utemur. Vulnere expur-  
 gato, & carne iam mediocri obducta, deinceps etiam lauacris adhibitis lina-  
 mentum auferri debet, & reliqua curationis parte subsequente quemad-  
 modum prius explicatum est, utemur. At si inflammatio quæpiam fuerit,  
 aut sanguinis profluuium, aut aliquid eiusmodi interea super uenerit, con-  
 uenienter unicuique occurrere conuenit, ne semel dicta iterum repetam. Si  
 uero uisionem potius in aquoso ramice, sicut recentioribus uisum est, ad-  
 hibeamus omnia quæ ante chirurgiam, & post eam dicta sunt, exequemur,  
 ipsum uero chirurgiæ opus sine ferro solum & diuisione per humoris emis-  
 sarium fieri debet. Decem itaque aut duodecim ferramenti literam Græco-  
 rum & imitantibus, & duobus gladiolis primum scrotum ferro & referentibus  
 per medium aduremus, cultello autem, aut obruso hamo membranas ex-  
 coriantes ferramento ensi simili, has ceu præcidentes aduremus. Nudata  
 uero tunica erythroides, facile autem cum alba & tenuis existat cognoscitur, acie  
 ferramenti instar & literæ facti perurentes humorem excernemus, postea ro-  
 tam ipsam detectam hamulis artolles, ferramento gladiolo simili auferemus.

DE CARNO SO RAMICE ET TOPHACEO. Cap. LXIII.



Aro in parte aliqua corporū quæ serorum implicat succrescens carnosum ramice producit. Nascitur autē ea ex causa latente, testiculo fluxionē experto induratoq; aut ex ictu, aut imperita post ramicis succissionē curatione: subsequitur autē

- 5 hos color ubiq; sui similis cum duritia. Si autē tumor in scirrū coalescat, nullus nec color, nec sensus adest: si maligni referat naturam, dolor urget, punctorius. Itaq; ferrū admouētes ægro, figurabimus ipsum, sicut & prius diuidemusq; similiter, & si quidē ex concreta testiculi carne uitii creatum sit, & darton membranā & erythroidē cōsimiliter discindemus, deinde testiculo eluato, eoq; extra erythroidē exempto, cremastere segregato à uasis, hæc quidē cōstringemus, illū uero nempe cremasterē amputabimus: testiculū uero qui cū aliorū carne coaluerit, ceu alienū eiciemus. Sin hæc cōcretio in tunica aliqua, aut uasē subnascat, scroto diuiso subiectisq; carni mēbranis, totū quod in carnē cōcreuit auferemus. quod si posterior cō-
- 10 missura carne fuerit glutinata, iis quæ ambiūt ipsam adeptis testiculū simul cum ea excipimus: quippe fieri nequit, ut testiculus sine hac permaneat. Ceterum tophi & in testiculo & in mēbrana erythroide occalescūt, renixu multo, duritie, & inæqualitate à carnosō ramice & aquoso discreti. His igitur manum sicut etiam carnosō ramici admoliermur.

26 DE VARIGOSO RAMICE ET VENTOSO. Cap. LXIII.



Alia in scroto, aut dartis membranis dilatata uarices simplici uocabulo nominat. Alia uero quæ testiculū nutriūt, si uaricū more dilarētur, uaricosum ramicē, Græci cirsocele nūtiū nūcupant. Notæ horū euidentes sunt, quippe pars affecta tumi-

- 25 dior, obliqua modice uaz in modū, & testiculi relaxatio apparet, tum alię nonnullæ difficultates, maxime in cursu, exercitio, & itinere. Hoc modo curamus: ubi cōmode ægrū figuraueris, scrotū manu permulcet, neruus cremaster in partē inferiorē repellitur. Facile autē dinoscit, ut qui tenuior uasis sit, solidior, renitēsq; seu potēs ualidusq; æger quoq; ad depressionē ipsius indolet, & iuxta colē turbat: uasā autē digitis nostris & ministri excepta in scroto, ualideq; distēta, acie scalpelli obliqua adacta supra instrumentū quod uasis cedendis supponit secabimus. deinde per hamulos ea quæ cuti subiacēt eleuata excoriātur. uasis ut in capite de angiologia & aneurysmatidis disputatū est, denudatis, acus duplex linū trahēs trāsmittitur: ansq; li-
- 35 ni abicisa, uasā & in prima ipsorū dilatatione & inferiori extremo fune deligabimus: & per mediū rectā incisa linea, & sanguine qui coierat euacuato, medicina ipsos curabimus quæ pus moueat, ut etiā funiculi cum uasis sua spēte excidā. Leonides autē præcipit, quod si aliqua ex uasis testiculū nutriendibus dilatata fuerint, hoc modo esse faciendū: si oīa, testiculū cū ipsius
- 40 capi oportere, ne uasis alētibz destitutus cōtabescat. Porro uentosus ramex, quū genere aneurisma existat, Leonidi quidē non attingēdus uidet,

propter periculū quod in uaricibus ab incessabili sanguinis profluuiō accidit. Recentiores autē quum duplex ipsius sit generatio, alia ex quatuor uasis testiculū alētibus, alia ab arteriis darton membranā & scrotum inter currentibus: hunc quidē ceu desperatæ salutis, repudiāt: illū priorē scalpel lo curāt. discernimus autē ipsos, quōd qui ab arteriis enascit, facile a d digi torum constrictionē euāescat, qui a uenis testiculū nutriētibus, aut neu tiq̃, aut cum multo metu. Cæterum curamus ipsos, ut in uaricosis ramici bus cōprehensum est, singulas uenas fune excipientes deligantesq̃.

DE INTESTINORVM RAMICE. Cap. LXV.



Ntestinorum ramex, quem Græci enterocelen dicunt, est in 10  
scrotū intestini deuolutio. Fit aut peritonæo circa ilia diru-  
pto, aut eodē extēso. utraq̃ igitur, ruptura, dico, & extēsis ex  
uiolenta quadā occasione præcedēte proueniūt, nempe ictu,  
aut saltu, aut clamore. At qui ualidæ tensioni fertur acceptus, proprie &  
propter relaxationē, & alias corporis imbecillitates, accidit. Notē utrique 15  
cōmunes sunt: conspicuus in scroto tumor: item quōd in exercitiis, itine-  
re, spiritus retentione. aliisq̃ occasionibus, idem maior q̃ prius euadat: cō  
prellus, tarde quidē recurat, celeriter autē rursus deuoluatur, superne inte-  
stinū resupinatis in loco permaneat, donec erigantur. Stercus autē in scro-  
tum receptū periculū subinde ipsis intulit: dolēt enim, nonnunq̃ etiā im- 20  
pressis digitis sonitū elidūt. Peculiaria ramicis ad extensionē relati indicia  
sunt, quōd non uniuerfim, sed particulatim temporis spatio & ob causas  
quaslibet, nonnunq̃ intestinū deuoluat, tumor æquabilis & profundus ap-  
pareat, intestino quod deuolutū est interiore abdominis mēbrana, perito-  
næon uocant, cōstricto. Ex ruptura facti ramicis signū est propriū, quōd 25  
uniuerfim ab initio intestinū deuoluatur, idq̃ ob causas uiolētas dūtaxat:  
tumor immēse magnitudinis, inæqualis, & per summa protinus in cute  
emineat: quōd intestina extra peritonæū elabant. Si igitur rupto perito-  
næo omentū duntaxat in scrotū inciderit, uitiū omenti ramex, Græcis epi-  
plocele appellat: si intestinū quoq̃ delabatur, omenti intestiniq̃ ramex, 30  
Græce epiploenterocele dicit: si uero & aqua in tunica à rubēti colore ery-  
throide dicta apparuerit, cōposita ex tribus quoq̃ appellatio sumit. Cæte-  
rum neq̃ hos, neq̃ ex ruptura intestinorū ramicē chirurgiæ subiicimus, so-  
lum uero ex intēlione ramicē intestini manu curamus, hūc in modū: ho-  
mine resupinato & cute iuxta inguina per ministrū eliuata, trāuersam li- 35  
neā incidimus, ut in angiologia explictū est. Nōnulli uero non trāuersam,  
sed rectā lineā ducūt, hamuloq̃ defixo diuisionē explicāt, quē testicu-  
lū supraiectū mēsurā adæquet, deinde rursus hamulis per quartā cutē trā-  
missis quot ad uulueris magnitudinem sufficiāt, retuso hamo, aut cultro  
mēbranas & pinguedinē subtus excoriātes scalpello præcidimus. detecto 40  
aut undequaq̃ peritonæo, demissoq̃ indice digito ad posteriorē scroti par

tem inter peritonæum & dactum membranam, posteriore connexum  
 soluemus, deinde dextra manu extremū implicātes, ad interiora scroti si-  
 mulq; sinistra peritonæū retrahētes ad diuisionem excipiemus testiculū  
 unā cum mēbrana rubetī, ac ministro uni iubebimus testiculū eleuet, ipsi  
 5 uero posteriore adnexū ex toto simul cum mēbrana rubenti dissoluētes,  
 explorabimus digitis num intestini inuolutio quædā in tunica erythroī-  
 de relicta sit, & infrā hanc ad aluū propellemus, deinde a cu bonę magnitu-  
 dinis linū ducente duplex decies implicitū ad peritonæi terminum qui di-  
 uisionem respicit, per mediū transuemus. Succisis autē linis quatuor facie  
 10 mus initia, atq; his per uinculū rursus implicatis, utrobique peritonæū ualē-  
 ter desstringemus, iterumq; initiis circūuolutis, astringemus quidem stre-  
 nue, ut nullū ex uasis nutrientibus adhuc possit cedere, ne inflāmatiō in-  
 de cōcitetur item secundū extrinsecus uinculū iniiciemus, minnus quā-  
 duos digitos à priori distans. Secundū hæc uincula digiti instar ex perito-  
 15 næo relinquentes, totū ipsum orbiculatim præcidemus, auferentes simul  
 & testiculū: rursus diuisione iuxta emissariū scroti adhibita, linamentum  
 longum iniicitur, & fomentis oleo imbutis uinculisq; ut in aquoso rami-  
 ce iniectis oīa quę restāt, quemadmodū illic expositū est, perficiemus. Nō  
 nullos autē nō imperitos chirurgos noui, qui mēbrana erythroīde excisa,  
 20 ferrametis candētibz extremū ipsius adurerēt, sanguinis profluuii metu,  
 ut est uerisimile. Hi autē ipsi post scalpelli administrationē ægros protin-  
 us in folio oblongo ligneo, cui aqua inesset calida ad septimū diem usq;  
 lauabāt, quinquies per diē noctēq; id faciētes, præsertim in pueris, & miri-  
 fice res processit: nam eitra inflāmatiōē ipsi seceabāt, & funiculi unā cū  
 25 corporibus protinus decidebāt. Interea uero dū ægri lauabāt, prædicta su-  
 perfusiones inuēiebātur. Alius quispiā præter commemorata, etiam pipe-  
 retrito cum oleo cetuicem ipsorum eodem tempore infricabat.

DE INGVINVM RAMICE, BVBO-  
 nocele uocatur.

Cap. LXVI.

30 **I**ntestini ramicē ex intentione creatū, inguinū hernia præce-  
 dit: primū enim peritonæo intēso, intestinū laxatū tūc quidē  
 in inguina abscedit, facitq; ramicē, quē Græci butonocelen  
 dicunt. Hunc uetustiores in eum modum scalpello eurant,  
 linea transuersa per inguina intumescētia, tres digitos longa incidit. Hinc  
 35 membrana & pinguedo eximuntur, mucro autē scalpelli per mediū peri-  
 tonæo detecto, qua fastigiatur adigi debet, is enim intestina in altū repel-  
 lit. Itaq; peritonæi eminentias utrinq; factas per scalpelli mucronē suru-  
 ris inuicē cōmittemus, deinde mucronē extrahemus, neq; peritonæū præ-  
 cidētes, neq; testiculū, neq; aliud quippiā retinētes, sed præsidio cruētis ido-  
 40 neo persanātes. Quoniā uero recentiores uisionē potius in inguinū rami-  
 cibus probarunt, hanc quoq; non incōgruenter trademus. Homo medio-

. D ii



criter moueatur, tussi uiolenta, intensioe, spirituq; tetento: ubi tumor in inguinibus apparuerit locum qui uri debet, atramēto scriptorio aut collyrio figura triangula circūscribemus, trāsuersam lineā per inguina sutsum ducētes, iniiciemusq; signum per trianguli medium. postq; zger decubuerit, candēs ferrum per mediā notam imprimemus, primum clauatū, inde per trianguli costas & literæ figurā representans, tertio in laterū aut lenticulæ modū factis, rotum triangulū exaquaremus ministro per rotā ustionem saniem panniculo extergente: tam alte uero aduremus, quousq; pinguedinem pertingamus, idq; in habitu corporis moderato, neque enim in gracilibus ob siccitatē ferrum altius admouendū est, ne imprudentes peritonæum aduramus, neq; tamen in crassioribus pinguioribusq; in quibus uel ante iustam ustionē pinguedo apparet. Sed quantū uri conueniat artificiose deprehēdemus coniectura. Secundum ustionem sal unā cum porro tritis crustæ insinuat, & inguinario in literæ X similitudinem ligamento utitur, per insequentes dies remediis quæ crustam adimunt, nempe omphacomele & similibus curabimus.

#### CVM SCROTVM ATTRITIS VESTIMENTORVM

fragmentis similiter attenuatur.

Cap. LXVII.



Axata scroti cutē sine interioribus ipsius corporibus uitum maxime indecor; gignit, quod Græci racosin appellāt. Leoni des igit resupinato homine, quod in ea superfluū erat scalpello super astatē, aut durū coriū, quod incidēdis subiicitur excidebat, orasq; uulneris futuris cōmittebat. Antyllus aut tribus etiā quatuor uel futuris superfluum cutem prius punctam forfice acura aut scalpello post futuras auferebat, futurisq; adunitam ut cruenta curabat.

#### QVOMODO FIANTE EUNUCHI.

Cap. LXVIII.



Vm ars nostra huc tēdat, ut corpora à statu qui præter naturam est, in naturālē deducar, eunuchos faciēdi ratio, quā Græci eunuchismū dicunt, cōrraria promittit. uerū quia & inuiti subinde à præpotētib; quibuscūq; eunuchos facere cogimur, explicādus cōpendiose modus est, quomodo illis fatis faciam⁹. duplex itaque est, alter cōtusione, alter excisione perficit, & prior quidē in hunc modum: Pueri adhuc infantes in aquæ calidæ foliū premūt, usq; dum aboleantur & euanesceāt, dissoluti nō amplius ad tactū sublabātur. Excisione hac ratione efficitur: Resupinatur in sedili qui eunuchus fieri debet, & scrotum cum testiculis sinistræ manus digitis premit: quo factō duas lineas rectas unā per alterum testiculū scalpello incidēs: ubi exilierint testiculi cute detracta excecabunt, ita ut tenuissimū solum naturale uasorū commercium relinquat, atq; hic modus, eo qui per cōtusionem fit magis probat. Nam qui cōtusionē testiculorū sunt experti, nonnūq; uenerē appetūt,

patte aliqua, ut uerisimile est, testiculorū inter contundendū delitescente.

DE HERMAPHRODITIS.

Cap. LXIX.



Ermaphroditon uirium ex cōpositione Mercurij & Veneris appellatū est, multū utriq; sexui adferens indecori. Cū enim quatuor, Leonide authore, differētię existant, tres quidē in uiris, una in mulieribus constituit. In uiris siquidē aliās iuxta penem, aliās in medio scroto muliebris pudendi pilis obsiri forma apparet. Tertia uero ad hęc accedit, in qua nōnulli per scroto ueluri pudendū urinā profundūt. In mulieribus supra pudendū iuxta pubē uirile frequēter genitale inuenitur, tribus quibusdā extrinsecus corporibus uno tanq̃ cole, duobus autē ueluri testiculis. Tertia itaq; uirorum deformitas qua urina per scrorum excernitur, curationem non recipit, reliquę res curantur corporibus superuacuis ē medio sublati & ulcerum modo tractatis.

QUOMODO NYMPHA EXCIDENDA SIT,

& cercosis emendanda.

Cap. LXX.



At uncula in sinu muliebris pudēdi subfulrās, Gręcorū lingua nymphę dicitur: quibusdā immensę magnitudinis efficit, & nō decentis inuerecūdię notā prę se fert. Quemadmodū uero nōnulli memorię prodūt, sunt quę per hęc partē etiā erēt uiris similiter consistūt & in uenerem ruunt. Quapropter resupinata muliere specillo nymphę superfluū prehēsum scalpello excindimus: diligētia adhibere ne alte ipsam penetremus: unde fluidus affectus, rhyada uocant, excitet. Porro cercosim, cum fir carnis ab uteri ore ptopago quę muliebri pudēdū repleat, inserim foras caudę modo procidar, nymphę cōsistētię cōdylomatis & hæmorrhoidibus.

DE MULIEBRIVM LOCORVM THY (militer auferemus.

mis cōdylomatis & hæmorrhoidibus.

Cap. LXXI.



Hymus eminētia est à reliqua cute recedēs, nunc rubēs, nunc alba, plurima parte sine dolore, thymi corymbis similis: cōdylomara uero, excrescētię sunt in callū induratę, quemadmodū hæmorrhoides iis quę in ano sunt respōdētes, interim & sanguinē profundūt. oēs itaq; eiusmodi in mulieribus excrescētiās, q̃ in conspectū ueniūt, inter detegendū specillo cōprehenfas, ferramētū quod ex dimidio spathā refert, acie excindem⁹, utemurq; galla leuigata, aur scisso alumine. Nam deligaturā in his maiores chirurgi non admittunt.

DE NON PERFORATIS ET PHYMO. Cap. LXXII.



Enitales mulierū partes claudūrur, interim ex natura, inncrim ex accessorio morbo quodā præcedente, aliās in imo, aliās in summo ore, sæpe etiā in medio spatio, idē: aur secundū naturā aut ex obstructiōe. Quod aut foramē inrrescit in recluditq; uel caro uel mēbrana est. Ceterū hoc mali graue sit impedimētū, modo in coitu, modo in cōceptu uel puerperio, aliquādo mensū purgā-

D iii.

tione, si quæ loca obstruit caro torū spatiū occupauerit, in quibusdā enim mediū foramine patescit. Causa igit inuēta, uel ex prōptu, uel etiā demisso specillo, si quidē cōmissura solū fuerit, hāc recta linea scalpello fistulis accommodato dissoluemus: sin aut distētio, hamulis per mediū corpus siue id mēbrana, siue caro existat trāsfixis eleuatū, scalpello diuidemus, ac sanguinis fluore medicamētus sine rosione siccātibus suppresso, ius quæ cicatricē ducūt utemur, instrumēto priapi instar factō iniectis, in quib⁹ potissimū nō alte admodū administratio est adhibita, quod ea de causa fiet, ne particulæ rursus coalescāt. Iā phymus in ostio uuluz succrescēs pari mō curaf.

DE ABSCESSV VVLVAE.

Cap. LXXIII. 10



Bi abscessus circa os uuluz prouenerit q manu tractari queat, non prōpte ad sectionē properare consiliū est, sed cū affectus fuerit absolut⁹, inflāmatio plurima parte increuerit, corpora quæ humoribus incūbunt, attenuata, idq; propter uteri excellentiā. Inter agendū uero mulier in sella resupinabit cruribus ad abdomen & femina cōtractis, inuicē diuaticatis: cubiti ipsius sub poplitibus subiiciētur & funiculis congruētibus ad ceruicē deligabūtur, medicus aut ex dextra sedēs tētabit specillo, quod dioptrā dicūt ærati accommodato. cōuenit aut specillo sinus muliebris altitudinē metiri, ne maiori specilli spatio uterū premi cōtingat, & si amplius illud sinu reperiatur, linamēta implicita summis oris imponūtur, ut super ipsa specillū firmet. Cæterū conuenit specilli trifoliū testulā habens in superiora demittere, & specillū à medico cōtineri, testulā à ministro cōuerti, ut laminis trifoliū diductus sinus aperiat. Iam uero si abscessus sublapsus mollis & tenuis existat, quod digitorū tactu subsidet, iuxta uerticē diuidet spathula, aut scalpello: ori uuluz pure uacuato, linamentū in longitudinē implicitum, lemniscon dicūt, tennerrimū ex oleo rosaceo imponet, uel potius extra diuisionē sinui muliebris sine cōpulsu inferetur. Extra uero summas oras & super pubē lumbos que lanæ succidæ aut puræ, oleo madētes accommodabuntur. Tertio die infidebit mulier in hydrelēū calidū, aut maluz decoctū: absterfis sudoribus linamentū in longitudinē implicitū in fissurā tetrapharmaco per se, uel cum discocto melle inunctū leniter insinuabis: erit aut solutū butyro aut rosaceo, exterior regio cataplasmatibus obducetur dum inflāmatio cessauerit, & uulua abscessu purgata fuerit. Sin aut difficulter expurget, collui debet oriculario clystere ex iridis decocto, aut aristolochiæ, aut melle. Cicatrix duci debet medicamēto ex cadmia, soluto uino per linamentū irroratum. At si intra os uuluz abscessus fuerit, attingi non debet.



QVA RATIONE PARTVS EX VTERO

excuriatur excidaturq; Cap. LXXIII. 10

Vomodo egre parietī succurrat tertio uolumine tradidimus: sin autē eo nihil proficiat, ad chirurgiā merito diuertimus, id

primum notantes, mulier superstes ne futura sit, an minus: & si quidem salus speratur tunc manum admoliamur: sin cōtrā, attingi non debet. Quæ igitur perniciem sui portendunt, inexpugnabili dormiēdi necessitate premuntur, resolutæ sunt, & uix possunt excitari, ac si excitentur in clamatæ, imbecilliter respondentes, rursus graui somno sopiuntur. Nonnullæ conuulsionis modo contrahuntur, aut neruis cōturbantur, aut alimentū non sentiunt, pulsus ualidē inturgescens deprehendit, sed languidus & imbecillus: quæ incolumes futuræ sunt, nihil eiusmodi patiuntur. Oportet igitur resupinam mulierem in lecto sic collocare, ut figura ipsius magis sit decli-

10 uis, crura ipsius exporrecta mulieres utrinque contineant, aut quædam ministra. Si uerò non adfuerint, mulieris thoracem uinculis quibusdā lectulo adfirmabūt, ne corpus attrahētes sequens, attractiōis uim dissoluat, ac summis uuluarum oris diductis, per ministrū sinistram manum contractam conualentibus digitis inunctam, in ostiolum inferemus, idēque pertentabi-

15 mus, & oleo infuso relaxabimus, disquirentes ubi uncū quo fœtus extrahetur, defigi conueniat. Idonei uero loci sunt quibus iniicietur, si in caput cōuersus infans descendit, oculi, occiput, os iuxta palatum, mentū, clauiculæ, & sub costis sitæ regiones, ad hæc præcordia, quæ Græci hypochondria appellant: si in pedes conuertitur, ossa super pubem extātia, inter costalia, clauiculae rursus & deinde uncus dextra manu continebitur, flexu ipsius digitis occultato, sinistra manu leniter inferemus, & particulā cuiuspiam ex prædictis usque ad uacua trāsmitemus. huic alter opponet, quo attractiō recta procedat, neque alteram in partem inclinēt, deinde æqualiter trahetur nō solum recta, sed etiam in latera, quemadmodum in dētiōibus eximēdis fieri

25 solet, & tensiōem interea remittere iterum nō conuenit, postea uerò indicem digitorum inunctum, aut etiam plures demissos inter os uuluarum & corpus impactum, orbiculatim circumagere, ueluti excoiando: si autem iuxta rationem uncus subsequatur, in superiora trāsserre conueniet, atque sic agere dum perfectā fœtus sit extractiō. Si autem secūda obiecta fuerit, nec propter obstructiōem queat cōuerti, circumposito pāniculo, ne deuoluatur, modicē artrahere oportet, ac prolapsū totū ab humero abscindere, idēque facere etiā si duæ secundæ prociderint. similiter etiā pedes procidentēs, corpore reliquo nō subsequente, ab inguinibus amputari oportet: deinde reliquū corpus distorquere conandū. At si caput iusto maius obstructiōnem pariat, & aquā subter cutē capitis infans collegerit, spatula polydis dicata, aut scalpro, aut cultro quod scolopomacherion dicit, inter digitos occultato, caluariā diuidemus, ut uacuata cōcidat. quod si naturaliter amplū sit caput, similiter diuisam caluariā forpice qua dētes aut ossa extrahuntur, comprimemus. Si ossa emineant, hæc quoque auferre ratio est. At si capite ad thoracē adactō obstructiō prouenerit, eodem instrumēto clauiculae compages usque ad interiora spatia diuidentur, ut humore uacuato

thorax concidat & collabatur: quòd si nò concidat, diuifas etiā clauiculas ipfas auferemus, tunc enim collabef. Porro si imus uenter mortuo fœtu fit inflatus, aut aquā subter cutem collegerit, eadem ratione ac uia eum uacua re cum ipsis interancis aggrediemur. Cæterū si in pedes deferuntur, inclinatio facile ad ureri os dirigitur: quòd si iuxta thoracem aut imum uentrē fuerit impactus, linamento ipsum attrahemus, eodēq; modo ea quæ ambiūt diuidemus. At si reliquis ablatis caput reuerfum in hæferit firmitus, sinistra manus demittetur in uterū, & si os ipsius pateat, manū in ima trāferemus, ac caput inuestigatū digitis ad os deuoluemus: deinde unum aut alterū defigentes, propter orificii inflammationem nò propellemus, sed in fusionibus pinguibus copiosisq; utemur: itē in fessibus, fomētis, & cataplasmatibus, ut diducto ore auferatur, quemadmodū superius comprehensum est. Porro quum in latera educitur fœtus, siquidem dirigitur, prædictis utemur rationibus: sin minus, totum ipsum intus dissectū particulatim eximemus, cura adhibita, ne particula quæpiam ipsius nobis necis intus relinquatur. Postquam manu scalpelloq; ad ministrationē obierimus, remediis ad inflammationem inscripris urendum est. quod si profluuium sanguinis oboriat, huius quoq; curationem accepisti.

SI SECVNDÆ FVERINT RELICTÆ. Cap. LXXV.



**F**œtu excusso frequēter accidit, ut uelamentū illius in utero firmiter adhærescat, quod nostri secūdas, Græci choriō, & deuteriō appellāt. Diducto igit uulū ostio, secūde, quæ inibi relictæ sunt, & in partē aliquā orbiculatim conuertæ, facile educunt. Manu siquidē sinistra calida, in unctāq; in fundum demissa, secūdas sublabentes oportet eiicere. Si aut fundo uteri fuerint adnatæ, demissa similiter manu cōprehendentes tēdemus, neq; in rectū, ne uulua procidar, neq; uiolenter admodū, sed leniter primum deducemus, huc illuc circūagentes, deinde paulo ualentius. hoc enim pacto obsequuntur & à connexu dissoluuntur. Quòd si uulua os conuiuere fuerit deprehensum, remediis ad hoc cōmemoratis utendū est. Si uires nò fuerint inualidæ, etiā quæ steruamēta prouocant, & aromatu halitu ex fictili uaporari cōueniet: & si os uteri diductū sit, manu inserta, secundas ut dictū est, extrahere conabimur. At si ne sic quidē exemptæ fuerint, negotiū facessere non oportet, secundū paucos enim dies putrefactæ & in saniē resolutæ excidunt. Quia uerò grauitate odoris & caput opplēt & stomachū peruertūt, suffitus conueniētes excitabunt: ad eos aut cardamomū & ficus aridæ commendantur.

QVOMODO COXENDICES ADVRANTVR. Cap. LXXVI.



Vemadmodū humerus, ita etiā coxa propter humiditatis copiam nōnullis excidēs, uisionē postulat, quod Hippocrates his uerbis testat: Quibꝰ coxa ex diuturno ipsiꝰ cruciatu loco suo mouet, crus cōtabescit & claudi fiūt, nisi uisionē experiantur.

Cōuenit igit̃ tūc illū prāferim locū adurere, ē quo articulus excidit, sic enim humor redundans desiccabit̃, & locus cicatrice densatus nō amplius os suscipiet, quare etiā penitus illic uestionē moliri cōuenit. Recētiore autem tres crustas adhibent, unā retro urentes in acetabuli sinu, alteram supra genu extrinsecus, & tertiam supra exteriorē talum, quā est carnosior.

## DE FISTVLIS ET CERIIIS.

## Cap. LXXVII.

**C**um locus postulet de ani fistulis differere, nihil mali fuerit prius generatum de omnibus fistulis uerba facere. Itaq; fistula sinus est callo obductus, aliquatenus indolēs, in plurib\* nascēs  
 10 particulis, magna uero parte ex abscessibus orit̃ parum dextrē curatis. Callus aut̃ cōtinua quēdā caro est, albida, maioris expers, eoq; etiā doloris neq; uena, neq; neruo ad ipsum pertinēte. Interim sinus siccus, interim humidus est, nūc humor incōtinēt̃ fluit, nūc certis quibuldā tēporibus remittit, ore ipsius oppleto iterūq; ad aperto. Aliās fistulae in os desinūt, aliās in neruū aut aliā quampiā principem particulā, uel recte intrusē  
 15 dentes, uel oblique, itē uel uno ore, uel pluribus peruiā. Quā igit̃ in grādes arterias, aut neruos aut tendines notatu dignos, aut membranā costas succingentem, aut aliquā principalem particulā deueniūt, uel nequaquam uel certe eum multa artificiosaq; diligētia attingere debemus. reliquis hūc  
 20 in modū manū admoliemur. primum tentabimus, si quidem recte intrus tendant cultro excisio si oblique, specillo inflexo. Huiusmodi autē sunt quā ex stagno fiunt, item ex aere tenuissima. In quibus autē duā plures uel orā habentur, notationi per specillū non obtemperantes, sinu per unum ipsius orificiū adusto ex clysteris in reliquas oras transitu deprehēdemus,  
 25 num una fistula sit pluribus oris dehiscens, an plures: ac ubi tentatū est, si quidem per summa habeatur sinus, arctusq; sit, demisso specillo explicantes, scalpello figura cōmodiore callū tollemus, aut unguibus, aut acie scalpri dera dentis: at si latitudinem habeant corpora superflua, circum adimi debent: sin autē non summa occupauerit, sed penitus recte tēdat, eo quatenus  
 30 licet, in alto diuiso, orbiculatim torum callū auferemus: quod si reliquē ipsius aliquē remāserint, medicamēto adurēte eas consumemus. Porro si amplius quū sit medicamento nō cedat, ferro candēte crustas ei inducemus. Cāterū si fistula in os terminat̃, hoc quidē quod integrū est, duntaxat rademus: ubi uero carie aliā uel quandā corruptionē experitur, quod  
 35 uitiatū est, totū excisoriis aciē inter sese oppositā habentibus tollemus, si opus sit, prius cerebra perforatū, siue ad perspiratū duntaxat, siue ad medullam usq; fuerit uitiatū. At si os quoq; emineat caulis modo porrectū, ferra ipsum adimemus. Sumpris itaq; duobus loris, unius quidem mediū ossi eminenti subiiciemus, ipsumq; per ministrum attollemus: alterius autem  
 40 rem quod crassius est, uel ex lana quoq; factum, similiter mediū carni quā ossi subiacet adaptantes, initiaq; infra prehēdentes, per ipsum lorū car

nē deorsum iubebimus detrahi, ne ipsa ferrē dētibz perradaſ, atq; hoc pa-  
cto nos excretionē molimur. Vbi uero particula quē piā princeps ſubiecta  
eſt, exēpli gratia, mēbrana coſtas inuoluens, aut ſpinalis medulla, aut eiuf-  
modi aliqua, inter excidendū aut ſerra coneuſiendū os, laminā, quā quod  
membranā cerebri cuſtodit meningophilax grēcē dieiſ, ſubiiciemus: non  
uitiatio aut oſſe, torū orbiculatim carne nudū ſerra eodē modo deſradetur.  
Fieri nāq; haud poteſt, ut oſſa circularim implicita carne obducant. Simi-  
li ratione ſi oſſis terminus prope articulū fuerit uitiatus, idē ſerra auferri  
debet. At ſi totū ſubinde oſ, nēpe cubitus aut radius aut tibia aut eiufmo-  
di aliquod contabuerit, totū adimeſ. Femoris aut caput, aut coxa, aut ſpi-  
nalis medullæ uertebra affecta, attingi nō debet, periculi quod ex arteriis  
adiacentibus accidit euitandi gratia. Hoc igit modo ac uia faciendū eſt, in  
ſingulis ubiq; particularum uitiatarum ſitu, uicinſitate, & naturā confor-  
tio inſpecto, item morbi magnitudine, & laborantis uiriū robore conſi-  
derato. Cerion aut quum ſinus ſit fiſtuſoſus, mellea diſfluens humiditate, 15  
eandem adminiſtrationē curationēq; cum fiſtulis & aliis ſinibus requirit.

## DE ANI FIſTULIS.

## Cap. LXXVIII.



NI fiſtulæ latentē quidē notantur inde quod ore nō apparē-  
te dolor ipſis oboriat, & purulēta humiditas per anū profun-  
daſ. Pluriſimſ abſceſſus quoq; indicia præceſſerūt: manifeſte  
aut cultro exciſorio, aut ſeta porcina demſſa noſcunt. Nā in-  
ſtrumentū ad ima penetrat, & digito indice in ſedē trāſmiſſo ſub labitur, ſi  
ſtula nimirū ad interiora perforata. At in iis quæ perforatæ nō ſunt, inſtru-  
mentū digito neutiq; ſimiliter occurrit, ſed per mediū corpore nō perfora-  
to. Tortuoſas autē & labyrinthi modo flexuoſas agnoſces inde, quod in-  
ſtrumentū paululū procedat, puſ aut ad illarum portionē copioſum eſſe  
ratur. At quæ prope inteſtinū oriuntur fiſtulæ, agniſionem ſui præbent,  
quod nonnunq; & lumbrici & ſtercus per oriſiciū erumpat. In omnibus  
aut ſerē callus aliquis in oriſicio prominet. Itaq; fiſtula inſanabilis eſt, quæ  
ueſicæ ceruicē perforauerit, aut quæ ad femoris articulum ſit, aut ad ipſum  
longanone tendat. Aegre uero conſaneſcit, quæ oriſicio caret, tum quæ  
deliteſcit & in os terminatur, multifariamq; fiſſa eſt: reliquæ in uniuerſum  
facilē eurantur, adminiſtratione hunc in modum adhibita reſupinato: ho-  
mine, ut cruribus ſurſum porreſtis femora ad uentrem inelinēt, quemad-  
modum ſit in iis quibus elyſter in aluum mittitur, ſi fiſtulæ extremum in  
ſummo ſub labitur, culter, aut ſpecillum per oriſiciū demittitur, ſubiecta  
q; cutis ſimplici linea exciditur: ſi autem alrē intra ſedē fiſtulæ termi-  
nus ſinat demſſo per oriſiciū cultello, ſiquidem perforatam ipſam in-  
uenerimus, demſſo oppoſitē affecto anulo, manus indice digito eiufdem  
ſcapelli initium adigentes & deſcēdentes, ipſum foras reducimus, ac cor-  
pora quæ incumbunt, cultello ſimplici diuiſione liberabimus. At ſi non 40



dū fistula perforata reperiat, in altū uerò ani duntaxat terminet & tentati-  
 bus nobis indici digito sublabat, corpus intercedens quod squamosum  
 membraneūq; est, uehementius mucrone cultelli perforabimus, traducto  
 q; per sedē cultro, rursus scalpello corpora quæ incūbunt resoluemus, quæ  
 5 admodum prius explicatū est. Si igitur terebræ aut scalpelli ad fistulas ac-  
 commodati acie sinus fundum iuxta sedē perforauerimus, ipsum instru-  
 mentum per anum inferentes, illinc totū quod interiaret acie terebelli per-  
 tundemus, & post excisionem specillo aut forcipe corpora diuisionē am-  
 bientia (calli autem sunt) prehensa ex toto adimemus, musculum qui anū  
 10 constringit, sphincter dicitur, ubiq; uitantes. Nonnulli siquidē rudius dū  
 in alto sectionē molirentur, ipsum conuulnerant, atq; inde inuolūtaria  
 stercoreis excretio homini accidit. At si qui timidiusculi chirurgiā fugiāt,  
 Hippocratica uti debent deligatura. Iubet siquidem Hippocrates, linum  
 quintuplex crudum per cultrū foratum uel specillū fistulæ demittere, &  
 15 lini principia coniungi, ac quotidie cōstringi, donec corpus totum quod  
 duabus oris intercedit, dissectū, linum eructet. Si uetustatem malum con-  
 traxerit, quum dissolues etiam psaro aut eiusmodi quodā arido illito linū  
 oportet extrahere. Sunt qui foramini terebræ fistulis dicatæ insertū linū  
 iuxta prædictā rationē propellunt, quod meo iudicio non cōuenit. Dum  
 20 enim chirurgiā uitant, præter quod hanc requirunt, etiam curationem re-  
 morantur. de latentibus autem fistulis Leonides hunc in modum tradit  
 Quum autem imum stringētis musculi fistula sit occupatū, quæ uel à se-  
 de incipiat, uel longius procedat, post notas indicatas, instrumento quod  
 ad sedē diducendā sit aptatū, dico autem quod Græci dioptrion appellāt,  
 25 muliebris sinus modo, anus distendetur, atq; quum fistulæ os clare appa-  
 ruerit, per ipsum specilli mucro demittetur, propelleturq; in imum: lami-  
 na uero subiecta tota fistula super eā diuidetur semispathula, aut spatha si  
 stulis incidendis peculiari. Nos autem quum in talē incidissemus affectū,  
 hoc administrationis modo uti non potuimus, quod ductus fistulæ in cō-  
 30 spectum nō ueniret. Nam inter anum & eius fibulā dextra parte sita erat,  
 instrumentum uerò quod ei diducēdæ erat impositum, magis operatio-  
 nem adumbrabat, at per digitos distendentibus anum nobis, rima quædā  
 inter unam quandam ani rugā ceu fistulæ emissarium apparebat, etenim  
 pus per ipsam emanabat, per eandem uerò cultelli mucronem in fistulam  
 35 ceu ab ea manu ducti demittebamus, deinde dextræ manus indice digito,  
 ani fibulæ inserto, quum inuenissemus quoddā inter digitum & instrumē-  
 tum tenue corpus, uiolentiūq; cultellum digito adegissemus, fundum fi-  
 stulæ sursum conuersum perforauimus, quūq; digito mucronē instrumē-  
 ti foras traieciissemus, cōspicū nobis factū totū corpus quod inter fistu-  
 40 læ oras habebat, dico aut earū quæ initio ad humoris emissariū sitæ erant,  
 & earum quæ nunc à nobis factæ sunt, scalpello præcidentes dissoluimus.



Vm hæmorrhoidū notæ, ex ipso quod uacuat innotuerint, anteq̃ manum admoliamur, clystere utemur copiosissimo, simul intestini superuacua inaniētes simul & anū, ut prōptius inuertatur & extrema ipsius pars exeat, irritātes. Relupinato igitur ægrotante aduersus lumen clarū, si quidem constrictione usi fuerimus, linū quintuplex ferramēto quo ora uenarū in ano extātia adurunt, uel quo uiaz labris hæmorrhoidū circumponentes unamquāq; hoc fune astringebus, una duntaxat relicta, qua sanguis superfluus emanet, quod etiā Hippocrates præcipit. Post astringentiē linamēto implicito oleo madēte, & ad sedem accommodato ligamine, usi, ægro quietē indicemus, oleo tepido, aut multa uētri medicātes, deinde postea cataplasmate ex micis panis & croco utemur. Vbi hæmorrhoides exciderint uino cicatrix ducit. Leonides autē nōn deligat, sed forcipe prehēsas ampliter hæmorrhoidas scalpello excindit. A chirurgia, manna utendum & amylo, chalcitide, uel eo medicamentum quod uisla spongia simul & pice constat, itē pastillo faustino ad absolutā adustionē. Alii uero instrumēti quo uiaz urunt utriculo, medicamine quod adurat repleto, quemadmodū uuā, sic etiā hæmorrhoidas usserūt.

## DE CONDYLOMATIS, TVBERCVLIS, ET

rimis.

Cap. LXXX.



NI. cōdyloma loco solum ab eo quod muliebres locellos infestat, differt occallefcens & ipsum sedis tuberculum, aut inflammationē, aut rima quæ dicitur rhagas præcedente. Primū itaq; tuberculum appellatur, occallefcens autē, cōdyloma: quare conuenit, quemadmodū illa, specillo apprehensa excindere, & medicamentis crustam ducentibus curare. rimas autem à stercore potissimum indurescentes, & cicatrice spatio tēporis occallefcētes, recentes faciemus, uel unguibus uel scalpello radentes, & cicatricem ut par est, inducemus.

## DE ANO NON PERFORATO.

Cap. LXXXI.



Veris recens natis, anus ex natura non perforatus interim inuenit, mēbrana uidelicet obstructus. hæc igit si fieri potest, digitis ipsis dirumpetur: sin minus, acie scalpelli eam excindētes, uino curabimus. Quoniam uerò & prouectis subinde ob uleus nō dextrē curatū anus cōmittitur, cōuenit hanc unioniē instrumēto conuenienti diruprā curare, fistula plūbea, aut obturamine quodā ano usq; dum in totū consanescat, cōmode imposito, ne rursus coalescat. Porro obturamentum medicamine quodam cicatricē ducente oblini debet.

## QVOMODO VARICES EXCINDANTVR.

Cap. LXXXII.



Arix uenæ dilatatio est aliquando in temporibus, aliquando in ima uentris parte sub umbilico, nōnunquam etiam circa testiculos, sed maxime in cruribus. Hic igitur originem plurima parte

ex materia melancholica trahit. eorum autē qui testiculis oboriūtur curationem per scalpellū iam in capite de uaricū ramice tradidimus, atq; his si militer cura infestantes aggrediemur, ab interiori femotis parte incipiētes, ubi etiā origo ipsorū magna ex parte inuenitur. inferius enim, in plures distributi propagines difficiliter tractātur. Loro igitur homine, funiculum superiori femoris regioni circūdamus, iubemusq; ut inambulet. inde repletā uenam a tramento scriptotio aut collyrio notabimus iuxta uaricis sitū, triū digitorū, aut paulo ampliori spatio interposito, decūbente agro crutibus extensis, alterū funiculum supra genu iniiciemus. Elata autem in uerticē uena scalpello scindimus, quā atramenti nota est, tam alte, ut cutē duntaxat scalpellū penetrēt, ne uenam diuidamus. ubi oras uulneris hamulis diduxerimus & mēbranas cultro ad ramicē aquosum accommodo excorauerimus, uena detecta & undequaq; explicata, femoris ligamenta soluemus, uase per obtusum hamū suspenso, acum duplex linū trahentem subiiciētes, habenuā amputabimus & diuisa scalpello per mediū uena, detrahemus sanguinis quantū usus postulat: deinde funiculo superiore uasis partē constringentes, rectumq; crus eleuātes manu expressu, sanguinē qui in crute est euacuabimus, deinde infrā rursus uas deuinciētes, uel id quod inter uiucula est abscisum, à uena adimensus, aut manere id sinemus usq; dum sua sponte cum funibus excidat, & uulnere ficcis linamentis oppleto spleniū & nelæo madēs iniectum deligabimus, medicamentūq; ad pus faciendum apto quod linteolis illinatur perfabimus. Noui autē ueteres nōnullos, funibus non usos: alios inde uas denudatū excindere: alios alte ipsum eleuatū cum uiolētia extrahere abruptum. Verum omnium tutissimus chirurgiæ modus est, quem supra diximus. Porro uarices in imo uentris suboriētes consimiliter tractabimus: item eos qui tempora infestant, quemadmodum in angiologia comprehensum est.

## DE DRACUNCULO.

Cap. LXXXIII.

**D**E dracunculo quomodo medicamentis potissimum emendatē, quarto libro peregrimus.

## DE EXTREMARVM PARTIVM VITIO, ACROTERIASMON APPPELLANT.

Cap. LXXXIII.



35 **V**mmis partibus nonnunq̃ putredine consumptis, nempe manu aut pede, ut etiā ossa ipsa cōtabuerint, uel causa exterius adueniēte, uel fractura, uel præsertim putredinē experta, & excisionē ipsorū quę serra fit postulēt, ante hāc necesse est corpora ossibus circūdata primū diuidete. Verum quia dum hoc primū fit, deinde longiore tēpotis spatio illa serrātur, sanguinis profluii merus subsequitur, recte Leonides non omnia primū corpora pertundit, priusq̃  
40 ex toto putredine cōtabuerint, sed partē, ubi nō plures neq; grādiōres esse uenas aut arterias existimet principio celeriter usque ad os resecat, deinde

E

os protinus ferra execat, panniculū lineum partibus præcisīs circumponens, ne ferra per ipsa tracta dolores pariat, reliquo exciso. ferramēta candentia uasis iniicit, & sanguinis fluore suppresso linamentis insertis & conuenienti deligatura adhibita, remedio utitur quod pus moueat.

## DE VNGVIVM PTERYGIIIS.

Cap. LXXXV. 9



Pterygium in unguibus carnis incrementū est, partē unguis operiens. Fit autē in pedis manusq; potissimū pollicibus: in pedibus quidem, ex offensione plerunq; in manibus autē, ex neglecta reduuia, & post inflammationē in pus mutata. Siqui deni hoc spatio tēporis unguis radicē exedit, ipsumq; corrumpit, subinde totum abolet, sæpe mediū unguis admodū infestat. Iuxta unguis autē radicem ipsam, non nullā ipsius partem putrefactā, aliquando totam radicē à rosione immunē relinquit. Est quum & os corrūpat, odor edatur grauis, digitus per summa dilatetur, magisq; liueat. his igitur manus debet admo ueri, ita ut totā unguis partē relictā acie scalpelli resecemus auferamusq;, 15 deinde exulceratā incisamq; partem ferramētis aduramus. Etenim pterygium genere depastio est, quæ nomen Græce dicitur, neq; subsidet, nisi adu stum, ut si negligatur, digitū corrumpat. At si osse & ungui à uitio immunibus, exterior unguis angulus qui delitescit, & carnē ipsi agnatā pungit, inflammationē excitet, conuenit pungentē unguis particulā tenui cultro 20 aut eiusmodi quodā subiecto sublimē eleuatam, acie scalpelli adimere, & quod eminet medicamēto crustis faciundis idoneo cōsumere. Pleriq; hoc modo ad inuistrationis consanuerunt. Si amplius fuerit uitii, primū scal pello circum adimemus, mox remediū ex medicamentis petemus.

## DE VNGVE CONTUSO.

Cap. LXXXVI. 25



Voniam uero subinde ex appulsu unguibus cōtusis dolores subsequūtur, qui ad manus operationē nos pertrahant, satis est Galeni uerba hic apposuisse, quæ sonāt in hunc modum: Vnguibus cōtusis præsens plane remediū ad dolorē auferen dum sanguinis detractionē experti sumus, quum pulsus doloresq; uehe 30 mentissimi oboriūtur. Cæterum linea obliqua nō recta in imum superne deorsum scalpello acuto debet incidi, ut sanie excreta, secta hæc unguis particula ueluti operculū quoddam subiacentiū efficiatur. At si in rectū superne carnis excresecitiam incidas, aliud corpus carne quæ ungui subii citur per mediā diuisionē suppullulante gignitur, inde rursus dolores pre hendunt, quos in reduuiis nominauimus, carne quæ sub ungue succreuit, contusionem experta. Eiusmodi igitur sectione dolorē protinus egro adi mi uidere licet. per dies insequentes commodum est, nobis subsectam un guis carnem leuiter attollētibus, unguis saniem excernere, ac rursus subie ctæ carni quemadmodū dixi, unguem operculi modo imponere, reliqua 40 digiti totius medicina uti conuenit quæ leniat discutiatq;.



Lauus circinatus in orbem callus est, coloris candidi, clauorum capitibus similis: toto corpore, sed pedum solo digitisq; præcipue enascitur, dolor sequitur, & incessus impedimentum. Itaq; circumsarcificatus specilloq; apprehensus, scalpro acutæ aciei, aut quo uenæ scinduntur, radicitus eximetur. Nonnulli, ne rursus succrescat, candenti ferro utuntur. Myrmecia uero cutis tuberculū est exiguum, callosum, rotundū & crassum, ad basim insidens, & ad frigora sensum formicarū moribus similem excitat. Hæc quoq; totum corpus, præsertim autē manus infestat. nonnulli igitur, inter quos & Galenus est, præcipiunt scarificata extrema parte, fistula pennæ durioris, quales sunt ueterum gallorum, anserum, & aquilarum, in imum adacta, ex basi myrmeciæ auferre. Alii ærea aut ferrea fistula idem faciunt. Recentioribus satis est, scarificatam specilloq; apprehensam, scalpro, clauorū modo, excindere. At uerruca, quæ acrochordon Græce dicitur, exigua cutis eminētia est, doloris expers, callosa, rotunda, plurima parte basim habet angustā, ut suspensa esse uideatur. Nominata uero sic est, quod chordæ nexui respondeat. producta igitur ea eminentiā excindimus: sin autē hoc non fiat, lino saltē aut pilo deligabimus. Novi plerosq; & has & prædictas omnis excrecentias ferramento extincto, ut dicunt, consumpsisse.

DE TELIS E CORPORE

extrahendis.

Cap. LXXXVIII.



Hirurgicæ partem telis extrahendis dicatam maxime necessariam esse, poëta Homerus his uersibus innuit:

Vit medicus multis aliis præstantior, ut qui

Corpore tela trahens, medicamine uulnera curat.

Primum itaq; telorum differentiz enumerari debent. differunt autē tela: materia, figura, magnitudine, numero, habitu, uitiis. Materia quidē quatenus ea quæ imponuntur aut lignea sint, aut arundinea. Ipsa uero tela, aut ferrea sunt, aut ærea, aut stannea, aut plumbea, aut cornea, aut uirrea, aut ossea, aut arundinea, uel etiā eadem lignea, tot enim differentiz potissimū apud Aegyptios reperiuntur. figura autē, quatenus alia sunt rotunda, alia angulosa, nempe triangula, alia sulcata, quæ & gonchota dicuntur: alia trifurcata, atq; alia cuspidata, alia cuspidibus carent. ac cuspidatorū, hæc cuspides posteriora spectantes habent, ut dum extrahuntur, contrā defigantur: illa in anteriora, ut propulsata idem faciant: quæ dā obuersas cuspides habent, fulminis instar, ut dum ipsa trahuntur propellunturq; in obiecta infigantur. Sunt quæ mota cardine cuspides habent cōtractas, quæ dum in trahendo explicantur, telum extrahi prohibent. Magnitudine uariant tela, quatenus alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleant: alia parua,

ut unum digitum æquent, quæ sane & myiata apud Aegyptios uocantur, alia mediū inter hæc locum occupant. Numero autē, quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla cōposita. tenuia siquidē ferramenta ipsi imponuntur, quæ in teli extractione in imo delitescunt. Habitu, quatenus alia ferrū acutū ligno habēt insitū, alia concauū: ac quædā firmiter ligno infixa sunt, quædā negligētius, ut in extractione separata intus remaneant. Viribus differunt, quatenus ueneno quædā sunt oblita, quædā non. Atq; hæc sunt telorum discrimina. Nunc dicamus quomodo extrahantur in conuulneratis, & in bello, & extra bellum spōte, & inuito, quacūq; occasione, ac qualibet ex materia confecta. Cæterum dupliciter tela in carne extrahūtur, tum euulsione, tum propulsatu. In quibus enim per summa telum impactum est, euulsione eximi debet. similiter etiā quæ alte inheerent, obiectæ uero partes si conuulnerentur, sanguinis profluuiū aut dolore ex confortii lege periclitantur. At propulsatu utimur in quibus alte telum infixum est, & partes obiectæ breue spatiū continēt, neq; neruus, neq; os, neq; cuiusmodi aliquid diuisionē impedit: osse autē conuulnerato, euulsorium modū assumit. Si igitur telum cōspicuum fuerit, inde extractionē moliemur: si occultatū est, cōuenit authore Hippocrate, modo uulneratus possit, in ea figura constitutū notare, in qua etiā uulneratus est: si nō possit, iacentis certe quatenus licet modo figurātes specillo tentabimus. & si quidē in carne fixū est telum, manibus extrahemus, aut eius impositorio quod etiam atraçton appellant, nisi exciderit, ligneumq; id potissimū sit: si excidat, forcipe qua dentes radices ue euelluntur, aut ferramento quod à telo extrahendo belulcum Græci uocant, aut alio quopiam instrumento accōmodo, extractionē moliemur, nonnunq̃ etiam carnem prius incidentes, si uulnus instrumentum non recipiat. At si etiam in opposita telum procefferit, nec illac ipsum possit extrahi quā infixum est, diuisis iis quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, uel euellentes ut dictum est, uel per eam partem in quam retendit propellentes, uel si id quod imponitur exciderit, demisso instrumento propulsorio ita ut neruum, aut tendinem, aut arteriam, aut eiusmodi aliquod necessariū uitemus, protrudere oportet. turpe siquidē est, dum telum extrahimus, peius eo malū efficere. Et si quidem acutū, quod *σφύρα* uocant, telū habeat (hoc autē specillo deprehēdemus) scēmina propulsorii instrumētī demissa a cōmodataq; telū propellemus: si concauitatē, mare. Cæterum telum eximetur, si crenas quasdam habere appareat, ceu alia tenuia ferramēta eis possint imponi, ac specillo rursus uli illa sinuueniamus, eadē ratione & uia auferem: si oppositas cuspidēs, ut uerisimile est, telū habēs nō exilierit, uicinus ei locus dissecari debet, si nulla pars necessaria cōtigua sit, detestūq; telum sustentātes mode ste extrahemus. Nōnulli uero exigua arundine cuspidibus ipsis circūposita sic telum euellunt, ne carnes à cusptide radantur. & si uulnus inflam-

matione uacauerit, futuris uis cruentorū modo curabimus, si inflāmatiō-  
nem experiatur, fomētis, cataplasmatīs, & cōsimilibus medebimur. Porro  
si ueneno telo quis ictus est, totam carnē quæ ueneno iam mutata est, si  
quidē fieri potest, præcidemus. Agnosces autē eam quod dā sana carne dif-  
ferat, pallida enim, subliuida, & ueluti mortua apparet. Aiunt autem Da-  
cos & Dalmatas cuspidibus eleniū & ninum dictū oblinere, idq; ubi sangui-  
ni uulneratorū obuenerit, hominē occidere: comestū uero ipsis innocuū  
esse, & nihil mali efficere. At si telū ossi inhaerit, rursus instrumēto expe-  
riemur, & si quidē caro impediāt, hanc adimemus aut diducemus: si uero  
etiā alte in osse demersum est, quod cognoscimus si firmiter id infixū nul-  
la ui cōmoueat, excisorio cultro osse quod iuxta est exempto, aut etiam  
terebra prius perforato, si crassum sit, telum liberabimus. Porro si in prin-  
cipem aliquā particulam telum defigitur, exēpla gratia, cerebrū, aut cor,  
aut guttur, aut pulmonē, aut iecur, aut uentriculū, aut intestina, aut renes,  
aut uulū, aut uesicā, quum iam notæ lethales apparuerint, & euulsio præ-  
sertim multū cruciatum uexationemq; accersitura est, nihil tētabimus, ne  
præter quod nihil sumus profecturi, etiā conuitiandi occasionem idiotis  
præbeamus. Si uero quæ ad basim sunt, in cōspectum tunc nō prodeant,  
præfati periculū, opus aggrediemur. Multi siquidē abscessu quoq; in ali-  
qua uitæ necessaria parte oborto, præter opinionē consanuerūt, quum &  
iecoris fibrā, & omēti partē interiorisq; abdominis mēbranę, peritonæi di-  
co, & totā uulū subinde ademptā fuisse, nec mortē inde subsequutam, me-  
morā prodāt. Est quū guttur de industria subinde in anginis diuidamus,  
ut incapite de ipsius incisione dicebamus. Telum itaq; si in his relinquat,  
in præsentaneā mortem præcipitat, præter quod artem etiā inhumanam  
ostendat: si eximatur, forte etiā salus subsequitur. Porro principaliū parti-  
cularum uulneratq; agnitio nō est difficilis, ut quæ ex accidentiū proprie-  
tate, excremētis, & particularū situ, inueniatur. Si igitur cerebrī mēbrana  
uulnus accepit, dolor capitis ualidus subsequitur, oculi feruent, rubentq;  
lingua agitur, mens desipit. Si cerebrū percussū est, ægri cōcidunt, uox  
nihil sonat, facies peruertitur, bilis uomitus sequit, sanguis per naris erū-  
pit, per autē humor albus pulciculę similis emanat, sanies per uulnus exit.  
At si in uacuā thoracis regionē telum defigat, salua spatiosa intus laxita-  
te, spiritus erūpit. Corde uulnerato iuxta mamillā sinisteriorē, telum ap-  
paret nō penetrans, sed ceu alteri impactū, ac nonnunq; pulsatilem motū  
edens, sanguis niger effertur, si trāsitus pateat, extrema frigescent, sudor e-  
manat, animus deficit, & sine mora exitiū subsequit. Pulmone icto, si spa-  
tiosa laxitas est, sanguis ex plaga spumās uacuas: quum non est, ore magis  
per uomitū redditur, ceruicis uasa attolluntur, lingua aliū colorē assumit,  
multū spiritus attrahūt ægri, frigidi appetētes. In septo trāsuerso, telū iux-  
ta spurias costas defixū apparet, inspiratio autē magna oritur, cū gemitu



& dolore per totā humeri partiū compagē. Quod si abdomen uulnus acceperit, id ex recrementis innotescet, quum latum intus spatium existat, uel etiā telo exempto, uel eo quod imponitur intus fracto, succus ex uentriculo euacuatur, ex intestinis stercus, interim & omentū, uel intestinum proscidit. Vesica autē uulnerata, urina excernitur. Itaq; in cerebro eiusq; membranis ictis, caluaria perforata telum eximimus, quemadmodū in capitis fracturis mox dicitur. in thorace autē, nisi telum subsequutum fuerit, per mediocrē inter costalium incisionē, uel etiā una excisa costa, lamina quæ reliqua tueatur subiecta, euellemus. Similiter in uentre, uesica, ceterisq; in altro particulis, si quidē telum subsequatur, citra negotium eximemus: sin minus, rursus diuisione adhibita medicina utemur, quæ cruētis cōueniat. In uētre, si res postulet, etiā suendi eius ratio, quæ gastrophagia dicitur, accommodabitur, quem in modū comprehensum est. At si in grandiore quodam uase, exēpli gratia, in iugularibus uenis quæ in imo latent, aut arteriis quas carotidas appellant, aut etiā magnis arteriis quæ alas uel inguina intercurrunt, telum defixum, copiosius sanguinis profluuiū propter exemptionē minetur, ratio est hæc funibus antea ex utraq; parte constringere, deinde teli euulsionē moliri. At si particule plures confixæ fuerint, uerbū causa, brachio cum thorace coniuncto, uel cubito cum aliis corporis particulis, uel pedibus inuicem, si quidē non per totas utraq; partes telum penetrauerit aut hasta, apprehensa hæc extrinsecus, ueluti etiā in una euellemus: sin ambas penetrauerit, dimidia ligni parte serra resecata, particulatim singula faciliori figura extrahimus. Quoniā uero & lapides subinde uel buccina, uel plumbū, uel simile quippiā ex funda mittit, tum ui, tum quod angulosa sunt defiguntur. Agnosces igit ea, quod moles aspera & inæqualis illabatur, item quod nō omnino in rectū tendit diuisio, sed amplior, & caro ueluti cōrussa liuidaq; appareat, ad hæc, quod cum grauitate dolor affligat. Hæc igitur cōuenit agitata instrumēto quo quid attollimus, aut aduersa scalpelli parte, aut uulnerario specillo recipere. si autē fieri potest, etiam forcipe extrahemus. Multis autem infixæ tela integra intus infederunt, quæ uulneribus cicatrice obductis, deinde longiore temporis spatio partem eam abscessu occupante & dirupto, exiliere.

DE FRACTVRIS, ET QVOT IPSARUM sint differentia.

Cap. LXXXIX.



Roximum fuerit tradita carnis uition; manu scalpello uel curandorū ratione, etiā de ossiū fracturis, dico sane etiā luxationibus, sermonē instituere, quoniam & ipsæ chirurgiæ generi subiiciuntur. & primū de fracturis agam usq; prius quæ in capite sunt, tum quod inter carnis & ossium chirurgiam medium locū obtinent, tum quod omnibus partibus caluaria præcellit. In uniuersum igitur fractura ossis est diuisio, aut ruptura, aut præcisio, à uiolētia quadam

extrinsecus accidēs. Cæterū plures fracturarū sunt differentiz, alia siqui-  
dē dicitur fieri raphanidon, hoc est ad raphani speciē, alia schidacidon, alia  
sonicha, alia alphetidon, alia cata apothrausim, id est, iuxta refractionem.  
Raphanidon igitur ruptura ossis est trāsuerfim per crassitudinē facta, quę  
etiā sicyedon & cauledon nonnullis appellatur, ex cucumerū & caulium fra-  
ctorum similitudine. Schidacidon autē quasi assulæ modo, est oblonga ossis  
fissura. Is onycha, quasi dicas in unguē, iuxta partem aliquā recta est fissu-  
ra in extremo lunata: quę etiam calamidon appellatur. Alphetidon, ad fa-  
rinę similitudinem dicta, est quum os in multas tenuis parteis finditur,  
quę & ipsa caryedon à quibusdā uocatur. Refractio autē, quę apothrausis  
dicitur, uel etiam præcisio, est quum pars ossis per summitatis rupturam  
aufertur, ut ablata superinnaret. Atque tot fracturę constant differentiis.

## DE FRACTURIS CAPITIS.

## Cap. XC.

**F**ractura in capite peculiariter caluariz est diuisio, nunc sim-  
plex, nūc multifida, à ui quadā exteriorē facta. Porro differē-  
tiz capitis fracturarū hæc numerant. Rhogme, id est fissio, Ec-  
cope hoc est excisio, Ecpiesma, quod est effractio, Engisoma,  
id est, corporū appropinquatio. Camarosis hoc est testudinatio, in infan-  
tibus etiā Thlasus quod est cōfusio. Rhogme igitur caluariz per summam est  
diuisio, aut rima profundior, in qua nequaquā os uitiatū foras emouet. Ecco-  
pe caluariz fissura est cū ossis offensus ruptura. At si à reliquo osse pars of-  
fensa disceserit, aposceparnismon nonnulli uitiū appellant. Ecpiesma in  
multas parteis caluariz effractio est, in qua profundius ossa descēderint, &  
cerebri membranā cōtactu suo premāt. Engisoma caluę ictus est, in quo  
os uitiatū ad interiorē cerebri membranā descenderit. Camarosis diuisio  
caluariz est, in qua pars affecta camerę modo exaltata relinquitur, ut Ga-  
lenus tradit, ac intro à sanis fracturę partibus ossa magis recedūt, mēbra-  
næq; innitūtur quemadmodū in ecpiesmate. sic enim ille existimat. Alii  
etiā trichismon, quasi dicas capillationem, his adnumerarunt. Est autem  
trichismon arētissima rhogme, sensum plerunq; fallens, eoq; latens: quę  
quia nō facile se ostēdit, mortis causam sæpe adfert. Thlasus caluariz diui-  
sio non est, eoq; nec fracturam recte dixeris eiusmodi affectiōem, uerum  
est ossis caluę in interiorē partē impulsio, aut inflexio, concauitatē in-  
tegra caluę continuitate tantum efficiens, ut licet in plumbeis & neisq; ua-  
sculis si foris percutiantur illidantur uel cōspicari. Porro cōfusiōis huius  
duz existunt differētiz: uel enim calua per totū sui affectum cōtēditur,  
ut frequenter etiā cerebri mēbrana abscessu occupetur: uel omnino à cal-  
uaria hæc per totum aut non per totū premitur, sed iuxta exteriorem dun-  
taxat superficiē usq; ad laminam secundā deprimitur. Sunt qui his differē-  
tiis apechema, quasi dicas ab Echo responsionem, addiderint. Ea est, à con-  
traria ictus parte facta caluariz fractura. At fallūtur hi, quoniā non fit in

hominis calua quemadmodū in uitreis uasculis fieri illi docēt. illa siquidē uacua sunt, ideoq; id patiuntur, calua autem hominis undiq; plena & alioquin solida est, sitq; in hoc ictu, quod in capite aliis ex causis fieri uidet, in quo integra cutis continuitate factus abscessus, quū sectus ferit, offensam illic hominis caluariam fuisse innuit. sic etiam & in hoc malo factus cōtra-  
 5 ria in parte abscessus, illic fuisse os credi postulat. atq; hoc uitium quemadmodum prima dicta rhogme curatur. Si igitur fractura capitis facta fuerit, speciē ipsius ex corpore quod percussit, deprehendes, si acutū fuerit, aut graue, aut durum, aut uolenter impactū. Item ex symptomatis quae ictu superueniunt, exēpli gratia, uertiginibus, uoce amissa, aut subito collapsu,  
 10 praesertim in engilomate, aut cōtusiōe, aut cepiesmate, aut interiori camarosi cerebro compresso: itē ex notis quae à sensu capiuntur. Si enim ampla cutis fuerit diuisio, per ipsam promptē cognoscemus: sin autē diuisio nō per torū icrit, aut angusta sit, fracturam tamen esse suspicemur, cute diuisa, & oculis, & specillo demisso eam pernoscemus. Si enim ex aliis quae piā  
 15 fracturis fuerit, inde manifestū euadet: at si rhogme solum angusta & pilosa sensum fugiēs, medicamēto aliquo nigro, liquido, uel etiā ipso atramentoseriptorio infuso, os rademus, ipsa nanq; rhogme nigra ostenditur, conuenitq; rasurā tam diu insistere, quousq; signū rhogmes aboleatur. Si ad cerebri membranā usq; peruenerit fractura, nō rademus, sed agnoscere co-  
 20 nabimur utrum mēbrana ab osse recesserit, an affixa permaneat. Si enim ipsa manet, inflammatio nulla uulnus infestat, æger paulatim febris liberatur, & pus coctū apparet: si recesserit membrana, augentur dolores, & febris similiter, os alium sumit colorem, pus tenue & crudū effertur, & si medicus rem negligētius tractet, nec perforatione utatur, hoc grauiora obor-  
 25 niuntur symptomata, nempe bilis uomitus, conuulsio, mentis deliriū, febris acuta, in quibus manū admoliri non oportet. Quod si his absentibus membrana cerebri non abscesserit, rhogme autē duntaxat fuerit, etiam solo rasorio curatur, uel si usq; in altrū penetret. Sin autē tantum usq; ad laminam secundam, quae diplocē dicitur, fractura peruenerit, eousq; radendum  
 30 est, uel etiam confractum os eximendum, quemadmodum docebitur. At si in tenuia frustra os fuerit comminutum, etiam hæc diligenter instrumēto idoneo auferentur, etiam si membrana non abscesserit. Ab initio autē quum uulneratum susceperis, hyeme quidem ante diem quartumdecimū omnino os auferre tētrato: æstate, ante septimum, priusquam cōmemora-  
 35 ta oboriantur symptomata. Cæterum manum hoc modo admolieris.

#### CALVARIAE FRACTAE CVRATIO.

Derafo super uulnus capite, duas lineas iuxta rectos angulos mutuō se secantes, quæ literæ X figuram accipiant, incidemus. harum autem alteram  
 40 esse cōuenit, quæ iam præcessit, deinde quatuor in uertice angulos exoriantes, ut totum os, quod perforabitur nudum existat: si quidē sanguis fer-

tur, linamentis ex posca obiectis cohibebimus: sin minus, siccis. deinde im-  
 plicito linamēto ex cnelēo iniecto, conuenienti uinculo utemur. sequēti  
 die, nisi recentius aliquod symptoma prohibeat, perforare os uitiatum ag-  
 grediemur. Collocato igitur in sedili aegroto, aut recubente prout uulneri  
 5 conuenit, auribusq; ipsius lana obturatis, propter sonitū qui ex appulsu  
 redditur, uinculum a liquo d uulneris soluemus, linamentis omnibus exē-  
 pris, & spongia deterfis sordibus, iubebimus ministris duobus, ut tenuibus  
 fasciis circumpositis, quatuor angulos corporū quē fracturę incūbunt,  
 attollant, & si quidem os fuerit imbecillū, aut natura, aut fracturę uitio, id  
 10 scalpris excisoriis acie inter se aduersis, aufeternus, primū cauis excisoriis  
 scalpris, quos Græci cyclifcos uocāt, à latiore incipientes, mox angustiori-  
 bus, deinde specilli modo angustis, malleolo sensim adactis, ad capitis cō-  
 cussionē utemur. Si aut ualidū os fuerit, prius eo terebellis quę mergi nō  
 possint, quas ab argumento abaptifmos dicūt, perforato, (eiusmodi uerō  
 15 sunt, quę paulo interius q̄ cuspis acuta est, eminētiās habent, quę ipsas ad  
 cerebri membranā demergi prolubeāt) per scalpra circūcisiōe usi, id quod  
 uitiatum est, auferemus, non uniuersim, sed particulatim. si quidē fieri po-  
 test, digitis: si non, forceipe, aut uulsella qua uel ossa uel pili apprehendunt,  
 aut eiusmodi quodā instrumento. Locus autē qui inter foramenta est, tā-  
 20 tum spatium continebit, quantū maximi mucronis specilli longitudo. tā-  
 altrē uerō descendet, ut interiorē ossis superficiem accedat, cura adhibita,  
 ne membranā cerebri terebra attingat. Quare etiam terebrā ossis crassi-  
 tudini respondere cōuenit, compluribus id genus ad hoc præparatis. At si  
 fractura caluarię usq; ad secundam laminam duntaxat peruenerit, ad hāc  
 25 etiam usq; solum foranda est. Osse iam ablato, asperitudinem quę ab exci-  
 sione caluarię prouenit, rasorio aut quodam scalpello excisorio ad equabi-  
 mus, laminā quę membranę custos est, subiicientes, ac ossiculis quę remā-  
 ferāt, ut uerisimile est, aut spiculis ingeniose ablati, linamēta inferemus,  
 quem modum diamotosin appellant. Hęc ratio chirurgię cōmuniōr si-  
 30 mul & promptior est, & periculo uacat. Item modus qui per lenticulatum  
 excisoriū scalprum fit, mirum in modum Galeno cōmendatur, sine for-  
 tione, post insculptionē cyclifcis salpris factam, ipsum adhibenti. Scribit  
 itaq; hunc in modum. Si uero unam semel partem nudaueris, ac scalprum  
 qui in cuspidē præfixam habet retusam leuemq; lenticulę speciem, aciem  
 35 uero per lōgitudinem erectam, submiseris, ubi latam partem lenticulę su-  
 per membranā defixeris, malleolo series, diuidesq; sic caluariā. ita si qui-  
 dem agentibus, omnia quę requirunt, euenient. Nam mēbrana, ne si dor-  
 mirans quidē agas, latę tantū lenticulę parti occurrens uiolari nō potest.  
 Quōd si ubi adhæreat caluarię membrana, huius quoq; adhærentiam in  
 40 noxie dirimit rotundum lenticulę extremum, subsequitur aut praeunte  
 eam à tergo ipse scalper caluariā secans. Quare nec qui minore cum peri-

culo, nec qui celerius perficiatur, forandi modū inuenias. At quæ administratio ferris & modiolis, quæ chœnicion siue chenicida Græci uocāt, peragitur, rectioribus, cum noxia, improbata est, sed administrationē quā in rhogme exposuimus, probāt. Idem uero modus ossiū excidendorum cōuenit in reliquis etiā caluariæ fracturis. Quantum uero excidere cōueniat, Galenus nos docebit, hunc in modum manifestō scribens. Quod uehementer est cōfractum, id totum auferri debet: si uerō ab eo fragmēta quædam longius excurrant, quemadmodum aliquādo cernitur accidere, hæc persequi ad extremum nō oportet, illud probè scientes, nullam inde noxiā sequuturam, modò reliqua omnia rite sint confecta. Post chirurgiā pāniculo simplici lineo, uulnere æquali, rosaceo madenti, cerebri membranā operiemus, exiguamq; lanæ stuppam similiter rosaceo imbutam prædicto panniculo imponemus, deinde linamentum implicitū duplex in cœclo aut ipso rosaceo tinctum, toti uulnere circumponemus, diligētia adhibita ne cerebri membrana grauetur, postea latiore utemur ligamento, neq; hoc astringentes, uerum ut linamenta solum teneat. Viētus adhibetur qui inflammationē arceat, & febribus peculiaris est, membrana cerebri crebrius interea rosaceo superfusa. Post tertium diem ubi uincula dissoluetis, & sordes spōgia deterferis, remedium induces quod cruentis iniicitur, & inflammationem repellit, superaccommodans membranæ aliquod ex cephalicis dictis aridis, usq; dum carne oppleatur. Nonnunquam os radetur, si hoc res postulet, propter quasdam summitates extantes, aut etiam propter ipsius carnis productionem. Reliqua medicamentorū materies, ut in uulneribus comprehendimus, admoueri debet.

#### DE CEREBRI MEMBRANÆ INFLAMMATIONE.

Quoniam frequenter cerebri quoq; membrana post chirurgiam, inflammationem experitur, ut nō solum caluarię crassitudo, sed etiā cutis ipsius excedat cum renixu, & naturalis ipsius motus pulsatilis impediatur, quæ potissimum & conuulsio aliq; grauias symptomata uel ipsa motus subsequitur. Origo inflammationis aut ex acuta quadam ossis eminentia pungente ducitur, aut ex linamentorum grauitate, aut perfriētione, aut multo esu, aut uini potione, aut alia quadam occasione latente. Si quidem ex manifesta occasione inflammationē contrahat mēbrana, ea protinus amputanda est: sin ex latenti, magis pugnate cōuenit, ut pore sanguinis dimissio ne, si causa non obstiterit, uictu qui inflammationi cōgruat. Item loco induci remedia debent, calentis rosacei fomentum, & althææ decoctum, aut scœnugræci, seminis lini, chamæmelorum, similiūq; superfundī: cataplasmata uerō ex cruda polenta, aut lini semine, cum prædicto decocto & galinarum adipe, adhæc fomentum ex lana adhibebitur. Capiri & occipitio meatuiq; auditorio oleum aliquod inflammationem prohibēs instillabitur, ita ut uiscerum cura habeatur, cataplasmatibus adhibitis, itē toti corpori

prospicere consilium in calidam id aquam, ut par est, collocantes inungentesq;. Si perseverat inflammatio, & nihil aliud prohibet medicamento quod bili ducenda est, purgare ipsos Hippocrates præcipit.


SI MEMBRANA CEREBRI NIGRVERIT.

- 5 Cerebri membrana si quidem per summa ex medicamentis in id efficacibus nigruerit, mel triplum rosaceo miscentes & per linamenta id applicantes, curabimus, deinceps & reliqua admoventes. At si nigrities sua sponte provenierit, idq; in imo potissimum, cum aliis grauib; indiciis, attingi tunc non debet, ut quæ nativum calorem mortuum innuat. Noui quendam  
10 qui post annumq; affectu confictaretur, caluaria perforata superuixerit. erat enim fractura in sincipite ex telo facta, emissariumq; habens per quod etiam membrana ab affectu immunis conservata est.

DE NARIBUS FRACTIS CONT-

sisq;ue.

Cap. XCI.

- 15  Arium pars ima, quæ sit cartilaginosa, frangi non solet, sed contundi, sima fieri & perueriti: superior quæ ossæ est, nonnunq; fragitur. In his aut deligaturam damnat Hippocrates, ut quæ magis resimas efficiat & distorqueat, præterq; in his quæ appulsu quodâ per medias naris emineant. hic enim conuenientem habent cum me  
20 dicamine imposito assumit, ut compressæ nares naturalem figuram recipiant. Fractis igitur naribus, in ima quidæ parte, indice aut paruo digito demisso in exteriora diriguntur: in interiore, etiâ scalpelli mucrone id faciundum est, primo statim die, aut non multo post. Quæ uerò decimo die naris ossa continent, extrinsecus indice magnoq; digito hæc efformare congruit.  
25 Ut aut figura quam singis non concidat, duo obturamina tortilia ex panniculo inuoluta, naso impones, unum singulis nasi foraminibus. et si altera duntaxat naris pars sit peruersa, eaq; sinere, donec os aut cartilago contineat. Nonnulli fistulas ex anserum pennis paniculis replentes, naribus insinuarunt, quò figura custodiat, & respiratio non impediat. quod non nec  
30 cessarium puro, quum spiritus per os trahatur. At si inflammationem nares sentiant, medicamentum aliquod quod eam arceat indemus, ex epli gratia, ex succis inscriptum, aut quod oxelæo constat, aut eiusmodi aliquod. uel ex triticea simila & thuris fuligine seu gummi unâ incoctis cataplasma iniicemus, tum propter inflammationem, tum ut nares contineantur. Quod si  
35 in alteram partem nares declinantur, Hippocrates postquam commodè eas figurauerit, oblongam habenulam digitali latitudine iuber circumdari, alterum ipsius extremum taurino glutine, aut gummi illitum summi: & narium parti agglutinari, ex latere quo inclinant. ubi illa exaruerint, habenam transferre per aurem oppositam uersus occiput, & frõtem oportet, deinde ipsi sub altero habenæ principio affirmabitur, ut nares in latera retractæ ad mediam dirigantur figuram, quod non admodum recentioribus pla-

cuit. Porro minutim contractis narium ossibus, diuidere ipsas, aut superiorem ipsarum partem conuenit, ac fragmenta ossiculorum uulsellis auferemus, futuris diductas partes committentes, accommodantesq; ipsis remedium quod cruentis aptum est, & conglutinat. Sin autem extra nares ulcus fuerit excitatum, linamentis in lōgitudinem implicitis curabimus. Sunt qui plumbeis canalibus, quas solenas Græci dicūt, usq; dum cicatrix fieri obducta usi sunt, ne caro ex ulceribus supererescat.

DE INFERIORE MAXILLA CONTRACTA,

& aure contusa.

Cap. XCII.



E aure contusa tertio libro tractatū est, tanq̃ huiusmodi affectus ad fracturas non pertineat. Inferior maxilla multas ob causas frangitur. Si igitur extrinsecus solū offensa nō per transuersum fissa inrorsus cauata fuerit, promptū est cognoscere. Opus aūt est altera manu, si quidē dextra maxilla fracta fuerit, dextra: si altera, sinistra. indice igit & medio digito in affecti os demissis, interiorē fracturæ extantiā, probē foras cōpellere conuenit: altera manu foris eā excipiente. Rectitudinē uerō maxillæ ex eiusdē dentium æqualitate deprehendemus. Quod si fractura per transuersum facta fuerit, primū tensiōe, dein de retractione, quā antitasin uocāt, partis in contrariū usus ministro eam cōtinente, ut dictū est, dirigere aggredieris: porro denteis in parte fracta diductos, inter se, ut Hippocrates præcipit, auro deligare, nēpe lino ab auro chrysolino dicto aut chrysonemate: quoniā uero huius faculas nō omnibus concedit, lino ualido, aut bysso, aut pilo equino, aut id genus ali quo. Verū si quidē eū ulcere fractura euenerit, specillo tentandū, nū quandoq; etiā re fractio ossis facta sit. atq; si exigua diuisione facta, os unum re fractū aut plura remanserint, idonco instrumento auferentes, futuris oras ulceris commitemus, & medicamento cruentis apto usi, deligabimus: sin autem citra ulcus contigerit, ceratum simplex maxillæ impositū conuenienter deuinciemus. fasciæ mediū per occiput dispēsbis. habenulæ utrinq; per aureis ad summam maxillā, inde rursus ad occiput, mox ad mentum, inde per genas ad sinciput, inde rursus sub imam occipitii partē, distribuentur, ubi & fasciam desinere oportet. Super hac rursus uinculum aliud fronti circūdatum, quod ἐπιλεμα Græci dicunt, post caput coniūgetur, omnes prædictæ fasciolæ id circum astringent. Alii uero tenuem ferulā, quemadmodum alii uasculum profundius paris lōgitudinis impositum maxillæ, deligant, ut commemoratum est: reliqui deligatura, quam Græci dicunt phorbiām, utuntur. At si utraq; maxilla in summo mēto auellatur, qua etiam parte coeūt, ambabus manibus parum inuicē distantibus, rursus adaptato, & denteis adunitos, quomodo diximus, deligato: ac congrua usus ligatiōe, tenui ac forbili alimento ægrotantē nutrirī iubeto. Nā mandere ipsi inimicum est. Si aliquid emotum à figura conuenienti puta



ueris, tertio die soluēs, iterum illigato, quod tam diu facies, q̄ callus fracturam firmarit. firmatur autē maxilla intra treis potissimū septimanas, quoniam laxa & medullæ plena est. Quod si inflāmatio aliqua superuenerit, ne aduersus hāc quidē, tum fomēta, tum cataplasmata negligere oportet.

5 Quod in omnibus ex æquo obseruatum abs te cupierim.

DE IVGVLO CONFRACTO.

Cap. XCIII.



Vgulum, quod etiā clauicula dicitur, quum naturaliter figuratum est, interiore ipsius extremo, cum pectore cōmittitur: exteriore, cum summi humeri cōpage, seu articulamēto adiun-  
 10 nitur. eoq̄: si humerū, aut ipsum sustinēs brachiū, fracturam quacūq̄: rādem parte experietur, quā humerū suum spectat, plerūq̄: infra interius extremū fertur, unā cum brachio detractū. Præstiterit autem per trāuersum potius q̄ assulatim, aut arundinis modo clauiculā frangi, quod uulgo receptū est. Nam tranuersim cōfracta, extensione cōpressio  
 15 neq̄: digitorū prompte in naturālē figuram reuertitur, cætera eminentias habēt, quæ ægre possint coaptari. Si igitur per totam ipsius crassitudinem quocūq̄: modo, iugulū fractum fuerit, duo ministri, unus ad humerum eiusdē lateris fractæ clauiculæ manibus circuminectis, brachium ad exteriora simul & sursum trahens, alter oppositum humerum, aut certe cerui-  
 20 cem attrahens, retractionem à se, quam Græci uocant antitafin, molienti: medicus suis digitis fracturam dirigit, prominentiora pellēdo, ima foras attrahendo. Quod si maiorem retractionē à se desideret, orbiculum bonæ magnitudinis ex panniculo, aut lanis, aut eiusmodi aliquod corpus alæ subiciens, cubiti gibberum lateri indidem adiget, ac reliqua sicut dictum  
 25 est, exequetur: si autē id nequeat, extremū clauiculæ iuxta humerū in altum situm ad superiora, ægrotante resupinato, educet, cervicali quodā medio-cri, dorso subiecto, ministro humeros duos ad ima deprimente, ut os clauiculæ quod in imo est, reuocetur, rursus digitis suis fracturā conformabit. Porro si partem aliquā iuguli refractam, instabilē, aut etiam pun-  
 30 gem percipiamus, scalpello in rectū diuisam eandē auferemus, ac reliqua scalpris exciforiis, lamina quæ integra tueatur, aut alio scalpro propter firmitatē clauiculæ subiecto, ex æquabimus, si quidē inflammatione careat, futuris: sin aliter est, linamentis utemur. & spleniis diuersis præparatis, ad ossis eminētis inclinationē, maiora ex cis & crassiora supera commodabi-  
 35 mus, si inflammatio infestat, oleo imbuta: si minus, arida. ac mediocri ex lana orbe propter alam subiecto, conuenientē inducemus deligaturā, per axillas, affectam clauiculam, scapulasq̄: prout res exigit, fasciātes. & si qui-  
 dem ad ima tetēderit pars clauiculæ humero proxima, latioris habenule dimidium, eiusdem cubiti gibbero subiiciētes, totum brachium ex collo  
 40 suspēdemus: altero autē uinculi dimidio, manum, quemadmodum in iis sit quibus ex cubito sanguis detractus est. At si uersus superius extremum

F

inclinauerit, quod rarum est, brachium suspendi non debet, uerum resupinus æger decumbit, & tenui nutrietur uictu. si uero opus est, etiam fomen- tis adiuuabitur, sed pro ratione, usque dum callus eam consolidet. firmatur autem plurima ex parte clauicula diebus uiginti.

## DE SCAPVLIS.

Cap. XCIII.



Capulæ quæ latæ sunt & mēse figurā repræsentāt, nō frangū-  
tur: iuxta spinā uero fracturā sustinent, nunc cōpressæ, nūc  
rupturā simplicē expertæ, aliàs etiā refractæ. Cōpressionem  
itaque tactu cognoscimus, si caua oecurrat, stuporē proximi  
brachii, & dolorē pulsatilem inducat. Ruptura ex tactus asperitudine & lo-  
ci dolore deprehēditur: ambo autē ratione qua inflammationē arcemus,  
curantur. Refractio & ipsa tactu agnoscitur. Porrò quiescentes scapulæ fa-  
scia conuenienti adaptantur: si autē pleniora sint & pungāt, per sectionem  
auferemus, & futuris, ut prius dictum est, utemur. Fasciæ autem & hic simi-  
liter ut in clauicula, iniiciuntur, incubitus oppositi lateris conueniet.

## DE PECTORE.

Cap. XCV.



Edium pectus, diuiditur imprimiturque: summū, refringitur.  
Rupturā itaque per mediū faciam dolor loci & inæqualitas se-  
quitur, & strepitus digitis innixus eliditur: impressionē uero  
dolor uehementis, spirandi difficultas, tussis, membrana quæ co-  
stas incingit dispuncta, nonnunquam sanguinis eruptio, partis contra-  
ctæ cauitas, & in cedēdo facilitas. Curationē eam adhibere oportet, quam  
in scapulis prodidimus. In impressione autē adaptatio Hippocratis adhi-  
bebitur, quam ille in clauicula quæ foras proeesserit, usurpat, per incubitū  
supinum cervicali dorso subiecto, scapulisque constrictis, ita ut costæ utrin-  
que manibus simul cōtrahantur. Iam uero costis lana obiectis circularē  
adhibebis deligaturam, loris prius in rectum subditis, postea duorum ini-  
tia inuicem excipiuntur, quæ orbiculares fascias decidere prohibeant.

## DE COSTIS.

Cap. XCVL



X costis & spathis dictis, ossæ quidē omni in parte rupturā  
sustinent: spuriæ autē, in ea tantū quæ spinæ adiacet. nam hic  
solū ossæ habent naturā: in exteriorē parte in cartilaginē de-  
generātes, contunduntur, nullā fracturā percipiūt. Notæ ipsa-  
rum nō sunt difficiles, etenim inæqualitas digitis explorantibus occurrit,  
strepitusque & ad eonfractū puerlio. Quod si intro spectauerint, dolor  
uehementis punctorius sequitur, eo qui in costis prouenit grauior, quod aculei  
modo membranā costas integrentē cōuulneret, itē ægra respiratio, tussis,  
eruptio sanguinis, subinde eomitæ. & reliquas utique immutationes digitis  
licet cōformare, at eam quæ intro spectat, nequaquam, quod tēdi nequeat. unde  
alii cibum flatulentū uberemque assumi iubent, quo fractura ex inflati-  
one & tēensione foras propellatur, quod necessarium non esse puto. Nihil

enim cōmune ad hoc inter se habent, tum thorax, tum uiscera nutritoria, præter quod inflāmatiō etiam ex repletionē augeatur. Alii cucurbitulā agglutinant, quod à ratione & uia curandi alienū nō esset. nisi corpora ex contractionē congregata, fracturam amplius ad interiora propellerent.

- 5 Quapropter Soranus hunc in modū scribit: Lanis oleo calido madentibus partes contegētur, & linamentis implicitis intercostale replebitur, ut deligatura æqualis iuxta orbiculārē circunductum ueluti in pectore fiat. Omnia uero ut in pleuriticis fieri debent, ad magnitudinis proportionē. Porro si magna quædā necessitas cōpellat, quod mēbrana costas cingens  
10 uehementē cōpungatur, cutem diuidere conuenit, & fractam costæ partem detegere. deinde lamina, ne tunica costas tegens cōniulneretur, prius subiecta, ossicula quæ pungūt ingeniose excindere ac eiicere oportet. postquam hoc feceris, ea sane quæ inflammationē carent cōiunges, & eruentōrum modo curabis: quæ autē illa affliguntur, linamentis oleo madidis  
15 operies, uictum curationemq; adhibēs inflammationi dicatam. Decumbent ægri ea figura quā facilius tulerint.

DE COXARVM ET PECTINIS OSSIBVS. Cap. XCVII.



- 20 Coxarum aut ilium ossa raro quidē frangūtur, sed easdē cum scapulis differētiās sustinēt. Frangūtur enim in extremis, rumpunturq; in longitudinē, & per mediū findūtur. Cōmites nō tæ ipso sunt, dolor partē affectam affligēs, punctiōnis pulsusq; sensus, eruris subitus stupor propter fissurā: adaptationē scapulis similem postulant, auersantur autē solam ex chirūrgia eius quod fractum est, exemptionem per exteriora corpora, ut quæ si opus sit, digitis confor  
25 mentur. deinceps autē etiam aliam curationem moliri oportet, fomētis utendo, & cōeua ilium linamētis adimplendo, quod deligatura cēu fasciis circularibus superiniectis, æquabilis efficiatur. Eadem etiā dicēda sunt, de pectinis ossibus, nihil enim peculiarius de ipsis dicere habemus.

DE VERTEBRIS, SPINA DOR-

si, & sacro osse.

Cap. XCVIII.



- 30 Ertebrarum cōplexus interim sane cōtusionem, raro uero & fracturā experiūtur. propter quæ contusis spinalis medullæ mēbranis, uel ipsa etiā medulla, nerui in doloris consortiū adducūtur, & mors præceps subsequitur, magisq; si certis uertebas affectus infestari, unde præfatus periculū, si quidē fieri potest, aut  
35 debis etiam sectione ossiculū quod premit eximere: si minus, ratione quā inflammatio propulsatur, ipsas lenies. At si processus uertebrarū aliquis unde spina cōstat, fuerit refractus, digitis tentantibus propere sublabet, dū refractio mouetur, rursusq; in locū transponitur. Cōuenit autē id quod  
40 refractus est auferre, cute extrinsecus incisa: suturisq; cōmissa, remedio cruentis idoneo uti. Ceterū osse sacro cōfracto, index sinistræ manus digitus in

anum demittendus est, dextra manu quod confractū est, quatenus licet, in naturalem figurā reducere oportet. Si autē aliquid refractū sentiamus, hoc quoq; diuiso, deligaturam curationemq; congruam adhibebimus.

DE BRACHIO.

Cap. XCIX.



N brachio cōfractio Hippocrates quidem intentionē hoc pa-  
cto molitur est: Lignū, inquit, oblongū colūnulæ modo, per  
summa fune deligatum, obliquū ex trabe quadam suspēdere  
oportet: collocato autē homine in sublimi quodā erectius,  
uel iuxta figurā quæ à recta sessione orthocatheuton dicitur, manū ipsius  
super cōmemoratum lignū traducere, ut mediū ligni alæ eius transuersim  
adapetur. manū autē inflexo iuxta rectum angulū cubito minister pro-  
cumbens cōrinebit, deinde graue aliquid, exēpli gratia, lapidē aut pondus  
plumbēū uel eiusmodi aliquid ex cubito suspēdens, sinensq; pēdere publi-  
me, ita fracturā conforabis: uel loco pōderis, famulus ad ima brachium  
detrahat. Nōnulli uero loco colūnulæ gradu scalæ usi sunt. Soranus hūc  
in modū tradit: ægro in sedili collocato, uel, quod sari est resupinato quō  
minus molestiæ sentiat, manu fune ligata iuxta cōpagem qua ipsa eum  
brachio coniungitur, & ex ceruice suspēsa, ut angulosa ipsius figura seruet,  
ministris duobus iubebimus, huic, supra fracturā, illi, infra digitos circum  
ponant, atq; sic tensionē perficiant. Quōd si ualētiorē opus sit tractatiōe,  
duos funeis æqualeis brachio circundamus, unū, supra fracturā: alterū, in-  
fra. atq; uni famulo super ægrotantis caput cōsistenti, alteri iuxta pedes, ca-  
pita funiū tradētes, iubebimus in diuersa brachiū distēdere. At si summus  
humerus fracturā senserit, dimidio uinculi, quod circa dicitur, alæ subie-  
cto, reliquā partē iuxta caput teneri iubētes, alio quod oppositū est retra-  
hente, antitafin, hoc est, à se retractionē uti dictū est, moliemur. quemad-  
modum sane si cubitus cōfractus fuerit, illi uel iuncturæ manus cum bra-  
chio funis iniicietur. Ossibus iam fracturæ probe coaptatis, distentio qui-  
dem remittet, sed iuxta Hippocraticā consuetudinē deligabitur. Porro si  
fractura inflammatione uacet, recensq; sit, lineis utēdum fasciis oblongis  
abunde, circa treis quatuor uel digitos latis, aqua madētibz, aut etiā posca:  
si inflammatio adest, lanis tenuibus mollibusq;, oleo imbutis: & si quidē  
in medio brachii fuerit fractura. initiū fasciæ super fracturam iniicietur:  
ubi bis res uel illigaueris, sursum fasciā ducere conuenit, ut (quemadmodū  
inquit) sanguinis influxiones excipiātur, atq; illic finiatur. Iam uero & se-  
cunda fascia uti oportet, initiū eius similiter supra fracturā iniiciēdo, atq;  
alia eo modo quo in priori: rursus autē superne deorsum, atq; iterum sur-  
sum reuocare, illic etiā sic terminabitur. Porrō cōstrictio mediocris esto,  
tum nostri sensus, tum ipsius ægrotantis iudicio. At si iuxta summā hume-  
ri compagem contigerit, priore fascia illam & scapulas & pectus cōprehē-  
des, ut deligatura fiat quā Græci geranida appellāt, perq; secundum usq; ad

cubitus dispensabis, ac inde ad supraposita recurre, cum summo humero scapulas pectusq; cōprehendens, primæ fasciolar similiter. Quod si gibbero fractura obuenerit, etiam cubitū colligare expedit, ita ut anguli figura cōfuetur. similiter in aliis quoq; artubus, nimirū cubito, femore, tibia, cum fractura in parte, aut etiā iuxta articulū & nō in medio mēbri existit, post articulū fasciam iniicere expedit. Recentiores itaq; secundū deligaturam protinus ferulas etiam iniiciunt, ut adaptationis figura contineatur, constringētes ipsas prout sensus & tumor ex inflammatione postulat: ueteres autē, à die septimo ferulas accōmodarunt. nam intra hunc inflammatione declinante membrū redditur tenuius. At Hippocrates tertio die ligamēta solui iubet, ne tensio quæ piā, aut motus præter solitū contextæ particulæ obuenerit, aut eius quod iam infixū fracturæ est, perspiratus prohibeantur, propter quos non solū noxius pruritus quibuldam accidit, sed etiam erosa à saniei acrimonia nonnunq̃ cute, exulceratio cōcitur. Itaq; aquæ temperatæ tantum superfundere ratio est, quantū saniem discutere sufficit. Post septimū diem, ex maiore interuallo soluere cōuenit, ceu partes non amplius sanie excernere desiderent, imò etiā calli obfirmatio hoc modo felicius prouenit. Cæterum ferulæ iuxta sequentē rationem debēt iniici. Splenia triplicia oleo imbuta super fascias circūdantur. si igitur membrum crassitudine fuerit æquabile, similiter: si inæquale, partibus magis cōcauis per splenia repletis, æquæ crassitudinis membrū ferulis accōmodandis efficiemus. deinde lana aut stuppa ferulas mediocriter inuolutas, in orbem fracturæ circūdamus, non minore q̃ digiti spatio inuicē distantes, easq; moderate constringemus: ita tamen, ut quatenus fieri licet, articulū propius accedere ferulas prohibeamus, præsertim iuxta interiorē flexus partem. ulcera siquidem in ipsis nonnunq̃ & neruorum inflammationes pariunt. uerum illic laxiores ipsas esse oportet, quemadmodū ualētiores, ubi fractura curuatur. Præstiterit autē thoraci etiam brachium mediocriter colligare, ne ipsum loco motum, figuram peruertat. At si quādoq; inflammatio fuerit, (eam uero agnosces ex ambiente tumore, ac rubore, & quod membrum nunc multo magis quàm prius stringatur) uel si confractum membrum distortum sit, & nihil horum appareat, sed ligamenta laxa, uel e contrario strictiora, quàm par est, inueniantur, solutis ipsis deligatura instauranda est. Resupinati igitur ægtotus debet, ita ut super stomachum manum contineat: brachio subiicietur molle aliquid pellem super se habens, ut superfusionum influxus excipiat. Superfundetur autem quotidie oleo calido, præsertim quum urget inflammatio, quādo etiam cibis tenuis exhiberi debet: postea mediocris, ad calli generationem. quies indicitur usque dum fracta occalluerint. occallescūt autem brachium & tibia, diebus circiter quadraginta, post quos ubi solueris fascias, & lauacro usus fueris, emplastris ad fracturas factis per sanare conuenit. hæc tractandi ra-

tio omnibus aliis prope modum confractis artubus conuenit.

DE CUBITO ET RADIO.

Cap. C.



Vbitus radiusq; interim uterq; iuxta eundē locū frangitur, interim alter dūtaxat, uel in medio, uel in parte qua gibberū spectat, aut brachiale. Omniū itaq; deterumū est quum ambo eadē parte frangunt, deinde etiā cubitus solus. At radius fractus, alius facilius curatur. siquidē maior cubito nō est, sed illum ipsum subiectū habet, ut ueluti in fideat. Porro si ipsorū alter dūtaxat fractus fuerit, in illo maxime intentionē ualidā moliemur: si uterq; similiter intēdemus manu anguli modo figurata, ut pollex omnium digitorū altissimus, exiguius digitus humillimus habeatur. sic enim cubitum radio subiici cōtinget. At si ualētiore opus sit intētiōe, ambobus potissimū cōfractis, nō solum manibus, sed etiā funibus intēdere aggrediemur, ut in capite de brachio comprehensum est. Ceterū omnis deligatura, & reliqua præsidia unā cum ferularum iniectiōe, hic adhibēda sunt, dum callus eos firmarit. Firmatur autē cubitus diebus plurimum triginta. Ac repositio ipsius similis erit ei, quam brachiū fractū uendicat, prāter ea quā ipsi subiiciuntur.

DE SUMMA MANU, ET

ipsius digitis.

Cap. CI.



Olæ & aduersæ eius partis, & in digitis articularū ossa, quū laxa fistulosaq; natura sint, cōtunduntur quidē plerūq; raro autem frangunt. Aegro igit in alto sedili collocato, medicus in altero quodā æquali aduersus sedebit, priusq; manum disponat: ac rēus per ministrū iis quæ fracta sunt, duobus digitis ipsa conformabit, pollice & indice digito prius cōpressa. deligatura utetur, quo tempore urget inflāmatiō. Nam propter laxitatē facile in ipsis callus amplior con crescit. At si a cies digitorū, aut digitus simpliciter cōfractus est, si quidem magnus & pollex appellatus fuerit, post cōmodam deligationē ab inferiore parte, ipsum utiq; cum manu ligabis, ne dimoueat: si ex aliis quispiam, uel index uel paruus digitus, proximo colligabitur: sin aliquis ex mediis, iis qui utrinq; habentur, uel etiā omnes deinceps ligari unā debent, melius enim conquelescunt. quemadmodū si etiam ferulis fracti colligentur.

DE FEMORE.

Cap. CII.



Adem de femore dicēda sunt, quæ de brachio prodidimus. peculiariter autē magis femur fractū, in anteriore partē & ex teriore promouet. etenim in his naturaliter dilatātū est. instauratur autē manib; funiculis, & antennis æquialētib; una, supra fracturā posita: altera, subter. Quod si in parte fractura euenerit, idq; iuxta femoris caput, dimidio fasciæ lana circūdato, ne corpora incidat iuxta inguina disponemus, & initia ad caput reducta, famulo ut partē cōtineat, trademus: infra autē fracturā fune circūposito initia ad intentionē al-

teri ministro exhibebimus. Quòd si ad genu fractura habeatur, funem sanè supra fracturam iniicimus, initia eius ad eleuationem dispensamus, genu etiam ipsum implicito quodam fune continemus, hanc autem partem restituiamus ægro decumbente, & crure exporrecto, quæ pungunt ossa ut  
 5 subinde dictum est, eleuata, superius tollemus. reliquâ curationem in capite de brachio exposuimus. cæterum callo firmatur femur quinquaginta circa diebus. At quomodo reponi debeat, post totius cruris disciplinam, comprehensum est.

## DE PATELLA.

## Cap. CIII.

10 **P**atella os laxum est ac molle, ualide corporibus superiore & ima parte cõprehensum. frequenter sane contundit, raro autem frangi solet. sustinet autem rupturâ per crassitudinẽ, & in tenuia fragmẽta findit, cum uulnere, uel sine uulnere. Nota uerò cõspicua (motus enim sublabit), continuitatis, & cauitas & sonitus. Instauratur  
 15 autem pars cruris extensa, nam tam diu bifariâ fissâ digitis cõmittitur, donec fracturæ labra suprâ sese contingant, & inuicem iungantur: quæ in tenuia fragmenta fissâ est, manu conformatur. etenim callo nõ generato, eò quod pars utraq; super musculos neruosq; cognatos à femore & tibia nõ retrahatur, tamen multa distentio contrahet & functionis difficultatem  
 20 affectis inducet, neq; enim laborantibus ipsis largius genu sustinet, & obambulando impediuntur, præsertim ascensuri, siquidem in æquabili motu actionis difficultas occultatur: in pausatione autem, eò quòd non inflatur genu, in cruris initio, & situ deprehenditur. atq; hic ossiculum pun-  
 25 gens eleuatum ubi exemeris, curationem sequentem admouebis.

## DE TIBIA.

## Cap. CIIII.

**T**ibia cubito respondens eandem curationem obtinet, etenim illa duobus ossibus fulta, altero crassiore & cognomini, altero tenui, quod ex similitudine perone, Græcis, quasi fibula, Latinis sura dictum, eadem fracturarũ differentias recipit. in omnem  
 30 enim partem prolabitur, quum ambo ossa conflata fuerint: in treis autem, quum alterum, intrâ & extrâ: tibia quidem, retro: sura, antè. quapropter etiam ipsa similiter restituitur manibus aut funiculis superioribus, quæ fracturæ fines sunt, interim ipsi tibiæ circumdatis, interim femori. Nam quum genu sit ualidius, articulum integrum per tentionem seruabimus.  
 35 Similiter & inferiore fracturæ funiculo, ut in cubito dictum est: reliqua ut in capite de brachio tradidimus.

## DE PEDE SVMMO.

## Cap. CV.

40 **P**alus nequaquam frangi solet, eò quòd undequaque tibia, sura, & osse quod obtestaræ similitudinem uocatur cyboides, custodiatur muniaturque. At os quod à scaphæ figura dicitur scaphoides, & supernæ pedis regionis, item pedis digi-  
 F iiii



torum ossa, ipsumq; cubicum, similiter iis quę in uola & opposita eius parte manusq; digitis sunt, franguntur. quare etiam quę de illis diximus, ne eadem repetantur, illinc huc transferre consilium est.

QVOMODO CRVS REPONI DEBEAT. Cap. CVI.



Emore fracto, aut tibia, nō minori cura repositionem ipsius, q̄ reliquam curationem obibis. Nam partium cōfractarum æqualitas, hac potissimum probē administrata, conseruatur. Nonnulli igitur canali, quam solenam Græci dicunt, nūc lignea, nunc fictili membrū fractum, aut etiam crus ipsum reposuerūt: alii uerō sola ea quę cum uulnere fracta sunt, eō quōd hęc ferulis nequeāt cōstringi, in totum uerō solenarum usum posteriores damnarunt, multis sane de causis, sed præcipue, quōd ipsarum duritia partibus negotiū facefferet. Neq; tamē alienum est, artus cum uulnere fractos ferulis excipere, ut ostendemus. Aeger itaq; resupinabitur, ac indumentum aliquod crassum cruri æquale, in longitudinē utrobq; contractum & inuolutum, ut canali per mediam concauitatem oblongam proportionē respōdeat, subiiciatur: pellis super ipsam molliuscula explicabitur, quę superfusiones excipiat, deinde in longum crus concauitati huic canalē referenti, insinuabitur: à lateribus alia uestimenta lanæ ue apponentur, ne membrum in latera declinet, pedis autē ima pars asserculum rectum panniculo circumdatū, propter molliorem affumet. ac maioris securitatis gratia, media fasciarū duarum trium ue, uestimento canalīs modo præparato subiicientes, fractum membrum ipsi leuiter deligabimus. At si æger non tolerans conetur pedē totum contrahere, conuenit id facere quod in superiore pedis parte dictū est, deinde blande cum asserculo deligate, ne inuiri inter dormiendum, ut uerisimile est, pedem contrahant. Aliqui uero etiam stragula lecti per medium pertundunt, ut ipsi sint immobiles, & per foramen urina & sterces reddatur, usq; dum callus coalescat.

DE FRACTVRIS QVÆ CVM VVLNERE

incidunt.

Cap. CVII. 30



Ractura cum uulnere facta, si quidem sanguis profundatur, hūc prius sistemus: si inflāmatio fuerit, præsidii in eam efficacibus utemur. Carnibus contusis, partem affectam scarificabimus, metu, ne in gangrēnā incidat, sublato: at si illa quoq; accesserit, aut alia quępiā serpens putredo, conuenienter occutremus. habes autem horum singulorum curationem quarto uolumine explicatā. At si nihil horum adfuerit, neq; ossa largiter denudata sint, hamulis suturisq; ue usi, remedio cruentis apto, his medebimur, sic, ut ossicula refracta, ut uerisimile est, & pungentia implentia ue primum aufetamus. Quōd si magnum aliquod os emineat non commissum propter magnitudinē, in intensiōe huic prospicies. Siquidem Hippocrates femore & brachio cōfractis ossa excidētia uniuert.

sim imponere dehortatur, periculū his futurum prædicens ex inflāmatione, quam tensio crearet, uel etiam conuulsione, ut credibile est, musculorū neruorūq;. Tempus uero nonnunquā administrationem commodam inuenit. In quocunq; igitur osse elapso tractationem molimur, nequaq; in inflāmatione ipsam aggrediemur, sed primo statim die anteq; inflāmatione occupetur: aut nono, inflāmatione iam finita. Adaptamus uero ferula quam Græci mochliscon uocāt, est autē ea instrumentū ferreum septem octo uel digitos longum mediocriter crassum, ne inter commouendum inflectatur, acutum in summo latumq; & leuiter inflexum, cuius acutum extremum superposito ossis tuberculo subiicientes, iuxta alterum occurrentes simul, & mediocri intensione membri facta, inter se fencis fracturæ commitemus, quod si facere nequeamus, scalpris excisoriis obuertas acies habentibus quod eminet auferemus, aut ferra subsecabimus, quemadmodum in fistulis docuimus: ossiumq; asperitudine adæquata, & membro directo, linamentis curabimus. Maxime autem animum adhibere oportet in membris cōiunctis, aut disiunctis appellatis, altero autē in ipsis osse particulatim ferra absciso, ut membrum in contractum maneat, etiā intensione accurata utemur, deligatura uero hoc modo adhibenda est. Circulares itaq; fasciæ, partibus uulneris utrobique iniici debent: oblique uerō, per ulceris longitudinem, ut iuxta hiatum oclusio ex omnibus fiat. Si sordidum adhuc ulcus est, purgantia adhibebimus: si purum, quæ carnem inducunt, linteolis illita, aliamq; comprobata uel materiam. Hippocrates pissera emplastro in linteolis utitur, id autem esse dicunt tetrapharmacum basilicum. Vbi caro increuerit, ferulæ iniiciuntur, aliqui uero per initia ipsa accommodant, ulceris locum uitantes, & pro usu urgente ipsas constringentes, uel rursus remittentes. In quibus autē squama repletura est, notabimus quidem hoc, inde quod copiosus humor & tenuis excernatur, caro autem ulceribus uacua inanisq; facta attollatur: deligatura quidem laxiore ad curationem utemur, hamulo autē, aut eiusmodi quopiam squamam euellētes, iterum ualidiore deligatura utemur. porro per totum ulceris tempus, medicamen aliquod ex iis quæ inflammationem arcent linamentū continens, uulnere incumbet, ac simplices fasciæ iniiciuntur, quæ singulis curationibus solui debent, quum aliz supra dictæ maneant, ut in capite de brachio expositum est.

## SI PRÆTER MODVM FRACTVRIS CAL-

lus obducatur.

Cap. CVIII.



Modici fracturarū calli indecoram omnino speciem efficiunt, nonnunquam etiam functiones impediunt, si propter articulum coaluerint. Si igitur recens adhuc callus coierit, remediis admodum astringentibus utemur, fasciis ipsa apprimentes. Nonnunquam uero & plumbea imposita lamina, id quod requiritur effecimus,

At si lapidosus solidusq; fuerit, incidētes ipsum rademus, id quod eminet, scalpris auferentes: si res exigat, etiam terebris usi.

SI DISTORTVM MEMBRVM CAL-

lus firmarit.

Cap. CIX.:



Vibus membrum distortū callus firmauerit, difficultate fun-  
ctionū obeundarum haud exigua subsequēte, praesertim si in  
pedibus fuerit, repositionis quidem modus non recipiendus  
est, ut qui extrema inferat discrimina. uerum si callus nondū  
radices egerit, laxantibus superfusionibus, & cataplasmatibus ex ficiis pingui-  
bus & columbarum stercore, aliisq; medicamentis quae à callo soluendo  
porolytica dicuntur, utimur. Insuper per manus frictione, & confractiōe  
hunc dissoluemus. Quod si lapidosus euaserit, scalpello superficie diuisa,  
excisoriis scalpris confortium ossis liberabimus, deinde fracturæ medebi-  
mur, ut superius à me dictum est.

SI FRACTURAE CALLO NON

firmantur.

Cap. CX.:



Racturæ nonnullæ sine callo permanent, supra definitum na-  
turæ tempus, aut ob continuas resolutiones, aut immodicas  
superfusiones, aut motum intempestiuum, aut fasciarum co-  
piam, aut quia totum corpus alimentum nō percipit, in qui-  
bus etiam tenuius fieri membrum contingit, itaq; cum alias occasiones, tū  
corporis inedia tollere cōuadum est, partim per calidiora alimenta ma-  
teriam particulæ distribuendo, partim cibum subministrando sufficientē;  
itē lauacra, & reliquas animi uoluptates. Porro notē eos qui callo iam fir-  
mantur comitantes, hæc inter alias sunt præcipuæ, si fasciolarum cruorem refe-  
rant, etiam non oborto uulnere, quod forsan accidit, calli substantia quæ  
do coalescit fistulis ossium inspersas sanguinis guttas extundente.

DE OSSIBVS LUXATIS.

Cap. CXI.

Q Vum luxatiōes fracturis proximæ sint, de iis uerba facere aggre-  
diemur. Luxatio igitur est, ut summatim dicam, quum articulus  
à proprio sinu, ad insolitum excidit, in qua motus arbitrarius im-  
peditur. differentias ipsius alias dicere non habemus, nisi eā duntaxat quæ  
ex maioris minorisq; ratiōe sumitur. quum enim articulus in totum exci-  
derit, cōmuni generis uocabulo affectus Græcis exarthrema, Latinis lu-  
xatio dicitur: quum autem aliquatenus duntaxat emotus est, aut usq; ad  
tuberculum è sinu elapsus, pararthrema.

DE MAXILLA INFERIORE.

Cap. CXII.



Vrsus à superioribus incipiētes de inferiore maxilla dicamus.  
Nā quū superior sit immobilis, luxatione non periclitat. infe-  
rior aut toto loco nō mouet, quod capita ipsius superiori ma-  
xillæ firmiter ac tutò insinuata sint: modicā uerò peruersiōe

- quam pararthrema uocauimus, subinde experitur, quòd ob musculos qui ipsam continent ex continuo madendi loquēdiq; exercitio in mollitiem elanguescēteis, qualibet de causa facile laxet, quod uerbū apud Hippocrate *εχαττα* dicitur, in quibus sine aliqua difficultate articulus sponte in primum locū reuertitur. uerum de maxilla in totū luxata, satis est illius uerba exponere, quæ compendiosa, integra, & perspicua existunt. Scribit itaq; hunc in modum. Excidit quidem maxilla rarò, laxatur autē subinde oris huiusmodi, quomodo etiam alia plures musculorum immutationes neruorūq; id efficiunt. Clarum itaq; hinc potissimū est quandocunq; exciderit. Nā inferior maxilla in anteriora propellitur, & ad contraria eius unde prolapsa est, peruenit, ossisq; tuberculū iuxta superiorē maxillam tumidius apparet, difficulter ægri maxillas cōmittunt. Talis autē repositio manifestò ipsis congrui. aliū enim continere caput oportet, aliū comprehendentē ab interiore parte & exteriorē digitis iuxta mentum hiantē homine quantum potest, primum quidem maxillā commouere, tēporis interuallo huc illuc manu diducere, ipsiq; homini iubere ut laxam maxillā habear, simulq; diducat & cōcedat, ut potissimū repente laxetur tribus figuris simul, mēte adhibita. Ratio siquidē est illā ex inuersione in naturālē statū reducere. Oportet autē inferiorem maxillā in posteriora propellere, itē maxillas cōmittete neq; hiare. Insectio igitur hæc etiā in aliis figuris fieri nō potuerit, medicina autē modica sufficiet, spleniū appositum ceratū laxiore deligare. tutius autē est, resupinato homine firmare caput ipsius puluinis subiectis, q̄ plenissimis, ut q̄ minime cedat. Cæterū uulnerati caput aliquis cōtinebit. Si autem utraq; maxilla eluxata fuerit, curatio quidem hæc adhibebitur. Cōmittere autē quale hi os possunt, etenim prominētiore ipsius maxillæ sunt. rectitudinē autē maxime cognosces, dentiū & superiorū & inferiorū terminis, quos secundū ordinē confert q̄ citissime inferere. quomodo autē inferentur, expositum est. Si autē periculū de anima non incidet ex febribus continentibus. & torpido Caro, musculi alterātur, & præter naturam intenduntur. uenter solet his biliosa deiicere, uel syncera pauca, & si etiam uomant, indiscreta eiiciunt. hi igitur & moriuntur. at hoc potissimum modo iniectionis nos subinde uisum, fomentis prius ex hydrelæo calido per spongiam super luxatam genam adhibitis, quum maximè cōtumaciter ingressui repugnet, homine humi collocato, post ipsum nos sedentes, quemadmodum ab Hippocrate traditum est, operamur.

## DE CLAVICULA ET SVMMO

humero.

Cap. CXIII.



- Laucula in partem interiorem non excidit, ut quæ pectori cōmittatur. unde ne mouetur quidem in ipso. At si uiolento quodam ictu & acti extrinsecus auellatur, quemadmodum fractura ipsius, instaurari debet. Pars autem quæ humero inserit,

non admodū sanē excidit, à bicipiti musculo summoq; humeri tuberculo prohibita. imò neq; uiolento quodam motu clauicula priuatim agitur, nisi propter solam thoracis factam separationem. Vnde homo solus inter animātia clauiculam obtinet: quam si in palæstra, ut uerisimile est, per uerti contingat, conformatione per manus dirigitur, & spleniis multiplicibus accommodatis unā cum deligatura decenti. eadem curatiōe etiam summus humerus peruersus in propriā sedē reuertitur. Est aut officulum cartilagineū quod clauiculā scapulis colligat, in reficcatis mortuorū cada ueribus occultatū, quod loco motū, imaginē imperitis exhibet, brachii caput excidisse. etenim in hoc exterior humeri pars acutior apparet: concauū autē, id unde excidit. uerū notis quas deinceps subiungā ipsa discernent.

## DE HUMERO LUXATO.

## Cap. CXVIII.



Rachii caput scapularū sinui insertū, excidit quidē frequēter, uerum neq; in superiorē partem, ut quod scapularū processus ancoræ similis impediāt: neq; in posteriorē, propter ipas scapulas: neq; tamē in anteriorē, ob muscoli bicipitis tendinē, ipsumque humeri tuberculum. Sed rarō quidē interiorem exterioremq; prolabitur, cōtinue uerō, præsertim macilētiōribus, ad ima atq; his sanē facile & excidit & rursus inseritur: multa aut carne præditis cōtra, rarō quidem elabitur, sed egre in sedē suam cōpellitur. Quibusdam itaq; etiam nō luxatis, ex ictu frequēter elapsi loco mēbri suspicio oritur, eò quod ualida inflammatio subsequatur. Porro quibus in imā partem luxatus humerus est, hoc modo agnosces: affectus humerus si cū sano cōferatur multū differt, quū exterior eius pars unde excidit, cōcaua appareat, ut in tuberculo humeri eluxato diximus, quod acutius q̄ naturaliter eē debet, apparet, & brachii caput elapsum in alā manifestō subsidit, ac manus huius cubiti gibber à costis magis recessit, quibus quidē costis si ipsum adigas, cū dolore admouetur, neq; ægri manū extenso cubito ad aurē possunt reducere, neq; aliū motum multiplicē per eā moliri. In pueris itaq; uel in quibus recens nec ampla facta est eluxatio, etiam nodo medii digiti flexi eminente medici manus, uel affecti sanæ, si non puer sit, frequēter restituta est, ut inquit Hippocrates. ualentius autē hoc modo luxata inferuntur. Homo lotus & superfusiōibus laxādi uirtute præditis usus, resupinari humi debet, & pila mediocris uel coriacea, uel alia quæpiam nō admodū mollis, alæ accommodabitur, ac sedens medicus aduersus ægrū, iuxta latus affectum, si quidem dexter humerus luxatus sit, dextri pedis calcem superponet pilæ alæ suppositæ: si sinister, sinistri. ac affectam manum prehensam ad pedes trahet, simulque calcaneo alam in diuersum propellet, ita ut aliquis post caput ad alterum humerū resistat, ne corpus circum diuellatur. Est & alia ratio immitendi, quæ humero subnixo perficitur, quod Græci *κρημνισμός* dicunt. Adolescens, aut longior ægrotatē, aut altius consistens iuxta affectū

latus, ægri indidē collocari alæ suum ipsius humerū subiiciet, & manū eleuatam ad uentrē suum attrahet, ut reliquū ægri corpus posterius imo maius sublime pēdeat. At si æger leuior fuerit, alius quispiā puer leuis ex ipso suspendet. Nam manu ac reliquo corpore in eōtraria detractis ad ima, sub  
 5 iectus alæ humerus facile elaplum articulū reponit. atq; hoc etiā spathula quā Græci hyperon dicūt, efficiunt. Est autē lignū oblongū, rectū, quod in pauimēto super aliud quoddā solidum ponit. huius igitur summū extremum rotundū, quod non admodum crassum neq; tamē tenue est, alæ ægri aut stantis, aut sedētis, subiiciet, iuxta totā ipsius longitudinē, ac manu per spathulā porrecta & detracta, reliquo autē corpore contrā inferius uergente, uel sua sponte, uel alio quodā trahente, restiturio fiet. atq; hoc etiam in scalæ gradu fieri debet, quemadmodū in contracto brachio per tōsionem fieri dicebamus. hic autē rotūdum quoddā corpus super gradum deligatur, quod ægrorātis alæ possit adaptari & brachii caput propellere.  
 15 Porro si ob uetustatē affectus, aut corporis duritiē, repositio nobis facessat negotiū, utemur etiā ratione quæ per amben appellatā sit. Est autē ambe lignū quod longitudinē duorum cubitorū habet, latitudinē quatuor digitorum, crassitudinē instar digiti, alterū extremum rotundū, quod etiā prompte in alā sinū ingreditur, spathulæ lignæ extremo cōsimiliter. hoc  
 20 itaq; extremū panniculo circumdatū, quō lenius existat, capitulo brachii iuxta alam accōmodabimus, totā uero manum ad lignū intēsam cum eo deligabimus, iuxta brachiū, cubitū, & eius extremū. deinde ligno obliquo inter duas columnulas rectas adaptato, uel rursus supra scalæ gradum manu traiecta eum ligno, ut ala per trāuersum gradui accōmodetur, manū  
 25 infrā trahētes, sinemus in alterā partē reliquū corpus in sublimi pendere. tunc enim articulus ingreditur. Vbi fuerit repositus, mediocris ex lana pila si quidē inflammationē pars nō sentiat, si sentiat, oleo madens alæ iniecta, deligabitur. per hanc autē & humeri & alterius alæ iuxta hiatū præsertim fasciæ deligaturis apparentibus, ut hiatus affectū humerū excedat,  
 30 brachiū cum costis deligare cōuenit, ipsumq; cubiti gibbæ, & summā manum ex ceruice deuincire, ne rursus de integro articul⁹ excidat. Post septimum diē uel tardius ubi fasciæ dissolueris, mediocri uti frictione præstat, eò quod corpore solidiore factō, articulus ita firmes, ut nō facile prolabas. Quod si autē crebro prolabas, aut humiditatis uitio, aut ob aliā quampiā  
 35 iam diu factā elabendi uia, ad uisionē ueniendū est, sicut supra eōprehendimus. Quum autē uel infantibus in utero aut editis in lueē adhuc inerescentibus, particula fuerit luxata necdū reposita, in humero quidē carnes nihil à naturali figura deficiūt, neq; enim manus quodeunq; opus perficere impeditur, os autē brachii breuius permanet, nō augetes, ac tales nominant  
 40 galianeones. In femore etiā os incrementū non sentit, & torū crus contabescit, quū enim pondus corporis ferre nequeat, non exerceat, ac in aliis mem

bris luxatis manentibus, quæ subiiciuntur, omnium iniuriarum exposita sunt.

DE CUBITI GIBBERO.

Cap. CXV.



Vanto cubiti gibberi articulus humero magis uariis creatus est, tanto plus negotii prolapsus exhibet: & tardius quidē excidit, sed difficilior reponit, propter tuberculoꝝ sinuumq; frequētiā. Nonnunq̃ igitur solum aliquatenus detorqueſ, quem caſum parathrema dixi, ſæpe uero etiā ex toto in omnē partē prolabitur, præcipue in priorē & poſteriorē, quod facile dignoſciſ, eo quod excidit oculis & tactui obiecto, ex quocunq; prolapſum ſit, & ſinu unde excidit apparente. Hæc uero poſſiſſimū ſani gibberi inſpectio coarguit. Conuenit aut̃ protinus membrū reponere priuſq̃ inflammatione occupetur: ſiquidem eam expertū, difficulter curatur. Quædam etiam nullā proſuſ curationē recipiunt, maxime ſi in poſteriora prolapſa ſint. Hæc enim luxatio omniū quæ in cubiti gibbero ſunt maxime dolorifica eſt, & periculofa. Quod ſi modice articulus inuerſus ſit, moderata etiā intenſione reſtituitur. ſic ut miniſtri manum exporreſtā iuxta brachiū cubitumq; contineant, & in aduerſa retrahant, medicus autē ſuæ manus palma quod exceſſit in ſuā ſedem cōpellat. Hippocrates autē in priora luxationē ſubito manus inflexu inſtaurat: ut palma ipſius humerū iuxta rectū pulſet: in poſteriora uero, ſubita turſus & diutius facta extenſione, quoniā luxatio in priorē partē, uiolenta poſſiſſimū extenſione efficitur, quæ in poſteriora flexu ſimiliter uehementi. Quod ſi luxatio perſeueret, etiā ualidam magis intenſionem uſurpabimus, cuiusmodi uero eſt poſſiſſimū quam Hippocrates in brachio cōſtracto expoſuit, ubi columnulā adhibebat. Porro recētio rem aliqui hunc in modū adaptant. miniſtris duobus manū, ut dictū eſt, intendētibꝫ, ita ut alter ſurſum ad axillam contineat, alter deorſum iuxta brachiale, medicus aduerſus ægrotanti conſiſtens, duabus palmis iuxta articulum, brachium circundat, ac ubi iuſſerit ueſtimentū contractum in oblongū uel latam faſciā manibus ipſius ſimul & ægrotantis brachio circundare, & in exteriora imaꝫ; propter ſummā manū retrahere, ipſe deinceps cum tenſione conſtrictas ipſas trahit, donec cubiti articulū excedat. Cæterum manus prius oleo illini debet, ut lubrica fiat & facile medici palmis deducatur. Sic enim prolapſa, ſi pertrahentiū manū ui premat, in propriam ſedem reuertūtur. Poſtq̃ ſunt reſoſita, in anguli modum figurata manu ex ſplenis & conuenienti deligatura curationem petemus.

DE BRACHIALI ET DIGITIS LUXATIS. Cap. CXVI.



Rachialis digitorumque luxatio nullum facieſſit negotium, per ſe, niſi cum ulcere facta fuerit. de hac igitur in capite de luxationibus quæ cum ulcere ſunt tractabitur. At ſine ulcere luxatis, mediocri intenſione, & remediis quæ inflammationē pellunt, medebimur.



## DE VERTEBRIS SPINAE.

## Cap. CXVII.



- Ertebræ spinæ si ex toto prolabuntur exciduntq; præcipitem mortē inferunt. Medulla siquidē ipsius spinæ uel quamlibet cōpressionem nō sustinet, quum & solus ex ipsa neruorū processus si cōrundatur, hominē in periculū perducere sufficit.
- Peruersionibus autē subinde affligitur, nunc in priorē partem distorta, ac uitiū lordosin Græci appellāt: nūc in posteriorē, & cyphosin à loco gibbato uocant: interim uero in latera, quod scoliosin nuncupant. Quum igitur multæ simul uertebræ in arctissimū peruersæ fuerint, plurimum simul
- peruersio apparet, iuxta circularē flexus rotunditatē facta, ac putant non nulli decepti, ab una uertebrā ampliter peruersa id fieri. Nam magna distorsio non angulo similis hunc spinæ flexum molitur, quando etiam magis periculū subsequitur. Si igitur introrsum spina est peruersa, restitutio- nis spes nulla est, eo quod per uentrē, antierius oppositio fieri nequeat. qui enim in scala sic affectos intendunt, aut eucurbitulas admouent, aut ster- nutamenta aut rursū aut flatus excitāt, quid tandem promouere putati sint, Hippocrates abūde coarguit. Quoniā uero subinde cuiusdā officuli spinæ refectio facta, cauū locū ostēdit, quemadmodū in capite de fracturis cōprehensum est, aliqui uitiū lordosin esse crediderūt, deinde hoc cele- rius perfanato ( proptē enim callo firmat ) lordosin curatu facilē existere pronuntiarūt, etsi nullam curationē admittat, aut certe difficulter. his ete- nim urina supprimit, aluus nō respōdet, corpus inhorrescit, postea etiā si ne uolūtate exeremēta prorūpant. Hæc autē cūeniunt, neruis & musculis cōsortiū lege laecessitis, ac celeriter ægri moriūtur: præsertim si superiores
- & ceruicis uertebræ affectū fuerint expertæ. Cui uero iam inde à paruulo potissimū uertebræ gibbatæ protuberant, uitiū longū esse neq; celeriter mortem sed morbū accersire, & insanabile Hippocrates prodidit. At qui- bus recens hic gibber ex casu prouenerit, machinæ quidē per scalam & re- ctam ægri suspensionē ac uteri inflationē adhibitz, ridiculæ sunt. sola au- tem Hippocratis adaptatio sufficiet. Cōuenit enim, inquit, lignū magnū quod tantā longitudinem ac latitudinē habeat, ut hominē excipiat, aut sea- mnū huic æquale, prope parietē deponere, ac iuxta hunc ita extendere, ut in longitudinem pede non amplius absit, & uestimenta quædam super ipsum explicare, ne hominis corpus infringatur, (erit autē hic lotus anteq̃
- super lignum seamnū ue infideat, ) deinde loro pectus ipsius bis circum- datum, per alas iuxta dorsum uincire, initia lori ligno oblongo pistillo si- mili deligare, atq; hoc super pauimētum iuxta ligni aut scāni subiecti ex- tremum cōstituere, & ministro post ægri caput stanti ex superiote parte continendū tradere, ut imo quidē extremo contrā fixo, altiore supra ca-
- put tracto, opportuna fiat intēsis: altero autē loro pedes simul & superio- res malleolorum partes deligātes, & rursus alio, ea quæ inter coxas & hum

bos habentur, commissura, huius inibi facta, iterum fasciarū extrema coniungemus: alii autē ligno pistillo respondentī similiter prædicto illigantes, statuemus in ligni aut scamni extremo pedes spectanti pistillum iuxta prioris similitudinem, deinde famulis iubebimus ut per ligna retractio-  
nem in diuersa moliantur. Quidam uero a fellis dictis hanc efficiunt. sunt  
autem hi axes qui cōtra rectum lignum uertunt: utroq; huius magni ligni  
aut scāni latere iuxta extrema ad pedes caputq; sita lora defigunt. Quum  
autē sic intentio ipsa administrat, manus palma gibberū constringemus:  
si autē usus postulat, etiā super ipsum insidebimus, nullum ueriti pericu-  
lum. At si ne sic quidē spina instaretur, & zger pressione ferat, utile est pa-  
rietem adiacentē in longum canalis modo exculpere ē regione gibberi, ut  
sculptura cubiti longitudinē habeat, neq; altior sit & grotantis spina, neq;  
multo humilior, imō sculpturā prius præparatā esse oportet. huius enim  
causa etiā lignum ab initio prope parietem poni maluimus. deinde asseris  
mediocris alterū finē ad ima cōprimemus, donec sensibilibiter spina diriga-  
tur. uerum, ut inquit Hippocrates, sola intentio citra asserē, rursusq; per  
asserem sola curatio, id quod requiritur potest efficere. Quod si hoc uerū  
est, non alienum etiam in lordosi & scoliosi per initia intensionem prædi-  
ctam, sine cōstrictione uidelicet, moliri, post adaptationē, lamina lignea  
quæ latitudine treis digitos æquet, longitudine gibbero respondeat & ali-  
quam ex sanis uertebis cōprehendat, loro lineo aut stuppa propter duri-  
tiem inuoluta, uertebis ipsis imponi & conuenienter deligari debet. ui-  
ctus adhibebitur tenuis. At si post hæc quædam gibberi reliquæ remanse-  
rint, laxantibus emollientibusq; remediis cum laminæ appressu, per diu  
utendum est. aliqui uero plumbeam laminam usurparunt.

## DE COXA LUXATA.

## Cap. CXVIII.



Vum alia corporis ossa interim peruertantur, interim toto loco excidat, coxa humeriq; articulus solus ei luxationi opportunus nō est, quia tota sede promouet, atq; ex his magis coxa articulus. quoniā sinum & rotundū & profundum possidet,  
ad hæc, quod altioribus tuberculis munitus sit. At si quādoq; articulus ob-  
uim quandā uehementem sinu suo exciderit, etiā multæ luxationis iuxta  
minoris maiorisq; rationē differētia proueniūt, quatuorq; modis, imō lo-  
cis coxa luxat, uel enim in interiorē partem, uel exteriorē, uel priorem, uel  
posteriorem, prolabitur: uerum intro quidē & extra cōtinue, & multo fre-  
quentius intro: in anteriora autē & posteriora, rarius. Quibus itaque in in-  
teriorē partem coxa prolapsa est, iis crus affectum si cum sano cōferas,  
longius spectatur, & genu prominentius, & ad inguina crus inflectere ne-  
queunt, & iuxta penem tumor manifestus occurrit, tanq; femoris capite il-  
lic desidente. Quibus autem in exteriora promota est, iis contrariæ notæ  
cueniunt. siquidem crus breuius apparet, & iuxta penem regio in sinum

dehiscit, clunes inturgescunt, & genu interius demergit, crus inflectere possunt. Si in priorē partem prolapsa est, crus sine dolore genu extendunt, non aut ad interiorē partem inclinare possunt, incedere conantes, urina his supprimitur, inguina intumescunt, nates rugosæ excarnesq; apparēt, calci inter ambulandū innituntur. Porro quibus in posteriora excidit, non aut poplitem, aut genu extendūt, neq; inflectere prius quā inguina possunt, atq; his crus breuius, inguina laxiora apparent, & per nates femoris caput eminet. Quibus sane iam inde à pueritia, aut certe longiore temporis spatio articulus prolapsus curæ non fuit, etiam præsidium nihil promouerit, membro iam in orbem coacto. Quibus aut continenter excidit, hicurationē Hippocratis assument, quapropter statim reponi luxatā debent, ut utz siquidē coxæ luxationes, nullo modo confanescunt. Cōmuniter itaq; in quatuor luxationibus cōcinnatio congruet, tū quæ conuersione articuli & circumductū fit, tū quæ intensione. Si enim affectus recens fuerit, & æger iuuenis, nonnunq; femur continentes circumagenresq; huc illuc articulum reposuimus. Quod si in interiorē partem luxatio declinauerit, etiam crure solum subito & ualenter ad inguina quā intime flexo, id quod requiritur effecimus: sin aut his non ceaserit, intensione utendum, primum per manus adhibita, quæ crus ab inferiore parte trahant ac per iecur tibiāq; constringant, ex superiore autem parte, sub alas corporis circumdant. Quod si etiam ualētior desideretur intensio, funibus cōtextis aut implicitis, uel loris crus deligare, omnino quidem supra malleolū: ut autem genu nihil patiat, hoc quoq; superius oportet: at pectoris regionem uincire necesse non est, uerum, ut dictum est, manibus subter alas cōprehendatur, loriq; mollis & ualidi medium iuxta penem adaptatū in humeros reducemus anterus per inguina & clauiculam: posterius, per summas partes, duōq; lori capitula ministro trademus, deinde omnes simul trahētes, ut ægrotātis corpus eleuetur, intensiōē molientur. hic quidem intendēdi modus cōmunis est quatuor femoris luxationū differētis, priuatim aut in singulis modus quo ossa ferra in sedem suam compelluntur, Græci mochlian dicūt, euariat. Intenso homine siquidē in interiorē partē articulus exciderit, lori iuxta penē siti mediū inter femoris caput ipsumq; penem dispensari conuenit, referri autem lorum per inguina adiacētia & clauiculā expedit. At adolescens quidam duobus cubitis affectum femur, quā crassius est, circumdatū, in exteriora ualētē extrahet. Atq; hic modus inferēdi aliis expeditior est, cui si articulus nō ceaserit, aliis quoq; utendū, uariis quidē magis, sed eō efficacioribus. intendi etenim hominē super lignum grandius aut scamnū oportet, in quo etiam spinæ gibbero uariatos intendimus. Insculpentur aut per totum ferē oblongæ quædam ceu fossæ, quæ latitudinem altitudinemq; trium digitorum, non maiorem habeant, diffidentes inuicem non magis quā digitos quaternos, ut ferra iuxta ex-

tremum in ipsis resistente, in quamcunq; partem conueniat, restitatur  
 membrum. Per medium autem lignum aut scamnum, aliud impingatur  
 lignum pedalis longitudinis, columnulę modo crassum, ut sub hoc inten-  
 so homine, lignū inter penem & femoris caput perueniat. Simul enim cor-  
 pus iis qui à pedibus trahūt porrigi prohibebit, eoq; ne usu quidē saepe ue-  
 nit in contraria ex superiore parte intensio: simul autem intenso quoq; ho-  
 mine ipsum lignum femoris caput foras propellet, ac intensio iuxta superi-  
 us dictum modum administrabitur, præsertim pedis. Quod si ne sic quidē  
 in sedem suam redierit, impactum lignum rectum aufertur debet, ex latere  
 autem huius situs utrinq; singula ligna infingentur, tanquam limina, non  
 minus quàm pedalis longitudinis, his aliud lignum adaptabitur gradus  
 scalę modo, ut trium lignorum figura H literam representet, nam paulo  
 inferius summis medium lignum accommodabitur. Deinde in sanum la-  
 tus iacente homine, sanum quidem crus inter hæc limina subter gradum  
 quodam modo ducemus, affectum autem crus ex superiore parte super  
 hunc ponemus, ut ipsi femoris capiti accommodetur, substrato prius ei  
 multiplici uestimento, ne femur contundatur. aliud autem lignum medi-  
 ocriter latum tantam habens longitudinē ut à femoris capite usq; ad mal-  
 leolum subiectum pertineat, intrinsicus eturi alligabitur. Vbi iam facta  
 est hæc intensio, aut per pistillum, ut in gibbero prius diximus, detrabere  
 ad ima crus cum alligato ligno oportet, ut uiolentia hæc femoris caput in  
 propriam sedem reuertatur. Cæterū est & alius reponendi modus sine in-  
 tentione per lignum, ab Hippocrate commendatus. Manus enim, inquit,  
 ægrotantis molliter costis alligare oportet, & pedes utrosq; ualido loto mol-  
 li per malleolos & super genu fasciare, ut quatuor digitorum spatio inuicē  
 distent: intenso autem affecto crure duobus digitis magisq; alterum ho-  
 minem supendere, ut caput cubitos duos à terra absit. Adolescens uerò ali-  
 quis peritus cubitis suis femur affectum comprehendens quæ breuissimū  
 est, ubi & caput femoris, & ex rheda suspendēs hominem facili compellet  
 articulum ingredi. Atq; hic reponēdi modus aliis quidem simplicior est,  
 ut qui non multo apparatu peragatur, sed ueluti miserabilem ipsum, uul-  
 gus abominatur. Poterò si in exteriora membrum fuerit luxatum, homo su-  
 perius intendi debet, lorum autem iuxta penem per oppositas parteis fer-  
 ri conuenit, inguina dico & clauiculam: medicū ab exteriori parte intror-  
 sum agitare iuxta conuenientem foueam ex iis quæ insculptę sunt, mini-  
 stro quodam uestiē ad sanum clunem ne cedat, obliiciente. Sin aut in prio-  
 ra promotus est articulus, homine intenso uir quidam ualidis dextræ ma-  
 nus palmam affectis inguinibus imponens, altera comprimet, simul  
 ad ima, simul ad genu constringet. At si in posteriora prolapsus est  
 articulum, non opus est quidem hominem in altum usq; intendi,  
 sed in firmo iacere, quemadmodum etiam si in exteriora articulus excide-

rit. Sicuti autem in gibbeto dicebatur, super lignum aut scamnum homo pronus intendetur, unculis non per ilia, sed in crure, ut nuper dictum est, porrectis. Iam uerò uti conuenit cōstructione per asserem adhibita, iuxta clunium regionem, ubi & articulus excidit. atq; hæc sane de coxendice ex causa foris adueniente luxata, dicta sint. quoniam uerò propter copiā humiditatis, ueluti humerus, sic etiam coxa prolabitur, ustiōe utendum est, quemadmodum in capite ipsius comprehendimus.

## DE GENV ARTICVLO.

Cap. CXIX.



Enu in treis parteis promouetur, interiore nimirum, exteriorē, & iuxta poplitem. in priorē enim prolabi opposita patella prohibetur. Eiusdem igitur intensionis utentes modis, interim per manus solas, interim etiam funibus, decenter deligabimus, reliquamq; adferemus curationem, hoc spectantes ut particula diutius immobilis conseruetur.

## DE MALLEOLI ARTICVLO, VBI ETIAM DE

pedis digitis agitur.

Cap. CXX.



Alii articulus si paulum excessit, modica etiam intensione curatur: si toto loco mutatus est, uehementiore indiget auxilio. Tentandum itaq; & hic per manus ualidiore intensione uti. Quod si non reponit, homine humi resupinato extensoq; lōgum aliquem & ualidum palum inter duo femora iuxta penem in imam humum rectum defigemus, ut corpus aduersus eum renitens ad pedis intensionem non cedat, imò prius defigetur, q̄ homo decumbar. Quod si magnum illud lignum adest, quod pedale aliud lignum per mediū habere defixum diximus, super hoc intensionem moliemur. ministro uno femur continēte retrahentēq; alter manibus aut loro pedem trahet, medicus luxatum manibus dirigit, alterumq; pedem alius ad ima cōtinebit. A repositione deligari, tutò pes debet, fasciis ad superiorem pedis partem, aliis ad talum distributis, cura adhibita ne posterior tendo iuxta calcem cōstringatur. In hoc casu usq; ad dies quadraginta in quiete homini perseuerandum est. nam incedere ante absolutā curationem tentantes, particulā reddunt inutilem. A si quis ex saltu, ut fieri solet, calcis os peruerterit, uel etiā aliam quampiam inflammationis dispositionem fecerit, blanda quadam intensione, conformatione, fomentis inflammationi contrariis, & fasciis firmis id dirigendum est, homine similiter usq; dum confanuerit, in lectulo perseuerante. Ceterum digitorum peruersio ut in manibus dicebamus, non difficulter moderata tensione emendatur. In omnibus autem luxatis peruersisq;, postquā instaurata sunt & conquerint, inflammationē in articulis, ut uerisimile est, remanentem, aut tumorem, quæ etiam diu membra à functionibus impediunt, molliētibus remediis persanabimus, quorum materiem nullus qui in artis operibus uersatur, ignorat.

## DE LVXATIS CVM VLCERE.

Cap. CXXI.



**I**N luxatis cum ulcere multa requiritur prudētia. Dum enim hæc inferuntur, extrema pericula, nonnunquā & mortē inferūt. inflāmati enim ex tēsiōe iis qui adiacēt neruis & musculis dolores ualidi, conuulsiones, & febres acutæ oboriūtur, præsertim in eubiti gibbero, genu, & superpositis partibus. Nam quo principalibus sunt uiciniora, hoc maius periculū concitant. Hippocrates itaq; horum repositionem, ualentiorēq; deligaturam omnino auersatur. solis autem quæ inflammationem abigunt leniuntq; præfidiis, per initia uti præcipit. Sic enim ipsis superesse forsan licebit. Quod autem ipse in solis digitis consulit, id nos reliquis etiam articulis facere tentabimus, ac inter initia statim quum pars adhuc inflammatione caret, prolapsū articulū mediocri intensiōe reponemus. quod si iuxta animi institutum euenerit, persistemus, sola ratione quæ inflammationem arceat, utentes: si inflāmatio quæpiam, aut conuulsio, aut aliquid prædictorum contigerit, rursus euicere ipsos necessarium est, si quidem citra uim porrigātur. at si hoc quoq; discrimen metuamus, (non enim porrigentur forsan inflammata) satius est per initia in maioribus quidem articulis repositione supersedere. ubi uerò inflammatio declinauerit, (id autem fit post septimum nonū ue diem) præfati etiam periculum, quod ex repositione futurum sit, tum quod si non repositum fuerit, claudi omnino superuiuent, conabimur tūto administrationem obire, utentes, propter commoditatem etiam scula. Porro ulceris curationem ut in fracturis cum ulcere dictum est, administrabimus.

## DE LVXATIONE CVM FRACTURA FACTA.

Cap. CXXII.



**A**T si luxatio sine ulcere cum fractura euenerit, communi intensiōe & per manus conformatione utēdum est, ut in simplicibus fracturis docuimus: cum ulcere autem rursus, ex fracturis eum exulceratione & luxatiōibus priuatim expositis, congruam administrationem petemus.

LIBRI SEXTI FINIS, IOANNE Guinterio Andernaco interprete.

# PAVLI AEGI<sup>13</sup>

NETAE LIBER SEPTIMVS, IOAN-  
NE GVINTERIO ANDERNA-

co medico interprete.

DE TEMPERAMENTIS, QVAE PER GVSTATVS  
qualitates deprehenduntur.

Cap. I.



**D**E SENSILIVM CORPORVM TEMPE-  
ramento, coniecturam ex odoratu aliquam sumere,  
haud est securū. Nam in odora, substantiis crassa qui  
dem sunt, sed non ita constar quo sint calore, & frigi-  
ditate prædita: odora uero, & tenuia quodāmodo sunt  
& calida, sed quatenus id sint, neutiquam ostenditur,

quòd substantiam habeant inæqualem. Multo adhuc minus ex colori-  
bus exacte quid licet colligere, cū in singulis calida, frigida, humida & sic-  
ca reperiantur. Verum in gustatu omnes similiter particulæ corporū gu-  
stabilium, ut hoc uocabuli usurpem, linguæ obiciunt, sensumq; mouēt,  
ut manifesto ex ipso quoq; temperamentorum uires deprehendamus.

Quod igitur astringit, contrahere, obturare, densare, repellere, in crassare,  
atq; ante hæc omnia, refrigerare, siccareq; est idoneum. Acidum, incidere,  
diuidere, extenuare, aperire, & per purgare citra calefactionē potest. Acre,  
similem acido effectum præstat, extenuādo purgandoq; sed acidum refri-  
gerādo euariat: acre, caleficiādo: præterea illud repellit, hoc attrahit, dissi-  
pat, \*rumpit, crustas inducit. Pari modo etiam amatum meatus expur-  
gat, abstergit, extenuat, incidit succorum spissitudinem, sine calore mani-  
festo. Aquosum frigidum in crassat, cogit, contrahit, obturat, mortem stu-  
poremq; inducit. Salsum contrahit, stringit, consumit, siccatur, citra insi-  
gnem caliditatem frigiditatem ue. Dulce laxat, concoquit, emollit, rarefa-  
cit: oleosum humectat, emollit & laxat.

\* impressū  
habet in plura

DE ORDINE ET INTERVAL-  
lo temperamentorum.

Cap. II.



**M**oderatum sane medicamentum ita ut temperatura ei respon-  
deat cui admouetur, inde quod nec siccet, nec humectet, nec  
refrigeret, nec calefaciat, ipsum neque siccum, neque humi-  
dum, neq; frigidum, neq; calidum, nominare cōuenit. Quod  
autem siccius est, aut humidius, aut calidius, aut frigidius, à præpollēte ap-  
pellatur facultate. Præstat autem in unoquoq; excessu, quatuor, quātum  
ad usum spectat, ordines statuissē: calidum quidem nominantes in primo  
ordine quod utiq; nos calefacit, sed non euidenter, ut illius rationali quādā  
demonstratione indigeat. Simili ratione, frigidum, & siccum, & humidū,

H



Quatuor sunt anchusæ, non eiusdem omnes facultatis. Nam onoclea appellatæ radix astringendi uim habet & quiddam subamarum, ad lienis renu-  
mque: dolores efficax, itidē cum polenta illita erysipelatis succurrit, folia  
aut minus radice refrigerant desiccantque; hinc ad alui profluuiū bibuntur.

- 3 Quæ dicitur lycopsis, astringens quodāmodo efficacius, similiter erysipe-  
latis cōuenit. Onochelos uero seu Alcibiadios nūcupata medicacior quo-  
dāmodo, uiperarum morsibus succurrit in cibo potuque; & alligata. Quar-  
ta omnibus aliis breuior, sine nomine propemodum, maiore quā Alcibiadi-  
os, amaritudine donata: latis alui lūbricis instar acetabuli pota benefacit.

## ADARCE.

Adarce ueluti spuma quædam est aquæ salis in cremis & arundinibus co-  
creta, tantum uero acrimoniæ habet & caloris ut extrinsecus cum aliis im-  
posita ferè urat: intro eam assumere nulli licet.

## ADIANTVM.

- 15 Adiantum siccatur, extenuatur, & modicè discutitur, calore ac frigidityte mediū  
est: Alopecii igitur medetur, tumores digerit, calculos potu confringit,  
reiectiones pulmonis desiccatur, alui profluuium sistit.

## AIZOON.

- Aizoon duplex est, maius & minus: urruque refrigerat ex tertio abscessu.  
20 desiccatur autem astringiturque: mediocriter. Idem ualeat erysipelatis, & ad her-  
petas inflammationesque: ex fluxione concitatas conuenit.

## AETONYCHON.

De Aëtonycho in capite de lapidibus pertractabitur.

## ATHERA.

- 25 Athera pulcra est sorbilis è zea in tenuissimū pollinē redacta, aut è tri-  
tico confecta, infantibus accommodatur. Item cataplasmatibus uice illinatur.

## AEGILOPS.

Aegilops discutiendi facultate prædita est, unde etiam indurescentibus in-  
flammationibus & ægilopi quæ oculorum fistula est, opitulatur.

- 30 AEGIROS, POPVLVS NIGRA.

Populus nigra in primo ordine calefacit, modice siccatur, & tenuis est sub-  
stantiæ, cuius folia cum aceto illita podagricos dolores sopiunt. Quæ ue-  
ro ex ea distillat resina, floribus calidior misceatur acopis & malagmatis, fru-  
ctus cum aceto potus comitialibus auxiliatur.

- 35 AEDAEON, HOC EST, PVDENDVM, MASCVLICERVI.  
Pudendum cerui masculi tritum atque ex uino potum, uiperarum mor-  
bus subuenit, misceatur autem compositis facultatibus.

## AETHALE, FVLIGO THVRIS.

Aethale & lygnys in litera L, exponetur.

- 40 AETHIOPIS.

Aethiopsis similia uerbasco habet folia, radice decoctū, potu datur ischia-

dicis, pleuriticis & sanguinem excreantibus, item faucium asperitates cum melle lenit.

#### AIMA, SANGVIS.

Sanguis frigidus nullus est, uerum suillus, humidior, & minus calet, humano maxime temperamento similis. Columbarum uero, palumbi & turtur<sup>5</sup> ris, temperatus quodammodo, oculorum liuores ex ictu, hyposphagmata dicunt, medicatur, si calidus instilletur. Item crassiori cerebri membranae infusus, in his quorum calua perforata est, inflammationem arcet. Nocturne sanguis cum uino aut aqua potus, spirandi difficultatem adiuuat. Vespertilionum, uirginum mamillas tuctur, & pilorum incrementa illitum prohibere dicunt. Similiter sanguis ranarum, chamaeleontis, & ricinorum qui in canibus herentes inueniuntur, sanguis facit. Galenus autem haec facto rei experimento falsa esse pronuntiat. Caprarum uero siccitatis nomine aquas cutem subeuntes cum melle potus iuuat, renumque calculos coheret. Gallinarum cohortali<sup>10</sup> um sanguinis est cerebri membrana profluua coheret. Agnus comitalibus prodest: haedinus nuper coagulatus circa hemina dimidium cum pari aceto contra cruentas pectoris excreationes bibitur. Vrsorum, syluestrium caprarum, hyrcorum & taurorum, abscessus maturare fertur. Terrestris crocodili, oculorum claritatem efficit. Equorum admissariorum septicis miscetur facultatibus. At antidotum ex sanguinibus, in lethalia medicamenta<sup>20</sup> efficax est. Item anatis, haedi & anseris, in antidota miscetur.

#### AERA, LOLIUM.

Lolium calore & siccitate ad tertium ferme ordinem pertingit, iridi facultate simile.

#### ACACALIS.

Acacalis fruticis, in Aegypto nascentis fructus est, cuius dilutum collyriis<sup>25</sup> claritati oculorum efficacibus miscetur.

#### ACACIA.

Acacia tertii quidem desiccantium ordinis est, primi uero refrigerantium, at si elota fuerit, secundi. Est autem acerba & terrestris.

#### ACALYPHE, QVAE VRTICA LATINIS DICITVR.

Vrtica & fructus & folia tenuem habent substantiam, citraque rosionem siccant, tumores discutiunt, abstergunt, uentrem subducunt, mediocriter flatulenta, quare etiam ad uenerem incitant.

#### ACANTHVS.

Acanthum alii a nigro colore foliorum melamphyllon appellant, alii proderoten, uis eius est discutere & siccare.

#### ACANTHIUM.

Acanthium tenui calidumque natura praeditum, conuulsis auxiliatur.

#### ACANTHA LEVCE, QVAE SPINA

alba Latinis nuncupatur.

Spina alba radicem siccantem & modice astringentem obtinet, eoq; & stomachicis, & sanguinē expuentibus, dentiumq; doloribus succurrit: semen tenue calidumq; est, quā uī conuulsioni quoq; medetur.

**A CANTHA, ID EST, SPINA AEGYPTIA, VEL ARABICA.**

- 5 Spina Aegyptia, secundum alios Arabica, astringit siccataq; impenſe, unde & sanguinem, & alias defluxiones retinet.

**A C I N U S.**

Acinus ocimo similis, mediocres astringendi uires habet, ideoq; aluum & menſeis pora ſiſtit, illita uero panos & ſacros ignes perſanat.

10 **A C O N I T V M.**

Aconitum, quod quidē pardalianches dicitur, exedētem lethalemq; uim habet, quā ob cauſam intro non aſſumitur: extrinſecus tamen in carni-  
bus quas exedi oporteat, uti licet. quod uero a lupis lycoctinon dicitur, ſi-  
mileis priori uireis ſortitum, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat.

15 **A C O R O N.**

Acoron in tertio abſceſſu calefacit & deſiccāt, radice ipſius ad ciendā urinae, lienemq; induratum utimur: cāterū membranae oculorum, ob cornus ſimilitudinem ceratoidis dictae, craſſitiem extenuat.

**A C R I D E S, L O C V S T A E.**

- 20 Locustae urinae anguſtiis praefertimq; mulierū, ſuſſitu profunt. At quae aliis caret, contra ſcorpionis morſus cum uino ſalutariter bibitur.

**A C T E, H O C E S T, S A M B V C V S, E T**

chamaecte, id eſt, ebulus.

- Sambucus, & magnus, & ebulus, qui chamaecte dicitur, quaſi humilis ſam-  
25 bucus, uterque deſiccandi facultatem obtinet, modice digerit & conglutinat, potus autem & manducatus, aquam per aluum educit.

**A L S, S A L.**

- Sal quilibet uim habet uehemēter ſiccā & astringentem, unde quicquid  
in corporibus humidum eſt, id omne depaſcit, reliquum aſtriſtione con-  
30 firmat, leuiterq; contrahit, \* qua ratione ad ſaſſamenta omnia adhibetur,  
putredinemq; arceat: crematus uero ſal magis diſcurit.

**A L T H A E A.**

- Althaea ſeu ebiscus ſpecies eſt maluae ſylueſtris, uis eius diſcurit, laxat, in-  
flammationem abigit, lenit, & phymata concoquit, radix autem & ſemen  
35 reliqua ſane intenſa habet, uerum \* exterit uiriliginē abſtergitq; praeci-  
pue autem ſemen calculos quoq; confringit.

**A L I M O N.**

- Alimon diſſimilariū partium eſt, ſaluſtū guſtu & leuiter astringens, ma-  
xima ipſius pars calore temperata cum humiditate inſuperabili eſt, & la-  
40 ctis ubertatem conciliat.

**A L C A E A.**

H iii

\* Crisus  
unde carnes  
eo coctis ad  
putredinem  
conferuat.

\* Non male  
addetur, pro  
prie.

Alcea syluestris matuz & hæc genus est, in uino pota intestinorum tormibus & erosionibus medetur, multo magis ipsius radix.

\* Græce est  
Algē, nimirum depra-  
uatum, pro-  
bitū, id est,  
ruperis, sic  
enim habet  
Dioscorides.

## ALCYONIVM.

Alcyonii genera omnia quidem abstergunt, discutiuntq̃: acri qualitate prædita, sed milesium (est autem uermiculum purpureumq̃): cæteris præstat: quare combustum, pilorum defluuia, quæ alopecie dicuntur, impetigenes, uirilignesq̃: abstergit. Porro, quod in superficie leuiorem habet & uehementer acris est, non modo abstergit, uerum etiam excoriat. Postremo, quod lanis succidis responderet, omnium est imbecillimum.

## ALME, QVAE MVRIA DICITVR.

Muria nulli alteri mixta substantiæ, similes habet sali uires, sed imbecilliores aqua temperata: at salforum piscium oliuarumq̃: colymbadū muria ualentius abstergit, contra intestinorum tormina & coxendicum dolores clystere iniicitur.

## A L O E .

Aloë calefacit in primo, siccat in tertio ordine, stomacho etiam amica est, abstergit dissipatq̃: aluum subducit, lora uero minus detergit, sed stomacho gravior est, inflammationem prohibet, & ulceribus cicatricem inducit, præsertim sedem & naturalia infestantibus,

## ALOS ANTHOS, ID EST, SALIS FLOS.

Flos salis liquidum est medicamentum sale concremato tenuius, acris, & fatis digerens.

## ALOS ACHNE, ID EST, SALIS SPUMA.

Salis spuma lanugo salis spumosa est, tenuior quidem illo magisq̃: discutiens, sed minus contrahit.

## ALSINE, ID EST, AVRICVLA MVRIS.

Alsine, quam alii muris auriculā uocant, uim habet helinxæ similem quæ refrigerat humectatq̃: quapropter ad feruentes inflammationes cōuenit.

## ALYPON.

Alypi semen bilem atram per inferiora purgat pari epithymo mensura sumprum cum sale & aceto, ueruntamen intestina leniter exulcerat.

## ALYSSON.

Alysson quod à cane rabido morfos iuuet, sic appellatum est, cæterum sic catoria, discussoria, absterfioraq̃: ui præditum, renum meatus aperit, ephe-  
lidem, quæ aspera discoloratq̃: cutis est, exterit.

## ALOPEX, ID EST, VVLPE.

Vulpes uiua aut mortua, tota in oleo decocta, discutiendi uim oleo conciliat, adeo ut humores alte fixos in cutem extrahat, hinc articularii in solio eo repleto diutius immorati, incipientem quidem affectum finierunt, inueteratum uero moderatiorem reddidere.

## AMARACVS.

Amaracus tertio in ordine calefacit, secundo deficcatur.

AMARANTVS, QVOD EST CENTARIVM MINVS.

Amarantus extenuat, incidit, menseis cū uino potus educit, sanguinis grumos dissoluit cū mulso, omneisq; fluxiones deficcatur, stomacho inimicus.

AMBROSIA, QVAE ROMANIS

caper syluaticus dicitur.

Ambrosia emplastri modo imposita uim habet astringendi, reprimendi, retundendiq;.

AMI.

Ami ad tertium calefacientium siccantiumq; ordinē refertur, tenue, discutiens, & urinā mouenda efficax, semen ipsius longē utilissimum est.

AMIANTVS LAPIS.

Amiantus lapis in Cypro nascitur alumini scisso similis, qui in ignē coniectus accēditur quidem inflammaturq; sed non comburitur, utuntur eo

nonnulli in deficcantibus psilothris.

AMMOS, ID EST, ARENA.

Arena litorum maris affatim deficcatur, candēs feruensq; sole aquas subtercutem exiccat, corporibus hydropicorum in ea coopertis: torretur eadē ad sicca fomenta in salis & milii uicem.

AMMONIACVM THYMIAMA, QVOD

Latinis ammoniacum suffimen, & ammoniaci gutta dicitur.

Ammoniacum thymiama, liquor est tanta molliendi uirtute præditus, ut scirros & top hos discuriat.

AMVRCA.

Amurca secundi calefacientium siccantiumq; ordinis est, eiusq; intensi, sicca enim in aridis corporibus ulcera curat, in reliquis intendit irritatq;.

AMPELOPRASVM, HOC EST, AGRESTE PORRVM.

Ampeloprasum, seu potrum syluestre acerrimum est calidissimumq; in summo ordine, quamobrem etiam \* exulcerat, inciditq; uiscerū meatus recludit, stomacho inimicum.

AMPELOS AGRIA, ID EST, VITIS SYLVESTRIS, quæ Latinis labrusca quoq; dicitur.

Vitis sylvestris racemi & germina ipsa abstergendi facultate pollent, item nonnihil astringens obtinent.

AMPELOS HEMEROS, ID EST, VITIS SATIUA.

Vitis satiaua facultas respondet sylvestri, sed imbecillior est.

AMPELOS LEVCE, ID EST, VITIS ALBA, quæ & bryonia dicitur.

Vitis albæ, quam & bryoniam & psilothron appellant, germina sanè cetero stomacho grata eduntur, urināq; ciendæ sunt, radix abstergit, tenuis na-

H iiii

\* Impositi  
exemplar  
nascitur  
habet pro  
uicem

tura & medioeriter calida, unde fit ut lienes etiam potu consumat, extrinsecus autem cum ficiis illita scabiei & leprae medetur.

AMPELOS MELAENA, ID EST, VITIS NIGRA.

Vitis nigra, quæ & ipsa bryonia nuncupatur, superiori consimilis est, nisi quod inefficacior.

AMYGDALA.

Amygdala quæ quidem amara sunt extenuant, viscosos crassosque humores altius hæreres meatus recludendo educunt, tum in cutem erumpentes abstergunt: arbor eandem uim repræsentat: at dulcia amygdala modo pato calore donata sunt.

AMYLON.

Amylon ex puro tritico aqua sub canicula æstu macerato conficitur, quæ (aquam dico) quinquies in die mutatur: quum autem tenerrimum euaserit, colo traiecta aqua quam superfuderis furfures secernere sicareque: ad solem oportet protinus ante quam aefcat. Cæterum uis eius est refrigerare medioeriter, & siccare, & acria lenire.

AMOMVM.

Amomum acoro uirtute respondet, sed illud quidem siccius, hoc autem maturat expeditius.

ANAGALLIS.

Anagallis utraq; uim habet abunde abstergentem subcalidam & attractricem nonnullam, ut etiam aculeos euellat, item succus ipsius naribus instillatus caput purgat.

ANAGYRIS.

Anagyris frutex est grauis odoris, aerisque, calefacit & discutit, semen tenuius, & uomitu eiendo est.

ANDRACHNE, HOC EST, PORTULACA.

Portulaca tercio quidem abcessu refrigerat, secundo autem humectat, quare etiam causone laborantes uentriculo imposita, iuuat, & fluxiones repellit, lentore suo dentium stuporem ex acidis contractum corrigit: obstrictionem, & intestinorum tormina, & sanguinis profluvia coërcet.

ANDROSAEMON, ID EST, HUMANI

sanguinis herba.

Androsami duplex genus est, alterum ascyrrhon uel ascyrrhoides nominatur specie hyperici, alterum dionysias. fructus ipsorum purgat, folia autem magis desiccant.

ANDROSARCES.

Androsarces amara acrisque herba est, uis eius est discutere & desiccare: potum ipsa, tum fructus ipsius urinam promouet.

ANEMONAE.

Anemonæ omnes uim habent acrem absterforiamque, item extrahendi &

oris uasorum recludēdis idoneam, qua pituitam per os purgāt, lepras tollunt appositū, & lactis faciunt ubertatem.

## ANETHVM.

- Anerthum calefacit in secundo ordine intēso, siccatur paulo remissius, quod  
 5 in oleo excoctum digerit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat, uustum tertiū calefacientium siccantiumq; ordinis efficit, humentibus ulceribus utiliter illinitur: uiride quoniam humidius minusq; calidum est, non ita maturat.

## ANTHYLLIS.

- 10 Anthyllis duplex quidem est, sed utraq; ulcera perficit, quæ chamepityi respondet, tenuior est, quare etiam comitialibus competit, cæterum efficacius eadem abstergit.

## ANISVM.

- Anisi semen acrius est, in tertio abscessu calefaciens siccansq; hinc utiq; &  
 15 urinam mouet & flatus discutit.

## ANTIRRHINON VEL ANARRHINON.

Antirrhinon siue anarrhinon persimilem inguinarię uim obtinet sed minus efficacem, atq; ex illo hoc quoq; cognosces.

## ANONIS VEL ONONIS.

- 20 Anonis siue ononis calida facultate est, præfertimq; ei<sup>9</sup> radix, cuius succus cū uino potus urinā ducit, calculos cōterit, crustas tūpit & dentes mitigat.

## APARINE.

Aparine, quam alii philantropon, alii omphacocarpon appellant, modicē abstergit & desiccatur, item tenuē quippiam in se continet.

- 25 APIOS, QVAM LATINI PIRVM DOMESTICAM appellant.

Apios temperatura inæqualis est, terrestrē aliud sortita, aliud aquosum, ob quod manducata stomachum iuuat sitimq; arcer, illita uerò siccatur refrigeratq; mediocriter.

- 30 APOCYNON VEL CYNOCRAMBE, ID EST, canina brassica.

Apocynon ceu cynocrambe, dicitur autem & cynomotoron quod celerissime canes enecet, eademq; ui maleficium & lethalis homini est, sædi admodum odoris est, & calida citra siccitatem, unde etiam digerendi facultatem illita repræsentat.

## APOCHYMA VEL ZOPISSA.

Apochyma pix est uetus quæ à nauigiis deraditur, tumores diffundit, siccatur & discutit.

## ARACHNE, ID EST, ARANEVS.

- 40 Araneus in emplastrū emollitus impositusq; fronti & temporibus tertianarum febriū circuitus finit, ut Dioscorides memorię mādauit, tela ipsius



applicata sanguinis fluores sistit, & ulcera in summa cute ab inflammationibus tuetur.

## A R G E M O N E.

Argemonæ facultas est abstergere simul & discutere.

## A R I S A R V M.

Arisar: multo breuius est aro, acriusq; radicē oliuæ magnitudine obtinet.

A R I S T O L O C H I A , Q V O D L A T I N I M A -  
lum terræ dicunt.

Aristolochia omnis calida, tenuis, abstergens, amara, & subacris, ad medicinas utilissima, at rotunda, tenuior & in omnibus efficacior est, clematidis odorata quidem sed imbecillior, longa uerò præter alia, media harum est, sed non minus calida, quàm rotunda.

## A R C E V T H O S , H O C E S T , I V N I P E R V S.

Iuniperus calefacit & siccatur in tertio ordine, fructus autem calefacit quidē similiter, sed in primo gradu siccatur.

## A R C I O N.

Arcion siue prosopites folia habet cucurbitis maiora, duriora que discutit quidem siccatur & astringit, quapropter & folia ipsius uetusta ulcera perlanant.

## A R C T I O N.

Arction uerbasco simile est, radicem habet teneram, cādidam, & dulcem, uis eius est tenuis, siccans, & mediocriter astringens.

## A R M E N I A C V M.

Armeniacus lapis uim habet absterforiam simul cum modica acrimonia & minore astrictione, hinc etiam oculariis facultatibus miscetur, & alendis palpebrarum pilis usum habet.

## A R N A B O.

Arnabo ex aromatis habetur, ob quod unguētis potissimum temperatur, calida siccaq; potentia præditum in tertio ordine, cassiæ & carpesio simile, unde Posidonius ubi cinamomi copia non datur, hoc utendū esse censet.

## A R N O G L O S S V M , I D E S T , P L A N T A G O.

Plantago refrigerat pariter & desiccatur in abscessu secūdo, temperata ex aquea & terrestri substantia, cui etiam astrictione non nihil adfit, quo nomine ad maligna ulcera, fluxiones, putredinesq; accommodata est, temperamenti moderatione, sanguinis quoq; profluuia cohibet & plurimis congruit, etenim siccitatis quæ nequaquam rodit cōpos est, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

## A R O N.

Aron calore & siccitate primi est ordinis, ex terrestri calida & astringente substantia & hoc generatum, radices ipsius calidiores sunt, dracunculo inferiores.

## ARSENICVM, QVOD AVRIPIGMENTVM

Latine dicitur.

Arfenici uis est caustica, utuntur eo & in pilis abolendis, quod si cuti diutius adhæserit, eam ipsam depascit, ustum uerò tenuius redditur.

## 5 ARTEMISIAE.

Artemisia utraq; secundo in ordine calefacit, siccatur in primo, tenuis adeo substantia est ut renum calculos comminuat, & uteri fomentis rectè ac commodetur.

## ARTOS, ID EST, PANIS.

- 10 Panis illitus intensius digerit quàm triticum, ceu & salis & fermenti participes. Nam ad extrahendum ea quæ alitè hærent, fermentum idoneum est.

## ASARVM.

Afarum similem acoro uirtutem habet, sed magis intensam.

## ASBOLE, HOC EST, FVLIGO PICTORVM.

- 15 Fuligo qua pictores utuntur: ex uitrariis officinis sumitur, uim habet digerentem, adeoq; acrem, ut & urat & exedat, cæterum \* adusta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

\* Dioscorides uideat  
quomodo hoc  
est ruptum.

## ASCALABOTES, ID EST, STELLIO TRANSMARINVS.

- 10 Ascalabotes animal ad reliqua sanè inutile est, sed scorpionum ictibus impositum opitulari ipsum tradunt: miscetur etiã uehementibus medicinis.

## ASCLEPIAS.

Asclepias calida, sicca, & tenuis substantiæ, torminibus cum uino pota cõpetit, uenenatorum autem moribus & maleficis mammarum gnuliebriũq; locorum uitii illinitur.

- 25 ASCYRRHON.

Ascyrrhon in androsæmo expositum est.

## ASPALATHVS.

Aspalathus dissimili constat uirtute acri & astringente, & utraq; siccante, idcirco & putredini & fluxionibus utilis est.

- 30 ASPARAGVS.

Asparagus petreus, aut myacanthinus abstergit utiq; , sed calore & frigiditate medius est, renes & iecur obstructa recludit, præsertimq; radices & semen. Item dentium doloribus medetur.

## ASPLENON.

- 35 Asplenon tenue quidem est uirtute, non tamen calidum, hac utiq; ratione & calculos confringit, & lienes consumit.

## ASTAPHIS, ID EST, VVA PASSA, QVÆ

staphis etiam dicitur.

- 40 Astaphis domestica concoquit simul & astringit, & leuiter discutit, syluestris aut æcris adeo est, ut pituitam per os educat, & uehementer abstergat.

## ASTER ATTICVS, SIVE INGVINALIS HERBA.

Aster articus, quam alii herbam inguinalem uocant, ob hoc ipsum quod non tantum emplastri modo imposita, uerū ad alligata etiam bubonibus prodesse creditur, mixta est uirtutis, digerentis & refrigeratoria.

## ASTRAGALVS.

Astragalus frutex est exiguus cuius radices astringunt, ipse non ignauiter & deficiat: ulcera itaque uetusta ad cicatricem perducit, & aluum fluentem radix in uino pota sistit: plurimus in Phæneo Arcadia nascitur.

## ASPHALTVS, BITVMEN.

Bitumen siccatur calefacitque in ordine secundo, quare ulcera cruenta glutinat.

## ASPHODELVS, QVAE HASTVLA REGIA

dicitur Latinis.

Asphodeli radix uim habet detergentem discutientemque, concremata autem ipsius cinis calidior, siccior & tenuior euadit, quo fit ut pilorum defluuiis medeatur.

## ATRACTYLIS, QVAM ROMANI ORCI

tunicam dicunt.

Attractylis seu cnicum syluestre ex spinosorum genere habetur, ui siccante & mediocriter calida.

## ATRIPLEX.

Atriplex humescit sanè in secundo, refrigerat in primo ordine, quae de causa uentrem quoque emollit: semen ipsius ui pollet absterforia, unde ieticis ex iocinoris obstructione accommodatum est.

## APHACE.

Aphace lenticulae modo astringit, sed manducata & gruius concoquitur, ualenti-  
us siccatur, mediocriter calefacit.

## APHRONITRVM.

Aphronitri uis est discutere & abstergere, ut non solum sordida exterat, sed etiam pruritus [quippe saniem dissipat] medeatur, potum uero stomacho nocet.

Orbasius  
Galenusque  
hoc adijciunt

## APHROS, ID EST, SPUMA NITRI.

Spuma nitri proximam nitro facultatem obtinet, sed tenuior substantia, ob quod & leuis, farinae modo existit.

## ACHRAS, QVOD PIRVM AGRESTE DICITVR.

Pirum agreste eandem piro domestico uirtutem habet, sed magis intensam, quae propter magnis uulneribus glutinandis est.

## ABSINTHIUM.

Absinthium calidum primo abscessu est, siccum tertio, astringenti, amara & acri simul donatum qualitate: quae biliosos in uentriculo humores per aluum & urinas inanit: quibus autem pituita redundat, hos propter astringentem nihil iuuat: succus ipsius, herba multo calidior est.

ENVMERATIO EORVM QVAE A B incipiunt.

BALANVS MYREPSICA, HOC EST,  
glans unguentaria.

Quæ intra unguetariam glandē ceu carnosa sunt, abstergēdi incidendiq;  
cum astrictione uim habet, eamq; ob causam denarii unius pondere cum  
5 mulsâ pota, facile uomitiones cient, & inferiorem uentrē subducunt, cum  
posca uero laxandis extis accommodata sunt. item cutis uitia cum aceto  
peruncta exterunt. Cortex alioquin egregia astringendi uirtute pollet.

## BACCHARIS.

Baccharis odorata est herba similis cinamomo, coronaria & acris: huius  
10 radicis decoctum meatus obstructos aperit, urinam & mensis citat, folia  
ipsius quum sint astringentia, fluxionibus opitulantur.

## BALAUSTIVM.

Balaustium, syluestris punice flos est, ualide astringens, sicca & frigida fa-  
cultate præditum, itaque summę cutis ulcera ad cicatricem perducit, & de-  
15 stillationes cohibet.

## BALSAMVM.

Balsami, quod ueluti lignum est, siccat & calefacit in secundo ordine, subtili-  
lemq; habet substantiam, liquor autem multo tenuior est, fructus proxi-  
me hunc uirtute accedit, sed minus tenuis est.

## 20 BALLOTE, MARRUBIVM NIGRVM.

Ballote quod alii marrubium nigrum dicunt, acris est & absterforiæ facul-  
tatis, impositum cum sale rabidi canis moribus medetur.

## BATVS, RVBVS.

Bati fruticosum, abunde abstringit & siccat, qua de causa & uulnera com-  
mittit, & defluxiones sistit, radix autem præter astrictiōem, non parum  
25 etiam subtilis est, unde renum calculos confringere est idonea. fructus si  
maturus est, magis calefacit, simulq; mediocriter astringit, ac ideo cibo  
idoneus est, immaturus autem & acerbus est & ualide siccat, præsertim re-  
torridus. Eadem etiam flos efficit.

## 30 BATRACHION, RANUNCVLVS HERBA.

Ranunculi quatuor sunt genera, omnia excellēter calida, sicca, acris, uren-  
tia, adeo ut ulcus cum dolore excitent: quibus si modice uraris, cutis uitia  
tantū exteuerit, radix autē arida sternutamētis ciendis est medicamentū.

## BATRACHI, RANAE.

35 Ranae aduersus uirulentorum morsus in iusculo coctæ eduntur. Crema-  
tarum ranarum cinis maxime siccas redditus, sanguinis eruptiones sistit,  
& capillorum defluuiis cum piceliquida medetur.

## BDELLIVM.

Bdellium tum Seythicum tum Arabicum scirros emollit, præsertimq; re-  
40 centes, Arabicū uero urinæ ciendæ est, calculos comminuit maturatq;.

## BETONICA.

Betonica herba est ramulis exilibus pulegio similibus sed tenuioribus, & propemodum si gustes, nullam qualitatem referentibus. Nascitur potissimum locis petrosis, qua & in renum medicinis utuntur. Est autē apud Romanos alia quadam betonica dicta, quam Dioscorides nominat cestrion, alii uero psychotrophon, eò quòd frigidis locis gaudeat, nihil simile cum prædicta habet, præter actionem: at ultra quòd urinam ciet, etiam aliis multis benefacit, potissimūq; radix ipsius, cum hydromelite posita uomitionem mouet, folia autem aluum subducunt.

## BECHIVM, TVSSILAGO.

Tussilago, quæ Græcis bechion siue bechicon inde dicitur, quòd tusses & 10 recta ceruice spirantes suffitu iuuat, cōstat ex calida aquosaq; substantia.

## BLITVM.

Blitum esculentum olus est, humidum frigidumq; in abscessu secundo,

## BVLBVS.

Bulbus esculentus amari simul & astringentis modice compos est, siccatur 15 glutinatq; uulnera, & abstergit. Qui autem uomitum cit, multo calidiorum uim repræsentat.

## BOTRYS.

Botrys, quam alii ambrosiam, alii artemisiam dicunt, planta est insigniter odorata, hæc cum uino pota, subrecta ceruice spirantibus quos orthopnoi 20 eos appellant, succurrit.

## BVBONIVM, INGVINALIS HERBA.

Bubonium in Attico astere dictum est.

## BVGLOSSVM, LINGVA BVBVLA.

Buglossum humidum calidumq; temperamento est, camq; ob causam ui- 25 no iniectum lætitiæ animi conciliare dicitur.

## BVNIVM.

Bunium quod alii arction appellant, calidum est, urinæ & mensibus educendis accommodatum, huic respondet & pseudobunium.

## BVPRESTIS.

Buprestis animalculum est cantharidi simile, reponitur itaq; sicut & illa. 30

## BVTYRVM.

Butyrum maturatur digeritq; mediocriter in teneris corporibus, bubones igitur & parotides iuuat, gingiuas extenuat, & præsertim in infantibus 35 dentientibus, item humores ex inflammatione pectori infarctos, liquidum concoquit.

## BVPHTHALMON, QVASI DICAS BOVIS OCVLVM.

Buphtalmon similem habet chamæmelo florē, sed multo maiore acriter 40 remq; ideo & discutientē, adeo ut cerato mixtum duricias remolliat.

## BRATHY, HERBA SABINA.

Sabina cupresso similis calefacit siccaturq; in tertio ordine, tenuissima que

\* Oribus siue  
infantibus de-  
trahentibus gin-  
giue eo illi-  
nuntur, sine  
dolore pro-  
mouet.

est, extenuat & digerit pota, tū in putredines cupresso similiter efficax est.

## BRITANNICA.

Britannica astringit & conglurinat, sylvestri lapathio specie similis, succus ipsius putredines os infestantes per sanat.

## 5 BROMVS, AVENA.

Avena similem hordeo obtinet facultatem, siccatur autem & modice citra corrosionem discutit, iam & nonnullius astringitionis compos est, unde & alui profluuiis subuenit.

## BRYON THALASSION.

- 10 Bryon thalassion refrigerat simul & astringit, eoq; feruētes inflammationes illitum adiuuat.

## BRYON.

Bryon, quod alii sphlāchnon dicūt, in quercubus & populis albis, piceisq; inuenitur, distrahendi simul & molliēdi uim moderatam obtinet, potissimum quod cedris adharet.

- 15

## BRYONIA.

Bryonia dicta est uitis alba.

## INITIVM LITERAE G.

## GALA, LAC.

- 20 Lac omne tribus constat substātiis, caseosa, serosa, & pingui, quam copiosissimam bubulum obrinet, unde etiam butyrum efficitur. Serum ipsius uim habet abstergēdi, unde & aluum subducit, si ipsum per decoctionem fecernas, id quod caseū refert & crassum est, magis obstruit, atq; ideo acrimoniam obtundit: coctum uero lac aut marinis calculis ignitis in ipsum  
25 iniectis, aut alio quodam modo, praesens fit remediū dysenteriae, & acrium in uentrem defluxionum. Cæterum lac totum ad acres oculorum fluores aliasq; acrimonias cōducit. At temperatissimū lac, muliebre est, mox caprillum, hinc afininum, ouillumq; postremo uaccinum.

## GALE, MVSTELA.

- 30 Mustelę concremata cinis abunde digerit, ex aceto igitur illitus podagricos, & articulares dolores iuuat: inarefacta autem inueterataq; mustela comitialibus auxiliatur.

## GALION.

- Galion a coagulando lacte dictum est, aparinx simile, siccandi uim, me-  
35 diocremq; acrimoniam habet: flos eius ad sanguinis ex naribus eruptiones & ambusta congruit.

## GALOPSIS, VEL GALIOPSIS.

Galopsis, quam alii galibdolon appellant, urticae similis herba est, uerum maiorem habet \* laeuorem & odorem grauem, scirrosos tumores dissipat

- 40 & emollit, item ad ulcera serpentia facit emplastri modo imposita.

## GARVM.

\* Dioscorides hoc ad siliu refert.

Garum calefacit exiccatq; ac ideo aduersus ulcera putrida extrinsecus eo utuntur, præterea contra intestinorum tormina & coxendicis dolores ex partibus inferioribus iniiciunt.

## GENTIANA.

Gentiana radix efficax admodum est extenuare, perpurigare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

## GERANIVM.

Geranium id quod foliis respondet anemonæ, radicem habet esculētā, quæ cum uino denarii modo pota uteri inflatiōes dissoluit. altera geranii species ad medicinam inutilis est.

## GE, TERRA.

Omnis terra desiccatur: quæ uero alterius substantiæ expers est, etiā sine morfu id faciat si ignea quædam ipsi qualitas admixta sit, lotionem hanc quoq; deponit. Inter cultas igitur terras quælibet pinguis omnium particularū quæ siccari postulant, curationi accommodata est: Aegyptio igitur luto utitur contra aquas cutē subeuntes, & lienes induratos, item ad fungos laxosq; tumores euidenter proficit. Ex terris medicatis lemnia rubrica, quæ sphragis dicitur, siccatur patiter & astringit mediocriter, contra lethalia medicamenta præsentis antidoti uires habet, ulceribus malignis cū aceto aut uino medetur, sanguinis profusionem quamlibet sistit, intestinorum tormina finit, & depascentem dysenteriam intestino multa prius, deinde muria per clysterem eloto, perlanat. Synopsis rubrica uehementior quàm lemnia, emplasticis miscetur medicinis, & pota lubricos interemit, sed multo lenior est samia, ceu glutinans & uiscosa, quare utendū ea est in his quæ leniri oporteat: omneis sanguinis excreationes, quacumq; parte erumpat, compescit. Selenusia & Chia maiore abstergēdi uirtute pollet, ideoq; mulienbus ad nitorem cutis & leuorem in facie utilis est, ulceribus carnem & cicatricem inducit, præsertim ambustis. Cimolia mixtæ facultatis est refrigerantis discutientisq; idq; simplex & illota. lota uero magis refrigerat, & ambustis ex posca medetur. Ampelitis à uineis appellata est, quod in nascentes ipsis uermes enecet, siccatur & discutit egregie citra erosionem. Cretica, æria est, & sine morfu abstergit. Erethrias euidenter astringit, concreta uero sine rosione desiccatur, præstātor uero est cinerea. Pnigitis similes cimoliæ uires repræsentat, sed colore nigrescit. Armenia, quam etiā bolum nomināt, summe desiccatur, unde intestinorū torminibus, alui profluuiis, sputo cruento, tabi, spiritus difficultati ex humiditate, ulceribus humidis & pestilentialibus uitiis strenue opitulatur. Cæterum cum uino tenui diluto bibitur: si febris adsit, cum aqua. Alana autem gleba armenia uim obtinet. Ochra uim habet discutiēdi exedendiq; reprimi igitur supercre-

## GERAS, SENECTVS ANGVIS.



Senectus anguis affatim siccatur: aceto igitur subferuefacta, dentium doloribus medetur. Aspidis exuium cum melle tritum delitumq; oculorum aciem maxime iuuat.

GES ENTERA, TERRAE INTERTESTINA,  
seu uermes terreni.

- 5 Lumbrici terræ detriti netuorum uulneribus impositi, repente euestigio mirabile adferunt præsidium.

GIGARTA, NUCLEI ACINORVM VVAE.

- Nuclei acinorum uuæ desiccant ordine secundo, refrigerant primo. quum  
10 itaq; abunde sint & acerbi omnibusalui uitiiis fluidis, conueniunt.

GINGIDIVM.

Gingidium calorem non adeo manifestum sortitum est, cæterum siccatur in abscessu tertio, & astringit, quæ de causa & stomacho utile est.

GLAUCIVM.

- 15 Glaucium astringit, sed ita ut etiam non nihil gustanti sit ingratum, manifeste refrigerat, eaq; ui sacris ignibus non ualidis succurit.

GLAUX.

Glaux herba calida & humida temperamento est, unde ad lac generandum efficax est.

- 20 GLECHNON, PVLEGIVM.

Pulegium calefacit, & extenuat uehementer, unde si illinatur rubor excitatur, & crassos uiscososq; humores è thorace & pulmone emolitur.

GLOEOS, SORDES BALNEORVM.

- Sordes balneorum calefaciunt modice, emolliunt, discutiunt, rhagadibus  
25 & condylomatis accommodantur.

GLYCYRIZA, DVLCIS RADICVLA

Glycyrriza tepidi humidique temperamenti est, alicuius etiam astrictioris particeps, eoq; non modo fauces exasperatas leuigat, sed etiam uesicæ scabiei medetur: eadem sitim arcet.

- 30 GLYCYSIDE, PAEONIA.

Glycyside quam alii pentameron, nonnulli pæoniam uocant, radicem habet acrem & leuiter subamaram & siccatam, cui etiam astrictioris non nihil inest, quapropter menses ciet, renes & iecur purgat, instar amygdalæ pota cum uino: at si hoc austerum fuerit, alui quoq; fluores coërcet, adalligata uero puero, morbum comitalem abigit.

GNAPHALIVM, CENTVNCVLVS.

Centunculus dictus est gnaphalium. quod foliis ipsius teneris loco tomēti, gnaphalon dicitur, utamur. sunt autem calida & modice astringentia, atq; hinc ad intestinorum tormina cum uino austero bibuntur.

- 40 GONGYLIS, RAPVM.

Rapi & radix & semē flatulenta & semini creādo sunt, ueneremq; excitant.

\* Græcum  
+ x, rā habet,  
quod est  
frigidū, pro  
stiprū, hoc  
est acerbi,  
sic enim Gd-  
lenus uidet  
legere.

## CORDYLON.

Gordylon alii fefeli appellant, calidum est, urinæ & mensibus educendis habile, radix ipsius cum melle linctâ, quæ in thorace hærent, educit.

## GYRIS, POLLEN FARINACEVS.

Pollen uirtute respondet amylo, sed calidior est.

## GYPSVM.

Gypsum uim habet siccantem opplentemq; propter quam ad sanguinis ex naribus eruptionem conuenit temperatum cum candido oui liquore, ustum uim opplendi non similiter retinet, uerum magis siccât & repellit præsertim cum posca.

## QVAE A D INCIPIVNT.

## DADES, TEDAE.

Tedæ acre quiddam habent, item uim concoquendi, & abstergendi nonnullam, unde aceto incoctæ dentium doloribus si hoc aceto colluantur, succurrunt: at si mel adiectum fuerit, pituitam per os educunt, mixtæ etiam eclegmatis faciles è thorace excreta reddunt.

## DAMASCENA.

Damascena, quum ad pruna uentum erit, exponam.

## DAMASONIVM.

Damasonium absterforiam quandam uim obtinet, qua calculos conterit, & aquas in uentre collectas educit.

## DAVCVS.

\* Græci  
habentur & quæ  
quod est ari  
næ, nimirum  
pro uisum  
hoc è aqua.

Daucû, quod & staphylinon dicitur, duplex est, cuius radix flatulenta est, & uenerè mouet. Syluestris dauci semen minime flatus creat, sed urinam & menses citat, quemadmodum & herba ipsa.

## DAPHNE, LAVRVS ARBOR.

Lauri arboris folia siccant & calefaciunt insigniter, magis quoque fructus: radicis cortex amarus & leuiter astringens calculos comminuit, & iocinosos opitulatur cum uino odorato triobolari pondere potus.

## DAPHNE HERBA, LAVRVS ALEXANDRINA.

Daphne herba, quæ & Alexandria dicitur, calida, acris, & subamara est, idcirco menses & urinas commouet: laureola uero, quæ daphnoides græcè nuncupatur, eiusdem facultatis est: tum chamædaphne, quasi dicas humilem laurum, quæ & ipsa commanducatur.

## DERMA, PELLIS.

Pellis ouina recens detracta, calens adhuc iis qui flagris cæsi sunt circumposita, mirificè auxiliatur. At hippopotami pellis combusta & cum aqua lauis imposita phymata discutit. At uiperæ pellis detrita impositaq; pilorum defluuia mirabiliter reficit.

DERMATA, HOC EST, PELLIS SEV CORIA VETERUM CALCEAMENTORUM.

Coria ueterum calceamentorum crematorum cinerem reddunt: siccatorium, unde ex calceis pedum attritis nōdum inflammatis, ambustis intertriginibus, & tuberculis medentur.

## DICTAMNON.

- 5 Dictamnū tenuius est uirtute pulegio, cetera simile. quod autem uocatur pseudodictamnū imbecillius est.

## DIONYSIAS.

Dionysias dicta est in androsamō.

## DIPHRYGES.

- 10 Diphryges mixta est facultatis: habet enim quippiam astringēs & medio crite acie, ideoq; malignis ulceribus præsens est remedium.

## DIPSACOS, QVOD LABRVM VENERIS DICITVR.

Dipsaci spinæ radix in secundo ordine desiccatur, nonnullam uerò abster-  
gendi uim simul obtinet.

- 15 DORYCNION.

Dorycnion simile temperamento est papaueri & mandragoræ, immodice refrigerans: si quidem modicum torporem inducit: copiosius assumptum interimit.

## DRACUNTIVM, DRACVNCVLVS.

- 20 Dracuntium simile quiddam atō habet, sed eo acrius, amarius, calidius, tenuiusq; est. Item astrictiōis nonnihil habet coniunctū. Radix ipsius pota uiscera purgat, & peruiacium seu malignorum ulcerum excellentissimum est remedium: folia respondent: fructus ualentior est.

## DRYOPTERIS, FILICVLA.

- 25 Filicula dulcis, acris, & leuiter amara est: radix acerba est, ceterum uim habet exedentem, qua & pilos abolet.

## DRYS, QVERCVS.

- Quercus & folia & fructus siccante & tepida ui pollēt, quamobrem uulnera recentia glutinant, inflammationibus incipientibus medentur: at quod  
30 sub glandis corio & circa fructus carnem membranæ simile includitur, ualētius astringit: eoq; ad fluxum muliebrē, aliosq; fluidos morbos exhibet.

## QVAE AB E INCIPIVNT.

## EBENVS.

- 35 Ebeni ligni uis est excelsa toria, deterforia & subtilis, quapropter quæ pillas obscurant abstergere creditur, aliisq; oculariis miscetur medicinis.

## ENCEPHALOS, CEREBRVM.

- Cerebrum leporis coctum cōfricatum, comestumq;: infantium dentitionibus utile esse fertur: nonnulli uerò tremoribus succurrere manducatū, literis prodiderunt. At galli cerebrū cum uino potum ad uenenatos morsus  
40 efficax esse Dioscorides pronuntiat, & sanguinis ē cerebri membranarum eruptionem cohibere. Cameli cerebrum Galeno auctore siccum cum aceto

potum, comitiales per sanat. Idem facit mustelæ cerebrum. Hirundinum cum melle in oculorum suffusiones efficax est. Cerebrum ouillum simili ter præparatum infantium dentitionibus exacte opitulatur.

## ELAEA, OLEA.

Oleæ ramusculi quantum astringunt tantum etiam refrigerant, fructus qui exacte ematuruit, moderate calidus est, immaturus maiorē tū astringendi tum refrigerandi uim repræsentat.

## ELAEA, HOC EST OLEA, AETHIOPICA.

Oleæ æthiopicæ lachryma ammoniaco tenui similis, uires habet exterforias, quare ad cicatrices, albugines, hebetudinesq; oculorum ea utuntur, & ad denarium dolores, si cauis ipsorum iniiciatur, efficax est: nonnulli uerò syluaticam esse hanc oleam asserunt.

## ELAEON, OLEVM.

Oleum ex oliuis drupis dulce calidūq; mediocriter est magis humectans: at quod immaturis oliuis exprimitur, Græci omotribes appellant, astrictio-  
nis particeps est tantæ quantæ etiam frigiditatis. Eorum uerò oleum  
morsu ac rosione caret, uetus quanto diutius reseruatum tanto acrius cale  
facit discutitq; præsertim si iam inde ab initio tenuē extiterit: iudicatur au  
tem id, si purum sit, pellucidum: si paucum magnam corporis partem inū  
gat, & ex facili cutem penetret combibaturq; huiusmodi nimirū est Sabi-  
num: quod autē ex agresti olea funditur, abstergit simul & astringit, squa-  
lidissimūq; id est in omni oleorū genere ricininum uerò æquales ueteri ui  
res obtinet: reliqua uerò nempe lesaminū aut raphaninū & quæ eius sunt  
generis, pro substantiis ex quibus constāt, uires quoq; diuersas præ se ferūt.

## ELAEOMELI, OLEOMEL.

Oleum in Syria ex trunco quodam arboris emanat crassius melle & dulci-  
us, quod instat duorum cyathorum potum cum aquæ hemina, crudos hu  
mores biliososq; ex aluo educit: qui uerò id bibunt, torpescunt, quod exti  
mescendum non est, sed excitari ipsi debent.

## ELATERIVM.

Elateriū succus syluestris cucumeris fructus appellat, in secūdo ordine ca  
lesfaciēs, quod mensis prouocat, sætus appositu propter summā amaritu  
dinē necat, euacuationē etiā ex naribus cum lacte instillatū molitur: ab in  
ferioribus partibus inditū, pituitam, nonnunq; etiam sanguinē extrahit.

## ELATE, ABIES.

Abies arbor calefacit siccitq; nigra populo similiter: de resina ipsius in re  
sinarum sermone agemus.

## ELATINE.

Elatine herba est parietariæ similis, mediocri frigiditate & astrictione  
donata.

## ELAPHOBOSCVS.

Elaphoboscus uirtutis est calefactoriæ & siccæ in secundo abscessu, substantia tenuis.

#### ELELISPHACVS, SALVIA.

Salvia euidenter calefacit & leuiter astringit.

#### 5 HELENIVM, INVLA CAMPANA.

Helenium calidum est & siccum cum excrementitia humiditate, quare & eclegmatis temperatū infarctos thoraci humores educit, ac particulæ ex eo ruborem contrahunt.

#### ELEOSELINON, PALVSTRE APIVM.

- 10 Eleoselinon in aquosis natum locis idem potest quod hortense apiū, licet maius ipso existat.

#### ELEPHANTVS.

- Elephanti ex ungue ramenta si illinantur, reduuis profunt: item ossium dentiumq; ipsius quum sint siccæ facultatis & absterforiæ, huiusmodi mi-  
15 scentur medicamentis.

#### HEL CYSMA, ARGENTI RECREMENTVM.

Helcysma argenti est excrementum, uiribus plumbagini respondēs: quippe astringit simul atq; extrahit, quò fit ut emplastris fuscis & iis quæ cicatricem ducunt, admisceatur.

#### 20 HELLEBORVS, VERATRVM.

Veratrum utrunq; calefacit & desiccatur in tertio abscessu, item acre est & absterforium, unde etiam ad leprosa cutis uitia conuenit: nigrum uerò si fistulis inferatur tribus diebus callum exterit.

#### HELICHRYSON.

- 15 Helichryson alii chrysanthon, alii amaranthū appellāt, coronarius est frutex, coma aurū referente, quæ cum uino pota urinæ angustis, serpentium morfibz, coxarum dolori, & ruptis accommodata est, mensis educit, sanguinem coactum ex mulso pota dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

#### HELXINE, PARIETARIA.

- 30 Helxinem alii perdicium, alii parthenium, quidam sideritim, quidam heraciam nuncupant, uis eius est abstergere, ac leuiter astringere, cum humiditate subfrigida.

#### HELXINE.

Helxine quæ & cisampelus dicitur, uim habet discutiendi.

#### 35 ELYMVS, QVÆ ET MELINE DICITVR,

Latinis panicum.

Panicum simile est milio, siccans refrigeransq; extrinsecus illitum, craterum & alui fluores desiccatur.

#### EMPETRON.

- 40 Empetron, quod ab aliis praoides nominatur, pituitam & bilem purgat, est etiam salsum, quare absterfionibus accommodatur.

## EPITHYMVM.

Epithymum in tertio abscessu siccat & calefacit, thymo efficacius.

## EPIMEDIVM.

Epimedii uirtus est mediocriter frigida cum humiditate aquosa, quod si illinat, mammas rectas conseruat, dicitur etiam sterilitatem potu facere. 5

## EPIMELIS.

Epimelis, quæ etiã ab Italicis rusticis uocat unedon, malus est syluestris, cuius fructus acerbus & stomacho inimicus est, capitiq; dolorẽ mouet.

## EPIPACTIS.

Epipactis, quæ & elleborine appellatur, aduersus uenena & iocinoris affectus bibitur. 10

## EREBINTHVS, CICER.

Cicer consuetum legumen flatus creat, ualentis materiz, aluum facilem reddit, urinam mouet, lacti seminiq; generando accommodatum, idem mē seīs elicit: ar crios appellatum, hoc est, arietinum, aliis magis urinæ ciendę 15 est, decoctum ipsius præsertim nigri calculos quoque in renibus conterit: quod orobizum ab eruo uocatur, calidius his est & subamarum. Syluestria quouis modo domesticis sunt ualidiora.

## ERIA, HOC EST, LANAE SORDIDAE.

Lanae sordidae resperсионibus utiles sunt, nam pinguedo ipsarum, quā 20 sypon Græci appellant, butyri modo concoquit: at quæ sordibus carent materiz rationem duntaxat obtinent: concrematę uim habent acrem, calidam, siccam simul & tenuem, ut etiam flaccidas cum humiditate, ulcerum carnes protinus absument.

## ERICE.

Erice ui pollet discutiēte citra rosionem, sed flore ipsius potissimum, & foliis utendum est. 25

ERINOS, QVOD LATINE OCIMVM AQVATICVM dicitur.

Erinos aquatica herba est, cuius seminis denarii duo cū mellis denariis quatuor illiti, oculorū fluxiones sistunt, succus aurium doloribus benefacit. 30

## HERMODACTYLVS.

Hermodactyli radix & per se, & ipsius decoctum uim habet purgandi, priuatim & arthriticis tunc quum humores defluunt exhibetur, uerum stomacho nimis quàm aduersatur.

## HERPILLVM, SERPILLVM.

Serpillum calefacit, ut & urinam & menstrua commoueat. 35

## ERYTHRODANON, QVAM ROMANI RVBIAM

passiuam uocant.

Erythrodanon rubra tinctorum radix est, acerbamaraq; lienem, iecur & renes ita purgat, ut cruenta quoque per urinam & menſeis euocet: ac cutis 40 uitia rancida abstergit.

## ERYSIMON.

Erysimi semen igneum calefactoriumq; est, nasturcio similiter, quare in fermento tostum, thoracem purgat in eclegmatis assumptum, duritiasq; emollit, & cæcos caneros illitu adiuuat.

## 5 EVZOMON, ERVCA.

Eruca & ipsa priori similis temperamento, flatulenta est, ob quod ad uenem instigat, semen ipsius urinam quoque mouet. Cæterum syluestris domestica ualentior est.

## EVPATORIVM.

- 10 Eupatorium tenuem uim & incidentem sine conspicuo calore habet, quæ iecur obstructum expurgat, est & nonnullius astrictiois particeps.

## EUPHORBIVM.

Euphorbium adurentem uim fortitum est subtilēq; aliis liquoribus similiter.

## EPHEMERON.

- 15 Ephemerum non uenenum illud sed quod iris syluatica nominatur, mistæ potestatis est, & repellentis & discutientis per halitum.

L. Adkins  
ex Galeo.

## ECHIDNA, ID EST VIPERA.

- Viperæ carnes calidæ & siccæ temperatuta euidenter existunt, quæ corpus totum per cutem expurgant, hinc multi quos elephantia male habebat, 20 esu potuue ipsarum conlanuerunt: quæ in maritimis aliisq; locis aridis degunt, magis ad sitim faciendam sunt efficaces.

## ECHINVS HERBA.

Echinus herba quædam acerba est, quæ repellat & siccet.

## ECHINVS, ERINACEVS.

- 25 Erinacei terrestres fel, pilos defluentes glutinat, caro eius inueterata ualidè discutit exiecatq; pota igitur elephāticis, malo habitu peditis, & aliis plurimis auxiliat: pellis ipsius cōcremata uehementius siccatur & digerit, capillotū defluuia cum pice liquida peruncta sanat. Marini erinacei quod esui idoneū est, urinam citat, & aluum reddit facilem: testa cremata terrestri respōdet.

## ECHION.

- 30 Echion alii doriada, nonnulli alcibiadion uocant, spinosa herba est, quæ non modo à serpente commorsis cum uino pota auxiliatur, sed præsumentes quoq; percuti non patitur.

## HESPEMA, SAPA, SEV PASSVM.

- 35 Hespema mustum decoctū, quod alii sirzon appellant, calefacit modicè & concoquit, est autem medicamentum & emplasticum, & rosionis expertum.

## QVAE A' Z INCIPIVNT.

Desunq; et dnd m ZEA.

- Zea tritico uiribus respondet, medium inter calorem & siccitatem obti- 40 nens, leuiter exiecat, nec non obstruit.

## ZINGIBER.



## HEPAR, IECVR.

Iecur rabidi canis tostum assumptumq; iis qui ab eo commorfi sunt subuenire fertur. Caprilli iecoris tosti humor tenuis, sanies uel lusciosos iuuare instillata: uaporq; eius decocti oculis recipi iubetur: idem iecur assummanducatum, comitiales coarguit. Idem præstare & hircinum ferunt. Ad hæc lacertæ iecur dentibus corrosis impositum, dolorem sopit. Item lupinum, medicamini hepatico quod constat eupatorio iniicitur. Asininum tostum comitiales, si ieiuni id manduecent, adiuuar. Apri iecur recēs inarefactum tritumq; cum uino, ad serpentium morsus bibitur. At mergi  
 10 hepar siccum epotum, calculos eiicit.

## ERIGERV, SENECIO HERBA.

Senecio mixtas habet uires, refrigerat & modice discutit.

## ERYNGIVM.

Eryngium calefacit quidem non manifesto, siccitatis autem haud obscuræ nec modicæ particeps.  
 15

## QVAE A' TH INCIPIVNT.

## THALASSION HYDOR, AQUA MARINA.

Aqua marina acris, calfactoria mediocriter, desiccās, & pota stomacho cōtraria est, uētre turbat, pituitamq; educit: si calida superfundatur, extrahit & digerit.  
 20

## THALIETRV.

Thaliectrum siccandi uim sine rosione habet, hinc ulcera inueterata cicatrice obducit.

## THAPSIA.

Thapsia acris est, & ualēter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit  
 25 insigniter, attractumq; eadem discutit.

## THEION, SVLFVR.

Sulfur trahendi & ipsum uim obtinet, calidū & substantia tenue, ut aduersus pleraq; uirulenta animalia resistat, præsertim turturem marinum, draconemq; uel siccum inspersum, uel saluē quoq; mistum, uel urinæ pueri, uel oleo, uel melli: item scabiosa corporis uitia mirifice perfanar.  
 30

## THERMOS, LVPINVM.

Lupinum, esculentum quidem obstruendi uiribus pollet: amarum, abstergit, dissipat, & sine morfu desiccet, lumbricos occidit illitum & potum, uiscera purgat cum ruta & pipere, potu etiam cutis uitia extergit, tumores dissipat, cum oxymelite illitum: syluestre autē amarius est & omni ex parte satiuo ualentius.  
 35

## THELYPTERIS.

Thelypteris, quam nonnulli nympheā uel ptelin appellāt, filici similis facultate, quæ cum uino pota latos & teretes uētris lumbricos interimir, fortum in utero corrumpit: folia ipsius manducata aluum emolliunt.  
 40

## THLASPI.

Thlaspi semē est uiribus acre, ut intestinos abscessus potu rūpat, menſeis prouocet: ab inferioribus partibus iniectū coxarū dolores finit, cruciata uacuat, ac alioquin ſupra infraq; bilioſa inſtar acetabuli potum, expurgat.

THRIDAX, LACTVCA.

Lactuca olus eſt non ſumme frigidū humidū ue, ſed pro fontanæ aque ſ temperamēto, quapropter calidis inflammationibus cōuenit, præterea ſi tim potu reſtinguit, & genituræ fluore cohibet: Sylueſtris lactuca hac minus & refrigerat & humectat, uerum ſucculentior exiſtit.

THYMVS.

Thymus in tertio ordine calefacit & deſiccet, glutinofos craſſosq; humores incidit.

THYMBRA.

Thymbra agreſtis quidem eadem quæ thymus præſtat, hortenſis autē in omnibus quidem imbecillior, ſed ad cibum laudatior.

THYMELAEA.

Thymelæa, unde granum cnidium ſit, ſimileis ei uireis obtinet.

QVAE AB I INCIPIVNT.

IDAEA RADIX.

Idæa radix guſtu acerba & uiribus, ſanguinis eruptionibus & rheumaticis affectibus, rum pota, rum extrinſecus impoſita accommodatur.

HIDROS, SVDOR.

Sudor per ſe contrahere efficax eſt, miſcetur autem in palæſtris exercitantium ſordibus, quibus aſtringēdi uis dūtaxat ineſt, ac redditur totum diſcuſſorium. Mammis igitur inflammatione tentatis efficax eſt remediū, & feruori ipſarum reſtinguendo: bene facit etiam bubonibus: at ſi fuerint ſicciores, cum cyprino, aut roſaceo emolliri debent.

IXOS, VISCVM.

Viſcum calefacit cum acrimonia, humores ex alto ualide elicit, & thapſiz modo diſcutit, hac tamen multo eſt ignatius.

ION, VIOLA.

Violæ folia aquea frigidaq; ſubſtantia præpollenti conſtant.

IOS, AER VGO.

Aerugo acrem guſtu qualitatē præ ſe fert, item digerit, cōſumit, inciditq; non tenerā modo, ſed duram quoq; carnē: at ſi momentū ipſius cerato copioſiori miſceas, medicamentum fiet quod citra roſionem abſtergat.

HIPPOCAMPVS.

Hippocampus marinum animal eſt, cuius concremati cinis cum liquida pice pilorum deſluuia, Græci uocant alopecias, explet.

HIPPOLAPATHVM, GRANDIS RVMEX.

Hippolapathum in paluſtribus locis naſcitur, lapatho conſimile.

HIPPOMARATHRON.

Hippomarathrum cachryi proximum, magis quàm marathrum deficcatur, unde & aluum fluentem sistit, & calculos cōfringit, menscisq; mouet: semen ipsius coriandro respondet, sed illo imbecillius est.

## HIPPOPOTAMVS.

- 5 Hippopotami, quod est equi fluuiatilis, testiculus aridus potus ad serpentium morsus efficax est.

## HIPPOSELINON.

Hipposelinon cum apio domestico uirtute cōuenit, nisi esset imbecillius,

## HIPPVRI, CAUDA EQVINA.

- 10 Hippuris astringentē cum amaritudine qualitatē possidet, eoq; ualēter simul & sine morfu deficcatur, ac uulnera maxima committit, intestinorū ramicibus opitulatur, & uitii fluore infestantibus cum uino pota medetur.

## HIPPOPHAES, LAPPAGO.

- Hippophaēs, quod alii hippophyes uocant, quo uesteis expoliunt furculolus frutex est, è cuius radice thapsiē modo liquor colligit, qui cum crui farina instar denarii datus, bilem ac pituitam purgat: item totus ipse frutex siccatus ad purgationes accommodatur.

## IRIS.

- Iris affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substantia, tussi utilis, hu-  
 10 mores in pectore contumaces extenuat, torminibus medetur, sordida uiscera purgat, cum mulla pota aluum inanit.

## ISATIS.

- Isatis domestica qua tinctorum utuntur, siccandi uireis & astringēdi habet, his etiā magna uulnera in duris glutinat corporibus, sanguinē erumpentem cōpescit, laxos tumores discutit, ac omnibus malignis ulceribus resistit. Syluestris autē quā magis rodat, magisq; ideo siccet, ualentius aduersus humidas putredines pugnat, ad cætera deterior, ut quæ immoderatus mordeat: cæterū ob uirium uehementiā lienosis quoq; utiliter adhibetur.

## ISOPYRON, AVT PHASIOLVM.

- 30 Isopyrum phasiolum uel semē amarum ac modice acerbum occupat, ob quod crassos glutinososq; humores & abstergit & incidit, sicut corpora contrahat stringatq; hinc etiā quæ alte desidēt expurgat, excreationibus sanguinis non inefficax.

## ITEA, SALIX.

- 35 Salicis & folia & flos facultate cōstant quæ citra rosionem siccet, tum quæ non nihil etiam astringat, cortex autē paulo siccior est, cuius perusti cinis ex iis habetur quæ uehementer exciccent, quippe clauos & myrmecias, cū aceto extert.

## ICHTHYOCOLLA, GLVTEN PISCIVM.

- 40 Ichthyocollē uis est opplere & siccare. recte misceretur emplastris glutinantibus, & iis quæ ad lepras, & irugationem leuoremq; uultus cōficiuntur.

PAVLI AEGINETAE,  
QVAE A' C INCIPIVNT.

CANCANVS.

Cancani radix modice siccat, & sine morfu, illitionibus accommodata, quare cum uino subacta tragacanthæ & dulcis radiculae modo, linctaq; , arteriarum scabritiem iuuat.

CANCAMVM.

Cacamum lachryma est arboris in Arabia, myrrhae similis, odore grato, qua etiam ad suffitum utuntur. uis eius est obesos extenuare, abstergere, & aperire obstructa.

CADMIA.

\*Galemi  
botryitis te  
nuiorē, pla  
citiū crassio  
rem ponit.

Cadmia utraq; siccat, sed quæ botryitis quasi acinosa appellatur, \* crassioris est substantiæ, placitis autē dicta, tenuioris. Cæterū cōcremata cadmia sine morfu desiccatur, abstergit, cōcaua ulcera explet, oculisq; & tori corpori utiliter adhibet: at humida maxime ulcera in corporibus molliusculis, eiusmodi cadmia sanat, in durioribus efficacium magis usus est.

CACALIA.

Cacalia uiribus & usu cum cancano conuenit.

CALAMAGROSTIS, GRAMEN ARVNDINACEVM.

Calamagrostis siccat, hinc succus decoctumq; radicū ipsius oculariis miscetur medicinis, semen urinam cit, & stomacho benefacit.

CALAMINTHA, NEPITA.

Nepita tertio ordine calida & sicca tēperamento est, tenuis acrisq; , menta longe ualentior, siquidē est ueluti syluestris menta: facile igit quæ alte harent ad se trahit, sudores mouet, totū corpus digerit, ac rigores febriū qui circuitu remeant, finit, extrinsecus cum oleo infricata strenue. quinetiam coxarum dolores soluit, & uitiosos humores in cutē erūpentes abstergit.

CALAMVS.

Calamus odoratus in secundo ordine calefacit & siccat, inest ei quippiam & subtile & astringens, urinam itaque citat, & stomachicis, tum quæ utero & iocinori faciunt medicinis temperatur. Calamus autem phragmites extergit, folia ipsius uiridia mediocriter refrigerant, cortex crematus calefacit siccataq; in tertio abscessu: radicem cum bulbis illitam spicula & aculeos extrahere asserunt.

CAMPÆ, ERVCAE OLERVM.

Erucae olerum cum oleo inunctæ, tutos à uirulentorum animalium moribus conseruare dicuntur.

CANTHARIDES.

Cantharides quæ in tritico reperiuntur luteis trāsuerſim cingulis inuolutæ, aceti serueſcētis uapote suffocata, ad plurima utiles redduntur, quippe ungues scabros cum cerato eiiciunt, clauis scabiosisq; affectibus opitulatur, iam uero & exedentē urentemq; uim habent: nonnulli uero etiam medi-

camentis utinā prouocātibus momentū ex ipsis admistū exhibuerūt.

## CANNABIS.

Cannabis semen flatus discutit, itaq; siccatur ut & geniturā exarefaciat, succus ipsius uiridis ad auriū dolores ex obstructione creatos efficax est.

## CANOPON.

Canopon sambuci flos est, de quo prius dictum est.

## CAPNION, SECVNDVM ALIOS CAPNOS, FVMARIA.

Fumaria inde nomen sortita est quòd succus ipsius copiosas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem: acris amaraq; est, unde urinas biliofas liberaliter prouocat, iocinoris obstructioni languoriq; medetur, stomachum confirmat & aluum emollit.

## CAPPARIS.

Capparis radix extergit, probe purgat, incidit, discutitq; tum amaritudine, tum acrimonia: at acerbitate contrahit, stringit & densat, qua propter  
 15 lienes induratos & pota & extrinsecus imposita, iuuat, menſeis promouet, pituitam per os educit, maligna ulcera sanat, dētiū dolores sopit, tumores digerit, & uirilignes, quas alphas dicunt, auriū uermes enecat: folia autem & fructus similem quidem, sed imbecilliorē uim possident.

## CARDAMVM, NASTVRTIVM.

20 Nasturtii semen sinapis modo utit, unde etiam illitum cutem exasperat: ceterum crassos humores, cum aliis potum incidit, herba uero arida uiribus responderet, humida moderatior, ideoq; crudam ipsam assumunt.

## CARDAMOMVM.

Cardamomum acre quidem & ipsum est, uerum nasturtio inualidius: cō  
 25 pos est etiam nonnullius amaritudinis, qua lumbricos interemit, & scabiem cum aceto exterit.

## CARIS.

Caris in pollinem detrита & cum radice bryoniæ pota, lumbricos occidit.

## CANCRI.

30 Cancrorum concrematorum cinis, fluuiatilium sane siccatur, erina ceorū & cochlearum modo, at totius substātiæ proprietate, canis rabidi morſibus potu mirabiliter efficax est: marinorū cinis eximia donatus siccitate his quidem non conuenit, sed iis qui magis siccari desiderant, proficit. fluuiatilis cancer tritus si illinatur, spicula & aculeos eiicit.

## CAROS.

35 Cari semen & siccatur & calefacit in tectio ferè gradu, flatus digerit, urinam mouet, idq; non semen duntaxat, sed etiam tota planta.

## CARPESIVM.

Carpesium odoratū est & tenue, uiscera obstructionibus liberat, urinas  
 40 mouet, & renes calculo laborantes purgat.

## CARYA, NVCES.

fertimq; demortuas siccat & à putredine asserit, pediculos, pulices, ascari-  
das, & aurium uermis interficit, aliaq; plura facit.

## CENTAURIUM.

Centaurii maioris radix acris, calida, & terreæ astrictionis compos est. mē  
5 leis itaq; promouet, fœtus corrumpit, mortuos eicit, uulnera glutinat, san-  
guinem spuentibus, & reliquis pectoris uitis præfens est remedium. Mi-  
noris centaurii radix inefficax est, coliculi ualidè & citra morsum \* siccant,  
unde non solum ad quæ maius centaurium ualet, sed etiam coxendice la-  
borantibus, ipsius decoctum inferius iniectum, biliosa uacuat, nonnunq;  
10 & cruenta, quum plus proficit.

## CERAS, CORNU.

Cornu caprillum hircinumq; concrematum denteis nitidos reddit, gin-  
giuas humectis compescit. Cerui cornu cum uino maceratum tritumq;  
deinde circumlitum mobileis sistit denteis, crematū: mox lotum, intesti-  
15 norum torminibus cœliacis, sanguinem expuentibus, & felle suffusis, duo-  
rum cochleariū instar auxiliatur: miscetur etiam oculariis medicinis. Tau-  
rinum cornu cum aqua potum, sanguinis eruptiones cohibet.

## CERASIA.

Cerasia dulcia quidem citius dilabuntur, austera stomacho utiliora sunt,  
20 acida uerò, ob incidendi uim quā habēt pituitosis excrementosisq; stoma-  
chis profunt, gummi uero cerasi arboris fauceis exasperatas leuigat, & cal-  
culo laborantibus cum uino potum succurrit.

## CERATONIA ARBOR.

Ceratonie fructus quæ ceratia dicuntur, siccandi & \* refrigerandi uirtutis,  
25 nonnullius etiam dulcedinis particeps est.

## CEPHALE CAPITA.

Menarum falsarum capita cremata, uim siccandi non admodū a crem ac-  
quirunt, hinc sedis rimas & guttur diu induratū sanant. Smatidis caput to-  
tum combustū ad pilorū defluuia cū adipe ursino proficit. Idem præstat  
30 etiā muris caput crematū cum melle. Milui aridū sine plumis, modo qui  
tribus digitis cōprehendiqueat, cū aqua potū ani dolores finit. Lacerte ue-  
rò caput aculeos educere tradūt, myrmecias, uerrucas, & clauos exterere.

## CECIS, GALLA.

Galla omphacitis, id est, immatura medicamentum est affatim astringēs,  
35 eamq; ob causam siccat, fluxiones repellit contrahitq;, laxa stringit, & par-  
tes imbecillas firmat, fluidisq; omnibus affectionibus accommodata est:  
ponitur autem in tertio siccantium ordine, secundo refrigerantium. Alte-  
ra quæ flauo colore inanis magnaq; est, non tantam in siccando & astring-  
endo habet efficaciam, sedis inflammationes & procidentias excocta iu-  
40 uat: gallæ uerò combustæ & aceto restinctæ, sanguini supprimendo sunt.

## CEPÆA.

Cep̃a portulacę similis est, folia ipsius contra uesicę scabies utiliter bibũtur, radix cum asparago, quem myacanthinum appellant, pota, urinę stillicidia, quę oppleto urinario meatu fiunt, abigit.

## CERA.

Cera quum temperata sit, reliquorum medicamentorum materia efficietur, ipsa uerò per se ex iis est, quę leuiter abstergunt, nam & digerentem & calidam uim exiguam obtinet.

## CERICES, BVCCINA.

Buccinorum testa concremata excellenter desiccatur citra rosonē, unde ulceribus maleficiis acōmodatur, at in iis quę putredinē experiuntur, cum aceto, aut uino, aut oxymelite ipsis utendum est, oleum in quo ueluti caro ipforum adhuc uiuentiũ excocta sit, aurĩũ dolores si instilletur, discutit.

## CICI, RICINVM.

Ricini fructus quemadmodum purgat, abstergit, digerit, sic etiam foliũ, sed imbecillius: de oleo tractatum est.

## CINNABARIS.

Cinnabaris acris mediocriter uires habet, item non nihil astringentes.

## CINNAMOMVM.

Cinnamomi uis est summē tenuis, nō item æque calida, sed tertii ordinis, nihil autem ex iis quę parem ipsi calorē referunt adeo siccatur, propter substantię tenuitatem. Cinnamom̃is autem ueluti inualidum quoddam cinnamomum est, quod nonnulli pseudocinnamomum uocant.

## CIRCAEA.

Circę radix calida est & odorata, quę cum uino pota fœminarum locos purgat: semen in sorbitione sumptum lac generat.

## CISSERIS, PVMEX.

Pumex absterforius est præsertim dentium, nō modo uiribus, sed etiã scabritię, coniiicitur autem in medicamenta quę carni ulceribus inducendę sunt, item in ea quę cutis labes exterunt. Crematus tenuior quidem sed mordax redditur: lotus, id quod morder, deponit.

## CISTOS.

Cistos aut cissaros frutex est astringens & modice frigidus uirtute, folia ipsius & germina adeo siccant, ut etiam uulnera conglutinēt: at flores quũ in secundo fere gradu sicciores sint, intestinorum torminibus, aliisq; fluidis uitiiis accommodati sunt: extrinsecus illiti, putrida ulcera compefcit.

## CISSOS, HEDERA.

Hedera contrariis constat uiribus, ut quę astringat & refrigeret. Item acris est & calida, aqueę substantię & tepidę quum uiridis est, particeps: cuius folia uino incocta uulneribus glutinandis, ambustis & lienosis salutariter adhibentur, succus ipforum naribus ad pituitam educendam infunditur, item diuturnis aurium defluxionibus succurrit: lachryma hederę, ut quę



acrior sit pediculos enecat, & pilos abolet.

CITRIVM, QVOD ET MALVM MEDICVM DICITVR.

Citrii medium acidum aut qualitatis expers est, in quo semen tertii refrigerantium siccantiumq; ordinis habetur, cortex siccatur in secundo quidem abscessu, sed non item refrigeratur, acri uirtute præditus: caro ipsius crassi succi est, pituitæ generandæ apta, & frigida: semen digerit, & in secundo ordine desiccatur, folia arboris siccandi discutiendiq; uim repræsentant.

CICHORIVM, INTYBUS SYVESTRIS.

Cichotium picris uel tanq; syluatica seris est, refrigerans siccāsque in primo abscessu: habet etiā uim astringendi, quæ ad hepaticas dysenterias cōuenit.

CLEMATIS.

Clematis quibusdā daphnoides, aliis myrsinoides, nonnullis polygonoides, farmēta habet oblōga, crassitudine iunci quæ holoschœnū dicitur, foliū uel rō lauri, siccādi uirtute pollet, quæ alui fluores, quæ diarrhiā dicunt, intestinum tormina, & dentiū dolores finit: cōtra uenenatorū morsus recte imponitur.

CLEMATIS ALTERA.

Clematis altera arboribus similis hederæ modo circumuoluitur, acri & caustica facultate donata, huius fructus cum aqua potus, pituitam & bilē per inferiora educit, folia autem ad lepras arcendas illinuntur.

CLINOPODION.

Clinopodii uis est calida siccāque: nodū uero adurēs, sed tertii ferè ordinis.

CNECVS.

Cneci semine ad purgandam aluum duntaxat utimur, si quis extrinsecus eo utatur, tertii siccantium ordinis erit.

CONCHYLIA.

Conchilia buccinis facultate proxima sunt.

COELIA, VENTER.

Veter mergi, aut recēs coctus, aut inarefactus, esu stomacho utilis esse dicitur: similiter etiam gallinarum interior alui membra sicca potui data: uerum Galenus experimento falsum utrunq; se inuenisse scribit. Palūbi uero auis uentrem paulatim potum calculos per urinā elicere, testis est Dioscorides. Mustelæ aluus pota contra quælibet uenenata amuletū dicitur.

COCCOS CNIDIQS, GRANVM GNIDIVM.

Granū gnidiū fructus est thymelææ, non chamelææ, ut quidā opinati sunt, acri & adurēte facultate præditus, purgat aut per aluum cum aqua potus.

COCCOS BAPHICOS, GRANVM TINCTORIVM.

Granum tinctorium leniter siccatur, unde magnis uulnibus, & neruorum itidem cum aceto aut oxymelite læuigatum, commode imponitur.

COCCYMELAEA, PRVNVS.

Pruni fructus uentrem subducit, recens magis, aridus minus: decocto ipsius faucium & gutturis inflammationes utiliter colluuntur. Gummi quod

ex arbore destillat, incidendi uim extenuandiq; testatur, ob quod nonnulli frangendis uesciq; calculis esse cum uino potum affitmant: ex aceto, puerorum impetigines perfanate. Syluestrium prunorum bacce euidenter astringunt, uentremq; reprimūt. Nominatur hæc planta in Asia prumnū, domestica uero pruna apparent, quæ Damascena appellatur, quemadmodum Galenus memoriæ mandauit.

## COLLA, GLVTINVM.

Gluten quod ex simila & polline cōficitur, emplasticam uim & concoctricem repræsentat.

## COLOCYNTHA, CVCVRBITA.

Cucurbita humidi frigidiq; in secundo abcessu temperamēti est, unde tota si imponatur, calidas refrigerat inflammationes.

## COLOCYNTHIS, CVCVRBITA SYLVESTRIS.

Cucurbita syluestris ualidam purgandi uim obtinet: uiridis ipsius succus infricatus, coxendicum doloribus auxiliatur.

## COMAROS, ARBVTVS.

Arbutus & arbor & fructus acerbæ qualitatē est, uocant eum memycælon: cæterum stomacho aduersatur, & capitis dolorem facit.

## COMMI, GUMMI.

Gummi siccante ui & emplastica pollet, & nimirū asperitatibus medetur

## CONIA, LIXIUIVM.

Lixiuum ueluti cineris lotium nominatur, omnium maximè absterforium & siccans est, quod ex fici & tithymalli cinete præparatur, ac fere iam exedens: quod si calx etiam cineri addatur, lixiuiū redditur adurens: quod iam protoſtaſton, quasi dicas, quod primum destillauerit, nuncupāt, eluentibus potissimum medicinis accommodatur. Antecellit autem omnibus uehementia, quod ex sola calce conficitur.

## CONYSA, CVNILA.

Cunila utraq; siccatur & calefacit in tertio ordine, hinc etiam oleum in quo decoquitur rigores febrium circuitu remeantes discutit: flores idem præstant, quorum decoctū menseis citat, & fetus extrahit: quæ uero in humidis regionibus nascitur, odore grauior & inefficacior est.

## COPROS, STERCVS.

Stercus quodlibet calefacit, maxime siccatur & digerit: uariat autem pro animantis quod ipsum reddit temperamento, & uictus ratione. itaq; canum quum ossa uorauerint fimus inarefactus, tormina intestinorū cum scisso lacte, quod Græci schiston uocāt, potus, sanat: idem uetusta ulcera reficit, si medicamentis in ea efficacibus misceatur. Hoc angine, tonsillarumq; inflammationes cum melle inunguntur. At infantium qui simpliciter nutriti fuerint stercus huic malo magis prodest. Luporum quod candidius in furcibus reperitur, coli doloribus strenue succurrit, non potum modo,

sed corpori etiam adalligatū: alligetur autem ex lana ouis à lupo enectā,  
 aut pelle ceruina. Caprillum stercus acrius magisq; digerens, scirrosos ru-  
 mores illicitum discutit, præsertim in duris corporibus: crematum uerò ua-  
 lentius abstergit extenuatq; Bubulum extrahendi quandam uim obtiner,  
 5 ideoq; \* uesparum & apium ictibus medetur: quinetiā toti corpori in sole  
 oblitum aquas inter cutem præclare iuuat. Columbarum syluestriū, quas  
 palumbes latini dicunt, aliis longe acrius cum nasturri semine cutē exul-  
 cerat. Auium cohortaliū ex oxymelire, aut aceto, aut mulso potū, uomi-  
 rione strangulantes fungos educit, præsensq; est remediū: hoc quoq; coli-  
 10 co dolore conflēstantibus porui quidam exhibebant. Nonnulli uerò & ci-  
 coniarum simum recta ceruice spirantibus potū auxiliari asserunt. Mu-  
 rium simus reliquis abstergit efficacius, eoq; pilorum defluuia curat, & in-  
 fantium sedi appositus, ad excretionem proritat. Sturnorū qui oryza pasti  
 fuerint, abstergendi exterendiq; uim præ se fert, qua curis asperitates, quas  
 15 ephelidas Græci uocant, exterit. Terrestrium crocodilorum simus uirili-  
 gines, quas alphos dicunt, exergit: quemadmodum \* fluuiatilium, oculo-  
 rum albugines extenuate creditur.

\* Oribasius  
addit cras-  
sionem.

\* Nimirum  
Nili.

## CORALLIVM.

Corallium ueluti arborea planta est in lapidis duritiem coalescens, crescit  
 20 non in terra, sed in alto mari, colore rubrum, lapidi simile, succandi ualidā,  
 astringendi mediocrem uim possidet, ideoq; cruentis sputis, & intestino-  
 rum torminibus utile.

## CORIS ANIMAL, CIMEX.

Cimex acri uirtute pollet. Scribunt igitur quidam cum aceto potum hiru-  
 25 dines eiicere.

## CORIS HERBA.

Coris herba, quam alii uocant hypericon, acris est & odorata, semen eius  
 ad urinam & menses ciendos bibitur: succutrit & phalangiorū moribus,  
 item ad opisthotonon cum oleo inungitur.

## CORIANVM SEV CORIVM, CORIANDRVM.

Coriandrum ex contrariis uiribus compositum est, tenuis substantię, ter-  
 renę, amarę, aquosę aurem humiditatis tepidę parciiceps, habetq; modicā  
 uim astringendi, quapropter inflammationibus, erysipelatis non admo-  
 dum feruentibus conuenit, tumores molliusculos cum quodam in id effi-  
 35 caci discutit. Semen modice quidem cum passo bibitum, lumbricos pellit:  
 liberalius autem sumptum, mentem tentat.

CORYDOS AUT CORYDALLVS, GALERI-  
ta siue alauda.

Alauda auis simplici iure elixa, coli cruciatibus opitulatur: assumi autem  
 40 continue & sæpe cum ipso iure debet.

## CORONOPVS, PES CORNICIS.

Coronopodis radix & ipsa ad colicos cruciatus ꝑficere māducata credit.  
COSTVS.

Costus modicum quidem amaritudinis, plurimum uerò acris & calidæ qualitatis habet, unde in quibus uel calefacere particulam quampiam cogites, uel ex alto in summa humorem aliquem elicere, ad costum confugium est: urinam igitur & menses ducit, lumbricos enecat. Quum uerò & flatulenti cuiusdam particeps sit, uenetem cum mulso potus stimulat, coxendicum doloribus, resolutis, febrium rigoribus ante accessiões, cum oleo infricatus, conducit.

## COTYLEDON, ACETABVLVM.

Acetabulum refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat: folia ipsius cum radice manducata calculos comminuere, & urinam ciere creduntur.

## COCHLEA.

Cochleæ concrematæ impense siccant, & medio critet calefaciunt, conferrunt intestinorum torminibus, in quibus ulcera nondum computrescunt, si misceantur harum partes quatuor, piperis albi pars una, gallarum partes duæ. At quæ ignem non sunt expertæ, si totæ in pollinem coactæ uentri imponantur, aquam subter cutem exinaniunt, profunt item articulariis doloribus applicatæ, quoad sua sponte deciderint: in uniuersum humorem alte insertum ualide desiccant.

## CRANIA, CORNVS.

Corni arboris fructus acerbus, si edatur ualide uentrem astringit, folia autem & germina acerbitate uehementer siccant, adeò, ut maximis durorum corporum uulneribus glutinandis sint.

## GRAMBE, BRASSICA.

Brassica quæ edendo est siccata, & manducata & à foris imposita, non tamē acrem conspicue uim ostendit, eoq; uulnera glutinat, & dolosa malignaq; ulcera, ac tumores solui contumaces per sanat: habet etiam nonnihil absterforium, quo lepras exterit. Semen ipsius potum lumbricos occidit, præsertim Aegyptiæ: caulium crematorum cinis adurente ui cōstat, cum adipe longis laterum doloribus utilis. Syluestris autem brassica, satiuā in omnibus ualidior est, unde nec intra corpus citra noxam sumitur. Marina, subfalsa leuiterq; amara, aluum soluit.

## CRATAEOGONOS.

Crataegoni herbæ semen & acre gustanti deprehenditur & frigidum, milio simile.

## CRETHMON.

Crethmon falsum est simul & amarum, sed modice, quare & uis ipsius est absterforia & desiccans.

## CRITHE, HORDEVM.

Hordeum refrigerat siccataq; in primo abscessu, uerum nonnihil etiam ex-

tergit: cæterum fabatum lomento siccitate præcellit, minus statulentum est, polenta hordeo multo magis siccatur, pituitosa præter quod largius humectatur, etiam abstergit uehementius.

## CRIMNON.

- 5 Quod in tritici & zæ farina crassius est, crimnon appellatur, ualidius nutriendum quam polenta: ægrius autem conficitur crimnon poltos, seu poltationem, quod Romani pultriculam appellant.

## CRINON, LILIVM.

- Lilii flos temperamento mixtus est, ex tenui substantia, terrestri & nonnulla aquosa temperata: quæ propter oleum quoque ex eo confectum discutienti uiscis, molliendique tepetescit, uulnè inflammationibus accommodatum. Radix ac folia siccat, abstergit, discutitque: medio cratur, quod si uel ambustis conferant: succus ipsorum & netuorum uulneribus cum oxymelle prodest.

## CROCODILION.

- 15 Crocodilli semen & succus calidam, siccam & discutientem uim præ se fert, urinas itaque & menses mouet: radix excreationes è pectore iuuat, item sanguinem per nareis ducit.

## CROCUS.

- 20 Crocus ad secundum calefacientium ordinem, primum siccantium refertur, astringit & concoquit.

## CROMMION, CEPALUM.

- Cepa ex quarto calefacientium ordine habetur, substantiæ crassioris, quam obrem hæmorrhoidas appositum aperit: item abstergit: uirilignes, albos dictas, cum aceto extert, defluos capillos oculus alyonio restituit, succus oculis suffusus aut crassi humoris uitio hebetibus auxiliatur.

## CYAMOS, FABA.

- Faba non multum à medio temperamento recedit, siue refrigerando, siue siccando: cato ipsius nonnulli etiam absterforiæ qualitatibus est, excreationibus è thorace & pulmonibus utilis: quum autem cortex fabæ non nihil quoque astringat, tota ipsa in posca decocta celiacis & dysentericis conducit, illita uero inflammationibus & tumoribus medetur, lac in mammis extinguit.

## CYANOS.

- Cyanos acrem habet uim detrahendi, & discutienti maiorem quam cinna-

## CYCLAMINVS.

- Cyclaminus uarias uires habet: etenim extergit, incidit, aperit, attrahit, & dissipat: succus itaque ipsius hæmorrhoidas sedi admotus aperit, duritias cum aliis discutit: cum melle, suffusus proficit, per nareis putgat, abdomini inunctus aluum subducit, fetus corrumpit: radix autem tota succo quidem est imbecillior, sed & ipsa uehementius adeo est, ut cum mulla instar trium

drachmarum pota, interanea expurget: cæterum cutis uitia exterit. Altera cyclaminus, quam etiam cissanthemon uocant, radice donata inutili, semen habet efficax, ut porum priori similia faciat.

CYMINVM, CVMINVM.

Cuminum in tertio ordine calefacit, urinam mouet, & flatu discutit. 5

CYNOSBATUS, RVBVS CANINVS.

Rubi canini fructus non instrenue astringit: folia id præstât mediocriter. at quod in fructu lanæ speciei præ se fert, ceu arteriæ inimicū cauere debet.

CYPARISSVS, CVPRESSVS.

Cupressi galbuli & turiones siccandi uiribus pollent, nullo calore conspiciendo: quapropter uulneta magna in duris corporibus conglutinant, & in flaccidis putridisq; ulceribus in alto fixas humiditates, citra noxam depascuntur, intestinorumq; ramicibus opitulantur.

CYPERVS, IVNCVS QVADRATVS SEV ANGVLOSVS.

Iūcus quadratus calefacit siccitq; citra morsum, hinc etiā humidiorib' ulceribus cicatricē mirabiliter inducit, ac oris ulcera per sanat: habet & uim quandā incisorīā, qua calculos cōminuit, urinā & menstrua promouet.

CYPROS.

Cypri folia & furculi mixtis constant uiribus, discutiente & astrictoria, tum ea quæ sine offendiculo & morsu siccet: ideoq; decoctum ipsorum am- bustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Item oris eruptiones, quas aphthas uocāt, ipsa arbor commanducata per sanat: item medicinis leni dicatis miscetur.

CYTISVS.

Cytisi folia discutitis leniter, & tepide nature sunt, quæ admodū & malæ. 15

CONIVM, CICVTA.

Cicutæ uires summe refrigeratorias esse, omnibus constat.

CONOS, PINVS.

Pini cortex & folia piceæ uiribus respōdent, sed acriora efficacioraq; sunt: fructus, quē etiā strobilon appellāt, uiridis, amarū quiddā & acre, cū humiditate possidet, quare thoracis affectibus ad facili excreatū accommodatur: esculētus in aqua maceratus ut acrimoniā exuat, tēperatus redditur, rosionis expers, opplens unguine suo obstruensq; ut etiam asperitates leuiget.

QVÆ AB L ORDIVNTVR.

LAGOPVS.

Lagopus sicce facultatis est, qua alui fluores desiccant. 25

LADANON.

Ladanon ex cisthō & cyprio 7 frutice ladone dicto, nascitur, quē capræ pascentes, barbis & feroribus quod pinguius & liquori simile est, ab eo auferunt, idq; collectum ladanon est medicamen præstantissimum, in secundo ferè abcessu calidum, natura tenue, emolliens mediocriter, discutiens

L. Dec. in  
impresso ex  
emplari.

& maturans, eoq; uteri affectionibus peculiariter conuenit: habet præterea nonnullas astringendi uireis, quibus defluos capillos confirmer.

## LATHYRIS.

Lathyrin & ipsam tithymali specie esse dicunt, quod eius succus, illius modo purget, semen autem huius præcipuam purgandi uim habet.

## LAPSANA.

Lapsana māducata stomacho nocet, illita uero nonnihil abstergit discutitq;.

## LAPATHVM, RVMEX.

Rumex mediocriter discurtit: acuta rumex, quæ oxylapathū dicitur, præter id etiam pauxillum repellit: semē autem præsertim oxylapathi, astringens, alui proflua, diarrhœas dicunt, & intestinorum tormina per sanar, folia uero semini e contraria faciunt: hæc etenim comesta aluum mouent, illud porum ipsam comprimit.

## LEMONIVM.

Lemonii fructus austerus cum uino eccliacis, dysentericis, & sanguinem spuentibus datur, item ad fluorem muliebrem acetabuli mensura.

## LICHEN HERBA.

Lichen herba in petris nascens museum repræsentat, uis ei est extendo purgare, mediocriter siccare, & refrigerare: impetigines sanat, inflammationes areet, & ut Dioscoridis uerbis utar, sanguinis eruptiones sistit.

## LICHENES EQUORVM.

Lichenes equorum triti cum aceto, comitialibus, & omnium uenenatorum moribus mederi feruntur.

## LEONTOPETALON.

Leontopetali radix & sicca <sup>L</sup> & calfacientis <sup>]</sup> in tertio ordine facultratis est, nec non discussoria. L. in fl. auctor  
non ex Gado  
leno.

## LEPIDION.

Lepidion, quam & hiberiada uocant ex tertio calefacientium gradu est, nasturtio proximum uiribus, minus autem eo desiccatur.

<sup>30</sup> LEPIS, SQUAMA.

Squama omnis ualide siccat, astringit, nec ignauiter mordet. Sed æris amplius siccat, extenuatq;: cui nonnihil æruginis adest, magisq;: ea quæ ex Cypridis clauis raditur, quam propterea etiam helitum quasi claualem appellant. Ar ferri squama liberalius astringit, atq; hæc magis stomomatis, quæ propter ad contumacia maligna uel ulcera præstantior est, sed æris, carnem magis purgat & consumit.

## LEVCACANTHV M.

Leucacanthi, quod alii polygonatum, alii ischiada uocant, radix incidit qui dem, & in tertio ordine siccat, in primo autem calfacit.

<sup>40</sup> LEVCAS.

Leucas calfacit siccatq; in tertio ordine, acrimonia uero præpollat.



## LEVCOION, VIOLA ALBA.

Alba uiola torus frutex abstergendi extenuandiq; uireis possidet, magis autem flores, & ex eis, sicciore: idcirco & mensis stimulat, foetus corrumpunt expelluntq; ac si quis aquae mistura uim ipsorum obrundat, etiam inflammationibus conducent, praesertim uteri: radices eadem praestant, crassiore magisq; terrestri natura praeditae: ex aceto inflammationibus in scirrum coalescentibus imponuntur.

## LEVCE, POPVLVS ALBA.

Popul\* alba aquosa, tepida, terrestriq; constat substantia, uirib\* abstergentis, LIBANOTIDES.

Libanotides tres numerantur, una sterilis, duae fructum ferentes, uires illis extergendi, incidendi, discutiendi: & emolliendi, succus earum oculis ex humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur: coronariae uero libanotidis decoctae ius, regio morbo laborantibus recte bibitur.

## LIBANOTOS, LACHRYMA THVRIS.

Lachryma thuris in secundo ordine calefacit, in primo siccatur, habet & modicam quandam uim leuiter astringentem: cortex ipsius manifesto astringit, siccaturq; in secundo abscessu absolute, crassior thure & minus acris, hinc sanguinem spuentibus, dysentericis, coeliacis, & stomachicis, cum foris impositus, cum intro assumptus, salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccaturq; tertio in abscessu, atque nonnihil extergit: quocirca oculos, ulcera, & purgat & explet.

## LIGNYS, FVLIGO.

Fuligo specierum quarundam concrementarum, nepe lachrymae thuris, myrrhae, terebinthi, styracis, picis liquidae, cedri, ueluti puluis quidam est, qui Graecis zethale dicitur, cum fumo ascendens. obtinet quidem siccitatem & terrestrem renuemq; substantiam. particulae autem ipsius differentiae iuxta materiae combustae rationem fiunt. Vtuntur ea potissimum in medicinis oculariis, & ad honestandas palpebras accommodatis. at thuris fuligo omnibus est utilior, ut quae mitior: contra piceae, pini, & tede ualentior est, quo fit ut ad glabrescentes palpebras aliis subnascentibus, distillantibus & erosos oculorum angulos, illachrymantesq; recte adhibeatur.

## LIGYSTICVM, LIGVSTICVM.

Ligustici & radix & semen adeo calefaciunt ut mensis citent, flatuq; probe discutiant.

## LITHARGYROS, ARGENTI SPVMA.

Argenti spuma medii inter metallica ordinis est, eoque ceu materiae ipsa aliis medicinis mista subinde utimur, siccatur tamen mediocriter, abstergit & astringit: inde femorum attritus per sanat.

## LITHI, LAPIDES.

Lapides omnes terrae modo desiccant, sed haematites astringit & adundè

siccatur, quare etiam oculorum asperitates exterit, quum quidem inflammatione carent, ex aqua: quum uero illa tentantur, ex ouo: ceterum ad sputa cruenta bibitur utiliter, ulcera supercrescentia compescit. Schistos lapis superior quidem consimilis est, sed imbecillior, mox galactites, id est, lactarius sequitur. Melitites cuiusdam etiam caloris copos est. Morochthus, quem alii a candore lactis, leucographida uocant, quo praedictis omnibus mitior est (nullas enim habet uireis efficaciores) eo moderatior, magisque dolorem lenit, eamque ob causam in teneris corporibus cum cerato ad cicatricem ulceribus obducendam eo utuntur. Ialpis qui subuiri colore est quum efficacior sit, oculorum cicatrices & pterygia extenuat: uiridis autem Ialpis adalligatus & in anulo gestatus cibum in stomacho non contentibus confert. Iudaicus dictus renum calculos conterit, unde etiam recentiores tecolithon appellant. Pyrites ualide discutit rumores, sanguinemque in grumos concretum: cuius quum facultas non est, molari utuntur. Phrygius praeter quod ualenter desiccatur, nonnihil etiam astringit rodique, unde & repellere & digerere potest, eoque oculariis miscetur remediis. Ageratus astringendi discutiendique uirtutis compos, gutturis inflammationem curat. Asiae petrae flos tam subtilem naturam habet, ut humentes & flaccidas carnes citra rosionem absumat. Gagates affatim siccas inflationibus praesertim diuturnis expedit. Magnes, quem & Heraclium lapidem uocant, aequales hamatiti uireis representat. Arabicus ebori similis, siccadum repurgandique uireis habet. Alabastrum combusti cinerem stomachicis nonnulli bibendum exhibent. Smyris extergit, dentifriciis accommodatus. Qui in spongiis inueniuntur lapilli, renum calculos frangunt. Similes his uireis habent qui in Argæo Cappadociae monte nascuntur. Similiter & ophites dictus, qui adalligatus contra uiperarum morsus confert. Ostacires, hoc est, crustaceus, & geodes a terra quam intra se complectitur appellatus, abunde siccare feruntur, ideoque inflammatis tumoribus mederi. Naxiae cotis detrimentum uirginum mammis & puerorum testiculis utile est, ne nimium crescant. Quod uero ex olearia cote detritum fuerit, absterforia ui donatum alopecias explet. Hieracitin & Indicum lapidem alligatum contra hemorrhoidas ualere perhibent. Sapphyrus potus, scorpionum ictibus aduersatur. Aphroselenes, comitialibus potui datur. Armeniacus, inferiorem uentrem purgat, sed stomacho nocet.

## LITHOSPERMON.

Lithospermon, quod alii diosporon, alii heraclion uocant, herbae aetonychi dictae semen est lapideum, album, quod cum uino albo potum calculos frangit, & urinas eiicit.

## LINOSPERMON, LINI SEMEN.

Lini semen ex primo gradu calidum est, inter humectantia siccantiaque medium, māducatum flatibus creandis est, uel si frictum fuerit.

## LINOZOSTIS, HERBA MERCVRIALIS.

¶ Hæc in  
Græco ex  
pluri superi  
ori medica  
mento per  
peram ascri  
pta erant.

Herba Mercurialis a luum liberaliter subducit, illita discutit. ¶ Sciēdumq; est eius semen infricarum corporis excrescentias præter naturā, quas uul-  
gus uocat naphia, abolere, sicut experientia comprobatum est. Sed uir-  
de semen esse oportet, & frequenter ipsum tuberculis illis infricare. 7

## LITRVM, NITRVM.

Litrum medium inter aphronitrum & salem uirtute est, crematū magis  
extenuat discutitq; & si intro sumatur, crassos uiscososq; humores plus cę-  
teris incidit & extenuat. Chala streum uero (est autē Chalastra Thessaliez  
locus) acrius siccantiusq; est, quare ad capitis destillationes & articulares 10  
cruciatu eo utuntur.

## LONCHITIS.

Lonchitidis, cui semen triangulum est lanceę simile, radix dauco equalis,  
urinam mouet: eius uero quę scolopendrio respondet, folia uiridia uulne-  
ra glutinant, sicca uero cum a ceto pota lienibus induratis medentur. 15

## LYCOPSIS.

Lycopsis radix quum sit astrictoria, cum polenta illita sacris ignibus au-  
thore Dioscoride conuenit: si lęuis cum oleo inungatur, sudores elicit.

## LYCIVM.

Lycium ex diuersis genere substantiis constat, calida, tenui & discutiente, 20  
terrestri ucto frigida & leuiter astringente, ut in secundo abscessu deficeret,  
calefaciēdo refrigerandoq; mediū est, hæc de causa ceu absterforio in ocu-  
lis obscuratis eo urūtur: tanquam astringenti, in cœliacis, torminibus in-  
testinorum, & maleficis ulceribus: at contra inflammationes, ut discutien-  
ti: cæterum primas obtinet Indicum. 25

## LYSIMACHIVM.

Lysimachium uim habet excellēter astrictoriam, qua & uulnera glutinat  
& sanguinem compescit, tum ipsum, tum ipsius succus, intestinorum tor-  
mina & potum & ab inferioribus partibus iniectum sanat.

## LYCHNIS.

Lychnidos coronarię semen calidum est & siccum in secundo abscessu,  
eoq; absoluto. 30

## LOTVS HERBA.

Lotus domestica, quam nonnulli triphyllon appellant, absterforias uireis  
obtinet & modice siccanteis, calore temperata est. At syluestris loti semen 35  
ad secundum calefaciennium ordinem refertur, habet autem nonnihil eti-  
am absterforium. Aegyptię semen in panes quoq; effingitur.

## LOTVS ARBOR.

Lotus arbor extenuat, siccatur & mediocriter astringit, qua de causa ad flu-  
xum muliebre, alui fluores pota cum uino aut aqua, aut etiam in aluum 40  
data, salutaris est, pilos defluos confirmat.

## QVAE AB M AVSPICANTVR.

## MACER.

Macer cortex est qui ex India importatur, tertio ordine siccatur, inter calorem & frigiditatem mediū obtinet: est etiam astringens tenuisq; unde coeliaci & intestinorum torminibus auxiliarius habetur.

## MALOBATHRON.

Malobathri folium æquales spicæ nardi uireis repræsentat.

## MALACHE, MALVA.

Malua sylvestris mediocriter discutit & emollit: hortensis autē, ceu humidior etiā imbecillior est: semen tanto uiribus præstat, quanto & siccus est.

## MAMIRAS.

Mamiras ueluti radícula herbæ cuiusdam est ceu geniculis frequentibus nodosis, quæ cicatrices & albugines extenuare creditur, ex terendi nimirū facultate prædita.

## MANDRAGORAS, MAMDRAGORA.

Mandragora tertii refrigerantium ordinis est: mala ipsius caliditatem quampiam & humiditatem refertunt, unde soporem grauem homini possunt accersire: at radice cortex uehementissimus, non refrigerat modo sed etiam siccatur. \* interior eius pars imbecillior est.

## MANNA THVRIS.

Māna thuris simileis thuri uiteis haber, sed remissas & sensim astringētes.

## MARATHRON, FOENICVLVM.

Fœniculum calefacit in tertio ordine, in primo siccatur. hinc etiam lacti generando est, & suffusus auxiliatur.

## MASTICHE.

Mastiche, Chia quidem calefacit siccaturq; in primo abscessū, ceterum compositæ est facultatis, astrictoriæ simul & emollientis: hanc ob rationem stomachi, uentris, intestinorum & iocinoris inflammationibus recte accommodatur. Aegyptia, nigriore colore quodammodo, siccatur magis & discutit, minus astringit, hinc furunculos quoq; dissipat.

## MELAN, ATRAMENTVM. INDICVM.

Atramentum Indicum auctore Dioscoride in genere leniter \* astringentium est, quæ inflammationes laxosq; tumores, ædemata uocant, rūpunt, ulceraq; purgant.

## MELANTERIA, CRETA SVTORIA.

Creta sutoria impense astringit extenuatq;.

## MELAN, ATRAMENTVM SCRIPTORIVM.

Atramentum quo scribimus abunde & ipsum desiccatur, solutum uero posca ambustis si illinatur, præsentis est remedio.

## MELANTHION, NIGELLA.

Nigella in tertio ordine calefacit & desiccatur, est etiā tenui natura prædita,

\* Græce haec  
bebat. v. 3.  
K. A. p. v. d. u.  
v. d. e. s. t. a.  
b. o. r. i. p. s. i. u. m.  
p. v. i. d. e. t. u. r.  
s. i. c. e. n. i. m.  
G. a. l. l. e. n. u. s.  
e. t. O. r. i.  
h. a. s. i. n. i. s. h. a. b. e. t.

\* Imprimis  
exemplar  
f. 2. 1. 1. 1. 1.  
uerum o. c. t.  
Dioscoridis  
codices v. o.  
q. u. i. n. i. u. m. h. a.  
b. e. n. t. e.

unde de stillationibus in narcis, olfactu prodest, intus assumpta discutiendis flatibus singularis est: quinetiam amari particeps deprehenditur, quolūbricos interficit: abstergit & incidit, hinc quoque recta ceruice spirantibus cōmode exhibetur, itē lepras extertit, myrmecias eiicit, & menstrua incitat.

## MELI, MEL.

Mel calfacit & siccatur ordine secūdo, abstergitque insigniter: coctum minus quidem acre redditur, deterforium, & uentri subducendo accommodatū, uerum magis nutrit. Amarū mel, sicut & id quod in Sardinia fir, mistas habet uireis, terrestrem & calidam. At mel sachar quod ex felici Arabia cōuehitur, minus dulce nostrum est, sed zqualeis uireis obtinet, prāter quod nec stomacho noceat, nec sirim faciat, quemadmodum hoc nostras.

## MELIA, FRAXINVS.

Fraxinus nota arbor est, folia eius pota uiperarum morsibus succurrunt: cortex crematur, illitusque ex aqua lepras separat, ligni uerō ramenta si bibantur, lethalia esse ferunt.

## MELILOTOS, SERTVLA CAMPANA.

Sertula campana diuersis facultatibus pollet: astringendi, discutiendi & concoquendi.

## MELISSOPHYLLON, APIASTRVM.

Apiastrum uiribus marrubio per omnia respondet.

## MEMAECYLOS.

*Memecylos est in greco uia, hoc est corni, pro melle, quod est arbori.*

Memæcylos \* attributi fructus, in litera C comprehensus est.

## MESPIA.

Mespila, alii tricocca quasi trigrania uocant, fructus est affatim acerbus, & uix esculentus, aluum que continens: germina folia que mespili impense acerba sunt.

## MEDION.

Medii radix uireis semini cōtrarias prae se fert, quippe austera est & fluxiones comprimit, ideoque muliebrem fluxum sistit: semen quum tenuis inciditque sit facultatis, mensēis quoque proritat.

## MECON, PAPAVER.

Papauer multiplex est: hortensis quidem, quod etiam thylacitin ceu utricularium uocant, semen est esculentum, si cum pane assumatur, mediocriter somnum concilians. At rhœas appellatum, inde quod semen ipsius ce leriter defluat, ualidius ipsum hortensē est: māducatur itaque non per se, sed momentum copiosiori melli mixtum. Quod ueluti decidenti, ac depresso calyce est, nigrum semen habet & medicatū, nimisque frigidū. Quod prolixiore & prociore constat calyce, medicatius uniuersis est, quapropter stuporem inducit quousque interimat. Nam & ipsum & eius lachryma, quā per excellentiam opion nuncupant, quarto refrigeratium abscessui ascribuntur. Cornutum papauer astringendi uireis sortitur, ideoque radicis ipsi

us decoctum potu iocinorosis auxiliatur: folia autē & flores perquam sordida ulcera expurgant, crustasq; tollunt. Heraclion & aphrodes id est spumofum papauer dictum, semen habet pituita purgandæ accommodatū.

MELA, MALA.

- 5 Malis omnibus frigida & excrementicia inest humiditas: & quæ in eorum censu tenera & aquosa sunt, frigiditate cæteris & humiditate præstant: dulcia, aquosa quidē, non tamē manifestē frigida sunt: austera dulcibus quidē frigidiora, sed minus humida: acida frigida quidē & ipsa, uerum incidendi humores uētriculo inhærentes uim testant: acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido & terrestri donata tēperamēto uentrē supprimunt, uulnera glutinā pati modo folia, succi, & cortices arborū inter se differūt.

MELEA, MALVS PERSICA.

- Mali Persicæ furculi & folia euidenter amara sunt, eoq; concisa tritaq; umbilico imposita, lumbricos enecant: fructus autem ipsius, nempe Persicū: 15 hoc esculentum, in secundo ordine frigidum humidumq; existit.

MELEA, MALVS ARMENIACA.

Mali armeniæ fructus, quæ nunc uocāt malā præcocia, consimiles Persicis uireis refert.

MEON.

- Mei radices in tertio ordine calefaciunt, in secundo siccāt, ideoq; urinam 20 & mensis cient: liberalius meon assumptum, capitis facit dolores.

MILAX.

Milax tā leuis q̄ aspera, arbores amplexa, calidā acrēq; facultatē possidet.

MISY.

- Misy medicamentū est ex iis quæ crustā faciūt & adurūt, ualētēq; astrin- 25 gunt, minus autem q̄ chalcitis erodit, quoniā tenuius ea est: cæterū chalcitis & fori uetustate in misy mutant, a superficie incipiēte statim mutatiōe.

MOLYBDAENA, PLUMBAGO.

Plumbago argenti spumæ uireis habet, a medio temperamento ad frigidus digressa.

- 30 MOLYBDOS, PLUMBVM.

Plumbum refrigeratoriæ uirtutis est, habet & humidæ substantiæ plurimū, quod ex frigore coaluerit. Trito igitur in eo aut uino, aut immaturo oleo, aut quodam succo refrigerāte, ad naturalium & sedis ulcerosas inflammationes excellentissimum erit remedium: lamina uerō plumbea super lum 35 bos gestata, ueneris insomnia cohibet. Item bractea tenuis ganglio imposita, ipsum dissipat. Concrematū plumbum ualidius quidem siccāt, sed & acrimoniæ non nihil obtinet: si eluatur, tum sine rosione siccāt, tum maleficis ulceribus præsentaneum est remedium.

MORAEA, MORVS.

- 40 Mori fructus maturus quidē aluū subducit & medicamentis stomachicis alijsq; moderatā requirunt astrictiōē utiliter miscetur, immaturus ubi

\* Græcē est  
μολυβδαῖος  
pro μολυβδαῖος  
nō in fructu  
tūm ex Gæ  
leno.

exaruetit, perq̄ obstruens fit medicamentum: cortex autem radice arboris etiam amaritudinis cuiusdam particeps, purgare potest, eoq̄ latos lūbricos occidit: foliorum autem surculorumq̄ uis, subducentium & comprimantium media quodammodo existit.

## MYAGROS.

Myagri semen pingue est. quod in eo oleosum habetur, opplendi uireis representat.

## MYACES, MYTVLI.

Myruli combusti, eundem cum buccinis effectum præstant, propriè uerò eloti palpebrarum asperitatem & albugines cum melle exterrunt, caro ipsorum canum moribus utiliter imponitur.

## MYARON.

Myaron, quā alij melampycon appellant, herba ferulacea est & pinguis, uidetur autem ipsius pinguitudo corporis asperitates læuigare.

## MYELOS, MEDVLLA.

Medulla facultatis est quæ indurata ac in scirrū cōcrescētia corpora emollit. Laudatissima est ceruina, mox uitulina: taurina, hircinaq̄ acrior est, magisq̄ siccat, & quæ in artubus cōtinetur, pinguior est magisq̄ emollit: quæ de spina elicitor, durior squalidiorq̄ est.

## MYCETES, FVNGI.

Fungi frigidi & humidum admodum temperamento sunt: nonnulli ipsorum manducati, etiam exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putridæ qualitatis participi.

## MYOSOTE, MVRIS AVRICVLA.

Muris auricula dicta est alfine.

## MYXA.

Myxa arboris fructus est minor quidem prunis, facultate uerò cōsimilis.

## MYRICA, TAMARIX.

Tamarix incidit extergitq̄, ita ut manifeste non siccet, sed a strictione quoq̄ nonnullam obtineat, quæ de causa decoctum ipsius potum lienes adiuvat, item dentium doloribus medetur: fructus autem & cortex ipsius galæ uirtute proximus est: cinis arboris uehementius exiccat.

## MYRIOPHYLLON, MILLEFOLIUM.

Millefolium tantam siccandi uim possidet, ut uulnera conglutinet.

## MYRRHA, VEL MYRRHIS.

Myrrha in secundo ordine calefacit, ac nō nihil etiam extenuat, radix ipsius odorata dulcisq̄ est, mensibus mouendis, & humoribus è thorace & pulmone repurgandis idonea.

## MYRRHINE, SEV MYRSINE, MYRTVS.

Myrtus ex diuersis cōposita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, quæ ualèter siccat: at myrtula trunco & ramis ipsius adnascēs tumida,



maiorē uī in astringendo & siccando scatet, iam uerò & folia aridiora uiribus magis siccant: item fructus succusq; tum foris applicatus, tum intus assumptus, persimileis uireis præ se fert.

## MOLY.

- 3 Moly, quod nonnulli rutam syluestrem, alii armanam dicunt, Syrii besafam, tertio calefacientium ordini annumeratur, substantia tenuē, hinc crassos humores uiscososq; incidit, discutit & urinam promouet.

## QVAE AB N INCIPIVNT.

## NAOCANTHON.

- 10 Naocanthon, sunt qui nacaphrion dicunt, Indicum est odoramentum, quod ad astrictos foeminarum locos suffitu uaporetur.

## NAPY, SINAPI.

Sinapi calefacit siccataq; in quarto abscessu.

## NARDOSTACHIS, SPICA NARDI.

- 15 Spicae nardi radix calfacit in primo, siccata in secundo ordine, particeps est etiam astringentis cuiusdam qualitatis, acris, & subamaræ, iocinori prodest & stomacho, extrinsecus admota & ebibita, urinam mouet & interaneorum fluxiones desiccata: sed Indica ualentior est quam Syriaca, & nigrior.

## NARDVS GALLICA.

- 20 Nardus gallica superiori uireis habet æqualeis, sed imbecilliores, præterq; ad urinam ciendam, calidior enim est quam illa, minusq; astringit.

## NARDVS MONTANA.

Nardus montana, quæ nonnullis thylacitis, pyritisq; dicitur, commemoratis est infirmior.

- 25 NARTEX, FERULA.

Ferulae semen extenuat calfacitq;: medulla ipsius uiridis adhuc, astringit, coq; sanguinem spuentibus & coeliacis accommodata est.

## NARCE, TORPEDO MARINA.

- 30 Torpedo marina uiuens capiti imposita dolores eius arcet, idq; forsan eodem illo torpore quem membris eam contingentibus inducis: oleum in quo uiua decocta fuerit, ad acriores articulorum cruciatus leniendos inūgitur: eadem torpedo anum procidentem coercere apposita fertur.

## NARCISSVS.

- 35 Narcissi radix adeo desiccata, ut maximis uulneribus sit glutinādis, imo etiam tendinum præcisionibus confert, ceterum abstergendi & attrahendi uim quandam habet.

## NEVRAS, SEV POTERION.

Neuras, quod alii poterion uocant, sine rosione desiccata, ut & ipsa nervos præcisos glutinet: radices autem potissimum hunc effectum præstant, &

- 40 imposita, & pota

## NERION, AVT RODODAPHNE.

Nerion extrinsecus illitū uim refert discussoriā: si intus assumat, occidit.  
NYPHAEA.

Nymphæa uireis habet sine rosione siccas, quibus & uentrem reprimat, & genituram arefaciat: uerum alba radice donata ualentior est, eoque fluxum muliebrem cum uino nigro & austero pota persanat: quæ nigrâ refert, detertoria quoque ui nonnulla pollet, eaque uertigines, alphas dictas cum aqua exterit: pilorum defluuia cum pice liquida illita replet.

QVAE AB X ORDINANTVR.

XANTHION, AVT PHASGANION.

Xanthion phasganium uel fructum fert discutiendi uinibus præditum. 10

XIRIS, AVT XYRIS.

Xiris natura tenuis est, discussorie, & extrahentis, ac nimirum siccatorie, præcipue semen, quod & urinam cit & licni induratio medetur.

XIPHION, GLADIOLVS.

Gladioli radix trahit, discutit, & siccatur. 15

QVAE INITIVM HABENT AB O.

OE, SORBUS.

Sorbus arbor cuius fructus oia, à nonnullis dicuntur, astringendi uim obtinet, sed minorem mellepilo.

OTHONNA.

Othonnam, alii herbæ esse succum in Arabia ad Aegyptum nascentis asserunt, alii lapidem Aegyptium: detergit autem eroditque, omniaque claritati oculorum officium, extertens. 20

OENANTHE, LABRVSCAE VITIS FLOS.

Oenanthe sylvestris uiris flos est, usus plurimi, quoniam insigniter astringit, stomachumque & aluum maxime firmat: Dioscorides autem aliam describit œnanthen contrariis donatam uiribus, unde secundas eam euicere, & urinæ stillicidio, morboque regio mederi tradit.

OENOS, VINVM.

Vinum calore & siccitate insita, secundi ordinis est: quod admodum uetus 30 stum est, tertii: Mustum uero primi.

OESYPVS, LANAE PINGVEDO.

Oesypus in sermone de lanis explicata est.

OLYNTI, GROSSI.

Grossi acrem & discussoriam uim obtinent, liquoris gratia qui in ipsis continetur. cocti igitur duros tumores dissipant: crudi myrmecias & thymos exterunt.

OLOSTEVM.

Olostium siccatur astringitque: hinc eo adrupta utuntur.

OMPHACIUM.

Omphacii succus est uix immaturæ, astringens egregie & siccus in tertio 40 abcessu: eoque fluidis affectibus & præsertim stomachicis, accommodatur.

## ONAGRA.

Onagra, quam nonnulli onotheram, alii onothurin dicunt, frutex est arboreus, cuius radix illira, ferocientia ulcera mitigat.

## ONOMA.

- 5 Onoma, uel onomis, uel phlomitis, uel ononis, acrem amaramq; uim obtinet, eamq; ob causam folia eius cū uino pota, scetus occidūt expellūtq;.

## ONOBRYCHIS.

Onobrychis uirarefaciendi & discussoria, tubercula, quæ phymata dicuntur, dissipat, urinæ stillicidio medetur, & sudores prouocat.

- 10 ONI, ASINI SEV MVLTIPEDAE.

Multipedæ quæ in humidis locis agunt, & ractæ in orbem se conduplicant, discutiunt siccantq; potæ cū uino urinæ angustis & arquato medetur, anginæ itidem cū melle iisdē illinuntur. Item detritæ cū rosaceo calfactæq; in mali punici cortice, auribus dolentibus salutariter instillantur.

- 15 ONYCHES, CONCHYLAE INDICAE.

Onyches conchyliorū Indicorū opercula sunt, quæ suffitu strangulatione uuluarum concidentēs scēminas excitāt, item comitiales: potæ aluū turbāt.

## ONONIS.

- Ononis radice cōstat quæ in tertio ferè gradu calefacit, cortex ipsius extergit, & incidit, unde etiam calculos conterit.

## OXOS, ACETVM.

Acetum mixtæ est naturæ frigida & calida, sed utriusque tenuis, frigida tamen calidam excellit, cæterum in tertio ordine siccatur.

## OXYACANTHOS.

- 15 Oxycanthus arbor piro syluestri & figura & uiribus æqualis est, habet & subtile quippiam coniunctum: sed fructus ipsius myrti baccis respōdet.

## \*OPIVM.

- 15 Liquores, & Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus per excellentiam opium dicuntur, calidi naturæ, & perspiratu discutiētes insigniter: uerum Cyrenaicus cæteris est calidiōr tenuiorq;.

## ORIGANVM.

Omnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi uires in tertio abscessu ostendunt.

## OREOSELINVM, APIVM MONTANVM.

- 95 Apium montanum uiribus domestico æquale est, sed imbecillius.

## OROBANCHE.

Orobanche sicco & frigido temperamento est, iuxta primum ordinem.

## OROBOS, ERVVM.

- 40 Eruum calefacit in primo gradu, siccatur in secundo, amarumq; est, quapropter incidit, detergit, obstrueta aperit: liberalius sumptum, sanguinē per urinam expellit.

\*Galenus  
impress<sup>o</sup> ba-  
trixini, Pau-  
lus & Oris-  
sus fecer.

## ORMINON.

Orminon martubio specie simile est, calidum, mediocriter siccū & abstergens, uenerē igitur stimulat, & oculos crassities cum melle repurgat, tumores laxos discutit, & extrahit aculeos. Sylvestre domestico ē ualentius.

## ORYZA.

Oryza uim quandam astrictoriam præ se fert: qua etiam uentrem mediocriter cohibet.

## ORCHIS HERBA.

Orchis herba (nominat autē cynosorchis, id est, testiculus canis) radicem habet bulbosam & duplicē: uis autē maioris, humida & calida, eoq; ueneri incitandæ est: minoris, calida & sicca, contrā igitur uenerem coercet.

## ORCHIS, SERAPIAS.

Orchis, quæ & Serapias dicitur, aliis triorchis, priore ualētius desiccatur, quare laxos tumores dissipat, ulcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inarescētia autem magis siccatur. Quoniam uerō substin- gere idonea est, aluum quoque cum uino pota retinet.

## OSYRIS.

Osyris, ex qua medicamenta ad exterendam leuigandamq; cutem, Græci coremata uocant, fieri solent, amara est, & iccoris laxandi uireis habet.

## OSTA, OSSA.

Ossa concretamenta uehementer discutunt siccantq;: præsertim id facere dicunt humana: atqui suillus talus cōbustus, in flarionibus & circa umbilicū torminibus mederi dicitur. quinetiam ossa cremata si potui quis exhibeat, morbum comitalem & articularios dolores abigūt. Bubulus talus uisus, mobileis firmare denteis prædicatur: cum melle potus, teretes lūbricos e- ducit: cum oxymelite, lienem consumit, & uirilignes, quas uocāt leucas, illius abolēt, item ad uenetem commendatur: femora bouis cremata potu sanguinis eruptiones, & alui fluxum compescunt.

## OSTRACA, TESTAE.

Testæ fornacium tritæ siccant exterguntq;: hinc dentificiis accommodā- tur, illarū cum aceto prurigini, pustulis, quæ appellantur exanthemata, & podagra conferunt: cerato exceptæ, strumas discutunt.

## OSTREA.

Ostreorum testa cremata aequalē buccinis uim, sed minus crassam repræsentat, abstergit igitur faciei labes, & dentibus nitorem conciliat: elota ro- sionem amittit, ad carnem cicatricemq; humidis ulceribus induendam accommodata.

## OVRON, VRINA.

Vrina quælibet calida est & acris, sed humana omnium aliorum animalium, exceptis maialibus, infirmior est. cæterum uehementer abstergit, quapropter nonnulli potionē eius in peste usi, mortē euaserūt: eadē lepras, ulcera

putredinem experta, capitisq; manātia ulcera, quæ uocant achores, & fur-  
fures perfanat. item pedum attritus nondū inflammatiōe occupatos. At  
impubis pueri urina omniū efficacissima est, unde etiam chrysocolle cō-  
ficitur. Molorū articularibus doloribus congruit. Caprarum & charne-  
5 lorum aluum deiicit. ideoq; contra aquam subtercutem bibitur.

## QVÆ A P INCIPIVNT.

## PANCRATION.

Pancration & specie & uiribus scyllæ simile est, uerum imbecillius.

## PALIVRON.

10 Paliuri folia & radix astringunt, eoq; aluum fluentem sistunt, tubercula,  
quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutunt. Semen eius tam ue-  
hemēti incisoria uirtute ualet, ut & calculos cōterat, & excreationibus è pe-  
ctore auxilietur.

## PANACES.

15 Panaces Herculeum est, ex quo opopanax dictus conficitur, in tertio ordi-  
ne calefaciens, in secundo siccans, emolliens, discutiensq; radice cortex li-  
quore imbecillior. habet nonnihil & abstergens, & carni ducendæ idoneū.  
semen ipsius menſeis quoq; citat. A sclepiō panaces & Chironium prio-  
ri calidiora sunt, hinc floribus ipſorū & semine ad malefica ulcera & phy-  
20 mata utuntur.

## PAPYRVS.

Papyrus ignem non experta, materia quædam efficitur: uſta, ſiccatur chartæ  
crematæ modo, uerum papyri cinis uiribus inferior est.

## PARONYCHIA.

25 Paronychis inde nomen accepit, quod digitorum reduiis, quæ dicuntur  
paronychis, medeas. uis eius est extenuare & ſiccare, idq; citra roſionem.

## PENTAPHYLLON, QVINQUEFOLIUM.

Quinquefoliū in tertio ordine deſiccatur, minime acre, eoq; in multos uſus  
accommodatur.

30 PEPLON HERBA.

Peplon nonnulli papauer ſpumeum dicunt: & hic frutex liquorem habet  
& rithymalorum modo purgat.

## PEPLION.

Peplion quoque liquorem habet, & magna ex parte maritimis locis naſci-  
35 tur, cætera quidem inutile, ſemen autem ipſius ſeruidi ſaporis, peplo conſi-  
militer expurgat.

## PEPERI, PIPER.

Piperis radix, coſti uireis reſert: fructus nuper quidem germinantis arbo-  
ris, oblongum eſt piper, humidius natura & calidū: fructus ueluti acerbus  
40 immaturuſq; album eſt piper, nigro acrius, ut quod impendio magis aſſa-  
tum ſit: utrunque uero & calefacit & deſiccatur.

## PEPON.

Pepon abstergendi facultate efficax est, inde ueluti caro ipsius ephelidas & consimilia faciei uertia exteri, semen renes obstructione liberat.

## PERICLYMENON.

\* Grace est  
πικύλη, male pro rē-  
napa sic enim  
habet uerū  
sua trāslatio  
Galeni.  
¶ in impres-  
sione desiderat

Periclymeni folia & semen incidendi simul & calefaciendi uireis obrinēt, s quapropter urinam cruentā excernunt, ad quatuor dies pota: L item genituram uiri siccant, J quadraginta diebus in porione assumpta: lienosos & ægre spirantes adiuuant.

## PERISTEREON, VERBENACA.

Verbenaca adeo desiccet astringitq; ut uulneribus glutinandis, & sanguinis eruptioni sistendæ sit.

## PERSAEA SEV PERSICA.

Persæa arbor est Aegypti, cuius folia & siccant & astringunt, eoq; sanguinis eruptionem compescunt.

## PETASITES.

Petasites tertio siccantium ordini ascribitur, unde ad malefica & phagedenica ulcera eam usurpant.

## PETROSELINON.

Petroselini semen calidū siccumq; est in tertio abscessu, ui incisoria præditum, urinā ciet, mensesq; trahit, flatibus discutiendis accommodatissimū.

## PEUCEDANVM.

Peucedani liquore & succo affatim calefacti, discutiendi, extenuantq; uti mur, tum naribus admoto, tum in porione assumpto, ad pulmonū & pectoris uitia ex humorū crassitudine cōtracta: item ad lienem induratum: dentibus autem perforatis impositus, dolorē protinus sopit, neruorumq; affectibus idoneus est: radix squamas ossium separat, maleficis ulceribus succurrit, in tertio ordine & calefaciens & desiccans.

## PEVCE, TEDA.

Teda arbor piceæ uiribus respondet, sed moderatior est.

## PEGANVM, RVTA.

Ruta syluestris ad quartū calefacientium siccantiumq; ordinē refertur: fatiua ad tertium, cuius uis est crassos lētosq; humores incidere, & dissipare, urinam mouere, attenuare, & flatus discutere, unde & uenerem coercet.

## PISSA, PIX.

Pix arida quidē in secundo abscessu desiccet, minus calefacit: liquida econtrario, imō etiā extergit, maturat, discutit, acrisq; est: eamq; ob causam ungueis scabros educit, imperigines exteri, tumores maturat. Valentior autē est liquida, ut etiam suspiriosis & purulenta excreantibus, linēta subueniat: sed arida uulneribus magis glutinandis est.

## PISSELAEON, OLEVVM PICINVM, SEV PICIS FLOS.

Picinum oleum, ex liquida fit pice: qua natura tenuius est.

## PISTACIA.

Pistaciorum fructus esus stomacho mediocriter conducit, iecur obstructum laxat, præcipue \* summi & odorati eorum operimenti ex uino decoctum, profunt etiam contra serpentium morsus.

\* Græce est  
ασίνιον pro  
ασίνιον. cuius da  
di Dioscori  
di interpret  
te.

## PITYIDES.

5 Pityides fructus sunt picearum, mistæ facultatis, astrictoriæ & acris, quam ob rem reiectionibus è pectore opitulantur.

## PITYOCAMPÆ, PICEARVM ERVCAE.

Picearum erucæ eiusdem sunt uirtutis cum cantharide & buprestis.

## 10 PITYOS PHLOEOS, PICEAE CORTEX.

Piceæ cortex astringendi uim eximiâ possidet, qua intertrigines & ambusta illitus per sanat, uentræ potus reprimat: folia etiâ uulnera cōglutinant.

## PITYVSA.

Pityusam quoque nonnulli tithymalli speciem asserunt, quoniam & liquorem habet, & purgat illi similiter.

## PLATANVS.

Platanus ui humidior & frigidiore pollet, eaq; de causa folia uiridia ad inflammationes nascētes proficiunt: cortex & pilulæ quoniâ maiore siccandi potentiâ habent, in aceto decoctæ dentiū dolores sopiunt, ambusta cū adipe per sanāt. Cortex autē crematus siccatur uehementius & abstergit, eoq; lepras pellit, & humidis ulceribus medetur.

## PNEVMON, PVLMO.

15 Pulmo agninus suillusq; attritus pedum ex calceis curare creditur: uulpinus sale inueteratus si bibatur, suspiriosis proficit: marinus recens detritus podagris & pernionibus commode illinitur.

## POLEMONIVM.

Polemonium, quod aliis phileterion dicitur, tenue est, & siccandi uiribus donatum, inde nonnulli contra coxendicis dolores, intestinorum tormina, lienem induratum, radicem eius cum uino propinant.

## 30 POLIVM.

Poliū minus, quo & in antidotis utimur, tertii calefactum siccantiumq; ordinis est, itaq; omnia uiscera laxat, urinā menscisq; trahit: uiride adhuc, magna glutinat uulnera, aridū maleficis inspersum ulceribus proficit.

## POLYGALON.

35 Polygalon folia habet gustu mediocriter acerba: potum, lac quoq; generare putatur, calidi humidiq; temperamenti compos.

## POLYGONATON.

40 Polygonatum uariæ particeps est facultatis, astrictoriæ, acris, amaræ, & cuiusdam gustu ingrata, quæ uerbis nequeat exprimi: quapropter in mul-  
tiplicis usus haud est accommodatum: radicem ipsius nonnulli ad faciei labes, quas pitilos dicunt Græci, abstergendas illinunt.



Sanguinaria habet sane uim quandam astringēdi, sed humiditas in secundo ordine frigida in ea præpollet: stomachi feruori frigida inspergitur uti liter, sacris ignibus, inflammationibusq; calidis illinitur, ac talis quum sit, fluxiones repellit, atq; hac ratione siccatoria esse putatur: fœmina autem mas uehementior est.

POLYCNEMON.

Polycnemon in secundo ordine calefacit & desiccatur, eoq; uulnera glutinat.

POLYPODION, FILICVLA.

Polypodiū siccatur abūde citra morsum: potū, inferius purgationē molit.

POMPHOLYX.

Pompholyx sine rosione siccatur, ideoq; cancris ulceribus aliisq; maleficis opitulatur, item cum oculariis medicinis miscetur.

PORPHYRAE, PVRPVRAE.

Purpuræ crematæ testis æqualem uim sortitæ sunt, opercula ipsarū cum oleo incocta pilos fluidos cōfirmant, cū aceto pota lienes tumidos sanant: fustitu fœminas locorū strāgulatu concidētes excitant, secūdasq; eiiciūt.

POTAMOGETON.

Potamogeton refrigerat & astringit, sanguinali herbæ consimiliter, iisdē uirtutibus præditum.

POTERION.

Poterii, quod alii phrynion dicunt, radices cōcisæ nervos præfectos & uulnera cōglutinant, decoctū ipsius epotū neruorū affectionibus auxiliatur.

PRASION, MARRVBIVM.

Marrubium in secundo ordine calefacit, amplius autem siccatur, iecur lienemq; laxat, excreationes è thorace & pulmonibus, menseisq; promouet: illitum extergit, discutitq; præcipua exterforia incisoriaq; ui præditum.

PRASON, PORRVN.

Porrum mali succi est & acris. ut autē Dioscorides memoriæ prodidit, grauiam facit insomnia, aluumq; bonā, urinā ciet, & extenuat: habet & abstergerendi uim aliquā, qua pectoris excreationes elicit. cæterū semen eius prisa incoctum nephriticis tēpetatur medicinis: folia etiā nonnihil astringunt, ac eam ob causam succus ipsorum sanguinem supprimit.

PRINOS, ILEX.

Ilex simileis quercui uireis habet, sed multo ea est ualidior.

PROPOLIS.

Propolis calefacit quidem in secundo abscessu, abstergit autem mediocriter, tenuisq; naturæ est, & meatuum apertoriz.

PTARMICE.

Parmicæ folia sternutamenta mouēt, totus aut frutex uiridis sugillata, liuoresq; alios discit, est enim herba calida & sicca, uiridis secundi ordinis, arida terti.

## PTELEA, VLMVS.

Vlmus siccare ualet & abstergere, eoq; uulnera glutinare, cortex autē magis, si recens fascioloq; modo uulneribus circumuoluatur, cum aceto lepras quoq; tollit: radices idem præstant, si ossa fracta quę solidari tophacia cicatrice quam poron dicunt, desiderant, decocti ipsarum iure perfundantur.

## PTERIS, FILIX.

Filix uim siccandi & amaram repræsentat, eaq; fortis corrumpit, latosq; lumbricos enecat, instar quatuor drachmarum cum mulla pota: quoniā uerō modice constringit, ulcera citra rosionem desiccare potest.

## PYCNOCOMON.

Pycnocomon discutiente ui acriq; donatum est, folia igitur panos & furunculos dissipant, semen præterea infixæ corpori extrahit, radix flauam bilem purgat.

## PYRETHRVM.

Pyrethri radix adurentem potestatem occupat, dentium qui frigori patuerunt dolores lenit, item ad febrium rigores ante accessionē infricatur cum oleo, adhuc iis quorū corpora ex perfrictione stupēt, & resoluta sunt, efficacissime adhibetur.

## PYROS, TRITICVM.

Triticum in primo ordine calefacit, uerum siccando humectandoq; medium est, nonnihil etiam glutinosum, & obstruendi efficax obtinet.

## PYTIA, COAGVLVM.

Coagulum omne naturæ acris est, tenuis, discutientis, & nimirum siccantis, sed leporinum comitialis sanare cum aceto potum, literis mandar sit; fluoremq; muliebrem emendat, lac in uentre concretum soluit: similiter etiam tuentas è thorace excreationes cohibere ipsum tradunt: equinum uerō coagulum coeliacis & intestinorum torminibus prodesse: phocæ, castorei uircis præ se ferre.

## QVAE AB R. INCIPIVNT.

## RHACOS, ATTRITAE VESTIS FRAGMENTVM.

Attritarum è lana uestium fragmenta concremata, simileis eidem lanę uircis repræsentant. Linei autem panniculi quum adhuc uruntur, tenuē ex se fumum reddunt, qui etiam destillationes discutiat, & uuluz sursum recurrenti salutaris sit: cremati iam ad lanæ uirtutem accedunt.

## RHAMNVS.

Rhamnus siccatur in secundo, refrigeratur in primo abscessu, quare herpetibus & erysipelatis nō admodū calidis medetur. sed teneris eius foliis utendū est.

## RAPHANVS, RADICVLA.

Radicula in tertio abscessu calefacit, in secundo siccatur: syluestris efficacior est (in ambobus,) semen utriusq; planta ipsa uehementius, itaq; suggillata, aliosq; liuores disiecit.

Drachma  
impressa.

## RHEON, RHA,

Rheon, quod alii rha dicunt compositum est ex terrestri frigida & tenui substantia, aëreaq; calida & leniter acri, eamq; ob causam conuulsis, ruptis, recta ceruice spirantibus opitulatur: quod discutiendi uim habet, liuores emendat quod astrictoriam, cruentas excreationes, coeliacos, & intestinorum tormina sanat, utraq; uero facultate, iocinorosos iuuat.

## RHETINAE, RESINAE.

Resinae omnes & calefaciunt & desiccant, uerum rerebinthina principarum obtinet, discutiens naturam, emollientis, tenuis, & absterforie, eaq; scabiem corrigit: & larix huiusmodi est. Quae uero est reda destillauerit, atq; hac magis adhuc pinea, acrior est, non ramen aur discutit magis, aut attrahit: medium inter ipsas locum tenet, & quae de picea, & quae de abiete raditur.

## RHODA, ROSAE.

Rosae mixtae constant substantia, aquosa scilicet, calida, astringenti & amara: flos autem ipsarum magis adhuc astringit, eoq; desiccatur.

## RHODIA RADIX.

Rhodia radix calefacit in secundo abscessu, tenui & discutiens uim praedita.

## RHOEA SIVE RHOE, MALVM PVNICVM.

Malum punicum omne astringendi uireis eximias habet, quibus refrigerat siccataq; uerum dulce aliis minus: austerum magis refrigerat siccataq; est & stomacho amicum, acidum refrigerat quoq; & maiorem quandam incindi uirtutem repraesentat. uerum acini succo magis astringunt siccataq; efficacius his adhuc malicorium quod sidion Graeci uocant: huic uirtute respondet mali flos qui cytinus appellatur.

## RHVS.

Rhu coriariae à medicis dictae fructus praecipue & succus magno in usu sunt, quum illa astringendi siccandiq; uim ex tertio ordine habeat, detergendi est secundo.

## RHYPOS, SORDES.

Sordes ex statuis æreis, aut uasis in quibus multum olei inhærescit, detractae sic ut non nihil æruginis admixtum sit, discutiendi uireis habent, siccandi q; mediocriter & emolliendi, eisq; immatura phymata discutiunt. Ardefordibus quae in palæstris habentur, quas nonnulli etiam patos uocant, in sudore dictum est. Aurium fordeculae reduuiis mederi dicuntur.

## QVAE AB S INCIPIVNT.

## SAGAPENVM.

Sagapenum, seu ferulae liquor est, calidus & tenuis, cui & absterforia quaedam uis inest, qua & oculorum cicatricibus & suffusionibus prodest.

## SALAMANDRA.

Salamandra ustae cineres nonnulli medicinis exedentibus, tum iis quae ad lepram & scabiem componuntur, admiscuntur.

## SAMPſVCHVM.

Sampſuchum calefacit, ſiccātq; in tertio abſceſſu: eſt etiam tenuis naturæ & diſcuſſoria.

## SANDARACHA.

5 Sandaracha adurentis eſt facultatis, quemadmodum & auripigmentum.

## SANDYX, VEL SIRICVM.

Sandyx aut ſiricum, extenuat & ſiccāt, non tamen calefacit.

## SAPROTES, CRIES LIGNORVM.

Lignorum caries, eorum maxime, quæ mediocriter aſtringunt: qualis

10 ulmus eſt, humentia purgat ulcera & explet.

*In impreſſo deſidera-  
tur.*

## SAPO.

Sapo, abſtergendi uim habet.

## SARCOCOLLA.

Sarcocolla, Perſicæ arboris lachryma eſt: opplendi & citra roſionem ſiccā

15 di uireis fortita, atq; ideo uulneribus eſt glutinandis.

## SARXIPHAGES, SAXIFRAGA.

Saxifraga urinam mouet, & calculos conterit.

## SATYRION, TRIFOLIUM.

Satyrium, aut triphyllon humidi eſt temperamenti & calidi, item flatuo-

20 ſum, unde ueneris appetentiam facit: nonnulli opifthotonis cum uino au-

ſtero potum, ſalutare eſſe tradunt. Galenus in commētario de theriaca,

trifolium ait hyacintho ſimile eſſe: quum aëre inturgeſcens, ſemen ſylue-

ſtri cnico æquale habet: decocti ipſius ius ſuperfuſum, phalangii aut uipe-

re morſus ſanare: ſano idem potui datum, ſimilem animalium horū icſti-

25 bus affectum conciliare.

## SAURA, LACERTA.

Lacertæ icur & caput, ſuo loco expoſita ſunt: totum autem caput diſſe-

ctum impoſitumq; ſcorpionum icſtibus medetur.

## SELINON, APIVM.

30 Apium tanti caloris eſt, ut & utinas & menſeis eliciat: ceterum flatu diſcu-

tit, præſertimq; eius ſemen.

## SERIS, INTYBVM.

Seris, ſubamarum olus eſt: admodum refrigerās humectansq; habet etiā

nonnihil aſtriſtionis.

35 Seriphium calefacit quidem in ſecundo, ſiccāt autem in primo ordine, cō-

ſimile abſinthio, minus tamen eo aſtringit, magis calefacit, animalia uen-

tris occidit, mediocriter ſtomacho aduerſatur.

## SESELI.

40 Seſelis radix, magisq; ſemē inſigniter calefacit, tenuisq; ſubſtantiæ eſt, uri-

nam quoq; ciet, comitialibus & recta ceruice ſpirantibus accommodatum.

## SEPIAE TESTA.

Sepiæ testa persimilis est ostreo, quod ad uireis attinet, sed tenuior substantia & abstergēs, eoq; in cinerē redacta, ungueis cum sale fossitio extenuat: ignem non experta si infricetur, sicut exterit, & cutis labes abstergit.

## SESAMOIDES.

Sesamoidis albi semen calefacit, detergit, & rumpit.

## SESAMVM.

Sesamum non parum lentoris, pinguisq; obtinet, idcirco opplere, molli-  
re, & mediocriter calefacere idoneum est.

## SEPS.

Seps, quam nonnulli chalcidicam lacertam dicunt, in uino pota, propriis morfibz succurrit.

## SIALON, SALIVA.

Saliua hominis ieiuni maxime discutit & abstergit, eoq; infantium impetigines illita exterit, & furūculos cum tritico, nimirum manso imposita, ma-  
turat, & sugillata delet, feris hominem occidentibus maxime aduersatur.

## SIDERITIS.

Sideritis Heraclia & helxine dicta est. Achillea autē sideritis illiquidē con-  
similis est, sed magis astringit, eoq; fluidis affectibus accommodata.

## SIDEROS, FERRVM.

Ferrum aqua restinctum subinde, uehementem desiccandi uim aquæ cō-  
ciliat, quæ pota lienosis cōducit: uinum autem in quo id restinctū est, cœ-  
liacis, intestinorum torminibus, cholericis, stomacho resolutis, auxiliat.

## SICYOS, CUCVMIS.

Cucumis esculētus quidem uridis, refrigerat humectatq; in secūdo ordi-  
ne, caro ipsius feruidas solat ut inflammationes, semen abstergendi incidē-  
diq; uirtute præditū, urinas mouet, & corpus nitidū efficit. aridus siccatur  
in primo ordine, uehementiusq; abstergit, & semen, & radix.

## SICYOS AGRIOS, CUCVMIS SYLVESTRIS

Cucumeris syluatici seminis succus, elaterium dictus est: qui autē è radi-  
ce & foliis premitur, elaterio similis est, sed imbecillior: radix detergit, diffi-  
pat, emollit: succus siccandi uireis habet.

## SILYBON.

Silybon spinosus frutex est, albo chamaeleonti persimilis, esui accommo-  
datus: radice liquor denarii pondere cū mulla potus, uomitiones excitat.

## SILVRVS.

Silurius falsus si edatur, faucibus humidas expurgat: applicatus corpori, sur-  
culos educit.

## SILPHE, BLATTA QVAE IN PISTRINIS INVENITVR.

Blattæ quæ in pistrinis inuenitur, interanea decocta contritaq; aurium do-  
lores persanant.

## SILPHIVM, LASERPITIVM.

LasERPitium probe calefacit, flatulentū est etiam & cōcoctū pervicax: à foris corpori applicatum, efficacius deprehēditur, magisq; liquor ipsius, extrahendi potens, item & superexcreſcentia amolendi.

## SINON.

Sinon calidus & subamarus uest, urinam mouet, concoctionem adiuvat, menseis educit, & uiscera obstrueta aperit. ¶ In impressum est.

## SION.

Sion calidū, urinam citat, & discutit, renū calculos frāgit, menseis euocat.

## SISARVM, SISER

10 Siferis radix cocta, stomacho utilis est & urinæ citāda, calida in tertio ordine: semen tenue est, discussoriū, ualidumq; idcirco iis quos singul<sup>o</sup> & tormina male habent, cum uino exhibetur.

## SISYMBRIVM.

15 Sisymbrium sunt qui cardaminem uocāt, cardamo, hoc est, nasturtio assimilatum: aridum quidem calefacit siccātq; in primo abſcessu: humidum autem in secundo.

## SCAMMONIA.

Scammonia calfacit, digerit, & biliosa extergit, magisq; eius liquor, qui iā & phymata dissipat, foetus appositu corrūpit, lepras extert, diuturno capitis dolori cum oxyrhodino utiliter respergitur: radix autem tū ipsa, tū decoctū eius potum, purgat: cum aceto autē & farina hordeacea decoctā, coxendicum doloribus illinitur.

## SCANDIX.

Scandix syluestre oluse est, calefaciens siccāsq; in secūdo gradu, urinā propellit, & uiscera obstructione liberat.

## SCINCOS, TERRESTRIS CROCODILVS.

Scinci carnes renibus proximā, naturalibus arrigendis bibūtur. rursus semē lactuæ cum aqua potum, eadem cōtraria uirium lege uideſ remittere: item lentis decoctum cum melle.

## SCYLLA.

30 Scylla incidit, calefacit & desiccāt in secundo ordine: pręstat autem eā asfām lautelīxam sumere.

## SCOLOPENDRA MARINA.

Scolopendra marina in oleo elixa inuncta q̄. pilos abolet, uſta etiā pruritum excitat.

## SCOLOPENDRION.

Scolopendrion asplenon est.

## SCOLYMON, CARDVVS.

Carduus calfacit, siccātq; in ordine secūdo, radix eius cum uino decoctā, 40 urinas foetidi odoris liberaliter educit, & alarū totiusq; corporis grauelentias corrigit.

¶ Derſi in Greco explori im-  
preſſo.

## SCORDION, TRIXAGO PALVSTRIS.

Scordium uariis pollet facultatibus, ut quod amarū, acerbū, & acre sit, purgat igitur simul & calfacit uiscera, urinas & menstruacō citat, refrigerata oīa excalfacit, uulnera glutinat, repurgat que: aridū illitū cicatricē inducit.

## SCORODON, ALLIUM.

Alliū calefacit siccaturque in quarto abscessu: at syluestre alliū quod ophiocorodō, quasi anguinū alliū, & agriocoridō dicit, domestico ualētius est.

## SCORODOPRASON.

Scorodoprason porri & alii mixtas habet uireis & gustatum.

## SCORPIOIDES.

Scorpioides excalfacit abscessu tertio, siccatur secundo.

## SCORPIVS.

Scorpius terrestris crudus impositus, aut tostus in cibo proprii ictus remedium efficitur: marinus autem fel habet oculorum suffusionibus utile.

## SCORIA, RECREMENTVM.

Recrementū omne ualidē exicat: ferri stercus aliis amplius, quod excoctū & in tenuissimum pollinē detritum, cum aceto auribus suppurantibus mirificē proficit, item iis qui aconitū biberunt, cum oxymelite potum remedio est. Plumbi recrementum eidem respondet, sed magis astringit.

## SMILAX, AUT CACTVS ARBOR, TAXVS.

Smilax uel cactus arbor est uirosae uirtutis.

## SMYRNA, MYRRHA.

Myrrha è secundo calefaciētium siccantiumque ordine est: capitis igitur uulnera si illinat glutinat, item amaram uim obtinet, qua uentris lumbricos & scetus occidat: ad hanc abstergit, eoque oculariis medicinis temperatur, & humores pectori infixos expurgat, ita ut fauceis non asperet. Bæotica myrrha uireis habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

## SMYRNION.

Smyrnion, quidam hipposelinon, quidam apium syluestre nominant, calefacit in tertio ordine eodemque siccatur, apio duntaxat fortius, petroselino inualidius, urinae & mensibus educendis accommodatum.

## SONCHVS.

Sonchus astringit & manifeste refrigerat, tum corpori admotus, tum maducatus: exarefactus autem mediocriter calefacit.

## SPARGANIVM.

Sparganium siccandi & hoc uireis refert.

## SPARTOS, GENISTA.

Sparti quo uireis ligantur, & semine cum mulla instat quinque obolorū pota, per superiora purgant ueratri modo sine periculo, semine per inferiora quoque purgat, uirgula ipsius ad coxendicum dolores proficiunt,

## SPECLARIVM, LAPIS SPECVLARIS.



Specularium, alii per ph scribunt spheclarium, quo nonnulli loco uitri in fenestris utuntur, eoq; diaphanes à perspicuitate appellatur, substãtia gypsum, uireis habet concrematis testis aut ostreis sumileis.

## SPONGOS, SPONGIA.

- 9 Spongia recens quæ marinum odorem adhuc reseruat, si cum aqua aut uino aut posca imponatur, uulnera glutinat. cremata, acris est uirtutis & discussoria: cum bitumine autem & pice liquida uisita oppositaq; ex igne, sanguinis eruptiones compescit.

## SPODIUM, CINERULA.

- 10 Spodium pompholygi uiribus æquale est.

## STAPHYLINUS, PASTINACA.

Pastinaca urinas mouet, menses proritat, præsertim semine ipsius & radix, folia autem abstergeri uiribus prædita phagedenicis affectibus congruit, & uiridia cum melle: syluestris autem pastinaca ad omnia ualentior est domestica.

- 15 STACHYS.

Stachys marrubio similis frutex, tertium in calefaciendo ordinem occupat, mensis itaq; excitat, fetus occidit, & secundas expellit.

## STEATA, ADIPES.

- Adeps omnis humanum corpus & humectat & calefacit, sed pro diuersis animalium temperamentis uirtus eius euariat. Suillus igitur omnium humidissimus est, ut ad olei naturam accedat, unde etiam rosiones obtundit. Caprillus, siccior est, & celeriter concreuit, eoq; iis qui in longanone rosiones experiuntur, ab inferiori parte iniicitur. Anserinus calidior est, maiorq; tenuitatem obrinet. Inter utrumq; hunc gallinæ gallorumq; adeps consistit. Leoninus calore omnibus & tenuitate superat, & propterea etiam ui discussoria. Bubulus inter suillum & leoninum medius temperamento existit. Vrsinus alopecis medetur, uulpinus aurium doloribus, quemadmodum uiperinus pilos abolere, & oculorum suffusiones impedire fertur. In omni autem adipum specie calidior sicciorq; est marium, atq; ex his eorum qui castrati non sunt  
30 magis quam aliorum. ceterum uetustate omnis adeps redditur calidior.

## STIMMI.

Stimmi præterquam quod siccatur, etiam astrictionem habet, ob quam oculariis collyriis miscetur.

## STOEBE.

- 35 Stœbæ semine & folia in tertio ordine desiccant uiribus donata astrictoris, eamq; ob causam uulnera magna conglutinant: decoctum ipsorum intestinorum torminibus, sanguinis eruptionibus, auribus purulentis auxiliatur: folia illita oculis ex ictu suffusis conferunt.

## STOECHAS.

- 40 Stœchas adaperit, extenuat, detergit, & confirmat uiscera omnia, totumq; corporis habitum.

## STRATIOTES.

Stratiotes aquaticus frigidus est natura: terrestris etiam astringendi uim habet, qua ulcera committit: nonnulli eo & ad sanguinis eruptiones & ad fistulas utuntur.

## STRYCHNON, SOLANVM.

Solanum hortenſe eſculētumq; astringit, & in ſecundo ordine refrigerat. Solanum halicaccabū hortenſi ſimile, urinæ ciendæ idoneum fructū habet acino uuæ æqualē. hypnotici, id eſt, ſomnifici ſolani radicis cortex, cū uino denarii pondere potus, ſomnū conciliat, ſemen habet ad urinā mouēdam accommodatū, ex tertio refrigerantium ordine: unde corymbi eius plures duodecim epoti, furorē accerſunt. Quartum uero genus ſolani inſus aſſumptū, inutile eſt: a foris autē illitum ulcera de palſcentia curat, refrigerando ſiccandoq; ad ſecundum ordinem relatū.

## STYPTERIA, ALVMEN.

Alumen omne maxime astringit, ſubſtātiāq; craſſum eſt: tenuius autē reliquus eſt quod uocatur ſciſſile, mox rotundum, & aſtragaliotes, Craſſum admodum eſt liquidum, placites & plinthites appellatum.

## STYRAX.

Seyrax calefacit, emollit & concoquit: tuſſi, deſtillationi in nareis, & grauedini utilis, menſeis idem & potus & appoſitus extrahit.

## SYCA, FICVS.

Ficus arida in ſecundo ſerē ordine ſiccant: pingues autem, duros tumores magis maturant: actiores detergunt, diſcutiuntq; decoctum ipſarū meliſ ſpeciem referens, quod iam nonnulli ſirzon appellant, uiribus melli reſpondet: uirides autem ficus, imbecillioris uirtutis ſunt, utraq; tamen & uirides & aridæ aluū ſubducunt. At ficus capriſfici, acres & diſcuſſorie ſunt, quemadmodum ex domeſticis groſſi.

## SYCE, FICVS ARBOR.

Ficus arbor calidi renuiſq; temperamenti eſt, adeo ut liquor & foliorū fucus non rodat modo, aut abſtergar uehementer, ſed etiam exulceret, ora uenarum aperiar, & mytmeas exrerat: iam uero & purgandi uim obtinet. At ſylueſtris ficus, quam capriſicum uocant, in omnia efficacior domeſtica eſt.

## SYCOMORVS, FICVS AEGYPTIA.

Sycomori fructus nullius nutrimenti eſt, & ſtomacho noxius: liquor arboris ui poller emolliendi, glutinatoria uulnerrum, diſcuſſoria tumorum bibitur inungiturq; ad ſerpentum morſus, lienes induratos, ſtomachi dolores & in acceſſionibus februm horrores.

## SYMPHYTVM PETRAEVM.

Symphytum petræum contrariis conſtat uirtutibus, habet enim aliquid quod incidat, ideoq; \* pus in thorace & pulmonibus collectum expurget:

habet, pui in  
thorace col-  
lectum et ra-  
nes extrahit.  
Galenus  
et Dioscori  
du inter-  
pres Pauli  
citās, nostrā  
versioni affi-  
piātur.  
L. Galenus  
habet more-  
dox.  
O Male in  
Græco est,  
et si non in  
pro eo q. 26.

habet etiā aliquam contrahendi uirtutē, qua sanguinis excreationibus me-  
deatur, cōuulsis, ruptis, mulierū fluxionibus rubris, intestinorum ramici-  
bus. item calida quēdā humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriz asperi-  
tates sanat. Symphyton alter; nempe magnū, uiscolum quippiā & L quod

pruriticum excitet ⁊ representat, scyllā simile. Vtūtur eo, ad quē superiori.

## SPONDYLION.

Spondylii fructus & radix uirtute acri & incisoria, suspiriosis, comitialibus  
& arquatis succurrunt, radix autem circumrasa, fistulisq; imposita illa-  
rum callos tollit, succus ē flore ipsius expressus, ueterrimis ⁊ aurium ulce-  
ribus instillatur.

## SCHINOS, LENTISCVS.

Lentiscus in omnibus sui partibus siccatur secundo ordine absoluto, calefa-  
ciendo autem & refrigerando medius est, adeo astringens, ut ad hypocisti-  
dis succum astrictione accedat.

SCHINVS ANTHOS, LENTISCI FLOS.

Lentisci flos modice calefacit, minus astringit, tenuē naturā sortitus, qua  
urinā mouet & menſeis trahit, obstruētaq; referat in fomētis, potu & cata-  
plaſmatis adhibitus: radix adhuc magis flore astringit, sed ille calidior.

## SCHOENOS ELIA, IUNCVS PALVSTRIS.

Palustris iuncus duplex est, sed eius qui uocatur oxyſchænos, semen est  
somniaficum: holoschæni autē dicti, minus, idem & capiti dolorem facit.  
utriusq; semē frixum si cum uino bibatur, alui fluores desiccatur, & mulierū  
fluxiones cohibet.

## SORI.

Sori uireis misy æqualeis obtinet, longe illo natura crassius.

## QVAE A T INCIPIVNT.

## TARICHON, SALSAMENTVM THYNNI.

Salſi thynni caro acris est & desiccatoria: morsus igitur à uipera, quam præ-  
sterem dicunt, quā plurimum eius esui datur, uinumq; superbibitur libe-  
ralius, & uomitus excitatur: eadem ad uomitiones quæ ciborum acrimen-  
to quærentur, accommodata est: item rabidorum canum aliorumq; ser-  
pentium morſibus utiliter illinitur.

## TAUROCOLLA, GLVTINVM BVBVLVM.

Taurocolla aliis xylocolla dicitur, ex bouum coriis cōfecta, uim habet in-  
signiter absterforiam, eoq; aceto subacta, impetigines & summæ cutis le-  
pras extertit: ambustis, si aqua calida soluitur, inflammationē oboriri non  
sinit: eadem oxymelite soluta, uulneribus accommodatur.

## TELLINAE.

Tellinæ salſæ crematq; adurentē cinerē reddūt, q cedrino liquori mistus,  
euulsos radicatus palpebrarū pilos, si instilletur, nasci iterum prohibet.

## TERMINTHOS, TEREBINTHVS.

Terebinthus calefacit in ordine secundo, siccatur autē si uiridis est in primo, si aridus secundo, fructus ubi inaruerit, ad tertium siccationis ordinem refertur: hac igitur ratione & urinam mouet, & lienes adiuuat.

## TETTIGES, CICADAЕ.

Cicadae crudae siccatae ad colicū dolorem potui dantur, aut tres, aut quinque, aut septem, cum totidem numero piperis granis: quidā costas contra uesciae dolores potui exhibent.

## TEVTLON, BETA.

Beta nitrosam uim habet, qua abstergit, discutit, & per nareis purgat, sed alba elixa plenius, inflammationi arcenda fit idonea, & modice discutit. 10

## TEVCRION.

Teucrion calfacit in secundo, siccatur in tertio ordine, ui incisoria tenui; lie nibus medetur.

## TEPHRA, CINIS.

Cinis nō omnis idem exacte habet temperamentum, sed pro materiae co- 15 bustae differentia euariat: acerbarum sane arborum cinis, nempe quercus & ilicis, astringendi uim nō modicam obtinet, qua sanguis eruptionem compefcit, quū nullius alterius datur facultas: acriū uerō, puta ficū & tithymali cinis, uehementioris acrimoniae & deterforius existit.

## TELEPHION.

Telephion in primo abcessu calefacit, secundo autē desiccatur: est iride absterforium, quapropter ulceribus putredinem expertis conuenit, & uiliginibus, tum leucas, tum alphas, cum aceto abolet. 20

## TELIS, FOENVGRAECVM.

Foenugraecum ex secundo ordine calidum est, è primo siccū, idcirco feruidas inflammationes irritat: minus autē calidas & induratas magis discutiendo per sanat. 25

## TITHYMALVS, HERBA LACTARIA.

Tithymali oēs è quarto calefacientium ordine sunt, acrimoniae & ualidae amaritudinis participes, sed radix quum sit quodāmodo imbecillior, aceto incocta detrium croforū dolores finit, liquores uehementiore donati uirute, denriū cauis imponuntur. reliquum corpus si attingant, adutūt. quare etiam pilos modice delitos auferūt, item myrmecias, uerrucas & huius generis alia: curis labes abstergūt, maligna ulcera, phagedaenica curāt. Ceterū ex septenario ipsorum numero ualidissimi sunt, appellati characias, 30 myrsinities, & qui in petris arboris modo nascitur: hos sequitur qui uerbascio similis est & cyparissias, deinde paralius quasi dicas maritimus, postremo helioscopius.

## TITANVS, CALX.

Calx uiua uehementer adeo urit, ut crustā inducat: restincta uero crustam quidem subito excitat, sed post diem unum non amplius. 35 calefacit

tamen & consumit catneis: si lauetur, idq; aqua marina, ualidas discutien-  
di uireis acquirit.

## TRAGACANTHA.

Tragacantha per similes gummi uiteis reprobentur.

## TRAGIUM.

9 Tragium frutex est in Creta lentisco similis, uirtute calida in tertio absces-  
su, attractoria, discutiente, & tenui. aculeos igitur educit, calculos commi-  
nuit, mensesq; citat, instar denarii potum. Sed alterum tragium, hoc ama-  
rius est, scolopendrio assimile, nascitur multis in locis, tanta astringendi  
10 uirtute praeditum, ut fluidis affectibus commodè faciat.

## TRAGORIGANVM.

Tragoriganum origani uirtutes habet, & nonnullam etiam astringentem.

## TRIBOLOS, TRIBVLVS.

15 Tribulus mediocriter refrigerat: sed terrestres siccando ualentior est, aqua  
tucus leuiter etiam humectat: uterq; contra inflammationum generatio-  
nes, omnesq; influxus conuenit: terrestres fructus quum tenuis existat, te-  
num calculos conterit.

## TRAGOSITODES, TRAGVS FRUMENTACEVS.

20 Tragus frumentaceus zea figura respondet, sed difficilior in stomacho co-  
sistit, aluum emollit.

## TRIGLE, MVLVS.

Mullus piscis continue esus, clatitati oculorum nocet, crudus dissectus &  
impositus, matini draconis, scorpionis, & \* araneatū moribus succurrit.

## TRIPOLIUM.

15 Tripolii radix calida est in tertio abscessu & actis.

## TRICHES, CRINES.

Pili combusti per similem lanis concrematis uim obtinent.

## TRYGON, PASTINACA MARINA.

Marinae pastinacae aculeus impactus deti infirmo, ipsum coterit excutitq;.

## TRYX, FAEX.

30 Fex uini ignem non experta compositis uiribus constat, ut quae abūde de-  
siccet discutiatq; astringentia autē facultas ei ex uini unde constat specie, acce-  
dit. Vtendum igitur est ea tum in humidioribus, tum in fluidis affectibus.  
phygethla discutit, lac, māmis eo refertis imposita, extinguit cremata ue-  
35 rō quam nunc etiā spheclē appellant, adurentē uim acquirit, quapropter  
& medicamentis quae adurunt, ipsam miscemus. ungues igitur scabtos cū  
resina eiicit: pilos cum oleo lentiscino per noctē totam inuncta, flauos ef-  
ficat. Lota oculorū medicinis absterforiis temperatur. Aceti fex in omnib;  
ualentior est iam dicta, magisq; astringit.

## TROGLODYTES, PASSER.

40 Troglodytes passer est, omnium auium excepto regulo minimus, in sepibus

overio, id est  
intendit, Ga-  
lenus et Ori-  
basius nobis-  
cū scribunt.

\*Græce erat  
draconis, et  
Dioscorides  
nobiscū sen-  
tit, ex quo  
ad uerbum  
sumpsit Pan-  
lus.

potissimum degens, qui & tostus & crudus falsus manducatus renum calculos conterit: cremati ipsius cinis epotus, idem præstat.

#### TYROS, CASEVS.

Caseus recens & mollis repellendi uim obtinet, leuiter refrigerans, quare & uulnera impositus conglutinat: at qui oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiam discussoriam modicam possidet, magisq; uulnera conglutinat: uetustus isq; pinguis discutiendi uirtutem præ se fert, qua articulationum quoq; topus accomodatus est, præsertim cum suillæ carnis & falsæ & pinguis decocto.

#### QVAE AB Y INCIPIVNT.

##### HYACINTHVS.

Hya cinthi radix bulbi specie repræsentans, primi in siccando ordinis est, secundi refrigerando, pueros itaq; impuberes diu conseruare cum uino illita creditur: semen leuiter abstergit astringitq;, idcirco arquatis cum uirno datur, ut quod desiccet magis quam refrigeret.

##### HYALOS, VITRVM.

Vitrum leue cum uino tenui & albo potum, uesicæ calculos comminueredicitur.

##### HYDNON, TUBER TERRAE.

Tuber terræ terrestri constat substantia cum modica quadâ uirtute tenui.

##### HYDRARGYROS, ARGENTVM VIVVM.

Argentum uiuum in medicinæ usum non adeo accommodatur, quod uenenum repræsentet: nonnulli uero concrematum ipsum in cinerem, mixtumq; aliis speciebus, colicis & iliosis porioni exhibuerunt.

##### HYDROPEPERI, AQUATICVM PIPER.

Hydropiper, herbula est calida, sed non piperis modo, uiride cum semine suo illitum, sugillata, & tumores induratos discutit.

##### HYDOR, AQUA.

Aqua præstantissima & alterius substantiæ expers, refrigerat, humectatq;, ex sua ipsius substantia: ubi autem ascititium calorem assumpserit, quando diu cum seruat, calfacit: frigida autem facta, refrigerat. Porro quæ non nihil mixta est, ut nitrosa aut bituminosa, adiunctæ substantiæ uireis acquirit. Pluuialis autem non nihil etiam astrictiōis habet, ob quam oculariis miscetur medicinis. Qualem uero conueniat laudatissimam esse aquam, in primo libro comprehensum est.

##### HYOSCYAMVS, ALTERCVM, SEV HERBA APOLLINARIS.

Altercum cuius semē nigrum est, item cuius flauum, uenenosum est: accommodatissimum uero curationibus, quod & semen & florem candidū habet ex tertio L refrigerantium 7 ordine.

##### HYPERICVM.

Hypericum duplex est, alterum, quod androsamon & ascyrrhon appel-

latur, expositum est: alterum uero calefacit & siccatur, tenui substantia præditum, eoq; urinas elicit & menstrua citat, totum ipsius semen, quod si cum foliis illina uiride, cicatricē uulneribus obducit, arida uero folia oblita ulceribus medentur, dantur etiam porioni aduersus coxarū dolores.

## HYPECOON.

Hypecoon refrigerat in tertio ordine, papaueri uiribus proximum.

## HYPOGLOSSON.

Hypoglosson frutex pusillus est, cuius radix & succus emolliendi uirtute pollent.

## HYPOCISTIS.

Hypocistis eorum quæ ad radices cisti & cistari appellati subnascuntur, nempe cytinorum, succus est, medicamentum ad omnes fluidos affectus efficacissimum, ut quod particulas siccet corroboretq;.

## HYPOPHAESTON.

Hypophæston species est spinæ fulloniæ, quemadmodū & hippophætes, ex huius capitulo, foliis & radicibus, succus expressus siccatusq; triū obolorum pondere, cum aqua multa ad pituitam & aquam uacuandam exhibetur: maxime congruit non nisi subrecta ceruice spirantibus, comitialibus & neruorum affectibus.

## HYSSOPVM.

Hyssopum in tertio ordine & calefacit & desiccatur, tenuisq; substantiæ est.

## QVAE A PH AVSPICANTVR.

## PHACI, LENTES.

Lentes in secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamēto donatæ, sed astrictionis quoq; nonnihil habent. Totum uero lentis corpus siccatur, aluumq; fistit: decoctū ipsius proritat, ideoq; prior aqua defunditur, quum astringendi gratia lentes assumuntur.

## PHACOS, LENTICVLA PALVSTRIS.

Lenticula palustris humectat, refrigeratq; in secundo abscessu.

## PHALARIS.

Phalaridis succus, folia & semen pota, uescit doloribus auxiliantur. habet eadem herba & tenuem quandam uim, naturamq; calidam.

## PHALANGITES.

Phalangites quod phalangiorum moribus medeatur, nomen hoc inuenit: est & tenuis naturæ compos, qua torminosis auxiliari putatur.

## PHELLOS, SVBER.

Suber præfertim ex uinorum cadis, combustum, cinerem reddit siccando uehementissimum, qui medicinis ad tormina intestinorum inscriptis admiscetur.

## PHILYRAS, TILIA.

Tiliz arboris folia, syluestri oleæ similiter astringunt, quibus commanda



præ ad cicatricē ulceribus obducēdam in siccioribus corporibus præstantissimum est: si eluatur, teneris utilius est.

CHALCV ANTHOS, AERIS FLOS.

Aeris flos tenuioris naturæ est, quàm æs cōcrematum, eiusq; squama: mixtus itaq; collyriis, palpebrarum & asperitatis & ficus exterit.

CHAMAEDRYS, TRIXAGO.

Trixago in tertio ordine calefacit siccitq; lienes igitur consumit, urinas & menstrua elicit, uiscerum obstructions expurgat.

CHAMAECISSVS, HEDERA TERRESTRIS.

10 Hederæ terrestris flos quum amarus insigniter existat, iecoris meatus adaperit, item contra coxendicum dolores exhibetur.

CHAMAEEVCE.

Chamæleuce in tertio abscessu calefacit, in primo desiccatur.

CHAMAEELEON.

15 Chamæleontis nigri radix calefacit siccitq; propemodum in tertio ordine est & absterforiæ facultatis particeps, quæ cutis labes exterit, itē duros tumores dissipat emollitq; & phagedænica ulcera illi re per sanat: si autem intra corpus sumat, ueneni loco est. Albi radix superiori proportionē respondet, sed amarior est: quæ si cū uino austero instar acetabuli bibatur, latos uentris lumbricos enecat: facit etiam ad aquam inter cutem.

CHAMAEMELON.

Chamæmelon siue anthemidis calefacit siccitq; in primo abscessu, præterea uirtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata constat.

CHAMAEPITYS.

25 Chamæpitys secundo gradu calefacit, tertio desiccatur, quæ ob causam & purgare & abstergere uiscera, potissimum iecur potest, item urinas mentisq; trahit, magna uulnera cōglutinat, putredinē expertis medetur, duritias discutit. decoctum ipsius, etiam coxendicum doloribus salutare est.

CHAMAEDROPS.

30 Chamædrops, quidam & hoc chamædrin uocant, alii etiam teucrion, uiribus chamædryi respondet.

CHAMAESYCE, HUMILIS FICVS.

Chamæsyce absterforia & acri facultate pollet, quæ propter & furculi ipsi & liquor myrmecias, uerrucasq; abolēt, crassas oculorum cicatrices cum melle abstergunt, hebetudini, & suffusioni incipienti medentur.

CHAMAELAEA, OLEAGO.

Oleago absterforia facultate, sordida ulcera & crustas cum melle purgat.

CHELIDONIUM, HERBA HIRVNDINARIA.

40 Chelidonium in tertio ordine calefacit, ualētēq; abstergit: succus ipsius claritati oculorū utilis est: radix arquatos cum uino & aniso pota, obstructiōe liberat: māducata, dentium doloribus auxiliatur. Minus chelidonium

\*Græce erat  
triplex in pro  
prietate.

## PSIMMYTHION, CERVSA.

Cerusa refrigerat & illitu opplet.

## PSYLLIVM, HERBA PVLICARIS.

Herbæ pulicaris semen secundi refrigerantium ordinis habetur, siccand  
do humectandoq; medium est.

## PSORICON.

Psoricon, chalcitide duplicata, argenti spumæ mixta, efficitur, utrisq; ta  
men aceto prius detritis, ac in recentem ollam coniectis, quæ diebus qua  
draginta sub fimo delitescet: sic enim maiorem siccandi uim, tenuiorem  
10 & minus rodentem quàm chalcitis, acquireret.

## QVAE AB O MAGNO INCIPIVNT.

## OON, OVVM.

Oui candidum & tenue, nullius plane rosionis cōpos, mediocriter refrige  
rat. utendū igitur eo in oculis, pudendorū ulceribus, aliisq; omnibus ma  
15 lignis: miscetur etiam medicamentis emplasticis, quæ sanguinem suppri  
munt: luteum uero pari facultate præditum, medicamentis tēperatur ad  
inflammationem arcēdam efficacibus: tostum uero magis siccatur, minus  
lenit. Porro totum ouum aceto incoctū si assumatur, uētris fluxiones de  
siccatur: si acerbū aliquid adiunxeris, exempli gratia, gallam, aut rhun, aut  
20 balaustium, ac frixeris, multo redditur efficacius: ambustis autē etudū im  
positum, protinus auxiliatur. Sorbile assumptū, pectoris uitia concoquit  
lenitq; & arteriæ asperitates leuigat. Præponetur autē recēs ueteri: & galli  
naceum reliquorum animantium ouis.

## OCIMVM.

15 Ocimum secundo calefacientium ordini ascribitur: habet & humiditatē  
quandam excrementitiā, propter quam neq; utile est intus assumprum:  
extrinsecus autem illitum, discutit & concoquit.

## OCIMOIDES.

Ocimoides, nonnulli philetæxion nuncupant, inutilis quidem radix est:  
30 semen uero tenue est & sine rosione siccatur.

## DE MEDICAMENTIS \*SIMPLICIBVS QVAE FLA

uz bili purgandæ sunt.

Cap. IIII.



Loēs denarius cum aqua mulsa mane datur, qui uesp̄ri id ex  
hibet, aut secundū cibum, noxā inferunt, quippe alimentum  
35 \*digerit, flauā bilem minus uacuat: trium obulorū instar as  
sumpta, abūdē ad deiectionē aluum sollicitat. Cæterū quum  
omnia purgantia medicamina stomacho aduerfentur, sola a loē cōducit.  
qui uero amaritudinem eius non sustinēt, in cataporia coactā assument.  
Sciendum uero est, medicamenta ea non simplici quodā temperamento,  
40 uerbi gratia, caliditate purgate (omnia siquidē calida, quale piper est, uacu  
ationem molirentur) uerū totius substantiæ proprietate, quomodo lapis

\*Græce est  
Asclepias  
pro Asclepi  
et id est, cor  
ruptū.

magnes ferrum attrahere demonstratus est. Porro ex purgantium medicaminum numero ea quæ uicem duntaxat emolliunt, primo libro sunt exposita: efficacioribus autem utimur, uel ad materiam deriuandam, uel ad affectum induratum commouendum excitandumq; aut ad corpus reficiendum, mutandumq; ipsius temperamentum, aut ad noxium humorem eliciendum. Iam uero sunt nonnulli mixti ex prædictis modi, in uicem connexi. Cæterum purgationibus hos uti conuenit, qui uiribus constant, & eas non grauatim assumunt, primosq; ætatis limites euaserunt, nõdum uero ad extremos peruenerunt, item qui stomacho robusto sunt, & copiosam materiam inutilem in corpore collegerunt, non multi adeo sanguinis compotes. Tempus autem purgatiõis, si nulla urgeat necessitas, uernum maxime & autumnale opportunum est.

#### QVAE BILEM VACVENT.

Quæ bilem educunt, quouis tempore præter hyemem recte usurpantur: ætate uero florida & ei proxima: habitu sicco, musculofo, nigri coloris, uel rubri: uiris magis quàm mulieribus: item in quibus cibi continue corrumpuntur, aluus astricta est, amara bilis redundat, iracundis, paucam urinam reddentibus cibo usis sicco & calido. In affectibus, arquato, iectoris imbecillitate, pleuritide, phrenitide, angina, insania, cephalza, lippitudine, erysipelate, lepra, febris, & quibus bilis superat. Datur aloë capite grauatæ, lippientibus, siticulosis, & qui per somnum imaginibus torquentur sine febris, ad hæc qui horrores discursum in corpore sentiunt, status acreis edunt, intestinis roduntur, quibus stomachus immodice æstuat, aut fastidio ex ciborum copia eueritur: postremo, quibus ob recrementorum abundantiam clyster nequit iniici: abũde siquidẽ inanit, sic ut totũ corpus non commoueat, nisi copiosa admodum fuerit exhibita: bilem autem intestinis, aluo & stomacho inhaerentem educat. Veratrum conuenit & acuto & longo morbo laborantibus, qui medicamentum bili ducendæ idoneum requirunt, quales sunt qui insania, altera capitis parte (heterocranici dicuntur) humorũ imperu in oculis decumbente, & pectoris affectibus torquentur: accommodatissimum est uisceribus, uteri & uesicæ uitæ medicinæ requiruntibus. Laudatur etiam ad longam asperæ arteriæ affectionem, arquatum, eruptiones quæ exanthemata dicuntur, impetigines, uel herpes, uel erysipelata, uel lepras. Veratrum nigrum bilem flauam potissimum è toto corpore citra molestiam educit, quam ob causam iis qui nõ grauitè febricitant, magisq; febris carentibus instar denarii exhibetur, radicibus in mulla & aqua maceratis; aut cum melle catapotiorum modo: uerum ita exhibetur, ut ieiunium præcesserit. Sunt qui misceant ei pulegiũ, uel thymbam, uel aliquod ex iis quæ subito dilabuntur, stomacho non inimica.

Scammonia cõsimiliter ueratro purgat, magis flauam bilem: cæterum inter omnia quæ purgationem moliantur, aduersissima stomacho est, da

tur igitur iis qui febris carent & stomacho sunt meliori, ad magnitudinem quatuor obolorum cum sale aut pipere aut zingibere, aut quodam stomacho utili, quod protinus corpus permeet, aut etiam cum melle: item cum gummi quoque sunt catapotia. Colocynthis, hoc est, cucurbitæ sylvestris medulla bilem potissimum uacuat, & mucosa non à sanguine tantum trahit, quemadmodum ueratrum & scammonia, sed etiam à costis & nervosis partibus, instar denarii in aquæ mulsa cyathis duobus, quibus & ruta incocta sit, epota: leuigetur autem accurate, quoniam asperitates ipsius interaneis adherentes, ulcera cōcitant, & nervos cōsortii lege afficiunt. Exhibetur recte, capite dolentibus, nempe quum cerebri membrana, uel ea quæ calvariam cingit, uiciata fuerit, exēpli gratia, uertiginosis, heterocranicis, cephalæa infestatis, comitialibus, attonitis, cōuulsis, ut in utramlibet partem deprauata sit facies, qui cynicus spasmus dicitur, diuturno in oculos fluxu uexatis, recta ceruice spirantibus, suspiriosis, uetusta tussi cōflictantibus, præterea iis quos articularii dolores & renū aut uesciæ affectus male habent. Elaterium scammonia modo euacuat. deligendū uero uiridi colore, leue & anno non uetustius: triobolari pondere cum laetis hemina leuigatum exhibetur. Tithymalus bilem elicit, non aliter quā elateriū & scammonia. dantur liquoris guttæ quatuor aut quinque cum polenta mace ratæ, quæ statim deglutientur. Nam in ore diu retentæ, linguā exulcerant, eiusque uiciniam. Lathyrides bilem purgant instar ueratri & scammonia. offerentur igitur septem octo uel, & usque ad quindecim: robustis sane & qui liberaliore indigent purgatione, māducari præcipe, imbecillioribus & malo præditis stomacho, integras ipsas deglutiri. Peplii turionum siccatorum, instar octo obolorum in mulsa datum bilem educit, ueratri modo, & flatus disiciit. Agaricum simileis cucurbitæ sylvestri uireis habet, lentum ad functionem obeundam, non autem stomacho admodum inimicum: datur leuigatum denariis duobus cum mulsa, sit autem albissimum, uehementer fragile, non adeo lignosum, neque teredinibus obnoxium.

Iris illyrica simili modo purgat octo obolorum instar ex mulsa assumpta. Sit autem nec uetusta, nec teredines experta. Centaurium minus bili & mucis purgandis aptum, coxendicum doloribus peculiariter conuenit: ius ipsius denarii & semissis pondere in aquæ hemina decocti ad dimidias bibitur. Tragorigani flos cum semine instar duorum denarium ex mulsa datur, quibus etiam ueratrū nigrum, quanquā hoc sit stomacho grauior, minus autem purget. Chamæleæ denarii quatuor in mulsa heminis duabus ad quartas decocti, similiter ueratro purgant. Nonnulli uero chamæleæ & absinthii dupla portione catapotia fingunt exhibentque. Aristolochia clematidis, hoc est, farmētaria fructus drachma in mulsa pota, colocynthis more purgat. Polypodii radix arida, si leuis cum mulsa illinatur, aut cum ea infricetur, eundē cum colocynthide effectū præstat.

## QVAE BILEM ATRAM VACVENT.

Medicamentis atram bilem educentibus utemur præcipue in melancholicis, furibundis, iracundis, hominum consortia exotis, aut secessu gaudentibus, item in his qui dum à morbo reficiuntur, purgationem desiderant, autumno feruidiore, habitu sicco & parum musculofo. Epithymum laudatissimum est remedium inter ea quæ atræ bili uacuanda sunt. dantur ipsius denarii quinque leuigati ex lactis hemina. Epithymbrum quod thymbræ supernatat epithymo similiter euacuat, sed imbecillius est. Pulegium atram ducit bilem instar acetabuli in multa potum. Tragorigani heracleotici idem modus, uti pulegium uacuat, ceterum ambo desiccant. Alypi semen inferius atram purgare bilem pari epithymo mensura cum sale & aceto dictum est, intestina uero si fide Dioscoridi accommodamus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio, quæ nunc alypias uocat, exhiberi debet in multa.

Parthenium similiter siccum si potetur, eadem solet extrahere. Alysson cum sale epotum non aliter quam superiora expurgat.

## QVAE PITUITAE VACVANDAE SINT.

Eorum quæ pituitam educunt usus est in habitu frigidiore & senio confectis perque hyemem, in resolutis, attonitis, inturgescētibz tumore laxo, quod œdema dicunt, insuper in his qui multum pituitæ in uentriculo, aut pectore, aut stomacho collegerunt, & in muliebri defluxione. congruunt etiam copiosa emungentibus, crassa excrementis, fastidiosus, & coxendicum cruciatu detentis, quum mucis articulis incubuerint, aut elephanticis: maxime autem conueniunt iis qui aqua inter cutem laborant, cui nomen est anasarca. Styraçis albi denarii pondus cum resina terebinthina æquali deglutitum, pituitam euacuat. Oleæ radice cortex drachmæ instar cum uino aut aqua. Pyrethri oboli nouem ex aqua. Lychnidis seminis denarii duo. Cyclamini radice denarius cum hydromelite. Scordii denarii duo cum melle. Chamæpitys in pollinem detrita, exhibitaque in catapotis. Squamæ Cypriæ denarii duo cum resina pati in catapotis ualentius purgant pituitam.

\* Improprie  
semita.

Lauri foliorum uiridum denarius & semissis. Cucumeris syluestris radicis cortice oboli duo. Ricini grana quadraginta, crotones dicti, putaminibus detractis eduntur, similemque effectum præstant. Apii dimidium quoad radicem est manducatum: nonnulli id chamæraphanon appellant. Bdellii drachmæ duæ ex hydromelite. Peculiariter autem gummi oculis defluentibus idoneum.

## QVAE AQVAM EDVCANT.

Aquam elicientibus uti conuenit in his quos aqua subter cutem, ab utre ascite dicta, male habet, in mulieribus albo fluore infestatis, item in iis quos uiscera fluida torquent. Squamæ Cypriæ denarius & semissis cum multa potus aquam educit: aceti uero momentum superforbere oportet, ne per uomitum reddatur. Coccum gnidium cortice detracto laue cum melle

cocto potum ne fauceis adurat, aquas trahit. dantur autem grana aut uiginti, aut uigintiquinq; aut triginta: ualētioribus quadraginta. Euphorbii denarius cum melle cocto potus, pituitā emolitur, magis autē aquas.

Lonchitidis feminis oboli octo cum mulla aquas purgāt. Cneoron similiter aquas trahit cum polenta potum. Cnici feminis denarii quinque leuigati ptisanæ incoquuntur cum salis momento, sorbēturq;. Ammoniaci suffiminis \* denarius in mulla potus aquam educit. Nonnulli uero lienosis id cum posca exhibēt. Sambuci corticis radice succus instar unciarum duarum potus cum uino aquas educit.

\* Manuscriptum denarium  
rij duo.

10 DE COMPOSITIS MEDICAMENTIS PURGANTIBVS. Cap. V.



CATAPOTIA EX ALOE.

Olocynthidis medullæ, absinthii succi, aloës, singulæ partes, scammoniz partes duæ: ex aqua granula ad erui magnitudinem funguntur. dantur undecim numero.

15 OXYMEL IULIANI.

Rutæ, origani, singulorum quadrās, thymi comæ triens, anethi fescuncia, iridis uncia, mandragoræ radice fescuncia, agarici sextans, tedarum pinguium uncia duodecim, cocci gnidii triens, lathyridum, alypiadis, singulorum quadrans, polypodii sextans, phylli, costi, spicæ nardi, singulorum uncia, rheu Pontici fescuncia, scillæ, sambuci turionū, canopi, (qui est sambuci cortex) singulorum quadrans, asari uncia, pulegii quadrās, epithymi, ueratri, acori, singulorum sextans, sii, amomi, hyperici, cumini, singulæ uncia, anisi sextans, aceti sextarii decem, mellis sextarii quinque: herbæ per tri-duum in aceto madesunt, deinde excoctis dum amplius dimidio cōsum-  
25 ptum fuerit, mel adiicitur: ubi unita fuerint, admiscēt lathyrides, costus, coccum gnidiū, spica nardi leuigata, & si uoles postquam perfecte cocta fuerint, oxymel adiungis. Modus summus est uncia, aut pro uirium ratione: bene facit podagricis affectibus & comitialibus, ac in quibus uacuare simul & crassos humores educere opus est.

30 PURGATIO AD EDUCENDVM AQVAS QVAE  
constat caryophyllo.

Aloës, epithymi, caryophylli, cocci gnidii, petroselini, rheu Pōtici, singulæ semūciæ, euphorbii scrupuli quatuor, mellis quod satis est. dat cochlearis mensura.

35 PURGATIO EX RHODOMELITE  
confecta, Alexandri.

Rosarum succi sextarii duo, mellis sextarius, scammoniz uncia quatuor. summus modus est quinque cochlearia: leuior, duo: medius tria. ALITER. Mellis libra, rosarū succi libra, piperis drachmæ duæ, scammoniz drachmę  
40 octo, mastiches drachmæ quatuor, zingiberis drachmæ duæ. ALIO MODO, QVO EGO VTOR. Spicæ nardi, asari, epithymi, singulorū semū-

cia: macerantur in aqua hemina per triduum: ubi mediocriter incoxeris, misceto aqua rosarū succi sextarium semissem, mellis tantundem. Postquā adusq; spissitudinem fuerint incocta, scammonia sescuncia admiscetur.

PVRGATIO EX MALIS COTONEIS.

Malorum cotoneorum tostorum uncia quatuor, piperis uncia sex, scammonia drachma, mellis uncia quinque: trita exhibentur cochleario instar uncia, aut pro uiribus.

COMPOSITIO DIA CITRIV, QVOD EST,

ex malo medico, stomacho utilis.

Mali medici corticis carnisq; pondo in aqua sextario uno & semisse ad tertias decoquitur, mellis sextarius semissis adiicitur: ubi mellis spissitudinē ex coctione acceperint, inspergitur laxigati piperis longi uncia, scammonia tostata in fermento tantundem.

BYCELLATVS PVRGANS.

Scammonia tostata uncia, piperis, apii feminis, singulorum scrupulum, sceniculi, anisi, singulae uncia, mellis libra: tosta mediocriter instar uncia datur in condito.

OLIVAE PVRGANTES.

Scammonia uncia, piperis tantundem, epithymi, cumini torrefacti, petroselinij, rutae foliorum, menthae uiridis, singulorum drachma quatuor, laserpitii drachma, palmularū uncia quinque, mellis tantundem, aceti heminae duae, oliuarum colymbadum sextarius, scissarum uidelicet: quidam & gari momentum addunt. Modus est quinque scrupula aut septem aut nouem.

PASTILLVS PVRGANS.

Scammonia drachma quatuor, euphorbiae tantundem, phylli, piperis, singulorum drachmae duae, mellis libra. datur instar uncia.

FVSICA PVRGANS ET STOMACHO GRATA.

Cumini, sceniculi, singulorum uncia, pulegii, apii, anisi, singulorum semuncia, epithymi, scammonia, singulorum uncia, salis uncia duae. Summus modus datur scrupulis duobus in posca, nonnulli etiam euphorbiae scrupula quatuor adiiciunt.

VINVM PVRGANS IN HYDROPICIS.

Scillae tres unciae, apii feminis uncia sex, piperis drachma, capparis radices drachmae quatuor, cocci gnidii cortice exuti drachma, folii malabathri galbuli duo, uini heminae duodecim, mellis sextarii tres: scilla contusa uino superfunditur, reliqua leuigata miscentur.

HALATIA, QVASI DICAS EX SALE CONFECTA, PVRGATIO.

Salis communis torrefacti drachmae sex, apii feminis, zingiberis, panis sicci, singulorum scrupula sex, anisi, piperis, singulorum semuncia, scammonia, epithymi, singulorum uncia. datur circiter cochleare.

COMPOSITIO DIA HERMODACTYLV, AD PODAGRAM.



Hermodytyli quadrans, anisi, cumini Aethiopici, ameos, thymi summi-  
tatum, piperis albi, zingiberis, singulorū scrupula tria, epithymi semūcia:  
exhibentur scrupulis quatuor. quidam scrupula sex dant mane cum cōdi-  
to, aut mulsā, aut aqua calida. ALITER EADEM PURGATIO. Her-  
modytyli uncia, cumini Aethiopici, anisi, agarici, zingiberis, singulorum  
scrupula sex, mastiche, spicē nardi, singulorū scrupula duo, musci filiqua,  
cnecri scrupula duo, datur quatuor scrupulis cum hydromelite. Scammos-  
niam, quod stomacho sit inutilis, damnamus. Si autē liberaliore uacuatio-  
ne opus sit, scammoniae filiquas treis mensuræ admiscebis: loto exhibes.

10 CATAPOTIA QVAE CONSTANT LAPIDE ARME-  
nico, arthriticis potissimum exhibenda.

Aloēs unciae quatuor, scammoniae unciae sex, agarici uncia, epithymi tan-  
tundem, lapidis armenici scrupula duodecim: cassiae uncia, spicē nardi un-  
cia, scillae roste sextans, croci scrupula duodecim: rhodomelite excepta  
15 duobus scrupulis exhibentur.

COMPOSITIO DIA. CORONOPODIV, AD  
eadem efficax, ad quæ ex hermodytylo cō-  
fecta, stomacho utilis.

Zingiberis scrupula duo, piperis scrupulum, agarici scrupula decem, cni-  
ci partis interioris scrupula quatuor, coronopodii rudicis scrupula sex. dā-  
tur scrupula tria: quibus alius est difficilis, filiquæ uigintitres, quæ faci-  
unt omnino L obolos 7 septem aut ferè octo. ubi uenter inanitus est, ad la-  
uacrum duces: inde ouis & pane enutries.

MEDICAMENTVM EX CYRENAICO LI-  
quore ad febrem quartanam.

25 Lactis cyrenaici, piperis, zingiberis, rutæ foliorum, singulæ drachmæ. da-  
tur ad nucis auellanae magnitudinem.

PVLVS AD PURGANDVM, TVMIDIS ET ELEPHAN-  
ticis singulariter efficax, & in quibus humorem cras-  
sum glutinosumq; emoliri uoles.

30 Cucurbitis duabus syluestribus circūcisis semen eximetur, interiore ipsa-  
rum carne relicta, dulci oleo ipsas replebis, & propriis operculis obiectas  
pernoctare sines, insequēti die uacuato oleo cucurbitas in aqua decoques  
dum tabescant, deinde ipsis proiectis oleo aquæ tempera nigri ueratri  
35 triobolum adiunges, scammoniae denarium: ubi iam cum his pulcicu-  
lam è simila, aut panem siccum leuigatum incoxeris, inde egroto dabis te-  
nui pridie ufo uictu, pilulas ad nucis auellanae magnitudinem, octo, aut  
decem, aut plurimū quatuordecim, & porioni aquam calidam exhibebis.

QVOMODO EOS QUI PURGANTVR, TVERI CON-  
ueniat, quidq; faciendum ubi medicamentum pur-  
gans nihil profecerit.

Cap. VI.  
O iii

\* Impressū  
habet octo.  
restitutū ex  
Alexandro  
ratioe id est  
genere.  
L. Impressū  
nō habet.

Dr hoc sal-  
tū ad  
Sibacū  
inueni 4. 12



Vmmatim in omni purgatione efficaci, medicamētum homini quem certa prius uictus ratione alueris, ieiuno & concoctione obita trades, ac à somno quoad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu abstinere usq; ad consummatam purgationem compelles.

EX COMMENTARIIS PHILAGRII.

At si in ediam non tulerit, aut quòd uentriculi os ad bilem cōtrahendam expeditū ex longa penuria præcedēte habeat, aut alia eiusmodi de causa, dabitur ipsi panis ex uino aquoso, aut ptisanæ cremor aut chōdri, idq; nõdum incepta uacuatione, (sic enim cibus corrumperetur) sed protinus ubi medicamentum fuerit epotū, sic enim nonnunquā ad celerem medicaminis motionē pondere suo opitulatur. Si uerò quocunq; medicamēto ad aluum emolliendam assumpto quis non purgetur, neq; uacuetur, nullo accedente periculo nihil moliedū est. At si magnitudo morbi urgeat, aut æger uellicetur, distendatur, & lancinationem expertus fuerit, clyster statim necessariò iniiciat. Si ne sic quidē uenter respondeat, corpore rosionē & ueluti euerfionē sustinente, lauare liberaliter inungēdo oportet: ubi repletū est grauaturq; sanguinis dimissio cōgruet, præsertim ubi multi cōpos sanguinis homo fuerit, oculos rubros habeat & emissitios, non ex natura, sed acquisitò ex medicaminis potione. Vbi horum nihil infestat, sed morsus & uellicatus affligit, à balneo cibum protinus offeres, uinum liberalius potui dabis, atq; interea clysterem inseres, nisi subsistat cruciatus, rursusq; lauabis. Esto autē oleum quod in aluum dabis rutaceum, aut ex alio quopiam status experte præparatum.

SI PURGATIO MODVM EXCEDAT. Cap. VII.



I purgatio maior sit impendio, curis infricari debet, & lauari calida: ante balneū uinū tenue, rubēs & flauū dari, tale siquidē celerrimē in totū corpus distribuitur: itē panis ex eo madens, & malum punicum. Quod si euacuatio perseueret, artus uinculis excipientur, quæ è summo deorsum distributa, constringant, & non nihil sanguinis & spiritus excipiāt: dabimusq; potui theriaces ex carnibus uiperarum momentum. deducit enim in cutem, subitòq; reuellit humorum in uentriculum confluxum, obtunditq; medicinæ purgantis quod ceu uirosum est & medicatū. huius penuria pastillos theriacos, præterea compositionem dia spermaton, & Philonium appellatam: imò etiam cucurbitulis supra stomachum, & cataplasmatibus ex polēta & mulso uti, prodest, deinde epithematis astringentibus: præsertim ubi ex totius corporis frictione, & medicaminum potu, subsidium fuerit sequutum. Aer ipsius uitandus qui frigidus nimium aut calidus existat: ille siquidem materiam à foris intro compellit, fluoremq; auget: hic discutit, & uires resoluit. At si ex intestinorum quæ medicamento irritatur, erosione, uacuatio oritur,

delinere commemorata oportet, & in alium dare quæ acrimoniam retundunt, adipem anserinum scilicet, uinum dulce, nardum & consimilia.

## DE HIERIS ANTIDOTIS.

Cap. VIII.

## HIERA ANTIOCHI.



- Hamēdryos, agarici, colocynthis medullæ, stœchados, singulorum denarii decem, opopanax, sagapeni, petroselini, aristolochiæ sarmentacea, piperis albi, singulorū denarii quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, croci foliorum, singulorum denarii quatuor, mellis quod satis est. ALITER. Colocynthis carnis denarii uiginti, scillæ tostæ, agarici, ammoniaci thymiamatis, ueratri nigri corticis, scammoniz, hyperici, singulorū denarii tres, epithymi, polypodi aridi, bdelli, aloës, chamēdryos, marrubii, cassiæ, singulorum denarii octo, myrrhæ troglodytidis, opopanax, sagapeni, piperis cōmunis & longi & albi, petroselini, cinnamomi, croci, castorii, aristolochiæ longæ, singulorum denarii quatuor, mellis quod sufficit.

\* Crisostomus  
decm.

## HIERA IVSTI.

- Epithymi drachmæ duodecim, marrubii, stœchados, chamēdryos, ueratri nigri, scammoniz, agarici, piperis longi, scillæ tostæ, singulorū denarii sedecim, euphorbii, colocynthis carnis, aloës, croci, gētianæ, petroselini, guttæ ammoniaci, sagapeni, singulorū drachmæ octo, opopanax, polii, cinnamomi, myrrhæ, spicæ nardi, iunci odorati floris, pulegii, singulorū denarii quatuor, aristolochiæ longæ & rotundæ, utriusque denarii duo, mellis quod satis est. datur scrupulis duobus, aut tribus, aut quatuor cum mulsa & sale.

## HIERA GALENI.

- Chamēdryos, piperis longi, piperis albi, stœchados, ueratri nigri, scammoniz, spicæ nardi, scillæ tostæ, (nonnulli etiam epithymi) singulorum drachmæ sedecim, myrrhæ, croci, ammoniaci suffiminis, euphorbii, singulorum denarii octo: excipiuntur melle.

## HIERA RVFI.

- Cucurbitæ sylvestris, quæ sicyonia uel colocynthis dicitur, carnis denarii octo, chamēdryos denarii decem, sagapeni denarii octo, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum denarii quinque, cinnamomi denarii quatuor, uel cassiæ octo, spicæ, croci, polii, myrrhæ, singulorū denarii quatuor, mellis quod satis est.

## HIERA ARCHIGENIS.

- Marrubii, agarici, chamēdryos, colocynthis carnis, stœchados, singulorum drachmæ decem, opopanax, sagapeni, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorū drachmæ quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, polii, croci, singulorū denarii quatuor: arida tunduntur simul & incernunt, opopanax aut, sagapenū, & myrrha cōtusa, mulsa per noctem unam in pila macerantur, deinde leuigantur, & siccis admiscuntur: melle

optimo excepta reponuntur in uitreo uase aut plumbeo. hæc ratio omnium hierarum communis est. Summus ipsarum modus est denarii duo: as fumatur & salis denarius, mellis heminae duæ, aquæ quantum satis est. Quod si uehementiores ad purgandum uoles efficere, quibus scammonia non inest, iniicietur, & his singulis obolus.

### QVAE SEDI ET VMBILICO

illita purgent.

Cap. IX.

#### ILLITIO SEDIS AD FLATVS EXCVTIENDOS.



Vta cum melle in tenuissimum pollinem redigitur, ut unus succus fiat, & penitissime intra sedem delinitur. Efficacissimū uero est, si cumini momentum & nitri assumat, uel cyclamini succum: stuppa exceptum imponitur, aut glādis forma melle apposito, flatus siquidem multi erumpunt, uentrem leuantes.

#### PERVNCTIO SEDIS VENTREM MOVENS, CHEZANANCE.

Alumen cum melle leuigatum coquitur quo ad rubescat, atq; hoc sedes perungitur, facile enim copiosa citra laborem subducit.

#### MEDICAMENTVM QVOD VMBILICO ILLINITVR,

epomphalium dictum, ad aluum subducendam.

Cyclamini denarii quatuor, nitri denarii tres, ueratri nigri & albi, singulorum denarii duo, colocynthidis denarii tres, scammoniae denarii duo, elaterii succi denarii quatuor, cocci gnidii totidem, caricarum pinguium unciae duæ, fellis taurini uncia.

#### ALIVD LAVDATISSIMVM.

Elaterii, lathyridis, galbani, cyclamini, ueratri nigri, singulorum denarii quatuor, colocynthidis carnis denarii octo, cucumeris syluatici recentis, scammoniae, cocci gnidii, tithymali, singulorum denarii duo, terebinthinae denarii tres: excipito hæc felle taurino, & unguinis modo utitor. Quidam uero adiungentes faui uncias septem, & sicyonii quod satis est, emplastri modo imposuerunt.

#### QVAE MEDICAMENTA VOMITVM CITENT,

& quomodo helleborum exhibeatur.

Cap. X.



Omnia utuntur & sani, qui ciborum humorum ue copia grauantur: & acuto morbo laborantes, quum à pituita aut eiusmodi quodam infestantur. At medicamentis uomitum facientibus neq; sani neq; acuta ægritudine occupati, uti permittetur: sed in longis profunt affectibus & praesertim induratis, quæ ualidam commotionem desiderent, qualis est podagra, morbus comitialis à stomacho originem trahens, elephantia, aqua subter cutem, melancholia & per similes. Aduersatur uomitus sanguinem excreantibus, malo praeditis stomacho & iis qui suffocationibus opportuni sunt. Promptissimum igitur ad uomitum ciendum est Cyprinum, digitis aut pinnis in id intinctis, demis-

sisq; in guttur. item nardi gallicæ radicum denarii septem ex mulsa poti,  
 sursum ualenter purgant: similiter etiam radicum betonicæ, quæ cestron  
 dicitur, quinq; aut sex denarii cum mulsa sumpti: & daphnoidis tria folia  
 uiridia in leuorem coacta comestaq;. Item elaterii obolus in aqua assum-  
 ptus, sursum piruitam & bilem expurgat: & herbæ pediculariæ grana quin-  
 decim cum mulsa crassiore. ex bulbis autem qui manducari solent, si cru-  
 di assumantur. Narcissi radix elixa, sursum per uomitum purgat. idem fa-  
 cit apii radice pars superior, æri propior, uocant eam nonnulli chamæra  
 phanon. Inferior autē pars per inferna purgat, & rota uero sumpta, utrin-  
 que: radiculæ prædictis minus quidem purgant, sed utilius: cæterum con-  
 uenit ipsas acreis & recentis adhuc minutim concisas, ante duas tres ue-  
 horas in oxymelite maceratas, quàm fieri potest multas, assumere, ter qua-  
 ter ue à cœna uomitu excitato, semel autē ieiuni uoment, & sæpe oxymel  
 absorbeant: ubi duabus horis inambulauerint, egeli dam bibētes aquam,  
 digitis aut pinnis in os demissis uoment.

QVIBVS MODIS VERATRVM EXHIBEATUR.

Veratrum dari debet, ubi longi ualentesq; morbi sunt, & spes ex aliis præfi-  
 diis adempta est, quod ægritudo omnibus ipsis fortior exiterit. Conue-  
 niunt autem siue continue infesta uerit morbus, ut aqua inter cutem, ele-  
 phantia, malus corporis habirus, resolutio, & id genus alia: siue statis tem-  
 poribus tepetatur, ut morbus comitialis, podagra. Porro quum plures hel-  
 lebori exhibendi modi existant, simplicior quidem, & præparatio potius  
 ad id assumendum, talis est. Raphano arundine puncto dissectoq;, uera-  
 tri albi optimi radicū præsemina inferuntur: ac ubi una nocte in eo  
 permanferint, proiciuntur: raphanus minutim concisus, cum oxymeli-  
 te in dictum modum egro exhibetur, nimirum uomitionibus assuetis, at-  
 que his horis quot diximus interpositis, ad uomitum cogendus est. At pro  
 prius ueratri exhibendi modus hic fuerit. Veratri optimi sextans in aquæ  
 hemina diebus quinque maceratus, ad aquæ tertias incoquitur: ubi ex pres-  
 sum ueratrum est, aquæ misceretur tantundem mellis. excoctum usque ad  
 spissitudinem prædicto modo, laborati exhibetur, præterq; uomere prius  
 assuetis, etiam ieiuno, probeq; defuncto concoctione, & cui alius respon-  
 derit, uel sua sponte, uel clystere semel bis ue iuxta uirium rationem soli-  
 citata. Omnium uero efficacissimus modus talis est. Dissectis ueratri ra-  
 dicibus in scami magnitudinem, (nam in renuissimū redactæ pollinē ui-  
 rium efficacia strangulationes pariunt) ueratri plurimum denarios duos,  
 modice unū, imbecillioribus prisanæ, cremori aut alicæ, aut id genus ali-  
 cuius incoctū, potui dabis: ualērioribus ex aqua calida aut mulsa. Incipit  
 aut purgatio post tres quatuor ue horas: quibus tardior est, iis melius pur-  
 gatur. Quod si uomitus lente oboriat mulsa potui data, uomere æger co-  
 gendus est, pinnis oleo madidis in os demissis. sine sic quidē proficiatur,

¶ Repositū  
ex Dioscori  
de.

\* Imprefū  
habet nāā 20  
3iv, id est, fe-  
cundum ra-  
tionem. ma-  
nufcriptum  
autem nōt' 20  
179v.

in balneum deduci debet. Vbi iam uomere inceperit, si uacuatio\* modice  
respondeat, nullum ægro negotium faceſſere oportet: ſi autem uellicatū  
aut conuulſionem experiatur, hydrelzum potui dabitur, ſimul & in aluū  
ab inferiore parte indetur: quod alioquin in his qui helleborum aſſumūt,  
nonnūquam accidit, unde medicamento coaceruationem facilius ferunt. 5  
Si anima deficiat, naribus quæ odorē mouent admotis & conſimilibus ui-  
reis recolligere, aliisq; ut uerſimile eſt ſuperuenientibus caſibus, eadē ac-  
commo dare oportet. At multa facta inanitione, cibus dari ſomnusq; per-  
mitteri debet, & alia ſicuti in his qui nimium purgantur diximus, factitāda  
ſunt. Si perſeueret uacuatio, cucurbitulas ſtomacho deſigere, & artus uin- 10  
culis excipere conuenit: ſi autem rationabiliter facta ſit, muſſa iuſta por-  
tio propinabitur, qua ſuperfluitates è medicamēto reliquæ eluantur: mox  
cibus boni ſucci offerretur. Iam uero in iis qui medicamenta per os abomi-  
nantur, omnino autem hellebori potionem requirunt, Antyllus huius-  
modi quodam uſus eſt clyſtere: hellebori albi drachmæ duæ in aquæ ſex- 15  
tario per diem & noctem unam macerantur, ſequenti die ueratrū in aqua  
ad dimidias coquitur, inde in aluum datur, ut uomitum cōcitet, ſuperius  
purgat paulo imbecillius quā ueratri portio. Vbi abunde purgatum eſt,  
glande acri impoſita, aluus irritatur, ut quod iniectū eſt reddatur, & æger  
non amplius uomat. Facta excretionē, muſſa ſemel biſ ue inteſtinis ablue- 20  
dis iniicitur. ipſe uero Antyllus tradit fieri etiam glandem ex helleboro al-  
bo tuſo cribratoq; deinde cocto melle excepto, ac clyſteris modo ex helle-  
boro præparati, ſuperiorem uentriculum purgare. Verum hic eſt modus  
probator, in quo uidelicet purgationem diſpēſare nobis licet: pondus igi-  
tur ſit ueratri drachmæ duæ, cæterum glans circumapretur aut uinciatur 25  
ſtuppa ſolidiore, cuius initium extrinſecus per ſedem recipiatur, quò glan-  
dem ubi ſatis purgando profecerit, auferre poſſumus. hic modus purgat  
quidem abſolutiſſime, non autem ſuffocationem aut aliud quoddam pe-  
riculum inducit.

## DE DIFFERENTIA ANTIDOTORVM.

Cap. XI. 30



Ræſatio Galeni de antidotis in hunc modum habet. Medici  
nas quæ non extrinſecus impoſitæ, ſed intra corpus aſſumptæ  
affectibus medentur, antidota ueteres nuncupant: cæterum  
triplex iſorum eſt differentia, quædam enim lethaliū me-  
dicamentorum gratia offeruntur, quædā ob beſtias uiuus iaculanteis, quas 35  
Græci τοξολωγæ appellant, quædam uero morbis ex prauo uictu contractis  
auxiliantur: nonnulla treis hos uſus promittunt, quemadmodum etiam  
quæ theriaca dicitur.

HEDYCHONÆ QVOD THERIACEN  
ingreditur, confeſtio.

Aſpalathi radicis corticis, calami aromatici, coſti, aſari, xylobaſſami, phu, 40





nucis auellanae, cum tribus uini cyathis, quotidie bis bibatur. Similiter facit ad eos qui ex quadam latente causa periclitati sunt, corruptela quae corpus conficit, lethalis medicamenti qualitatem imitata, quemadmodum in pestilentia correptis potissimum fit, semel quotidie, in aliis uero affectibus à decē annis usque ad uiginti usus eius celebratur, in tussi, thoracis doloribus aut laterum: si febris abest, cum mulso: si illa uratur, cum hydromelite, sub noctem ad fabam Aegyptiae magnitudinem exhibetur. Sanguinem autem excreantibus omnibus, si morbus recens est, ex posca: si uetustior, ex symphyti decocto, quantum faba Aegyptia explet, idque mane & uesper. At quos inflationes & tormina iuxta umbilicum, aut morbus coeliacus male habet, ex aqua calida ad fabam Aegyptiae magnitudinem mane assument. ceterum appetentiam uehementem excitat, rigores, perfrictionem, & bilis uomitum, praesumptum ante accessiones dilucit, menses trua ducit, & fetus mortuos eiicit, fabam Aegyptiae instar porum ex mulsa, aut passo in quo rura aut dictamnium decoctum sit. Item ad uocem abscissam ualet & per se & cum duplicato tragacantho ex mulso aut passo porum, atque sub lingua retentum eliquatumque: lieno sis, iocinotosisque ex posca, si scirrurus adest, ex oxymelite, aut aceti scillini sesquicyatho: in nephriticis, cum oxymelite circa fabam Aegyptiae magnitudinem: dysentericis tantundem cum decocto rhu, mane & uesper. Ad lippitudines autem summe etiam in hunc modum temperatum facit: antidoti & opobalsimi unciae duae, mellis cyathus: mixta paulatim unguntur. Idem denteis abstergit. plerique uero ut sanitatem ab iniuriis uindicent, noua luna ad graecanicam fabam magnitudinem ex eo sumunt, coeotione bene obita, cum uno mellis cochleari, & duobus aquae cyathis. Similiter etiam in peregrinationibus eo utuntur, quum prauis cuiusdam aëris aut aquarum in itinere suspicionem habent.

## SALES THERIACI.

*L. Haec uide-  
tur à scriba  
quodam ad-  
dita, qui sali-  
tem theriaci  
rum descri-  
ptionem in-  
curia omi-  
sit, eoq; in  
calcem libri  
reiecit.  
Galenus li-  
bra 10a.*

Sales theriaci ante Mithridatium antidotum huc transferendi sunt, habes autem eorum descriptionem ad calcem libri septimi post caput de men-  
suris & ponderibus. Sumuntur uiperarum recēs captes numero quatuor, mox  
falis ammoniaci aut communis modius Italicus, deinde cum ipso in pilam  
coniecto runditur minutatim gentianae sesquilibra, aristolochiae rotundae  
sesquilibra, centaurii tenuis cornu librae duae, cardamomi, marrubii, singu-  
lorum unciae sex, trixaginis palustris, apii, chamaedryos creticae, singulo-  
rum libra, rutae satiuarum seminis sextarii duo: melle attico in unitatem co-  
guntur, & dimidia ipsorum pars in nouum fistile conuicitur, deinde qua-  
tuor uiperarum uiuae, quibus adduntur etiam scillae tenerae recentes quinq; mi-  
nutim concisae, hinc reliqua misturatur portio dimidia superinicitur: ac ubi  
olla cooperta diligenter fuerit, tribus quatuorue foraminibus corpus ipsi-  
us pertundes, ut per ea uapor coctionis modum significet. Primum enim  
uidebitur fumus exire copiosus, obscurus admodumque turbidus, qui igne

- bestias iam inuasisse nuntiet, quando te animum diligēter aduertere conuenit, ne tandem fumi huius aërem è uiperarum exhalatu uiciarum inspires. Postea, ubi uapor cessauerit, & renuem quandam flammā per foramina eiacularam conspexeris, tunc ipsa tosta esse quam optime censeo, atq;  
 5 ira fictili ab igne sublato tota die noctuq; refrigerant. Deinde a pertos ex-  
 emprosq; carbones diligenrer tundiro, & cum hisce misturis cribro: Ru-  
 tæ syluestris feminis, hyssopi cretici, singulorum unciiis nouem, fœniculi  
 feminis, nardi gallicæ, stachyos Scythici, singulorum unciiis \* sex, petro se-  
 lini macedonici, malabathri foliorum, singulorū 0 uncia, amom, iuuæ,  
 10 ormini feminis torrefacti, singulorum unciiis tribus, origani summitarū,  
 thymi summitarum, singulorum unciiis \* duabus, baccharum iuniperi, pi-  
 peris albi, fœniculi, singulorum libris 0 octo, laserpitii radices unciiis decē,  
 coriandri feminis, zingiberis non perforari, (saryrii J feminis uel radices,  
 pulegii, fœfelis massaliotici, menthæ, singulorum unciiis sex, cassiæ fistulæ  
 15 unciiis duabus, cinnamomi uncia. Porro ego sales ipsos preparauī, non cō-  
 bustis bestiis, sed ipsarū pastillis, quēadmodū in theriaca, sic ut hos iis quē  
 cum bestiis cremantur admiscerem, quō si quam in se amarulentiam ha-  
 berent, eam per adustionem deponerent: tantumq; pastillorum modum  
 iniēci, quantum uiperarum quærernionem habere coniiciebam, atq; hac  
 20 ratione longē præsantissimi euaserunt.

## ANTIDOTVM MITHRIDATIS, DIA SCINCV.

- Myrrhæ troglodyticæ, zingiberis, cinnamomi, singulorum denarii decē,  
 spicæ nardi, thuris, thlaspis, opobalsami, iunci odorati floris, costi, stæcha-  
 dos, fœfelis, galbani, resinæ terebinthinæ, piperis longi, castorii, hypocisti,  
 25 dis succi, styracis, malabathri foliorum, singulorum denarii quatuor, cas-  
 siæ nigre, polii, piperis albi, trixaginis palustris, dauci feminis, carpobalsa-  
 mi, cyphios, bdellii, nardi gallicæ, gummi, petroselini, opii, cardamomi, fœ-  
 niculi feminis, gentianæ, foliorum rosæ, singulorū denarii octo, dictamni,  
 anisi, acori, phu, singulorum denarii tres, mēu athamātici, acaciæ, alui scin-  
 30 ci, hyperici feminis, singulorum drachma & semissis, uini & mellis quod fa-  
 tis est. Præparatur theriacæ modo. Galenus tradit ad eadem hoc ualere,  
 ad quæ illa, præterq; ad uiperæ morsus, in eos enim theriace efficacior est.

## ANTIDOTVM DIA HAEMATON, HOC EST

ex sanguinibus, ad omnia uenenata, & letha-  
 lia rhedimenta.

- 35 Piperis albi & longi, costi, acori, phu, anisi, dictamni cretici, singulorū de-  
 narii duo, amomi, opobalsami, rutæ syluestris feminis, fœniculi feminis, cu-  
 mini æthiopici, anethi, anatis masculi sanguinis sicci, hædi sanguinis, an-  
 serini sanguinis, anatis fœminæ sanguinis, napi syluestris feminis, singulo-  
 40 rum denarii tres, gentianæ radices, trifolii, iunci odorati floris, lachrymæ  
 thuris, rosarum siccarum, singulorum denarii quatuor, cinnamomi dena-  
 p

\* Galenus  
sex.

rii \* duo, trixaginis palustris denarii octo, petroselinii, polii, myrrhæ, nardi, singulorum denarii sex, cassiæ denarii tres, lactis cyrenaici totidem, stæchados denarii quinque, asari denarii duo, guttæ ammoniaci denarii tres, mēu, athamantini denarii duo, agarici tantundem, carpopalsami grana viginti, mellis cocti quod satis est.

## OXYMEL SIMPLEX.

Aceti quàm macerrimi albi sextarius, aquæ sextarii duo, mellis sextarius, ad liquidioris mellis spissitudinem incoquantur, sic ut mel interea despumetur.

## ACETVM SCILLITES.

\* Dioscori  
des septē, ni  
cine sunt li-  
tera (C) l.  
○ Diosco-  
rides quinque

Scillæ albi coloris in taleolas concisæ libræ sex quadraginta diebus in umbra siccantur, deinde ubi rursus purgatæ fuerint, in aceti generosi sextariis duodecim, diebus \* sexaginta in sole madescere sinuntur, uase bene operculato. post eum numerum dierum scilla ex aceto expressa proiicitur; ipsum uero acetum defæcarum transfunditur. Nonnulli uero scillæ libram in aceti sextarios ○ sex coniiciunt. alii uiridem scillam in acetum pari utriusque modo demittunt, sinuntque usque ad mensis sex, atque hoc modo maiorem incidendi uim acquirit. Valet autem acetum scillatum collutum ad fluida oris uitia & plerisque interaneorum affectibus potum medetur, quibus exulceratio coniuncta non est. item aliis compluribus efficax est.

## OXYMEL SCILLINVM.

Scillæ partis internæ tenerioris pondo dua, aceti acris albi sextarii quindecim, piperis, petroselinii macedonici, singulorum uncia duæ, dauci cretici, ameos, anisi, nardi gallicæ, ligustici, asari, cardamomi, spicæ nardi, amomi, rheu pōtici, singulorū uncia semissis, fœniculi seminis, cumini, laseris, zingiberis, pirethri, hyssopi cretici, costi pulegii, singulorū uncia, menthæ uiridis fasciculus, ruræ uiridis turiones quinque, mellis attici sextarius, sapæ sextarii duo, apii uiridis fasciculus: interior scillæ pars alba contusa in acetum mittitur, finiturque diebus septem sub caniculæ æstu madescere, deinde scilla sublata, arida quidem iam cōtusa: uiridia, nō contusa in acetum cōiiciuntur. Rursus post dies septē omnibus exemptis, mel & sapa aceto adiiciuntur, excoctaque usque ad spissitudinem in uitreum uas defunduntur. Cæterum præsidio hoc & ieiunus instar potionis utere, & post cibū liquidaminis modo, est enim longe utilissimum.

## MEDICAMENTVM GALENI E' SCILLA, COMITIALIBUS POTISSIMUM EFFICAX.

Scilla minutim manibus contusa in uas melleum demittitur, eo que diligenter operculato in loco ad meridiem spectante sub æstu caniculæ reponitur, quadraginta diebus post caniculæ sidus in superficie uase soluto scilicet corpus effluxisse deprehendes, exceptus igitur ipsius succus melle opti

mo edulcoratur, daturq; comitialibus quotidie cochleare, pueris exiguum, prouectis magnum. Ipsumq; scillæ corpus tritum cum melle datur cochleari, atq; hoc uirtute secundum est.

## PHILONIS ANTIDOTVM.

- 5 Piperis albi drachmæ \* uiginti, alterci denarii 0 octo, lachrymæ papaueris <sup>\* Oribasius uiginti quatuor.</sup> denarii decem, croci denarii quinq; pirethri, euphorbii, spicæ nardi, singuli denarii, mellis Attici uel alterius generosi non cocti quantum sufficit. datur <sup>0 Oribasius uiginti.</sup> prouectioribus ad nucis auellanae magnitudinem: minoribus fabæ instar: pueris, ciceris. Medicamentum est quod dolorem sopit & somnum accersit.

- 10 **ATHANASIA DOLOREM LENIENS, PLEVRITICIS**  
accommodata, auctore Oribasio.

Cassiae drachmæ octo, spicæ nardi, amomi, croci, opii, styracis, myrrhae, costi, singulorum drachmæ quatuor, mellis despumati quod satis est, datur quemadmodum Philonium.

- 15 **MEDICAMENTVM EX DVPLICI PIPERE,**  
eiusdem effectus.

Cardamomi, castorii, opii, singulorum denarii tres, myrrhae, costi, piperis albi & longi, galbani, singulorum denarii tres, croci totidem: excipiuntur discocto, & ad fabæ magnitudinem exhibentur.

- 20 **MEDICAMENTVM DIA CODION, ID EST,**  
ex papaueris capitibus & sapa.

Capita papaueris uiridia minime aquosa octo decem uel, die postquam decerpta sunt, incoquantur cum dulcis radiculae uncia, madefacta in sapa sextario rursus incoquantur dum tabescant, ubi mediocris spissitudo facta est, ab igne sublata defenduntur: usus medicamenti est in febris ubi sopire opus est, & quum tenuis defluxio à capite in thoracem defertur.

**MEDICAMENTVM EX CAPITIBVS**  
papaueris & melle.

- 30 Capita papauerum, ut dictum est, & dulcis radiculae uncia, in aqua pluuia lis aut puteanae sextario donec intabescant excoquantur. ubi expressa fuerint, semisextarius mellis decocto iniicitur: excocta usque ad spissitudinem, dantur: in quibus præter quod dolorem lenire & somnum conciliare oportet, etiam purgatione opus est, & abstersione eorum quæ in pectore aut pulmonibus renibusque inhaerescunt.

- 35 **DIA CODION, COMPOSITVM.**

- Aquæ, in qua papauerum capita decocta sunt ad prædictam commoderationem, sextarius, uini dulcis heminae duæ, mellis podo, croci, hypocistidis succi, singulorum drachmæ quatuor: concoquantur usque ad spissitudinem, uerum stomacho utilius est medicamentum ex melle, capitum papaueris decocto, & malis cotoneis præparatum: efficacius si præter capita, seruula campana & dulcis radícula aquæ incocta fuerint.

## ECLEGMA EX MARRUBIO, SIMPLEX, TABIDIS

maxime accommodatum.

Marrubii comæ pōdo in aquæ heminis sex decoquitur ad tertias, inde herba proiicitur, adicitur autem aquæ meli, incoquanturq; usq; ad mellis spissitudinem instar cochlearis exhibetur. 5

## EX MARRUBIO, COMPOSITVM.

Marrubii comæ, iridis illyricæ, hyssopi, pulegii, dulcis radiculæ, apii, singulorum sextans, caricarum pinguium quadrans, nuclei pini resinati tantum dem: minutim contusa arida cum caricis in aquæ sextarios tres demerguntur, coquanturq; usq; ad tertias, illis exemptis, aquæ mellis libræ duæ indūtur, & ad crassitudinem melleam incoquantur. 10

## MEDICAMENTVM EX ERVIS.

Amygdalarum amararum sextans, farinæ erui triens, hyssopi tantundē, iridis semuncia, nucleorum pini torrefactorū uncia duæ, mellis sextarius, uel quod satis est. 15

## MEDICAMENTVM DODECATHEON.

Iridis illyricæ triens, erui triens, hyssopi, urticæ seminis, dulcis radiculæ, scænu græci, singulorum sextans, bulborum, seminis lini torrefacti, singulorū triens, melanthii scrupula octodecim, pulegii scrupula sex, nucleorum pini torridorum sextans, piperis scrupula sex, mellis quantum sufficit. 20

## ANTIDOTVM, SOTERA.

Spicz nardi scrupula triginta nouem, myrrhæ scrupula uigintiseptē, croci scrupula triginta septem, castorii scrupula triginta nouem, opii scrupula triginta sex, petroselinii scrupula quadragintaquinque, anisi scrupula nouem, apii scrupula septem, iunci odorati floris scrupula triginta sex, cassiæ scrupula duodecim, piperis longi totidē, sinonis seminis scrupula sex, styracis scrupula octodecim, amomi scrupula duodecim, felis totidem, hedychoi, costi, asari, singulorū scrupula octodecim, mellis quod satis est. 25

## EX STYRACE BECHICON, HOC EST, TVSSI EFFICAX.

Amomi, cassiæ, singulorū sextans, styracis, spicz nardi, singulorum sescūcia, croci, piperis albi, singulorū uncia, mellis sextarius: exhibet cochleariū. 30

## MEDICAMENTVM PHILOXENI, PVRULENTIS ET

longa defluxione infestatis idoneum.

Resinæ terebinthinæ denarii uigintiocto, nardi denarii sedecim, mirrhæ stillatitiæ denarii sex, cardamomi, bulborum, tantundē, croci denarii duodecim, galbani, denarii sedecim, amygdala amara octoginta, mellis hemina: ex aqua poratur, quantum faba Aegyptia explet. 35

## ESDRA, MVLTIPPLICIS VSVS, VEHEMENTER

enim desiccat.

Amomi scrupula sex, croci scrupula octodecim, dauci seminis scrupulū unū & dimidiū, sceniculi seminis scrupula tria, cassiæ sesciqui scrupulū, iunci 40

odorati floris scrupula quatuor & dimidiū, cinnamomi scrupula tria, hypocystidis succi scrupula quatuor & dimidiū, sulfuris unciz quinque, papaueris seminis scrupula quinque, pyrethri scrupula tria, petroselinis sesquiscrupulum, iridis illyricæ scrupula septem & dimidium, alterci seminis scrupula tredecim & dimidium, spicæ nardi scrupula septem & dimidiū, rutæ seminis sesquiscrupulum, anethi scrupula tria, cardamomi unciz tres, rosarum siccarum scrupula quatuor & dimidium, nerii floris sesquiscrupulum, est autē ueluti fibra ex qua oritur rosa, rhododaphnes & rosæ ipsius singulorum scrupula tria, theu scrupula sex, gentianæ scrupula sex, hedychoi  
 10 sesquiscrupulum, traga canthæ scrupula quindecim, licii scrupula sex, citri arboris foliorum scrupula sex, ocimi seminis sesquiscrupulum, anisi scrupula tria, costi, myrrhæ, singulorū scrupula sex, bdellii scrupula sedecim, artemisiz succi scrupula tredecim, rhu lyriaci scrupula uiginti quinque & dimidium, asari, uteri mergi, lapidis iaspidis, singulorū scrupula tria, piperis  
 15 scrupula quindecim, castorii sesquiscrupulum, cimoliæ scrupula sex, silonis scrupula nouem, styracis totidem, opobalsami scrupula duodecim, sese lis herbæ sesquiscrupulum, mellis unciz uigintiocto, uini quantū satis est.

MEDICAMENTVM EX MALORVM COTONEORVM CARNIBUS.

10 Malorum cotoneorū purorum libræ tres, coquuntur in uini peructusti sextariis tribus, deinde conteruntur: quibus piperis, anisi, ligustici, singulorum contritorum uncia admiscetur. Nonnulli etiam zingiberis semunciam adiungunt. quidam in uicem uini, aceto usi sunt.

MEDICAMENTVM EX SVCCIS MALORVM,

25 ad appetentiam abolitam & ægram concoctionem probatum.

Malorum cotoneorū maturorū succi sextarii duo, mellis laudati tantundem, acetis sextarius, zingiberis unciz tres, piperis albi unciz duæ: incoquantur ad spissitudinem. hoc Galenus ad eosque perfrixerunt præparat: in quibus autem bilis redundat, sine pipere & zingibere conficitur.

QVOMODO PARETVR MELAPLACONTVM.

30 Malorum cotoneorum purorum libræ sex in uino coquuntur quousque iptabescant, inde exemptæ conteruntur. nonnulli mellis libras octo adiciunt, coquantque igne leni, ferula agentes. ubi tam spissum totum euaserit, ut manus non inquinet, etiā tunc addunt contusi piperis uncias tres, anisi tantundem, petroselinis unciam. Sunt qui zingiberis unciam & mastiches tantundem misceant: \* deinde mixta instar semunciz formant, & cum lauri foliis componunt.

CYDONATVM CONTVSVM FRAGMENTIS SALVIS.

40 Malorum cotoneorum purorum frustulatim concisorū pondo octo, in uini sextariis totidem incoquuntur temperate, ut non dissoluantur, deinde

\* Exemplum  
uia uidentur  
hic de præparat.  
ta.

mellis despumati pondo octo, piperis uriciz octo, petroselini, anisi, singuli quadrantes, zingiberis quincunx, spicz nardi fescupcia, caryophylli uncia, ipsis admiscetur: omnia contusa ac modice incocta usq; ad iusculi spissitudinem auferuntur, quibus refrigeratis fragmenta simul cum iute componuntur.

#### MEDICAMENTVM DIA TRION PIPEREON,

cx triplici pipere.

Piperis communis, albi, & longi, singulorū denarii septem, zingiberis, anisi, thymi summitatum, singulorum denarii duo, mellis quod satis est.

#### ALIVD ORIBASII.

Piperis albi unciz duæ, piperis nigri, & longi, spicz nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyssopi, fescelis, dauci, petroselini, singulæ unciz, zingiberis denarii quatuor, mellis libræ tres.

#### ALIVD.

Piperis communis quadrans, albi uncia, longi tantundem, petroselini, cinnamomi aut cassiæ duplicatæ, zingiberis, singulorum uncia, mellis unciz una & uiginti, uel quod satis est. ego etiam thymi comæ unciam miscui.

#### DIOSPOLITES.

Cumini aceto madefacti torrefactiq; uncia, piperis, zingiberis, singulorū unciz duæ, rutæ uiridis fescucia, nitri drachmæ duæ & semis: melle excipit.

#### MEDICAMENTVM DIA CITRIV, HOC EST EX

malo medico, tardè concoquentibus efficax.

Aceti heminx tres, mali medici carnis pōdo libra, hyssopi, rutæ, singulorū fasciculus: per noctem in aceto madefacta ad tertias decoquuntur, expressaq; proiciuntur: aceto miscetur mellis sextarius, tursusq; incoquantur ad mellis spissitudinem: ubi in crassata fuerint, insperguntur asari, mēu, piperis albi, singuli sextantes: exhibetur cochleare mane, & dormituro.

#### PICRA, HOC EST AMARA, COMPOSITIO GALENI.

Aloës drachmæ centum, xylobalsami, mastiches, croci, spicz nardi, asari, cinnamomi, singulorū drachmæ sex. Quidā addunt etiam iunci quadrati floris & cassiæ, utriusque denarios sex. exhibetur drachma ex oxymelite.

#### PICRA EX OXYMELITE, AD STOMACHICOS,

uterum, & aquam inter cutem.

Aloës unciz quatuor, phylli unciz duæ, costi, cassiæ, amomi, iridis, singulorū denarius, fœniculi radices corticis libra, mastiches, nardi gallicæ, zingiberis, singulorum denarius, piperis denarius, mēu denarius, aceti, mellis, utriusq; sesquiseptarius: fœniculū in aceto prius excoctum proicitur, deinde mel additur. Vbi usq; ad melleam spissitudinē incoctis, reliqua detrita insperges.

#### MEDICAMENTVM EX LVPINO IECORE PRAE-

stantissimum.



Gentianæ, chamæpityos, petroselinii, marrubii \* succi, arcii, sinapis, scolopendrii, panacis radicis, rubricæ erythrodanæ, brassicæ seminis, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi, erucæ seminis, eringii radicis, polii, echii, eupatorii, baccarū iuniperi, lupini iecoris, helenii, pares modi: mel  
 5 le non cocto excipiuntur, mulsoq; coctionem non experto, ad nucis aulanæ magnitudinem dantur.

\* Græcæ est  
 X' dūcis,  
 id est succi,  
 arcii, forte  
 legendum  
 x' dūcis  
 id est fellis  
 ut sim. sic e-  
 nim Galeni  
 habet in si-  
 mili compo-  
 sitione.

## THEODORETUS DIA ANACARDION.

Anacardiorū fescuncia, croci, cassiæ, phylli, spicæ nardi, caryophylli, mēu, agarici, iunci quadrati floris, rheu, epithymi, singulorum denarii quatuor,  
 10 acori, piperis, singulorum fescūcia, aloës uncia tres, saxifragæ, mastiches, iridis i'lyriæ, singulorum fescūcia, myrobalanorum uncia, mellis libræ sex, uel quantum sufficit.

## THEODORETUS ALTERA DIA ANACARDION.

Aloës drachmæ sexaginta, agarici drachmæ uigintiquatuor, croci, cassiæ,  
 15 rheu pontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulorum drachmæ decem, costi, rutæ seminis, piperis albi, singulorū drachmæ octo, spicæ nardi drachmæ tres, xylōballami, asari, chamædryos, mēu, singulorū drachmæ quatuor, mellis quod satis est. Nonnulli hic quoq; addunt anacardia duo, datur drachmis binis cum mulsā.

## MEDICAMENTVM CYPHOIDES, AD IECHOROS, &amp; pectoris uitia.

Vuæ passæ catnis drachmæ uigintiquinq; croci drachma, calami odorati  
 drachmæ \* duæ, bdellii drachmæ duæ & semis, Leassiz sesquidrachma, cin-  
 namomi tres oboli, nardi totidem, iūci quadrati drachmæ \* duæ, myrrhæ,  
 25 resinæ terebinthinæ, singulorum denarii quatuor, aspalathi ramēti oboli  
 duodecim, mellis drachmæ sedecim, uini quantum sufficit.

\* Gal. dua  
 & semis.  
 L. Repositū  
 ex Gal.  
 \* Gal. dua  
 & semis.

## ALIUD CYPHOIDES, ALEXANDRI.

Croci, cinnamomi, bdellii, singulorū denarii quatuor, myrrhæ, calami aro-  
 matici, singulorū drachmæ duæ, aspalathi, iunci odorati floris, singulorū  
 30 drachmæ tres, cassiæ, nardi, singulæ drachmæ, terebinthinæ resinæ drachmæ  
 sedecim, vuæ passæ catnis drachmæ centum sexaginta, mellis sesquihe-  
 mina, uini Chii quod sufficit.

## DIA BACANVM MEDICAMENTVM, HEPATI accommodatum.

Bacani uncia, costi tantundē, phylli scrupula octo, piperis albi scrupula  
 35 sex, spicæ nardi totidē, mellis quod satis est, datur cochleariū cum tempera-  
 tura conditi. MEDICAMENTVM ZOPYROS.

Myrrhæ drachmæ quicq; croci, cassiæ singulorū drachmæ quatuor, cinnamomi  
 drachmæ tres, spicæ nardi drachmæ duæ, iūci odorati floris tantū  
 40 dem, piperis albi sesquidrachma, thuris drachma, costi drachma, mellis  
 quod satis est.

Syracis calamitis drachmæ sex, rhuris, amomi, croci, singulorū fescuncia, spicæ nardi drachmæ sex, phylli drachmæ duæ, piperis albi drachmæ sex, & communis octo, myrrhæ uncia, costi tantūdem, mellis quod satis est.

## CATAPOTIA DOSITHEI AD IECVR INSCRIPTA.

Aloës uncia, spicæ nardi, phylli, costi, singulorū scrupula duo, agarici scrupula octo, mastiches scrupula tredecim, epithymi scrupula quatuor, rheu scrupulum.

## OXYMEL SPLENICVM, HOC EST, LIENI DICATVM.

Capparis radicum corticis, scolopēdrii, spicæ nardi, asari, iridis, iunci quadrati floris, iunci rotūdi floris, anisi, cumini, fœniculi, acori, ericæ fructus, singulorū uncia, myricæ foliorū, salicis foliorū, apii radices, thuris arboris, scillæ, singulorū uncia duæ, aceti sextarii tres, mellis tantūdem, guttæ ammoniaci \*. præparatū modo scillini, duobus cochleariis exhibetur.

\* Pondas de  
fideratur.

## OXYMEL, CALCULOSIS EFFICAX.

Saxifragæ, betonicæ, graminis, adianti, spicæ nardi, carpesii, asari, eryngii, singulorum uncia, petroselinī Macedonici, rutæ seminis, singulorū semuncia, fœniculi uiridis, iridis, scillæ rostræ, chamædaphnes, singulorum uncia duæ, capparis radicum corticis uncia tres, sili uncia duæ, aquæ, aceti, mellis, singulorum sextarii duo.

## PHVSICA, AD CONTERENDVM CALCULOS.

Pulegii, mastiches, apii seminis, menthæ siccæ, singulorum uncia, salis cōmunis torrefacti pōdo, coriandri seminis, spicæ nardi, anisi, ameos, singulorum scrupula sex, phylli scrupula quatuor, piperis albi semuncia, uel cōmunis uncia, lithospermi uncia sex, betonicæ totidem, aceti generosi sextarii quinque: omnia contusa, cribrata & in tenuissimum pollinē detrita, per triduum aceto madescunt, deinde diebus quadraginta insolantur: ubi usus inciderit, nigrum cicer, asparagi radicem, apium & adiantum decoquis, in huius decocti misturam leminas duas aceti superinfundis, & ægro in calido balnei folio propinas. Nonnulli uero medicamēti ex prædictis speciebus ficci, scrupula duodecim cum posca dictarum herbarū iuri temperata exhibent, & nihilo minus medicamentum proficit.

## CONDITVM CALCULOS CONFRINGENS.

Piperis albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonicæ, singulorum uncia, petroselinī, phylli, singulorum fescuncia, rutæ syluestris seminis semūcia, mellis sextarius, uini ascalonitis sextarii sedecim.

## MEDICAMENTVM EX SANGVINE HIRCINO.

Quum uua inceperit maturescere, hirci ætare florentis sanguinis in sole siccati cochlearia duo calculosis exhibeto cum passo cretico. Quidam uero amomi & phylli, utriusque treis uncias miscēt. Alii etiam myrrhæ quatuor scrupula.

## EX CICADIS MEDICAMENTVM NEPHRITICVM.

Lithospermi, raphidis piscis combusti, fefelis, singulorum uncia, ameos, cucumeris fatiui seminis, saxifragæ, uue passæ acinis exemptis, althææ seminis, phaeoli albi, lyncurii, singulorum semuncia, spicæ nardi, phu, mēu  
 5 lapidum ex spongiis, singuli denarii, adianthi, paliuri seminis interioris, si sicci, rubi radice, graminis, polypodii, singulorum denarii tres, hircini sanguinis desiccati ut dictum est, scrupula sex, cicadarum siccarum sine capite, pennis & pedibus, triens, piperis albi denarii sex, mellis discocti quod satis est. datur instar nucis auellanæ in condito tribus obolis, aut de cocto saxifragæ, aut si, aut radice asparagi, aut rosmatini, aut quinquefolii, aut lanariæ herbæ radice.

## MEDICAMENTVM EX LITHOSPERMO.

Lithospermi, betonicæ, saxifragæ, petroselinii, piperis albi pares portiones cum melle excipiuntur.

## 15 MEDICAMENTVM EX MARRVBII SEMINE.

Piperis albi & nigri, dauci cretici, cucumeris fatiui seminis, scæniculi seminis, marrubii seminis, petroselinii macedonici, pyrethri, zingiberis, phylli, singulæ uncie, mellis quod satis est.

## MEDICAMENTVM EX LAPIDE IYDAICO,

20 qui ticolithos dicitur.

Spicæ nardi, hyssopi, lapidis iudaici, singulorū scrupula octo, piperis scrupula duodecim, zingiberis, petroselinii, costi, saxifragæ, singulorū scrupula sex, cassiæ, apii seminis, singulorū scrupula tria, cyperi scrupula sex, rameti eboris scrupula quatuor, cardamomi ligni scrupula sex, seminis lini scrupula quatuor, mellis quantum sufficit.

## 25 MEDICAMENTVM EX SYLVESTRIS MALVÆ

femine.

Cucumeris domestici seminis denarii duodecim, alterci seminis denarii sex, cicutæ seminis denarii tres, (alii sex) opii, scæniculi, maluæ sylvestris seminis, croci, singulorū denarii tres, apii seminis denarii sex, cassiæ denarii quatuor, amygdala basilica decē, nuces auellanæ totidē, asari denarii quatuor: passo cretico excepta dantur tribus obolis, si febris abest, cum sapa. Nonnulli melle excipiunt.

## MEDICAMENTVM EX BELLARIIS NEPHRITICVM,

35 ticum, uesicæ & renum exulcerationi idoneum.

Vuz passæ albæ cui acini sint exempti, nucleorū pini recentium, singulorum uncia duæ, cucumeris seminis cortice exuti, baccarum myrti nucleo ablato, amygdalarum amararum, palmularū pinguiū, apii seminis, papaueris seminis, croci singulorū denarius, myrrhæ uncia duæ: instar denarii  
 40 ex passo ieiuno propinatur.

## SATYRIACVM ANTIDOTVM.

Zingiberis, satyrii superioris, singulorū drachmæ octo, scinci caudæ, mēu, afari, petroselinī, cardamomi, sefelis, singulorum drachmæ quatuor, et uicæ seminis, cinnamomi, singulorū drachmæ tres, ormini, piperis albi, cnicī seminis, singulorum drachmæ duæ, iunci odorati floris, spicæ nardi, singulæ drachmæ, sanguinis hircini mystrum. datur denarius imbecillioribus cum lacte.

CATAPOTIA EX XYLOMACERE, DYSEN-  
tericis utilia.

Xylomaceris, opii, theu, singulorum scrupula sex, gallæ, myrrhæ, singulæ unciz. excipiuntur uino spathite.

10

MEDICAMENTVM EX CORALLIO, QVOD  
diacoralliu uocatur, podagricis idoneum.

Rheu barbarici, pconiz, myrrhæ troglodytidis, spicæ nardi, singuli sextantes, phylli uncia, caryophylli grana quindecim, anagallidis phænicei coloris quam uocant corallion, semuncia, aristolochiæ longæ unciz quatuor, & rotundæ totidem. datur instar scrupuli quotidie, concoctione probe defuncto. Incipiendum uero est ab æquinoctio autumnali, quod circa uigesimalum quartum mensis septembris diem accidit, capiendumq; deinceps ad dies quinquagiuta, deinde relinquetur quindecim dierum interuallo, atq; sic facere oportet quousq; dies quibus assumitur absoluantur trecenti sexagintaquinq;. Sub caniculæ ortu omnino abstinendum est, hoc est à uigesimo quarto die Iunii usq; ad Augusti finem. Vitari debet uenus, carnes præfettim suillæ, salsamentum, garum, beta, daucum, mentha, & lactuca discocta, peponesq; pisciū capita, cammari, tum qui molli, tum qui testacea cute præditi sunt, legumina omnia, & summatim quæ crassi succi sunt, uinum nigrum & liberalius. Balneum couenit & quotidianum exercitiū, uel pedibus, uel equo, uel gestatione adhibitum. Qui uero habitu sicciore sunt, etiam si plenius nutriantur, non offenduntur.

AGAPETI COMPOSITIO AD PODAGRAM.

Phylli, theu barbatici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, costi, chamædryos, singuli sextantes, aloës hepaticæ quincunx, hyperici, pconiz, singuli quadrantes, aristolochiæ longæ, phu, mēu, damafonii, anagallidis, singuli trientes: utendi modus idem est qui in compositione dia corallii.

COMPOSITIO ATACTOS AD PODAGRAM.

Phylli, mēu, damafonii, anagallidis cui flos est cæruleus, erythrodani, mastiches, croci, cassiæ, aloës hepaticæ, gentianæ, chamædryos, singulorum uncia, caryophylli, afari, ( piperis ) albi & nigri, singulorum semuncia, spicæ nardi, myrrhæ, rheu barbarici, pconiz radices, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum unciz duæ. Similis usus est.

L. In græco  
desse uidet.

PROCLI COMPOSITIO, PODAGRAE ET COXEN-  
dicum doloribus accommodata.

40

Chamædryos unciz nouem, centaurii unciz octo, aristolochiz unciz septem, gentianæ unciz sex, hyperici unciz quinq; petroselini macedonici unciz quatuor, mēu unciz tres, agarici unciz duz, phu uncia una, mellis attici heminæ duz.

1 MEDICAMENTVM EX REBVS SEPTEM CONSTANS,  
ad eadem.

Hyperici, aristolochiæ longæ, singulorum uncia, centaurii, chamæpityos, agarici, singulorū tres unciz, chamædryos unciz sex, gentianæ unciz quinque. Nonnulli etiam petroselini unciam addunt, mellis drachmas quinq; datur instar denarii.

## DE PASTILLIS.

## Cap. XII.



15 **P**astilli Græce trochisci à figura nominantur. Tres sunt eorum species, alii namq; sunt potabiles, alii in aluum dantur, alii delinuntur. Ex his igitur qui potantur, alii comprimunt aluū, aut sanguinem aut aliam quampiam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opplendo, aut desiccando eam cohibentes: quæadmodum qui constat spina ægyptia, & qui feminibus, cōsimilesq; alii do-  
lorem sopiunt, uel quod sensum obstupefaciant, uti crocodæ dictus, uel quod humores diffundant, ueluti ex aromatis cōfecti: alii lienem, aut re-  
20 nes, aut iecur obstructione liberāt, ut qui ex amaris amygdalis confit. Eorum uerò qui in aluum induntur, nonnulli acrimoniam obtundūt, ut in torminibus intestinorū, quæadmodum ex pompholyge, amylo, terra samia, ex cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo preparati, nonnulli alui aut sanguinis profluium astringunt, sicuti qui alumine, acacia, & omphacio  
25 constant, qualis est qui plantaginis iniecti: nonnulli adurētes, dysenteriz quàm ulcera depascentia exercent, idonci: ex sandaracha, auripigmento, calce, charta combusta, confecti. Inferentur autem cum succo lenticulæ, aut oryzz, sicut intestinum prius muria elorum sit, egerq; cibum & potū antea assumpserit, ne aliquid medicamēti uirtutis reliquū, ad stomachum  
30 rapiatur. Cæterum utiles sunt pastilli qui ab inferioribus partibus iniiciuntur, ad affectus potissimum qui infra umbilicum infestant. Nam superius uis ipsoꝝ peruenire nō potest. At qui delinūtur simileis illis uireis obtinent: uetū astringentes, in herpete, papulis, quæ dicuntur exanthemata, intertriginibus, sanguinis eruptiōibus, & fluidis ulceribus proficiūt: cuiusmodi est Andronius & Polyidæ qui uero obtundunt, carbunculis & maleficis ulceribus expediunt: utpote leucus dictus, & dialotarion. urentes, sicut iam comprehensi, cuius generis habentur & Faustiani, serpentibus naturalium & sedis ulceribus, pterygiis, & carnosis narium uitii accom-  
35 modantur.

## PASTILLVS ASTER DICTVS.

40 Croci, opii, castorii, spicis nardi, cassiæ, myrrhæ, lēniæ cretæ, mādragoræ cor

ticis, singulorū triens, dauci, apii, anisi, fœfelis, alterci seminis, styracis, singulorum denarii octo: uino lzugantur.

PASTILLVS TRIGONVS.

Apii seminis, alterci seminis, singulorum denarii duo, anisi denarii quatuor, opii denarii tres: aqua teruntur.

PASTILLVS A SEMINIBVS DIA SPERMATON DICTVS.

Anisi, ameos, fœniculi seminis, singulorum denarii quatuor, apii seminis, opii, alterci seminis, singulorum denarii duo: aqua lzugantur.

PASTILLVS CROCODES, HOC EST CROCEVS.

Anisi, dauci cretici seminis, singulorum drachmę quatuor, myrrhę, castorii, singulorū drachmę duz, croci, opii, singulorū drachmę tres, apii seminis, styracis, singulorum drachmę quatuor, alterci seminis drachmę sex: ex aqua deteruntur.

PASTILLVS DIA RHODON.

Acaciz, gummi, rofarum floris, balaustiorum, hypocistidis succi, gallarū, singulorum drachmę tres, rofarum uiridium succi, plātaginis seminis, singulorum drachma, lycii Indici tantundem.

PASTILLVS DIA CORALLIV.

Alterci seminis, thuris, singulorū drachmę octo, terrę samię, corallii, minii Sinopici, opii, singulorum drachmę quatuor, amyli, balaustiorum, singulorum drachmę duz: succo polygoni excipiuntur.

PASTILLVS EX ELECTRO.

Herbę pulicaris unciz quinq, mastiches unciz quatuor, electri scobis, iridis, croci, singulorum \* unciz quatuor, opii O unciz duę.

PASTILLVS EX SPINA AEGYPTIA.

Spinę Aegyptię, rhu, thuris, acaciz, aluminis scissi, hypocistidis succi, gallē, lemnię cretę, corallii, symphyti, terrę samię, aloës, ladani, pares portiones: uino subiguntur.

ALIVS PASTILLVS, QVEM GALENVS APHRO-

diassticon clidion inscribit.

Satię punię floris, spinę Aegyptię, balaustiorū, hypocistidis succi, acacię, singulorum drachmę sex, lycii, rhēu pontici, opii singulorū drachmę quatuor, myrrhę drachmę duz: excipiuntur uino myrteo, uel rofarū, baccharum uel myrti decocto.

CLIDION ORIBASH, AD DYSENTERICOS

et cœliacos.

Gallę omphacitidis denarii octo, opii denarii quatuor: ex aqua singuntur catapotia. dantur terna aut quaterna.

PASTILLVS EX CORNV CERVINO DYSEN-

tericis & sanguinem excreantibus salutaris.

Cochlearū drachmę duodecim, cornus ceruini cōbusti, gallę torrefactę,

\* Galenus et  
Oribasi  
drachma  
triginta.  
○ Oribasi  
tu drachmę  
quindecim.

\* Galenus  
unde fuit  
peli est, ac  
eis succi.

acacię inarefactę, singulorum drachmę quinę; oboli duodecim, baccarū myrti nigre drachmę quindecim, opii siccati, hypocistidis succi, singulorū drachmę quinę, labruscę floris drachmę sex, mādragore radice succi, ter rę famię quę alter dicitur, singulorū drachmę duodecim, rhu obsoniorū  
 5 drachmę quatuordecim, malicorii torridi drachmę septē, thuris drachmę octo, piceę corticis exarefacti drachmę quatuordecim, alterci seminis siccati drachmę decē, rhus coriarii sextarii duo, uini nigri quātum rhu inco quendo ut uinum fiat crassissimum, satis est, atq; hoc percolato: reliqua ex cepta in pastillos coguntur.

10 PASTILLVS AMAZONVM.

Apii seminis, anisi, singulorū drachmę sex, absinthii comę drachmę qua tuor, myrrhę, piperis, opii, castorii, singulorū drachmę duę, cinnamomi drachmę sex: aqua subiguntur.

PASTILLVS EX AMYGDALIS AMARIS.

15 Anisi, apii seminis, asari, amygdalarū amaranū, absinthii comę, paria pon dera: ex aqua singuntur pastilli, qui drachmam pendeant. dantur febri ca- rentibus ex mulso: febricitantibus cum hydyomelite.

PASTILLVS EX ERICA, LIENI DICATVS.

Ericę fructus denarii quatuor, piperis albi, nardi syriacę, suffiminis am-  
 20 moniaci, singulorū denarii duo: ammoniacū aceto soluitur, aridisq; admi scetur: singuntur pastilli qui singuli denarium cōpleant. exhibentur singu latim cum oxymelitis cyatho.

PASTILLVS EX VESICARIIS, DIA PHY-  
 salidon uocant.

25 Cucumeris fatiui excorticati seminis uncia quatuor, alterci seminis, cicu rę, singulorum uncia duę, fœniculi, lapathi seminis, croci, nucleorum pi- ni, amygdalorum amarorum, opii, singulę uncia, uesicarię sextarii tres, uini quod sufficit.

PASTILLVS PHILIPPI, AD INTE-  
 stinorum tormina.

30 Balauftiorū, acacię, hypocistidis succi, opii, rhu, thuris, myrrhę, croci, gal- lę, aloës, rhēu pontici, malicorii, baccarū myrti, singulorū drachmę qua- tuor: excipiuntur uino austero, formanturq; pastilli triobolares. dantur si fe bris abest, cum uino: febricitantibus, cum hydromelite.

PASTILLVS MVSAE.

35 Aluminis, aloës, myrrhę, atramēti futorii, singulorū sescuncia, malicorii, crocomagmatis, L. croci J singulorum drachmę sex: excipiuntur uino.

QVOMODO CROCOMAGMA PARETVR.

Croci uncia duę, rosarū, amyli, myrrhę, aloës, thuris, gūmi, singulorum  
 40 uncia, costi, spicę nardi, singulorū drachma: uino subiguntur. At in capite de oleo crocino alia quoq; crocomagmatis confectura dicitur.

L. Additur  
 ab Orthesio.



## PASTILLVS NERAE EX HERAE COMMENTARIIS.

Myrrhē, aloēs, croci, singulorum drachmę octo, aluminis scissi, drachmę centum: aqua excipiuntur.

## POLYIDE SPHRAGIS.

\* Galenus tres, additę thuris quatuor. Aluminis scissi denarij \* quatuor, myrrhę denarii octo, atramenti futorii denarii duo, floris satiuę punicę denarii duodecim, fellis taurini denarii sex, alijs denarij sedecim, aloēs uncia: uino austero excipiuntur.

## PASIONIS PASTILLVS.

\* Grece erat uino prolixior, sic enim habet Orisius, et sensus exigit. Squamę æris denarii duodecim, æris combusti, \* falis ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rasę, thuris, singulorū denarii octo, uini quod sufficit. 10

## PASTILLVS ANDRONIVS.

Satiuę Punicę floris drachmę decem, gallę drachmę octo, myrrhę drachmę quatuor, aristolochię longę drachmę quatuor, atramenti futorii, croci, aluminis scissi, crocomagmatis, misyos, thuris, singulorū drachmę duę: laeuigantur in uino astringenti, uel aceto. 15

## PASTILLVS FAVSTINI.

Auripigmenti drachmę duodecim, sandarachę drachmę sex, calcis uiuę drachmę octo, chartę combustę drachma, myrti baccarum succo uel decocto excepta, in pastillos redigito, & cum myru baccarum, lēticulę, & rubi radicū decocto immittito. 20

## \* PASTILLVS EX CHARTA, DIA CHARTIU appellatus.

\* Orisius, drachmę triaginta duę, quod magis conuenit. Chartę combustę \* dupondo, calcis, auripigmenti, sandarachę, singulę unciz: succo plantaginis excipiuntur.

## PASTILLVS CUI NOMEN EST THRONUS Marcellius.

Chartę combustę drachmę decem, sandarachę, auripigmenti, squamę æris, aluminis scissi, singulorum drachmę quatuor, balaufti drachmę tres, opii drachmę duę, calcis non restinctę drachmę uiginti, omphacii drachma, hypocistidis succi drachmę tres: uino myrteo excepta coguntur in pastillos qui drachmas quatuor pendeant: \* coquanturq; in uino malicorium, myrti bacę, & rosę usq; ad tertias: datur pastillus unus aut in totum quatuor, ex sex uini cyathis. 30

\* Exemplar græcum uidetur hic esse mutatum.

## PASTILLVS A SVBERE, DIA PHELLON DICTVS.

Gallę, chartę, scęculę uini, panis, singulorū concrematorū denarii decē, in alio habetur etiam cornu ceruini cōbusti denarii quindecim, auripigmēti denarij duo, sandarachę, calcis, utriusq; denarii quindecim, acaciz cerusę, singulorum denarii quinque, argenti spumę denarii tres: uino laeuigantur. 35

## BITHYNVS.

Malicorii drachmę decē, cadmię unciz tres, aristolochię, gallę, panacis, \* radidis iridis, atramenti futorii, aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamę 40

zris, mānz, (nōnulli etiam costi,) singulorum fescūcia: aceto subiguntur.

PASTILLVS DIA CASTORIV, AD VLCERA,

nomas & defluxiones.

Croci, aloēs, thuris, singulorū uncia, cytinorū, aluminis scissi, castorii, mā  
5 nę, & ruginis rasę, singulorū uncia, minii sinopici libra: excipiūt uino ueteri.

PASTILLVS EX CASTORIO, COLICIS EFFICAX.

Myrrhę, castorii, singulorum scrupula sex, croci, opii, singulorum scrupula nouem, anisi, apii feminis, dauici feminis, singulorum semūcia, alterci feminis scrupula octodecim.

10 PASTILLVS EX OENELAEIO, SEDIS

& naturalium uitiiis utilis.

Cerusę uncia decę, argenti spumę uncia quinę, thuris, recrementi plumbi, aluminis scissi, singulorum uncia duę: uino marinę experte lęuigantur. in usu uino rosaceo aut myrteo soluantur.

15 PASTILLVS EX LAPIDE PHRYGIO, NATV

ralium uitiiis accommodatus.

Lapidis Phrygii combusti restincti q̃ ter, primum butyro uel rosaceo, deinde uino, postea melle, uncia duę, rosarum floris uncia quatuor, malicorii uncia.

20 PASTILLVS DIA LOTARION, QVOD EST EX LOTO

syluestri, ad sedis & naturalium uitia.

Cerusę, amyli, glaucii, croci, aluminis, æquales portiones: teruntur succo lori syluestris, aut uino.

PASTILLVS LEVCVS.

25 Terrę samię triēs, pompholygis, cerusę, amyli, singuli sextantes, opii scrupula quatuor: aqua subiguntur.

PASTILLVS DIA ALICACABV.

Spumę argenti drachmę uiginti quatuor, cerusę drachmę duodecim, aut una & uiginti, alicacabi drachmę octo, atramenti sutorii drachmę quatuor, aluminis scissi tantundem, minii quod ad colorem fati est: aqua excipiuntur.

PASTILLVS EX DVPLICI VERATRO, IDEM

uero ex \* acacia duplici.

Acacię nigre & rubentis, glutini fabrilis, (in alio pisciū glutinis) singulorum uncia quatuor, guttę ammoniaci, glaucii, aloēs, singulorū uncia duę,  
35 thuris masculi, ueratři nigri & albi, singulorū uncia: aceto seillino excipiuntur. quum usus incidit eodē uel communi soluta, ante balneum, & rursus post id inunguntur.

PASTILLVS CRIOGENES.

40 Myrrhę, & ris combusti, aristolochię rotūde, & ruginis rasę, squamę stomomatis, uerbenacę rectę, aluminis rotundi, singulorū uncia, aceti quantum

\* Mendose  
cras. i. i. i.  
id est, gili  
pro nati.

fatis est, decerpi autem debet uerbenaca, quū sol est in ariete. Fit etiam em  
plastrū in hunc modū: pastilli, \* cere, colophonice, olei, par mensura, aceti  
quod ad lēuigandum pastillum sufficit.

## PASTILLVS A' NIGRO VIRIDI'

que colore dictus melanchlorus.

Myrrhē, aloēs, squamæ eris combusti, auripigmenti, aluminis scissilis, &  
rotundi, iridis, chalcitidis, misyos, salis fossiti, atramenti futorii, cerusæ,  
nitri, argenti spumæ, panacis radice, cadmiz, malicorii, gallæ, aristolo-  
chiæ rotundæ, squamæ stomomatis, æruginis rasæ, singulorum uncia, ace-  
ti quod satis est. Fit etiam hoc modo emplastrum: pastilli unciz duæ, 10  
colophoniz, ceræ, olei, singulorum unciz sex, aceti quod pastillo subigen-  
do satis est.

## PANTOLMIVS AD CHIRONIA MALIGNA QVE

ulcera & defluxiones.

Cassiz, aris cremati, cerusæ, argenti spumæ, æruginis rasæ, aluminis scissi, 15  
rotundi, liquidi, & lateritii quod plinthis dicis, panacis radice, aristolochiæ  
longæ, & rotundæ, malicorii, atramenti futorii, portulacæ, iridis astragali-  
tidis, chalcitidis, misyos, guttæ ammoniaci, salis ammoniaci, æruginis fer-  
ri, squamæ eris, aloēs, diphrygis, thuris, gallæ, sarcocollæ, plumbi cremati,  
foliotum oleæ, foreos, myrrhē, cretæ futorie liquidæ, balauftiorum, spinæ 20  
Aegyptiæ, sulfuris ignem non experti, nitri, rhu rubri, rhu syriaci, chryso-  
collæ, \* rhus coriari, acaciæ, salis spumæ, omphacii, auripigmenti, singu-  
lorū pares modi: cū aceto diebus triginta, sub caniculæ siderelauigant.

\* Græce  
rhus rotundi-  
as, id est, de  
lunum.

## PASTILLVS NYMPHODOTI.

Aphronitri uncia, nitri Alexandrini, saponis gallici, singulæ unciz, salis 25  
cappadocii, mastiches, gallæ, singulorum denarii quatuor, soliorum rosæ,  
amomi, amyli, singulorum uncia, phylli denarius, aluminis scissilis, costi,  
singulorum denarii duo, uini myrtei quod satis est.

## PASTILLVS EX T'HAPSIA, HEMI-

cranico dolori efficax.

Succi thapsiæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ octo, opepanacis, eu-  
phorbii, singulorum drachmæ sex, nitri, liquoris parthenici, singulorum  
drachmæ quatuor, piperis, sagapeni, singulorum drachmæ duæ, aceti quan-  
tum sufficit. Vbi utendum est, aceto inunctum post horas sex abluito: ac  
si uoles remissiore uti, cerato pari exceptum illinito, nec etiam: finito. 30

## PASTILLVS QVIA ANO SVBICITVR, HYPOTHE-

ton dictus, ad intestinorum termina, & ani dolores.

Terræ samie, amyli, singulorum quadrans, croci sextans, acaciæ, tragacan-  
thæ, singulæ unciz, castorii, thuris, lycii, singulæ semunciz: in calidioribus  
etiam opii semuncia adicitur: herbæ pulicaris succo excipiuntur, \* fin- 40  
gunturq; pastilli.

\* Exemplar  
græcū uidet  
hic de prauis  
tum.

## DE MEDICAMENTIS QUIBUS ARIDIS VTIMVR,

xeria dicuntur, &amp; smegmatis.

Cap. XIII.



Ridorum medicamentorum quæ sanæ & cataplasmata ab inspergendo uocant, alia ulceribus congruunt, alia curi applicantur: ex iis quæ ulceribus faciunt, quædam cauis carnem inducunt, quædam ex crescentia reprimunt, quædam cicatricem generant, quædam urunt exeduntque; nonnulla sanguinem coërcent. Quæ igitur carni generandæ sunt, uel repurgando sordida, carnem creant, ut quæ constant ex eruo, aristolochia, iride, panace, myrrha, rhure, aloë: uel humiditatem circumfluam desiccando, uel uti quæ fiunt ex ære, diphyrge, squama, charta combusta, piece cortice, & spina, quæ & ipsa cicatricem obducunt: uel acrimoniam rosionemque obtundendo, qualia sunt ex pontholyge, amylo, cerusa, fæce cōbusta, speculario; ostreis crematis, terra samia, & consimilibus, & quæ compositorum ex his uireis habent. Ex reprimentibus lenia quidem sunt, quæ constant squama æris, quæ misy, chalcitide cōbustis, & galla: ualentiora sunt, quæ atramento sutorio, ærugine, misy, chalcitide, ignem non expertis. Vrentia uero exedentiaque fiunt ex calee, auripigmento, sandara, cha, & fæce uini combusta, quam uocant spheelen, hoc est fæculam: atque hæc omnia componuntur, cæterum in tenuissimum redacta pollinem, si ulceribus inspergantur minus rodunt: si spissiora magis, idque urendo faciendoque crustam. Sanguinem reprimentia aut astringendo, aut refrigerando, aut siccando, aut oppleno illum coërcent, quorum materiam capite de pastillis sumus exequuti. At eorum quæ euti admouentur, alia abstergunt exteruntque, ut ex cimolia, pumice, lomento, fermento hordei, peponum carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutunt, qualia fiunt ex uerratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, cachry, terra lemnia, sepis testa: atque hæc, assumpta calee & auripigmento cum liquore aliiquo, pilis abolendis idonea, & smegmata fiunt. Quædam capiti admouentur, ut fluxum ex eo ruentem desiccant, cuiusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio, & id genus aliis præparata. omnia uero smegmata euti non inuncta accommodari debent.

## CEPHALICVM ARIDVM, CAPITI CONVENIENS.

Eruorum quineuns, iridis sefecuncia, mannæ sefecuncia, aristolochiæ, squamæ æris, singulorum sefecuncia.

ALIVD.

Piceæ corticis drachmæ sex, rhuris drachmæ quatuor, pumicis tantundem, iridis drachmæ duæ, resinæ siccæ drachmæ sex, aristolochiæ drachmæ duæ.

## MEDICAMENTVM EX ALOE, DIA ALOES DICITVR.

Aloës drachmæ sex, erui drachmæ octo, mannæ drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ duæ.

DIA SPHECLES, HOC EST EX FÆCE VINI COMBUSTA, manethonis.

Cadmiz combusta & illorū pondo uncia, terrā famiz pondo uncia, fæcis uini combusta pondo unciz quatuor, lapidis specularis pondo unciz quatuor, thuris pondo unciz quatuor. quidā & amyli uncias quatuor addūt.

## MELITERA ORIBASIL.

Chalcitidis, squamæ æris, gallæ, balauftiorum, ceræ, singulorū pōdo quadrans, aristolochiz longæ pondo uncia, malicorii, aluminis scissi, singulorum semuncia.

## MEDICAMENTVM EX OSTREIS, DIA OSTREON dicitur.

Cadmiz, thuris, singulæ unciz, ostreorum combustorum unciz tres. 10

## MEDICAMENTVM EX THVRE, DIA LIBANV.

Argēti spumæ, thuris, squamæ æris, mali Punici, amyli, cerusæ, pares modi, APHRODITARIVM.

Thuris, squamæ æris, mali Punici, amyli, cerusæ, paria pondera.

RHODIA, AD SVPPRIMENDVM SANGVINEM, VL 15  
cera depalcentia & excrementia.

Gallæ crudæ denarii sex, gallæ combustæ restinētæq; uino aridæ denarii duodecim, squamæ æris nigri, si non sit, rubri denarii octo, atramenti futorii denarii uigintiquatuor, aluminis scissi denarii uiginti septem: teruntur diebus fat multis. 10

## MEDICAMENTVM XANTHON, HOC EST, FLAVVM.

Chalcitidis combustæ drachmæ quadraginta, atramenti futorii usti drachmæ uiginti, misyos cremati drachmæ decē, æris usti drachmæ quinque.

MEDICAMENTVM A MVRINO COLORE PSARON dictum. Misyos quincunx, gallarum triens, chalcitidis sextans, squamæ æris tantundem, atramenti futorii uncia, æruginis rasæ sextans. 15

## MEDICAMENTVM HELIOCAES, ADVRENS.

Auripigmenti pondo, calcis uiuæ dupondo: aqua læuigantur per dies caniculæ, deinde siccatis utitor.

## ANTHERON. 30

Cyperii denarii octo, myrrhæ denarii duodecim, sandarachæ denarii tres, rosarum floris denarii duo, croci denarius, crocomagmatis, aluminis scissi, iridis illyricæ, singulorum denarii duo.

## MEDICAMENTVM EX CHARTA, QVOD GRAECI dicunt dia charta, ad nomas oris potissimū &amp; naturalium ulcera. 35

Aeris squamæ, chartæ combustæ, singulorum denarii octo, auripigmenti, sulfuris uiui, singulorū denarii duodecim, plumbi cremati denarii sex. Ad humidiores quidē sepedonas, sicco utitor: ad siccas, rosaceo macerabis, nonnunquam & melle cum rosaceo.

MEDICAMENTVM EX MYRTO SYLVESTRI, DIA 40  
oxymirsinæ appellatum, ad eadem.

Rhus coriarii uncia duodecim, myrti sylvestris foliorum, sandarachæ, singulorum drachmæ octo, salicis foliorum siccorum, malicorii, singulorum drachmæ sex, aluminis scissi, chrysocollæ, aloës, chalcitidis crudæ, squamæ, auripigmenti, salis communis, singulorum drachmæ quatuor.

5 MEDICAMENTVM MASSALIOTI.

Nitri, opii, chrysocollæ, lapidis asii, sandarachæ, misyos, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, æqualia pondera: sicco utitor.

SMEGMA ARIDVM, QVOD ASCLEPIOS DICITVR.

Bactarum lauri, nitri alexandrini, salis torrefacti, salis cappadocii, stillæ ammoniacæ, aphronitri, pumicis, singulorum libra, ueratri nigri, herbæ laniariæ, pyrethri, fœculæ quæ est uini fax cōbusta, herbæ pediculariæ, sinapis, iunci angulosi, aluminis scissi, iunci odorati floris, iridis, gallæ, singulorum uncia sex, sampfuchi libra, uiticis feminis, pulgii, farinæ fabarum & lupini, singulorum uncia sex, chamæleontis nigri, sulfuris, gummi, thuris, 15 piperis, cucumeris sylvestris radices, marrubii, cimoliæ, pœoniæ, sepiæ testæ, fœnugræci, phylli, costi, cumini, euphorbii, spicæ nardi, singulorum uncia tres. Alexāder autē præter hæc adiicit salis ex nitri fœtibz, salis Tragacæ, singulorum libram, adarces unciam, aluminis liquidi & gallici, cnici, cocci gni dii, graminis aridi, brioniæ siccæ, singulorum treis uncias.

\* Videt in  
Græco deef.  
se nardi.

20 SMEGMA PEONATVM.

Thuris, mastiches, stillæ ammoniacæ, singulæ uncia, tragacæthi fescuncia, succi uuæ immaturæ dodrās, peponis feminis recētis quadrans, similæ sextarii quinq; ouorum unius & uiginti albumina, iridis triens. quidam & ueratri nigri sextantem miscent.

25 ALITER CRITONIS.

Lomenti modius, similæ sextarii quatuor, trifolii glandis unguentariæ, iridis illyricæ, singulorum pondo quatuor, guttæ ammoniaci, costi, singulorum pondo, ouorum tenuia aquata, peponum carnis sextarii duo, uuæ immaturæ succi tantundē: macerantur, redactaq; in pastillos siccantur, deinde contusa in cretaq; in usum adhibentur. ALITER. Tragacæthæ, thuris, mastichæ, guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ decē, omphacii drachmæ quinq; similaginis sextarii quinq; cādidī ouorum liquoris uncia, peponū carnis unciz decem: præparatur ut supra dictum est.

SMEGMA QVOD CAPITIS DEFLVXIONES EXICCET.

35 Nitri alexādtini tui uncia quinq; salis communis torrefacti fescuncia, salis cappadocii uncia: hæc aceto q̄acerrimo macetata in patinā fistilē cōiiciuntur, atq; in furno uruntur, dum redigantur in carbonēs: inde refrigeratis læuigatisq; ad abstergendū utitor, uinum in balneo instillans.

SAPO CONSTANTINI.

40 Rosarum siccaturū, aloës, gallæ, malicorii, malabathri, sarcocollæ, singulorum tres uncia, balaustiorum, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum un

ciz duz, costii uncia, saponis gallici libra, excipiuntur iure lupinorum.

XERION QVOD EST ARIDVM PSILOTRVM

ad podagram.

Mastiches, thuris maseuli, herbæ pediculariz, ueratri albi, spumæ argenti, singulorū unciz tres, phylli, amyli, ueratri nigri, lapidis asu floris, singulorū uncia, alcyonii, pumicis tosti, cimoliæ, sampsuehi, singulorū unciz tres, spicæ nardi uncia. Nonnulli etiam aloës uncia addunt. cōsum in uase xerion referuatur: ubi ne cessitas inciderit, oryzzæ cremor & ptisanæ in ollam coniiicitur: postquam inferbuerit, xerii, saponis, gallici, auripigmenti, aluminis scissi, sandarachæ, singulorum sese uncia additur, calcis uiuæ recentis libra. Vtitor unguento mense ter. nono uidelicet lunæ die, decimono-  
no, & uigesimo nono, id quæ usq; ad annum: post hunc, semel mense, quū uigesimalum nonum luna diem agit.

DE MEDICAMENTIS LIQVIDIS QVAE ILLINVN-

tur, ad oris uitia unde stomatica dicuntur, ac guttur

aaccommodatis.

Cap. XIII.



Vanto rarior molliorq; est summa oris tunica, cute quæ corpus totum obtegit, tãto etiam magis stomaticorum medicaminum usus euariat. Quū igitur inflammatio incipit, ea requiruntur medicamenta quæ humoris influxum repellant, cuiusmodi sunt, arida quidem, omphaeium, galla omphaeitis, succus rhu, hipocystidis, aluminis, cortex piecæ, & thuris balaustia, & generatim omnia quæ astringunt, ita ut insuauē ingratamq; & lethale uim non representent: liquida uero, succus mororum tum quæ batina, tum quæ sycamina dieuntur, item nucum uiridium corticis, & mali Punici, præsertim acidi, & malorum cotoneorū, mustum, amineumq; mel autem per initia solū ut medicamenta adhæreant temperatur. at quum humor substiterit, misceri debent quæ conequant & mediocriter dissipent, cuius generis est crocus, myrrha, & dulcis radieulæ succus, at per totum id temporis quod inter statum & declinationem intercedit, recte miscetur alterutrum aut repellens, aut discutiens: & primum quidem superabunt repellentia, deinde digerentia: in morbi declinatione solis uti degerentibus absque astrictione oportet, qualia sunt nitrum, aphronitrum, organū, hyssopum, thymus, nepita, iris, bēfafa, cōsimiliaq;. liquor tunc sapa esto tum quæ ex mulso de cocto, tum quæ ex caricis & palmulis cōficitur ipsumq; dulces mustum cū melle: ubi uero ueluti reliquæ quædam inflammationis remanserint, etiam sulfur ignem non expertum miscēbimus: succum autem primum cū melle incoquemus, dum liquidioris mellis spissitudo fiat, inde sic arida in tenuissimum pollinem pertrita inspergemus, postea modice coquemus, quoad omnia exacte in unitatem cogantur, quo facto uitreum uas medicamentum transfundemus.



## DIA MORON SIMPLEX.

Mororum succi sextarii tres, prius cœcoquuntur dū tertia portio fuerit absumpta, adiectoq; mellis sextario, rursus incoquantur ad melleam spissitudinem.

## DIA MORON COMPOSITVM.

- 5 Mororum succi hemina sex usq; ad strigmenti crassitudinē coquuntur, deinde admixto lauis croci denario, myrrhæ duobus, uux immaturæ uno, aluminis scissi ternis obolis, mellis hemina, quousq; spissescant incoquantur.

## DE MORIS BATINIS, QVÆ RVBI FRVCTVS SVNT.

- Item quod ex moris batinis constat, eodem modo præparatur, maiore uia  
10 astrictoria præditum.

## DIA CARYON, QVOD EST EX NVCIBVS, SIMPLEX.

Viridium nucum corticis contusi succi hemina quinque, mellis hemina, coquantur ad dimidias.

## DIA CARYON, COMPOSITVM.

- 15 Per initia quidem & in uigore oris inflammationum, misceri debent croci, & aluminis, singuli denarii, myrrhæ duo, in declinatione uero ad digerendum nitri denarius, sulfuris tantundem, cum prædicta nucum corticis succi, & mellis mensura.

## MEDICAMENTVM EX SVCCO MALI PVNICI.

- 20 Mali Punici cui nuclei sunt adēpti dulcis succi sextarii quatuor, mali Punici acidi succi sextarii duo, mellis sextarius, myrrhæ mineæ drachmæ octo, crocomagmatis, gallæ, singulorū drachmæ octo, aluminis scissilis drachmæ quatuor, iridis illyricæ drachmæ octo, omphacii drachmæ octo: cōficitur quemadmodum quod moris constat.

## ALITER IDEM.

- 25 Mali Punici dulcis cum corio suo combusti succi sextarii sex, mellis generosi sextarius, aluminis scissi uncia, myrrhæ semuncia.

## MEDICAMENTVM E' MVSTO, DIA GLEVCOVS DICVNT.

- Musti sextarii sex, gallæ, aluminis scissilis, singulorum denarii duo, croci, myrrhæ, singuli denarii. Si lenire uoles, dulce esto mustum: si repellere, au  
30 sterum. quod autem neutrum est, mediam inter hæc uim obtinet.

## AEGYPTIA STOMATICA.

Mellis pondo, olei bes, resinæ terebinthinæ sextās, croci denarii quatuor: in cacabo liquefiunt.

- 35 MEDICAMENTVM DIA BESASA, EX RVTA SYLVESTRI.

- Anisi feminis, apii feminis, iunci odorati floris, ameos feminis, aluminis scissi, itidis illyricæ, besasa, quod nonnulli harmala uocant, (est autem ruta sylvestris) cinnamomi, myrrhæ troglodytidos, croci, gallæ, singulorū uncia, aristolochiæ longæ, cassiæ, crocomagmatis, rosarum siccarum, singulorum uncia, costi, hirundinum cineris recentis, singulorū uncia tres,  
40 nardi indicæ, amomi, singulorum semuncia, mellis quod satis est.



Vlcium simul & utilium porionum, aliz ex uino conficiuntur, coniectis in id quibusdam speciebus, exempli gratia, pipere, absinthio, casamo, aliisq; cōpluribus, unde etiā appellatōnem nonnunquā sortiuntur, aliquādo melle admixto, interim non: aliz ex aqua in qua decoquantur mala, uel rosā quēdam, nempe uua immatura, mala Punica, myrti baccā, eoq; mel optimū miscetur, tum quōd firmum sit, tum quōd dulce, interdum etiā utile: si illud excipias quod à cibis in paruis uasculis asportatur, austerū: item hydromel uinolum, quod etiā sine melle fieri nouimus, quemadmodum apomel ex melle solo & aqua, citra alterius cuiusdam substantiæ misturam. Imō etiam ex uino confectę poriones, quas & propomata Gręci nomināt, mel lis despumati sextarium unum, ad uini quaternos recipiunt, componuntq; citra cōtionem. At quę ex aqua & liquore fiunt, si quidem coquantur, unum mellis ad treis liquoris, cuius duę ferē partes inter coquendum sint absumptę, sextarios assumūt: sin minus, unum mellis ad binos liquoris. ceterum quę non coquuntur, diu satis in sole prorsus oportet, & pręsertim omphacomeli. Ex aqua uero temperatas potiones coquere conuenit, quōd propter imbecillitatem facillimē mutentur. omnes autem in fistilia uasa exigua oblita transfundendę sunt, iisq; tuto operculatis in apertis locis usq; dum excoquantur reponendę. attenuantibus autem & probe aqua temperatis uti conuenit. Omphacomel postquā musti modo inferbuerit crassumq; euaserit, tunc operiri uas debet. his igitur quę uino constant, quum febris abest, potissimum utimur, uel solius uoluptatis gratia, pręter eas quę scammonia aut grano gnidio aut eiusmodi purgāribus medicamentis componuntur, uel propter eiusmodi affectus in quibus & medicamentis in illas coniectis, per os uti licet. Ex aqua autem aut succo aliquorum confecturę febricitantibus conueniūt, interdum ceu affectui commode, quemadmodum apomel ad saluam educendam, aut urinas citandas, aut aluum emolliendam, aut extenuādum humorem, hydromel autem & hydrosorum siticulosis, aestu flagrantibus, resolutis & stomacho uitiosis. Omphacomel, myrtites, rhodostacton, hoc est, mel rosaceum, & rhætes, cōliaco affectui, intestinorum torminibus, uomitionibus, aliisq; fluidis uitis congruunt. Iam uero his collutionibus subinde in stomacis affectibus utimur.

#### HYDROMEL EX MALORVM COTONEORVM SVCCO.

Malorum cotoneorum nucleis exemptis contusorum succi sextarii duo, mellis sextarii tres, aquę sextarii sex, incoquantur despumando ad tertias. ALIUD. Malorum cotoneorum frustularim concisorum nucleis ablatis pondo quinque, in aquę fontanę sextariis decem incoquantur, dum intabescant, ablata ab igne, refrigeratęq; eximuntur, expressęq; succo proici-

untur, aquæ modo dimidia mellis mensura temperatur, iterumq; incoquitur despumâdo, quoad octaua portio absumpta fuerit. Nonnulli uero ex dulcibus etiam malis similiter hydromel componunt.

AQVAE ROSATAE QVAM HYDROROSATUM dicunt, compositio.

- 5 Rosarum unguibus exemptis libræ quatuor, aquæ sextarii quinque, mellis sextarii duo.

MELLIS ROSACEI, QVOD RHODOMELI uocatur confectura

- 10 Succi malorum cotoneorum sextarius, rosarum trepondo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii quinque. Verum quoniam rosæ non eodem tempore cum malis inueniuntur, conuenire eas cum melle quando colliguntur componere, ac ubi mala prouenerint, totam compositionem moliri.

OMPHACOMELITIS PRAEPARATIO.

- 15 Vix immaturæ succi sextarii tres, mellis sextarius: mixta diebus quadraginta insolantur, uel discoquantur.

QVOMODO MYRTITES FIAT.

Myrti baccarum succi sextarii tres, mellis sextarius, ad tertias decoquantur.

APOMEL, EX COMMENTARIIS PHILAGRII.

- 20 Fauorum melle scatentium alborum pondo, aquæ fontanæ trepondo & dimidiū: confractis fauis unitisq; aqua cum melle incoquitur, dum & spuma ipsius & id quod ueluti cerosum supernat, particulatim relinquatur, atq; runc refrigerata diligenter transfunduntur.


RHODOSTACTI COMPOSITIO.

- 25 Rosarum quibus ungues sunt exempti succi sextarios duos, mellis sextarium incoquito despumans quoad quarta pars fuerit absumpta.

RHOETIS CONFECTIO.

Mali Punici succi sextarii tres, mellis unus, ad tertias decoquantur.

DE COLLYRIIS ET AGGLVTINAMENTIS. Cap. XVI.

- 30  Aria oculariū mendicamētōꝝ materies existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particule stirpiū, & metallica his inferunt: ex quibus alia acrimoniā leniūt & ueluti opplēt obstruuntq; utpote pompholyx, spodiū, amyllum, plumbū, terra samia, cadmia, eaq; oīa lora, & cādidus oui liquor. Quibus ita utendū est, ut  
35 caput prius uacuationē experiat: nam si repletū fuerit, merus est ne oculorum runicæ humoribus distēt perrumpantur. Alia contrariā his naturā obrinent, nempe acrem, recludendis uacuādisq; iis quæ diu impacta fuerunt accommodata, quemadmodū liquores Cyrenæicus, Medicus, sagapenus, euphorbiū & consimilia. Nonnulla sordidis ulceribus abstergēdis  
40 cōueniunt, qualis est squama æris, ipsumq; çs, chalcitis, misy, fori, flos çris, stummi, cōcremata omnia. Quædam his uicina sunt, smectica ab exteren-

dis sordibus appellata, cuiusmodi est auripigmentum, sandarachæ, & lapidis asus flos. Sunt & astringentia, atque ex his quæ mediocriter id faciunt uehementer lippitudini, ulceribus, & defluxionibus conducunt, nempe rosarum folia, flores, fructus, spicæ nardi, phyllum, crocus, glaucium & hypocistis. Quæ uehementiorem astringendi uim repræsentant, oculorum clari-  
tati conducuntibus potissimum medicinis miscentur, cuius generis est omphacium, acacia, balustium, satiuæ Puniceæ flos, & galla. Alia concoquunt discutiuntque, ut myrrha, crocus, castoreum, lachryma thuris, scænuæ succus. Porro ex compositis oculorum remediis, alia delinunt, simplicemque appellati-  
onem habent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria uocant. Quæ igitur delinuntur omnem comprehensam materiam recipiunt, omnibusque conferunt affectibus: cæterum uere præsertim præparari debent, & state siquidem uirus ipsorum perspirat euanescitque, hyeme species gelu rigide temperari nequeunt. Conterere autem ea oportet liquore non copiose affuso, ne metalla subsidant, aromata supernant, uerum modice, ut sordium modo  
conterantur. Aqua uero pluuialis erit, tum quod tenuis sit, tum quod modice astringat. Si quidem uino aut succo aliquo laxigentur, teranturque eadem, metalla sanè longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo laxigabuntur. demum ubi satis laxia euaserint, gummi adiicietur: in formam  
reducta, uasis maxime æreis aut uitreis reponentur. Cæterum iis quæ è succo conficiuntur, protinus uti licet: metalla uetustate redduntur meliora. Porro inter collyria arida quædam consumunt exterruntque: callos, ficos, ungues, scabiosaque uitia, è chalcitide, & ruginè & misy composita: quædam  
lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accommodata, quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi fiunt. Sunt quæ præferuent tueanturque: oculos ab humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia, stimmi, croco: omnia in renuissimum pollinem coacta oculis applicantur. At liquida collyria fiunt ex melle attrito, opobalsamo, oleo ob uetustatem tenui, scæniculi succo, diuersorum animalium felle, li-  
quore cyrenaico, aliisque compluribus. Conferunt hebetudini, suffusionique incipienti, medicamenta quæ extenuent, calefaciant, purgentque. Utendum his est, & omnibus acerbis, ubi caput repletione caret, sub dio, aëre puro austrino, non nimis frigido, neque item calido nimium. At agglutinamenta quæ anacolemata græce dicuntur, ex medicamentis præparantur quæ ob-  
struunt, opplentque: glutinant, stringunt, aut refrigerant, aut astringunt, siccant uel, qualis est farina pollen, manna, terra samia, myrrha, cochleæ, acacia, opium, cum candido uel liquore. glutinantur autem fronti in quibus humor non intra caluariam delitescit, sed extrinsecus affligit.

COLLYRIUM QVOD PROTINVS DOLOREM SEDET  
monohemeron appellatum, ad incipientem ue-  
tustamque lippitudinem.

Acaciz drachmæ triginta sex, gummi drachmæ triginta duæ, cadmiæ drachmæ uiginti quatuor, æris cremati & eloti drachmæ octo, opii, drachma: uino austero læuigantur. Medicamentum discutit & siccatur.

## CHIACVM COLLYRIVM.

- 5 Minii sinopici, gallæ omphacitidis, croci, rosarū recentium unguibus exemptis, floris quem thylaca uocamus, gummi, singulorum unciæ tres, opii uncia: uino aminzo, aut falerno, aut chio austero teruntur. Sit autem uinū marinæ expers.

## CYGNARIVM.

- 10 Cadmiæ ustæ clotæq; unciz sex, cerusæ lotæ unciz quatuor, pompholygis tantundem, amyli unciz duæ, tragacanthæ, opii torrefacti, gummi, singulorum unciz duæ, aqua pluuiali læuigantur.

## RVBENS CYGNVS.

- 15 Cadmiæ crematæ clotæ sextās, terræ samiz tantundē, cerusæ triens, pompholygis bes, amyli sextans, opii sextans, acaciz, tragacanthæ, singulæ unciz, gummi triens: aqua cælesti subiguntur.

## ALBVS CYGNVS.

- 20 Cadmiæ unciz quindecim, cerusæ unciz septemdecim, opii drachmæ octo, thuris drachmæ septem, amyli unciz septem, gummi drachmæ tredecim: aqua cælesti teruntur.

## PELARION AD VLCERA.

- 25 Cadmiæ, cerusæ, singulorum denarii uiginti quatuor, acaciz, opii, singulorum denarii octodecim, gummi, tragacanthæ, amyli, singulorū denarii nouem, myrrhæ denarii tres, æris, croci, singulorum sesquidenarius: aqua cōteruntur.

## PHAEON, AD OCVLOS SANGVINE SVFFVS.

fos, & magnos affectus.

- 30 Cadmiæ teneræ drachmæ uiginti quatuor, cerusæ drachmæ sedecim, æruginis rasæ drachmæ duodecim, stimmi drachmæ octo, aluminis scissi drachmæ tres, chalcitidis ustæ drachmæ tres, nardi Indicæ drachmæ quatuor, omphacii drachmæ duæ, æris drachma, squamæ æris drachmæ octo, ericæ fructus drachmæ tredecim, lachrymæ papaueris drachmæ uiginti quatuor, croci drachmæ quatuor, castorii drachmæ tres, myrrhæ drachmæ sex, lycii Indici, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quatuor, rosarum recētium drachmæ duæ & semissis: uino falerno aut furrētino, aut aminzo, aut chio austero perteruntur, inungitur per triduum, aqueum ex sœnugræci succo instillatum, deinde ex ouo aut lacte, postremo aqueo crassius.

## COLLYRIVM EX DECOCTIS, DIA ZEMATON DICITVR.

- 40 Cadmiæ unciz sedecim, cerusæ unciz octo, amyli, opii, tragacanthæ, acaciæ, singulorum unciz duæ, gummi unciz sex: lęuigantur decocto rosarū siccarum, meliloti, capitem papaueris, dulcis radiculæ, pari singulorum modo.

## COLLYRIVM DIA HYDRIAS, REPELLENS.

Liquoris qui in uasis cerealibus tophi modo cōcretus reperitur, librę tres, cadmię uſtę & elotę libra, ceruſę, pompholygis, terrę ſamię, qui aſter dicitur, ſingulorum elotorum uncia ſex, thuris uncia, myrrhę tantundem, ſucci lini feminis, herbę pulicaris, triſanę, ſcēnugraci, ſingulorum libra, 8  
tragacanthę uncie ſex, gummi libra.

## COLLYRIVM ILAMBONIS.

Cadmię uncia, pompholygis uncie quatuor, ceruſę libra, tragacanthę, gummi, opii, ſingulorum uncia quatuor: aqua pluuiatili teruntur.

CINEREVM, QVOD SPODIACON DICITVR, AD IN- 10  
flammationes, deſluxus, & chemoliſin.

Thuris, ſtimmi, ſingulorum denarii centum, cadmię, ceruſę, utriuſq; denarii uiginti quatuor, terrę ſamię, papaueris lachrymę, ſingulorū denarii tres, gummi denarii quindecim: lę uigantur oleę coliculi ſucco. ſit autem iſ in hunc modum: teneriora oleę folia elota contunduntur in mortario, 15  
paululo aquę ſuperfuſo, per linteolum exprimuntur.

COLLYRIVM EX OLEAE TVRIONVM SVCCO TE-  
nerum, dia thalias uocatur.

Thuris drachmę quatuor, ſtimmi drachmę quindecim, cadmię drachmę uiginti octo, ceruſę drachmę quadraginta nouę, terrę ſamię drachmę o- 20  
cto decim, opii drachmę ſex, gūmi drachma, plūbi uſti eloti q; drachmę octo: excipiuntur oleę turionum ſucco.

## DIA THALIAS.

Aeris cremati drachmę duodecim, ſandycis uncia uiginti quatuor, folio-  
rum oleę uncia duę, opii tantundem, gummi uncia decem, uino ſpahi- 25  
te uel aminę excipiuntur.

## DIA SMYRNON CLAVDIACVM.

Glaucii, ſarco collę, ſingulorū drachmę quadraginta octo, croci drachmę uiginti quatuor, opii, myrrhę lapidis hęmatitis, ſingulorum drachmę ſex, 30  
tragacanthę drachmę quadraginta octo, gummi drachmę ſedecim: ui-  
no Italico ſubiguntur. uſus eſt ex ouo.

## ALIVD DIA SMYRNON AD RHYADAS ET AEGYLOPAS.

Cadmię lotę, lapidis hęmatitis eloti, ſingulorū denarii uiginti octo, myrrhę, ſpodii Cyprię, ſingulorum denarii uiginti quatuor, opii denarii octo, 35  
croci denarii quatuor, (alii octo) piperis albi grana triginta, gummi denarii ſedecim: uino Italico teruntur. ex ouo adhibetur collyrium: ſi uisum ſit recens, aquatum.

## STACTICVM PROSECHII.

Cadmię, gummi, ſingulorū drachmę uiginti, ſtimmi, atramenti ſutorii, ſingulorum drachmę octo, opii drachmę quatuordecim, eruginis rafe dra- 40  
chmę decem, piperis albi drachmę ſex, croci drachmę octo, miſyos crudi

tantundem, opobalsami drachmæ quatuor: aqua conteruntur.

## HYGIDION AMMONII.

Cadmiz, æris, singulorum drachmæ sedecim, cerusæ, castorii, aloës, croci, singulorum drachmæ quatuor, squamæ drachmæ quinq, rosarum floris, 5 plumbi usti, singulorum drachmæ octo, lycii drachmæ tres, lapidis schisti drachmæ quatuor, opii drachmæ decem, acaciæ drachmæ quadraginta, gummi drachmæ quadraginta octo: aqua excipiuntur.

## OLYMPOS SEV OLYMPIACVM.

Acaciæ, spicæ nardi, thuris, singulorū drachmæ octo, æris cremati elotiꝯ, 10 stimmeos usti & loti, cerusæ concrematæ lotæꝯ, cadmiz, singulorū drachmæ duodecim, myrrhæ, opii arefacti, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ quinq, æruginis rasæ drachmæ tres, lapidis schisti, squamæ rubræ, lycii Indici, omphacii, singulorum drachma, castorii, rosarum floris, singulorum drachmæ duæ, phœnicobalanorum drachmæ quatuor, si 15 militer ossæ palmularum ustarum ligna numero quinq, gummi unciz quinq, aqua pluuiali superfunduntur, in qua commadescant tres dies totidemꝯ: noctes, calami odorati, alterci seminis, rosarum siccarum, singulorum drachmæ quatuor, phylli drachma.

## NARDINVM.

20 Cadmiz, croci, gummi, singulorum drachmæ triginta sex, æris usti drachmæ octodecim, stimmi, acaciæ, singulorum drachmæ triginta, nardi syriacæ drachmæ duodecim, opii, myrrhæ, singulorum drachmæ sedecim: aqua subiguntur.

## THEODOTION MINVS.

25 Stimmi, acaciæ, singulorum drachmæ uiginti, æris usti drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, myrrhæ totidem, æruginis drachmæ duæ, aloës, meconii, lycii, singulorum drachma: pluuiatili aqua læuigantur.

## RHINARIVM.

Lapis hæmatitis, lapidis schisti, singulorum drachmæ sedecim, æris cōbusti, cadmiæ, æruginis, singulorum drachmæ octo, opii drachmæ quinq, 30 chalcitidis drachmæ duæ, gummi drachmæ octo: uino excipiuntur.

## XYSTER.

Pumicis, misyos, ostreorum, singulorum crematorum unciz sex, cadmiæ, opii, chalcitidis ustæ, croci, aloës hepaticæ, castorii, phylli, singulorū drachmæ duæ, stimmios, acaciæ, singulæ unciz, æris cōbusti unciz quatuor, 35 myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor, spicæ nardi drachma, cerusæ drachmæ octo, gummi drachmæ quatuor: aqua cœlesti superfunduntur. Nonnulli etiam uinum miscent.

## HECATOMBE, AD CICATRICES CRASSAS.

40 Cadmiz ustæ lotæꝯ, æris cremati & eloti, uniuscuiusque drachmæ octo, stimmios combusti, acaciæ rubentis, gummi, singulorum drachmæ quin-



decim, aloës, gallæ, æruginis uermicularis, castorii, lycii, spicæ nardi, croci, opii, myrrhæ, cerusæ, hebeni ramenti, chalcitidis, singulorum drachma, rosarum drachmæ sexaginta: aqua pluuiali teruntur.

## COLLYRIUM EX CORNU, DIA

ceratos dicitur, Galeni.

Plumbi combusti, cornus ceruini cremati, singulorum unciz duæ, cerusæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepis restæ combusti, æruginis, myrrhæ, gummi, singulorum uncia: aqua pluuiali excipiuntur.

## COLLYRIUM E' THVRE, DIA LIBANV NVNCVPATVR.

Thuris unciz sex, cadmiæ, pompholygis, terræ samiz, amyli, gummi, singulorum unciz tres, cerusæ unciz sex, squamæ æris unciz quatuor, tragacanthæ unciz tres, opii unciz sex: aqua cœlestis adiicitur.

## LIBANIVM.

Cadmiæ elotæ, amyli, singulorum denarii duodecim, cerusæ tantūdem, spodii, pompholygis, terræ samiz, plumbi usti & loti, tragacanthæ, singulorum denarii octo, opii denarii duodecim, gummi denarii quatuor: aqua pluuialis additur, & ouorum uiginti albumina. Sunt qui etiam myrrhæ denarios quatuor addant.

## ASTER MAGNI.

Pompholygis, cadmiæ, cerusæ, singulorum drachmæ sedecim, plumbi drachmæ octo, amyli drachmæ octodecim, thuris drachmæ decem, terræ samiz drachmæ duodecim, myrrhæ drachmæ duæ, tragacanthæ, gummi, singulorum drachmæ octo: aqua additur.

## VRANIVM.

Terræ samiz, piperis, singulorum unciz tres, spodii eloti uncia, gummi unciz quatuor, stimmios cremati eloti: unciz duæ, squamæ lotæ uncia, opii unciz duæ, cadmiæ combusti & elotæ drachmæ duæ: aqua pluuiatilis admiscetur. Carnem inducit, repellitq.

## COLLYRIUM EX SVCCO FOENVGRAECI.

Cadmiæ, tragacanthæ, singulorum unciz octo, cerusæ unciz triginta, amyli tantūdem, opii uncia: leuigantur succo fœnugræci.

## COLLYRIUM CLEONIS.

Pompholygis, plumbi, singulorum unciz quinque, croci fescuncia, squamæ æris quod stomoma dicitur uncia, gummi unciz duæ: aqua pluuialis additur, aquatum illinitur.

## DIA RHODON, HOC EST, EX ROSIS, QVÆ

septuaginta duas uncias pendunt.

Rosarum uiridiū unciz septuaginta duæ, cadmiæ usti & elotæ denarii uiginti quatuor, æruginis rosæ denarii duo, spicæ nardi denarius, squamæ æris elotæ denarii duo, stimmios combusti eloti: opii, myrrhæ, singulorum denarii tres, croci denarii octo, amyli denarii duo, gummi denarii uiginti quatuor: aqua pluuialis admiscetur.

## ALBUM DIA RHODON.

Cadmiz cremata & lota, ceruse elota, singulorum libra, amyli, opii, tragacanthæ, singulorum uncia tres, aloës fescuncia, gummi uncia tres, croci fescuncia, rosarum unguibus detractis uncia sex: aqua miscetur.

## 5 COLLYRIVM EX ALOE, DIA ALOES NVNCVPATVR.

Cadmiz, ceruse, aloës, singulorum uncia decem, rosarum uiridium uncia sex, amyli uncia tres, opii uncia, tragacanthæ uncia duæ, gummi uncia tres: aqua pluuiatilis adiicitur.

## CROCINVM DIA RHODON.

- 10 Spicæ nardi, rosarum siccarum, aloës, singulorum drachmæ duæ, alterci albi fescuidrachma, croci drachmæ quantior & semissis, glaucii uncia sex, fareocollæ tantundem, opii drachmæ duæ, tragacanthæ uncia: aqua pluuialis additur.

## NILI DIA RHODON.

- Rosarum tenerarum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, papaueris obolus, gummi drachmæ quatuor: aqua cœlesti excipiuntur.

## LYNCEVS AD CLARITATEM OCVLORVM.

- Cadmiz, æris combusti, guttæ ammoniacæ, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatitis, opii Thebani, singulorū drachmæ sex, aloës hepaticæ, fellis taurini, galbani, sagapeni, singulorum drachmæ quatuor, æruginis rase, opopanacis, salis ammoniaci, singulorū drachma, gummi drachmæ sex: aqua pluuiali teruntur.

## PROTEVS AD IDEM, CICATRICES QVE EXTENVAȚ.

- Cadmiz, ceruse, chalcitidis crudæ, singulorum denarii quadraginta, piperis fescuidenarius, liquoris cyrenæici drachmæ octo, croci denarii duodecim, opii Thebani denarii decem, sagapeni denarii duodecim, oliuæ Aethiopicæ denarii duodecim, auripigmenti, aluminis scissilis, singulorum denarii octo, myrrhæ denarii duodecim, suffiminis ammoniaci denarii uiginti, opopanacis denarii sedecim, opobalsami denarii decem, gummi denarii uiginti: aqua pluuiali excipiuntur.

## 30 COLLYRIVM EX SVCCO FOENICVLI.

- Cadmiz pondo drachmæ septemdecim, atramenti Indici pōdo drachmæ sedecim, piperis longi pondo drachmæ tredecim, & albi duodecim, liquoris cyrenæici pondo drachmæ octo, opobalsami pondo drachmæ sex, spicæ nardi pondo drachmæ sex, sagapeni, opopanacis, singulorū pondo drachmæ quinque, opii pondo drachmæ quatuor, euphorbiū pondo drachma, gummi pondo drachma: succo fœniculi leuigantur.

## COLLYRIVM EX OPOBALSAMO.

- Cadmiz, ceruse, singulorum drachmæ octo, omphacii drachmæ quatuor, piperis albi uncia sedecim, opii drachmæ quatuor, opobalsami, gummi, singulorum drachmæ sedecim: aqua pluuialis additur.

## THALASSEROS.

Cadmiz unciz octo, æruginis unciz duæ, arramenti Indici unciz octo, piperis albi unciz quatuor, liquoris medici uncia, opobalsami unciz duæ, gummi unciz sex: aqua adiicitur.

## HARMATION.

Guttæ ammoniaci, aris cōbusti, corticis thuris, singulorū drachmæ quatuor, æruginis drachma, gūmi drachmæ quatuor: aqua cœlesti excipiuntur.

## COLLYRIVM MALABATHRINVM, QVOD

& Isotheon dicitur.

L. R. positiū  
ex Galeno.  
○ Galenus  
duo.

\* Galenus,  
stimmi o-  
cto, gummi  
quadragim-  
ta.

Cadmiz denarii sedecim, aris usti & eloti denarii quattuodecim, opii, lycii Indici, malabathri, nardi Indici, croci, aloës, singulorū denarii duo, L. ce-  
rusæ denarii octo, castorei denarii ○ octo, myrrhæ denarii quatuor, acaciæ, \*  
stimmi, singulorū denarii quadraginta: aqua teruntur. usus ex ovo.

## COLLYRIVM VINO EXCEPTVM, DIA OENV DICITVR.

Cadmiz, lapidis hæmatitis, & schisti, singulorum drachmæ quadraginta, aris usti drachmæ triginta, chalcitidis drachmæ triginta duæ, papaueris se-  
minis drachmæ tredecim: papaueris semen aqua decoquitur, succus ex-  
pressus aliis adicitur, quæ lēuigantur uino spathite uel aminēo.

## ALIVD EX VINO.

Aeris combusti, cadmiz placitidis, singulorum unciz nouem, lapidis hæ-  
matitis eloti unciz sex, croci, myrrhæ, aloës, suffiminis ammoniaci, singu-  
lorum unciz tres, lycii Indici, spicæ nardi, singulorum sescuncia, piperis  
albi grana centum quinquaginta, acaciæ rubentis unciz nouem, gummi  
unciz tres: uino falerno aut aminēo teruntur.

## COLLYRIVM EX DVOBVŚ LAPIDIBVS

ad aspritudinem.

Lapidis hæmatitis, schisti, cassiæ, singulorū denariū octodecim, eris, ca-  
dmiz, opii, æruginis rasæ, singulorum denariū nouem, gummi tantundem,  
chalcitidis usti denarii sex: aqua teruntur.

## ARIDVM COLLYRIVM GALENI, QVOD

oculos tuetur.

Lapidis phrygii minutim cōtusi usti; in ollula quousq; incādescat, & re-  
stincti butyro nō ueteri, deinde iterū similiter cremati, extincti; uino fa-  
lerno, ac rertiū usti & extincti melle siccati; pōdo libra, eris cremati, pife-  
ris albi, phylli, singulæ unciz, stimmi sescuncia: omnib' in liquorē detritis  
quū medicamētū ab igne auferet, liquoris balsami nō crassi, (id enim a-  
scere medicamētū prohibet) sed lucidissimi uncia inijciat. Vti autē eo cō-  
uenit in palpebris dūtaxat, sic ut specillo illato tunice nō attingant, sed ut  
solū medicamētū palpebris apertis illinat. Inūgi autē debet nō semel, ue-  
rū sepius, tū ante cibū, tū secundū ipsum, magisq; ubi iā lippitudo sentit.  
Miraculū enim est, qđ omni alio medicamēto secun' ab iniuria uindicet.

## ARIDVM DIA CROCVM.

Sarcocollę drachmę octo, croci drachmę quatuor, glaucii tantundem: inungitur frequenter dic. Nonnulli uero aloē quoque miscent.

ALIVD ARIDVM AD SICCAM LIPPITVDI.

nem quę xero phthalia dicitur, sycosin, se-  
pedonas, carnis excrecentias.

Cadmię denarii decem, chalcitidis denarii uiginti, piperis grana quindecim, nardi gallicę denarius: teritur cadmia & chalcitis cum uino: ubi inaruerint, reliqua adiiiciuntur, cogunturq; in pollinem.

HYGRA, HOC EST, LIQVIDVM COLLY-  
rium, ex caucalide.

Caucalidis succi, chamędryos, coronopodis, interdū & othonnę succi par mensura. Est autem othonna magnum chelidonium.

ALIVD AD SYCOSIN, QVAE EST VETER-  
rima palpebrarum asperitudo, encanthidas

& excrecentiam carnis.

Misyos tosti drachmę sex, atramenti sutorii drachmę quatuor, mellis at-  
tici sextarius.

ERASISTRATI PANCHRESTOS HYGRA, MI-

rifica est in oculariis uitiis, tonfillis, puden-  
dis & auribus suppurantibus.

Aeris denarii sex, misyos tosti, myrrhę, singulorum denarii tres, croci ses-  
quidenarius, piperis denarius, uini chii & passi cretici, utriusque sesquihe-  
mina: omnibus in uino laugatis, dum inaruerint, passum superfunditur,  
& usq; ad melleam spissitudinem incoquantur.

AGGLVTINAMENTA OCVLORVM QVI DE-

fluxionibus infestantur.

Terrę samię, mānz, thuris, myrrhę, pares modi, oui aquaro excepti, in lin-  
teumq; illiti fronti imponuntur. ALIVD. Alterci seminis drachma, opii  
tantundem, myrrhę drachmę duz, croci drachma, farinę pollinis dra-  
chmę quatuor, ouorum tostorum lutea duo, albumine oui excipiuntur.

DE EMPLASTRIS, ET MEDICAMENTORVM QVAE

in illa mittuntur coctione, tum qui cerę modus cum oleo  
esse debeat, ex commentariis Antylli.

Cap. XVII.



Edicamentorum quę emplastra ingrediuntur, alia sunt terre-  
stria, utpote metallica, lapidumq; & terrę species, flores, cinis,  
& conchylia, alia sunt oleamenta, alia lachrymę, alia liquari  
possunt: quędam liquores, quędā succi sunt: semina uero, her-  
bas, & radices modicas recipiunt. Cæterum ex ipsis emplastris nonnulla  
sunt uulneraria, quę enema, quod cruentis iniiciātur: colletica, quod glu-  
tinent: & catagmatica, quod fracturis accommodentur, appellamus. Consta  
re autē ex siccantibus non summę, uerum secundi ordinis absoluti, & tertii

R iiii

incipientis, oportet, cuiusmodi sunt salix, quercus, cupressus, piceæ & tedæ cortices, myrrha, thuris lachryma, bitumen, aloë, aristolochia, cinis sarnē taceus, cerusa, spuma argenti, & pleraque ex metallicis. Coqui debent quousque manus amplius non inquinent. Porro quæ cicatricem ducunt emplastra & ipsa ex siccantibus componuntur, uerum efficacioribus quam glutinatoria, quod genus est, æs combustū, squama tum eius tum ferri, ærugo, chalcitis, æris flos combustus, alumē, galla, plumbago, cadmia, pumex, & ostracea. Digerentia uerò & calefacientibus & siccantibus modice fiunt, nempe aristolochia, thapsia, oleo ueteri, & raphanino, melle, opobalsamo, pice, resina terebinthina, galbano, sale combusto, salis flore. Quæ emolliunt, ex argēti spuma, adipib<sup>9</sup>, medullis, oleo ueteri, propoli, ammoniaco, styrace, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, uel radice althææ & cucumeris syluestris, præparant. Siccantia, ex sulfure, nitro, sale, cinere, & bitumine. Ad extrahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro, propoli, ærugine, fermento, stercore, sulfure terebinthina. Quæ concoquunt, ex cera, ladanio, uua passa, amomo, croco, tbure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, hyssopo, adipe, ærugine. Pus mouentia, ex hydreleo, polline, pane tritico, chōdro, butyro, adipe suillo & uitulino, thure, pice, resina. Quæ uero leniūt, argenti spuma cōstant, cerusa, oleo, anetho, chamæmelo, amylo, cera tracta. Iam uerò enzima dicta, recētibus adhuc uulneribus & fracturis iniici debēt, adiutariq<sup>ue</sup> ē summa splenioque parte spongiis posca madentibus, simul illigatis, solui tertio quoque die, & rursus eadem splenia non alia accommodari oportet. At quæ emolliunt, extrahunt, digerunt, concoquunt, & pus præterea mouent, post cataplasmatū ceratorumque usum adhibentur. Quæ leniūt etiam per initia statim, summis potissimum partibus applicantur. Cæterum quomodo coquantur, deinceps exequemur.

#### BASILICVM TETRAPHARMACVM.

Cera, resinz colophoniz, picis, seui taurini, pares portiones.

EMPLASTRVM EX SVCCO LINI SEMINIS,

digerens detergensq<sup>ue</sup>.

Olei ueteris dupondo, ceræ unciz uiginti, resinz colophoniz, adipis suilli, singulorum pondus & dimidium, argēti spumæ pondus, cerusæ unciz sex, succi lini seminis tantundem, farinae pollinis uncia, thuris unciz quatuor.

EMPLASTRVM EX MELLE, DIA MELITOS DICTVR.

Argenti spumæ, ceræ, olei, singulorum librarum quatuor, terebinthinæ resinz librarum duarum, mellis, adipis suilli, singulorum libra. ALIUD. Argentæ spumæ librarum sex, olei librarum quinq<sup>ue</sup> & semissis, resinz colophoniz librarum septem & semissis, ceræ librarum tres & semissis, mellis librarum tres.

EMPLASTRVM A SVCCO DIA CHYLON DICTVM.

Argentæ spumæ pondus sex, olei, æstare quidem pondus septem, hycme

uero pondo nouem sænugræci ○ semisextarius: lini seminis tantundem,  
 \* althææ repondo: althææ, seminaq; in uiginti aquæ sextariis discoquun- ○ Oribasius  
in sextarius  
\* Oribasius  
althææ radice,  
cit.  
 tur, quousque paululum ex ea relictum fuerit, inde succi pondo quatuor,  
 exprimuntur miscenturq; oleo ac incoquuntur dum ebullire desierint,  
 5 posthæc argenti spuma in tenuissimum pollinem detrita inspergitur, po-  
 stremo omnia igne non acri excoquuntur usquedum digitos intinctos  
 non inquent.

EMPLASTRUM EX POLLINE FARINACEO,  
 dia gyreos appellatum.

10 Farinacei pollinis, guttæ ammoniaci, singulæ libræ, resinz è picea derafæ,  
 ceræ, adipis suilli, singulorum libræ duæ, succi lini seminis quod satis est.

EMPLASTRUM AB HERBIS BOTANICVM  
 dictum.

Lapathi rhexelzi, anchusæ chæro spelethi, hoc est, onoclez, heptaneuri,  
 15 plantaginis, singulorum unciz tres, olei libræ sex, adipis suilli tantundem:  
 herbæ oleo excoctæ proiciuntur, reliqua cum oleo cliquantur.

EMPLASTRUM EX HASTVLA REGIA, DIA  
 asphodelu dicitur.

Hastulæ regiæ radicis succi libra, rosacei, chamæmelini, adipis anserini, sin-  
 20 gulorum unciz duæ, adipis suilli unciz tres, ceræ unciz quatuor.

EMPLASTRUM E FERMENTO, ABSCESS-  
 sus rumpens.

Fermenti axungia, singulorum unciz sex, salis unciz quatuor, piceæ resi-  
 25 næ unciz tres, ceræ unciz quatuor, aphronitri uncia, guttæ ammoniaci un-  
 cia duæ, mellis unciz sex, saponis unciz duæ.

EMPLASTRUM DOTHIENE.

Suffiminis ammoniaci pondo, nitri Alexādrini unciz sex, aphronitri tan-  
 tundem, adipis suilli pondo duo, ceræ totidē, resinz terebinthinæ pondo,  
 olei ueteris uncia, aceti quod satis est.

30 EEMPLASTRUM EX RADICE LANARIA, DIA  
 struthiu dicitur, strumas discutiens.

Argenti spumæ, radicis lanariæ, aristolochiæ, singulorum triens, galbani,  
 squamæ griseæ, aloës, singulæ unciz, mannæ sextans, stillæ ammoniacæ se libra,  
 resinz picea unciz sedecim, aceti scillini sextarii quatuor, ad aridorum le-  
 35 uigationem.

SMILION AD ABSCESSVS.

Olei ueteris sesquilibra, argenti spumæ, nitri rubri, salis ammoniaci, cineris  
 lixiui è sicu qui primus destillauerit, proto stactos dicitur, resinæ, singulo-  
 rum libra, galbani, guttæ ammoniaci, singulorum unciz tres, atramenti su-  
 40 torii unciz quatuor, ceræ unciz sex, fruginis, opopanax, singulorum un-  
 cia, aceti quod satis est: argenti spuma & frugo in oleo coquuntur dum

manus non inquinent, deinde reliqua admiscuntur.

EMPLASTRUM DIA SCORODON, HOC EST,  
ex aliis, ad rumpendum.

Cerae unciae sex, resinae colophoniae unciae quatuor, resinae pityinae, hoc est ex picea arbore unciae tres, seu taurini unciae quatuor, nitri rufi sciscinia, 5  
allia pura uiginti, olei dimidium sextarii: alia in oleo excocta proiciuntur, reliqua miscuntur.

EMPLASTRUM DIA APYRANV AD DISCVTIENDVM.

Adipis asferini, & fasianorum, singulorum unciae tres, olei ueteris unciae uiginti sex, herbae pulicaris unciae tres, urticae seminis, radices apyrani uiridis, 10  
singulorum libra, cerae tractae unciae decem, emplastri quod dia chylon inscribitur unciae duae, resinae terebinthinae uncia. Radix apyrani minutim concisa cum herba pulicari in oleo madescit, semenque urticae per noctem & diem: ac ubi excocta fuerint, ipsa quidem proiciuntur: quae liquari possunt, oleo mixta soluantur. 15

EMPLASTRUM PYRINE, AD DVRTIAS ET SCIRROS.

Althaeae, palmularum, aut dactylorum qui nicolai dicuntur, singulorum 20  
librae duae, scenugrae, lini seminis, singulorum sextarii dimidium, chamemeli, meliloti, palmularum corticis singulorum unciae sex, uini aminae sextarii dimidium, spumae argenti libra, cerusae, resinae colophoniae, singulorum 25  
librae duae, cerae, resinae terebinthinae, singulorum libra, olei ueteris librae quinque, aquae librae duae, panis aridi cotuli cribrati: librae quinque: herbae in uino decoctae exprimuntur, succo panis immadescit, sequenti die laeuigatur, argenti spuma, cerusaque in aqua, deinde oleo iniecto incoquuntur, dum medicamentum digitos non coinquinet, inde reliqua adduntur, sub 30  
latis ab igne panis inditur, ualdeque rudicula agitur. adiguntur etiam zruginis, rasa & salis floris, singulorum unciae sex, iridis, aristolochiae, singulorum unciae sex, terebinthinae resinae libra J.

L. Am. redm  
dat. aut duo  
sunt empla-  
stra.

PELARION EX SCORIA ARGENTI, DIA HELCY-  
smatos dicitur, ad similia abrasa. 35

Cerae, seu taurini, singulorum unciae quinque, scorae argenti unciae sex, resinae colophoniae unciae quatuor, picis olei, singulorum unciae duae: scoria argenti arida leuigatur uino uel succo scenugrae: quod si scoria desideretur, plumbagine utimur. 40

EMPLASTRUM EX ALTHAEA, PODAGRICIS ALI-  
isque duritiis accommodatum. 45

Succi scenugrae, & lini seminis, & althaeae, singulorum trepondo, olei dup-  
do: incoctis usque dum succus absumatur, colophoniae resinae pondo, ad-  
dicitur, item terebinthinae resinae pondo, hederis lachrymae quadrans: ubi solu-  
ta fuerint, & ab igne sublata, cerae pondo iniicitur, galbani triens: utraque si- 40  
mul contusa solutaque rudicula agitantur.



## CISSINVM AD NERVORVM VVLNERA,

punctus, &amp; maximè diuturna.

Squamæ rubræ uncia quatuor & semissis, thuris uncia, misyos fescuncia, chalcitidis drachmæ quatuor, aceti sex: læuigantur æstiuo sole usq; dum acetum fuerit consumptū, deinde solutis ceræ uncias octo, olei octo decim misceto. Si autem diuisus fuerit neruus & nudus sit, in uicem galbani, resina terebinthinæ uncia duæ induntur.

## MELANCHLORON AD EADEM, ET CRVENTIS APTVM.

Malicorii, aris cōbusti, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ aris, aluminis scissi & liquidi, (alii uice liquidi rotundū ponunt) iridis, misyos, atramēti sutorii, chalcitidis, æruginis rasæ, cadmiæ, aloës, myrrhæ, thuris, panacis radicis, argenti spumæ, cerusæ, pares omnium portiones, teruntur in sole æstiuo cum aceto diebus pluribus, singunturq; pastilli. Emplastrū uerò fit hunc in modum: medicamenti uncia duæ, ceræ uncia sex, olei uncia octo, in netuorū uulneribus ueteris, in aliis cōmunis, tēperant.

## EMPLASTRVM EX SENETIONE, QVOD DIA

erigerontos dicitur.

Senetionis succi libræ duæ, olei ueteris sesquilibra, cyprini olei uncia quatuor, axungie ueteris libra, resinæ terebinthinæ uncia, galbani semuncia, resinæ piceæ uncia sex, æruginis, thuris, hyssopi medicamenti, singulorū uncia, squamæ aris scrupula octo, ceræ uncia decē, apochymatis uncia quatuor decim: oleum & succus ad fordium spissitudinem incoquitur cum adipis: arida cyprino læuigantur, galbanum cum cera contunditur & cacabo demittitur, apochyma si quidem siccum fuerit, læue in cretum poterat inaspergitoq; quod si in læuorem deteri nequeat, portione olei solutum excipiat, atq; tunc omnia misceantur.

## EMPLASTRVM MNASAEI DISCVTIENS.

Ceræ, axungie porcine, singulorum libra, resinæ colophonice uncia sex, argenti spumæ libræ duæ: uini genetosi libræ quatuor adiciuntur.

## ARIOBARZANION, AD EOSDEM AFFECTVS.

Argenti spumæ fescuncia, cerusæ libra quincunx, aquæ marinæ uncia uiginti quinque, olei ueteris sesquilibra, buccinorum concrematorum uncia septem & semis, ceræ rufæ uncia nouē, resinæ terebinthinæ uncia sex, thuris uncie tres scrupula tria & dimidium.

## EMPLASTRVM EX DRACVNCVLO.

Ceræ, resinæ colophonice, picis aridæ, axungie, resinæ, singulorum libræ quatuor, guttæ ammoniacæ libræ duæ, dracunculi radicis libræ quinque: radix arida læuis aliis solutis inspergitur.

PSITACIVM.

Ceræ, resinæ colophonice, adipis suilli, alterci foliorum tenerorū, uel succi corum, æqualis modus. In Alexandria autem ceræ libræ duæ semis, alterci libræ duæ, axungie libræ duæ semis, colophonice resinæ libræ decem

miscentur, magisq; discutit medicamentum.

## MYRSINATVM.

Argenti spumæ, cerusæ, sandycis, plumbi combusti & cloti, singulæ unciz, ceræ unciz sex, olei myrtei libra, uini quod satis est.

## EMPLASTRVM EX CERVSA, VEL OVIS.

Ceræ tractæ unciz sex, rosacci sescquilibra, argenti spumæ unciz duæ, cerusæ tantundem, amyli unciz tres, ouorum quinque aquara.

## EMPLASTRVM, QVOD LIQVIDVM

fit parygrum uocatum, Oribasii.

Argenteæ spumæ sescuncia, cerusæ tantundem, ceræ triens, pinguis suilli septunx, resine colophonie dodrans, lini seminis succi, olei, singuli dextantes: mirifice facit ad calcanei rimas. in ulceribus autem (inquit) uitant, namea tetri odoris reddit.

## EMPLASTRVM DIA CADMIAS, CI-

caticem inducens.

Chalcitidis ustæ unciz duæ, cadmiæ, mannæ, singulorum uncia, ceræ, resine colophonie, olei myrtei, singulorum libra, uini quod satis est.

## PALMVLATVM, PHOENICINE DICTVR.

Axungie ueteris libræ duæ, olei libræ tres, argenti spumæ tantundem, chalcitidis crudæ uncie sex: primum chalcitis cum oleo in pila commodiore leuigarur, uel in sole: ubi fordium spissitudo facta fuerit, etiam spuma argenti prius detrita superiniicitur, postea adeps: postquam probe in pollinem redacta fuerint, leni igne incoques, quoad digitos non inquinent, palmarum rudicula agitans.

## EMPLASTRVM EX ANCHVSA, AMBVSTIS EFFICAX.

Ceræ tractæ uncie nouem, rosacci uncie octodecim: his liquatis porphyridos anchusæ radice sicce læuissimæ uncias quatuor inspergito. ALIUD. Anchusæ radice uiridis, marrubii, gummi, singulorum uncie tres, decoctæ in olei uncis nouem proiiciuntur, oleo ceræ tractæ unciz quindecim superiniiciuntur, omniaq; soluuntur.

## EMPLASTRVM EX POMPHOLYGE, POM-

pholygeron appellatum.

Pompholygis unciz duæ, argenti spumæ unciz tres læuigantur cum lini seminis succo, adiiiciuntur ipsis liquatæ refrigeratæq; ceræ unciz sex, adipis anserini uel gallinacei uncie duæ, chamemelini unciz sex.

## PHILOCOTYCHE, DOLOREM LENIENS,

ad sedem utilis.

Thuris uncie septemdecim, myrthæ uncie septem, opii drachmæ quatuor, aluminis scissilis drachmæ duæ, butyri drachmæ quatuor, ouorum tenuium lutea quatuor, cadmiæ crematæ & clote drachmæ quatuor, pompholygis drachmæ sex, ceræ tyrrhenicæ drachmæ octo, adipis anserini drachmæ

fedecim, medullæ ceruinæ drachmæ undecim, plumbi cremati clotiq; drachmæ nouem, lapidis hæmatitis drachma, hyssopi liquidi drachmæ quatuor: arida læuigantur cum uino Italico: quæ liquari possunt, admiscuntur.

## EMPLASTRVM AMITHAONIS, AD ARTICVLOS

- 5 recenti cicatrice contractos, conuulsosq; est etiam ad extrahendum efficax.

Ammoniæ, ceræ, bdellii, singulorū drachmæ octo, resinæ terebinthinæ, iridis illyricæ, galbani, singulorum drachmæ uiginti.

## EMPLASTRVM ARISTOPHANIVM EMOLLIENS.

- 10 Picis libræ quatuor, apochymatis libræ duæ, ceræ libra, opopanax uncia, aceti hemina.

## EMPLASTRVM EX PLVMBAGINE AD CALIDOS affectus.

- Plumbaginis uncia quatuor, spumæ argenti uncia duæ, cerusæ tantundē,  
15 ceræ uncia octo, myrtei libræ duæ: uino læuigantur arida.

## CORACON EX OXYMELITE, AD NATURALIUM uitia &amp; nomas accommodatum.

- Gallæ unciæ duæ, squamæ fescuncia, chalcitidis, thuris singulorum uncia: teruntur aceto diebus compluribus, deinde mellis uncia quinque miscen-  
20 tur: ubi uerò seorsim ceratū feceris, ex myrtei uel rosacei uncis duabus, seu taurini uncis octo, ceræ uncis quatuor, resinæ terebinthinæ uncia, mixta simul læuigato & utitor, quemadmodum medicamento quod charta constat, tum ex penicillo, tum ex linamento.

## EMPLASTRVM EX OXELAE.

- 25 Argenti spumæ pars una, olei, aceti, singulorum partes duæ, nonnulli treis ponunt.

## EMPLASTRVM EX ACHATE, DISCVTIENS emolliensq;.

- Lapidis achatis semiuisti fescuncia, ceræ uncia quinque, resinæ frictæ uncia  
30 tres, olei uncia.

## ISIS CRVENTIS ACCOMMODATA, AD GLVTINANDUM, carnem inducendum, &amp; purgandum.

- Squamæ zris, zris combusti, aristolochiæ rotundæ, singulorum denarii octo, aluminis scissi denarii sex, salis ammoniaci, thuris, guttæ ammoniacæ,  
35 singulorum denarii octo, myrrhæ, aloës, galbani, singulorum denarii duo decim, dracunculi radice succi denarii octo, ceræ libra, resinæ colophonice libræ duæ, olei ueteris uncia tres, aceti quod satis est.

## ATHENA, AD VLCERA SORDIDA, IMPASTa, neruorum uulnera.

- 40 Malicorii, zris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ & lōgæ, aloës, guttæ ammoniacæ, squamæ zris, aluminis scissilis & rotundi, iridis, misyos, atramē  
\* Aloës libb  
ponitur, sicut  
te hic pro se

his ammoniacis, ut Galenus habet in eiusdem nominis compositione.

ti futorii, chalcitidis, æruginis rasæ, cadmiæ, aloës, myrrhæ, thuris, propolis, galbani, singulorum uncia, ceræ drachmæ ducunt, picis tantundem, resine colophoniz drachmæ centum, olei uncia sex, acetici quod satis est.

## EMPLASTRVM DIA DICTAMNVM, GLVTINANS,

ad canum morsus, & omnigena ulcera.

Argenti spumæ pondo duo, squamæ æris sefcũcia, olei ueteris sextarii duo, diphrygis uncia tres, gentianæ sefcuncia, aristolochiz, aluminis scissilis, singulorum uncia duæ & semis, dictamni tantundem, colophoniz pondo, mannæ uncia tres, guttæ ammoniaci uncia sex, propolis uncia duæ, ceræ unciæ sex & semis, primum oleum cum argenti spuma incoqui debet dum incrascescat, nec digitos inquinet, deinde lebeate deposito æruginem & squamam iniicies, rursusq; incoques, dum manum non inficiant, iterumq; cacabum ab igne tollens, resinam & ammoniacum incretũ adicies, mouens donec feruere desinant, mox in igne repones, ac ubi modicè inferbuerint, æs & diphryges admiscebis, ac rursus coques usq; dum firma spissitudo facta fuerit, deinde ceram iniicies, eaq; discocta ut digitos non coinquinet, propolin immittes, his abundè refrigeratis, mox aloën, mannam, dictamnũ, aristolochiam, gentianam, singula læuissima insperges.

BARBARA, EMPLASTRVM QVOD CRVENTIS PROTI-  
nus uulneribus iniicitur, & fracturarum callos firmat.

Bituminis Iudaici, picis aridæ, ceræ, resine, singulorũ libra, terebinthinæ uncia duæ, argenti spumæ uncia, cerusæ sefcũcia, mannæ uncia duæ, opopanax uncia duæ, zingiberis uncia duæ, olei uncia tres, acetici quãtũ sufficit.

EMPLASTRVM EX SALICIBVS, DIA ITEON AP-  
pellatur, glutinans, cruenta excreantibus, & purulentiæ efficax, thoraci impositum.

Misfos, chalcitidis, æruginis, cerusæ, gallæ, aluminis scissilis & rotũdi, crætæ futoriz, singulorum uncia sex, ceræ libræ duæ, resine picæ libræ duæ, picis tantundem, malicorii uncia sex, bituminis libræ duæ, salicis foliorũ totidem, olei rosacei uncia quatuor, atramẽti futorii uncia sex, acetici quod satis est. sunt qui terebinthinæ uncias nouem addant.

EMPLASTRVM NICOLAI AD RECENTIA VVLNERA,  
ra, & sinus glutinandos aptum.

Squamæ æris uncia quatuor, æruginis rasæ sefcuncia, argenti spumæ tantũdem, aristolochiz lōgæ & rotundæ, singulorũ uncia, aluminis scissilis & rotundi, singulorũ uncia, atramẽti futorii uncia, sulfuris uiui uncia, gallæ omphacitidis unciæ quatuor, salis ammoniaci uncia, misfos uncia, origani uncia, chamæleõtis uncia, cadmiæ botryitidis uncia, ueratri albi uncia, peucedani uncia tres, apii feminis uncia duæ, symphyti radice sefcũcia, cerusæ sefcũcia, mædragoræ succi semũcia, chalcitidis sefcũcia, terræ samiz uncia, thuris masculi uncia, aloës uncia, bdellii unciæ duæ, opii thebani tantundẽ,

zingiberis troglodytici semuncia, stilla ammoniacæ uncia, scenugræci uncia sex, perdicii herbæ succi uncia sex, ceræ flauæ uncia tres, resina colophonica libræ duæ, resinæ pityniæ, hoc est è picca libra, polentæ tantundem, mastiches uncia sex, picis nigre libræ duæ, olei ueteris libra, styracis uncia,

5 opopanacis sescuncia, aceti quod satis est.

ICESIOS AD STRUMAS, ABSCESSVS, LIENEM,  
articulos & coxendicum dolores.

Argenti spumæ denarii centumviginti, olei ueteris sextarii duo, aceti sextarius, æruginis sescquidenarius, picæ corticis denarii octo, chamæleontis radicis, euphorbii, hypocistidis succi, propolis, zingiberis, helenii, pyrethri, singulorum denarii sedecim, ceræ libræ tres.

EMPLASTRUM NERONIS, AD ICTVS, OMNEMQ; particularum carnosarum dolorem.

Olei ueteris sescquibra, argenteæ spumæ libra, ceræ, resinæ picæ, singulorum uncia septem & semissis, guttæ ammoniaci uncia quatuor, cerulæ tantundem, galbani, mannæ, zingiberis, thuris, singulorum uncia.

OXERA, MVLTIPPLICIS VSVS.

Picis aride libræ duæ, ceræ libra, guttæ ammoniacæ uncia, resinæ terebinthinae libra, galbani uncia duæ, mannæ unciæ duæ, aceti sescquiseptarius.

10 ACERATOS, HOC EST CERÆ EXPERS,  
emplastrum Galeni, glutinat, concoquit, ulcera  
ad suppurationem perducit, ex ricinino ueteri oleo, medicaminis in linteolos illiti modo, solutum.

25 Argenti spumæ trepondo, \*olei ricinini, aut ueteris pondo 0 quatuor, aceti quàm acerrimi dupondo, æris squamæ nigre, chalcitidis, æruginis, singuli sextantes: argenti spuma cum oleo incoquitur, dum strigmenti fiat spissitudo, deinde metallica compluribus diebus ex aceto læuigata adiiciuntur.

\* Galenus, olei ricinini ueteris.  
O Galeni quatuor mis.

30 EEMPLASTRUM EX METALLICIS.

Chalcitidis uncia, misyos unciæ duæ, squamæ æris unciæ tres, thuris tantundem, colophonice unciæ duæ, galbani sescuncia, ceræ libra olei quincūx, aceti quod satis est.

ARMENIA, FRACTVRIS ACCOMMODATA.

35 Chalcitidis unciæ quatuor, squamæ æris uncia duæ semis, æris cremati uncia, thuris uncia duæ, olei libra, aceti tantundem: coquuntur metallica in oxelæo, dum manum non inquinant, inde thus adiicitur.

MELAENE SERAPIONIS.

Spumæ argenti libra, ceræ uncia septem, guttæ ammoniaci uncia tres & semis, galbani, æruginis, singulorum denarii noui, resinæ colophonice uncia septem, myrrha drachma, olei sescquihemina: argenti spuma cum oleo inco-

quitur quousq; digiti intincti non inquinentur, deinde adiiciuntur reliqua.

ANICETOS, AB INSVPERABILI VI APPELL-  
latum emplastrum, glutinat, discutit, squamas sepa-  
rat, & ad articulos recenti cicatrice con-  
tractos ualet.

Baccarū lauri, iridis aridæ, thuris, singulorum drachmæ sexaginta, æris cō-  
busti drachmæ uiginti, nitri, salis, guttæ ammoniaci, singulorū drachmæ  
uiginti, pyrethri, herbæ pedicularis, cachrys, grani gnidii, sinapis, colum-  
barum stercoris, aristolochiæ, cumini, æruginis, iunci quadrati, erucæ semi-  
nis, singulorū drachmæ octo, aceti hemina duodecim: læuigantur sub æstu  
caniculæ, quousq; acetum consumatur, deinde decocti caricarum crassissi-  
mi unciz nouem adduntur, quibus mixtis pastilli fiunt, siccanturq; ubi u-  
tendum est, pastillotum ipsorum unciz duæ læuigatæ aceto miscentur, re-  
sinæ unciz tres, ceræ tyrrhenicæ unciz duæ, olei tantundem.

EMPLASTRVM EX LOLIO, DIA AERON DICITVR.

Picis libræ duæ, resinæ piceæ unciz nouem, ceræ tyrrhenicæ unciz quinque,  
olei unciz tres, bituminis in creti unciz duæ, lolii farinæ sextarius, aceti quā-  
tum sufficit.

EMPLASTRVM EX LIQVORE SYCAMINO.

Argenti spumæ, picis aridæ, seui taurini, singulorum unciz octo, terebin-  
thinæ unciz tres, ceræ unciz quinque, æruginis rasæ, popanacis, galbani,  
singulorum uncia, olei ricinini, aut fusini, aut admodum ueteris hemina,  
picis liquidæ tantundem, liquoris sycamini cuius fructus sycomora di-  
cuntur, hemina.

EMPLASTRVM A DVPLICI COLORE DICHRO-  
mon appellatur.

Aeris combusti, aluminis scissilis, guttæ ammoniaci, singulorum uncia,  
ceræ libra, resinæ colophonis libra, seui suilli libra, aceti quod satis est.

INDICE AD VLCERA QVAE SERPENDO DEPA-  
scunt, & sanguinis sputum.

Ceræ, resinæ frixæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacynthi, singulorum li-  
bra, cerusæ, chalcitidis, misyos, cretæ sutoriæ, aluminis scissilis & rotūdi, gal-  
læ omphacitidis, malicorii, singulorum unciz sex, aceti quod satis est.

EMPLASTRVM EX CINERE ASPIDVM, DIS-  
cutit strumas & podagras.

Resinæ terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudaici, singulorum de-  
narii trecenti sexaginta, ceræ, baccarū lauri, stillæ ammoniaci, aphtonitri,  
seui uitulini, singulorū denarii trecenti quadraginta, lapidis pyritis, calcis  
uiuæ, singulorū denarii centum quadraginta, cineris aspidum totidē, olei  
ueteris hemina duæ: refrigerato medicamēto cinis inspergitur. fit etiā sine  
cinere, quod nonnulli eū auerfentur, & nihilominus etiā lapis a suis efficiat.

## LEAENA, SICCAT, DIGERIT·QVE.

Suffiminis ammoniaci, plumbaginis, singulorum denarii cētum, sinapis denarii octo, chamæleontis radices denarii sedecim, resinæ colophonice denarii centum, squamæ æris, lanariæ radices, singulorum denarii quinq; eu phorbii, æruginis, singulorum denarii octo, aristolochiæ denarii sedecim, pyrethri denarii octo, olei ueteris hemina, raphanini quantum sufficit.

## ALITER LEAENA, CORPVS RECOLLIGIT,

humoresq; euacuat.

Attramenti sutorii uncia duæ, auripigmēti uncia, ueratri nigri, thoracum  
10 cātharidum, singulorū sesquidrachma, sandarachæ uncia tres, ceræ sesquidra, resinæ frictæ libra, olei hemina duæ.

## MACE DONICVM.

Ceræ, resinæ colophonice, picis, seui taurini, lachrymæ thuris pares portiones: eliquatis, ac sublati ab igne lachryma thuris inspergitur.

## 15 SPHAERION AD ARDORES.

Cerusa, argenti spuma, calcis uiuæ, singulorum uncia tres, ceræ sescuncia, berenicarii, rosacei, singulorum uncia: liquefacta aridis superfunduntur, ac orbiculi formantur, quum usus incidit, olei uncias sex liquato cum duabus ceræ, adiicitoq; medicamenti unciam & agitato: refrigeratum ex aqua un  
20 ciis nouem contundito, ego etiam ternas rosacei uncias addo.

## EMPLASTRVM EX OCHRA, INFLAMMATIO-

nem arcet, tum sponte, tum in iudicio,  
tortis idoneum.

Ochræ atticæ libræ duæ, cretæ libra, argēti spumæ uncia octo, uino laui  
25 gatæ, ceræ, resinæ colophonice, picis, resinæ piceæ, singulorum libra, resinæ terebinthinæ uncia octo, olei libræ duæ hunc in modum soluuntur: ceræ libra, olei ueteris libræ tres, medicamenti libra, uino conteruntur.

## EMPLASTRVM EX CEDRIA, GLVTINAT, DI-

gerit, abstergitq;.

30 Ceræ, picis, singulorum libra, resinæ colophonice uncie octo, cedrini liquoris uncie sex: liquata simul incoquantur, dum digitos non coinquinent.

## ALIVD EMOLLIENS.

Ceræ, picis, singulorum uncie octo, resinæ colophonice drachmæ uiginti  
35 quinq; propoleos drachmæ septēdecim, cedrini liquoris drachmæ uiginti.

## EMPLASTRVM EX PVMICE, AD CICATRI-

cem ducendam.

Myrtēi libræ duæ, ceræ libra, pumicis cremati uinoq; restincti drachmæ sex, squamæ ferri quod stomoma dicitur drachmæ sex, æris uisti, cimolice  
40 singulorum drachmæ quinque: super linamentum spongiamq; ex aqua accommodato.



EMPLASTRVM PAVLA, STRVMIS ET BVBNIBVS efficac.  
Cera, resinæ colophoniz, nitri, singulorum libra.

EMPLASTRVM DIA NITRV, AD CARBVNCVLOS.  
Nitri tosti unciz tres, ceræ, olei, resinæ colophoniz, singulorum sesqui-  
drachma, liquoris cyrenaici aut medici drachmæ decem: imponitur in  
linoleis solum.

EMPLASTRVM EX ANEMONE.  
Anemonæ unguibus detractis unciz duz, ceræ unciz quinq, olei unciz  
quatuor, resinæ quinq & semis, colophoniz resinæ libræ duæ & semis.

EMPLASTRVM MACHERIONIS VIRIDE, AD  
coxendicum cruciatus, articulos  
infarctos, & abscessus.

Opopanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, iridis, guttz ammoniaci, aristolo-  
chiz, singulorum uncia, resinæ terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singu-  
lorum unciz septem.

VIRIDE ALIVD SIMPLEX.  
Resinæ libræ tres, ceræ libra, æruginis rasæ selibra, thuris drachmæ uigin-  
tuinq, aceri quod satis est.

ALIVD VIRIDE, AD HVMIDA VITIA ET  
carnis excrescentias.  
Resinæ colophoniz unciz sex, æruginis rasæ sescuncia, ceræ unciz duz,  
salis Cappadocii uncia, rosacei unciz duz, aceti quantum sufficit.

PEGANERA AD PLEVRITICOS.  
Rutæ uiridis pondo, butyri sesquipondo, resinæ terebinthinæ pondo & qua-  
drans, hyssopi medicamenti tantundem, opopanacis quadrans, galbani  
tantundem, anethi pondo.

EMPLASTRVM DIA STACTES, HOC EST EX  
cinere lixiuo stillatio, coxendicum do-  
loribus, articulariis, & tumoribus  
œdema referentibus, utile.

Ceræ, olei ueteris, cineris lixiui qui primus destillauerit, singulorum libra,  
resinæ frictæ, nitri Alexandrini, nitri albi, resinæ terebinthinæ, singulorum  
unciz sex: utrunq; nitrum lixiuo teritur.

EMPLASTRVM E' NITRO AD ABCESSVS,  
scirros, & tumores.  
Olei ueteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiuii, singulorum libra, resinæ tere-  
binthinæ unciz sex, galbani, propolis, guttz ammoniaci, singulorum un-  
cia: præparatur quemadmodum superius.

EMPLASTRVM EX SALE, DIA HALON DICITVR.  
Ceræ pondo unciz quatuor, olei pondo libra, salis cōmunis pondo unciz qua-  
tuor, aphronitri tantundē, cerusæ pondo unciz octo, aceti pondo unciz duæ,

ad arida conterenda. ALITER. Salis cōmunis, nitri singulorū unciz quatuor, cerz, olei ueteris, singulorum unciz sex, aquz marinæ quod satis est.

EMPLASTRVM DIA PTERNES, EX PERNA,  
rophos soluit.

5 Perna suille ueteris pinguis, guttę ammoniaci, casei ueteris uaccini aut caprilli, seu iaurini, apochymatis quæ est naui rasura, singulorum libra, medullę ceruicę unciz octo, hyssopi cerati unciz tres, cyprini olei unciz sex, uini Aegyptii quod satis est.

EMPLASTRVM DIA CINNABAREOS, HOC EST EX

10 cinnabari ad tophos aliosq; omnigenos tumores induratos, dicitur pamplethes.

Argēti spumæ libra, olei ueteris sextarius, squamæ zris uncia, zris usti tantundem, cinnabaris scrupula octodecim, lapidis magnetis uiui uncia, lapidis phrygii drachmæ sex, lapidis pyritis, cadmiæ, æruginis rasæ, thuris, singu-

15 gulorum uncia, diphrygis unciz duę, aloës sescuncia, galbani tantundem, lapidis onitis scythici scrupula octodecim, lapidis hæmatitis uncia, propolis libra scrupula uiginti octo, cerę unciz septemdecim, lapidis perdicitis uncia, (in alio perdicati habet) betonicę uncia scrupula octo, gētianę uncia, aristolochię longæ & rotundę drachmę quatuor, \*chameleontis nigri un-

\*Græci habet adiecti semuncia nimirum superflua, nisi aliquid desit

20 cia, dictamni scrupula quadragintaduo, resinæ aridę libra, seu i struthiocameli libra: lapides cum spuma argenti teruntur seorsim, adiectis salis floris libris duabus, donec totum absumatur.

EMPLASTRVM EX AVELLANIS, DIA LEPTOCARYON dicitur, ad articulorum tophos probatum.

25 Cineris lixiui qui primus destillauerit unciz sex, auellanaŕū partis interioris unciz duz, aphronitri unciz sex, olei ueteris libra, saponis gallici unciz quatuor, mellis unciz octo, ouorum sex aquata, cerę unciz decem, resinæ terebinthinæ unciz duz: lzuigantur ex lixiuo.

DIA TVRPAENES CERATVM AD PODAGRAM,

30 dolorem leniens mirabiliter.

Quinto Martii mensis die, olei communis sextarios duos lebeti in domo subterranea infundito, coquitoq; lignis è uite: ubi inferbuerit, turpenzæ marini piscis libram adiecto, asphaltacis animantis quod nonnulli madamudam uocant, sanguinis uncias quatuor, incoquitoque dum carnes piscis 35 dissoluantur aut torrefiant, deinde exemptis illis, olei & cerę momentum adiecto in spissitudinem, ut mollissimum fiat ceratum, quod linteolo illitum impones.

MEDICAMENTVM EX VRINA MVLI, PODAGRICIS VTILE.

40 Vrinæ muli sextarii quatuor, argenti spumæ libræ duz, olei ueteris mystrum, xrita diu omnia ut strigenti spissitudo fiat, incoquito donec digitos non inquinent.

MEDICAMENTVM EX LAPIDIS ASII FLORE,  
Philagti, ad scirtos.

Peucedani radices, asii lapidis floris, si non adsit, salis, guttae ammoniacae, lanatum succidarum crematarum, singulorum uncia, aristolochiae rotundae, pumicis, canini stercoris, rutuginis rasa, squamae aris, mysios singulorum scrupula octodecim, castorii tantundem, myrrhae uncię tres, aceti quā-acerrimi tantundem, cerę uncię duodecim & semis, resinae piceae, picis brutię, singulorum uncię octodecim, semis, scrupula sex, olei ueteris quod sufficit.

EX EODEM, GALENI.

Cerę, resinae terebinthinę, singulorum libra, lapidis asii, manne, singulorum tres uncię, cyprini uncię duę, aquę lixię quantum satis est.

MEDICAMENTVM EX SALIS FLORE, ARTICVLARIIIS in declinatione accommodatum.

Resinae terebinthinę, resinae frictę, resinae piceae, cerę, singulorum libra, picis aridę, aluminis scissilis, salis floris, singulorum semibra: coquantur in lebe.

MEDICAMENTVM QVOD NVTRIENDAE VL-  
cerum carni est.

Rosacei, resinae terebinthinę, mellis, singulorum uncię duę, cerusę, butyri, singulorum uncia, alii etiam thuris unciam addunt.

MEDICAMENTVM ITALICVM AD PVRGANDVM  
sordida, inducendumq; catnem.

Erinę (dico autem sylvestris ficus) tenerum corticem oleo excoctum proiicito, cerę rusę quantum satis est in oleo liquefacito, in linamenta illito utitor.

ENTATICON, QVASI DICAS INTENSORIVM.

Satyrri, pudendi ceruini, scinci caudę, singulorum drachmae duae, erucae seminis, pythetri, cachryos, cerę, singulorum drachmae quatuor, resinae terebinthinę drachma, oua passerum troglutarum tria, stelliones transmarini tres, olei laurini uel irini quod satis est: macerantur uiui in aceto stelliones ad dies triginta, uase cui insunt in fimo defosso.

: CHRYSÆ, CRVENTIS VVLNERIBVS ACCOMMODATA,  
Thuris, aluminis scissilis singuli sextantes, colophoniae resinae libra, olei quadrans, auripigmenti sextans, oxelae quod satis est.

CATAGMATICE QVOD EST FRACTVRIS IDONE-  
um medicamentum, Oribasii.

Picis brutię libra, uncię quatuor, argenti spumę tantundem, thuris uncię octo, resinae terebinthinę uncię quinę, seui taurini libra, uncię quatuor, galbani, opopanax, singulorum uncia, cerę uncię quatuor, olei ueteris libra, aceti uncię quinę.

CATAGMATICE AD FRACTVRAS CVM VVLNERE

citra'que id factas, ex commentariis Heracliti.

Picis aridæ mina, argenti spumæ tantundem, mannæ minæ dimidium, seu uirulini mina, ceræ tyrrenicæ uncie uiginti sex, opopanacis uncie octo, æruginis rasæ, æris cyprii, singulorum minæ quinq; & decima eius portio, resinæ rerebinthinæ sesquimina & quinta portio, æris uncia, ricinini, aut olei ueteris hemina, aceti hemina semissis.

#### LIQVIDI HYSSOPI MEDICAMENTI PRAEPARATIO.

Sertulæ campanæ uncie quatuor, cardamomi uncie duæ, lanarum bene sordidarum uncie sex: macerata in uini duobus sextariis ad triduum incoquito, dum paululum fuerit reliquū. his ablatis miscenrur uino olei uncie tres, coquunturq; dum exiguum supersit, atq; uino etiam tunc adiiciuntur resinæ colophoniz uncie decem, terebinthinæ tantundem: nonnulli uero & eæ dextantem miscent, hyssopi herbæ unciam, aliisq; incoquunt: alii lanas uino eluūt: ubi deficearint, uinum cum sordibus lanarum addūt, quas pinon etiam appellant. quum usus incidit, tæis ex eo uncias mittūt, tum reliqua ut comprehensum est.

#### QVOMODO MEDICAMENTA QVÆ EMPLASTRA ingrediuntur coqui debeant.

##### ARGENTI SPUMA.

In medicaminum coctionibus argenti spuma cum oleo decoquetur. Conuenit autem laxatam rursus ex oleo conrerere, ut sordiu fiat spissitudo, inde leni igne contineretur excoquere, mouēdo. initio igitur intumescit & in bullas atrollitur: ubi uero iam fere satis incocta fuerit, colorem fæci similiorem recipit. Modus coctionis est, quum à tumore subsidet, & manus non inquinat.

##### PLUMBAGO.

Plumbago similiter argenti spumæ excoquitur, sed eousq; dum non modo digitos non inquinant, uerum etiam ex igneo colore in rufum & uchementer floridum elanguescat.

##### AES CREMATVM.

Aes crematum non protinus ab initio ad coquendū iniicitur, sed ubi emplastrum semicoctū fuerit. finis coquēdi est quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superet, & emplastrum rufum efficiat.

##### SORI ET DIPHRYGES.

Sori & diphryges demittuntur & ipsa inter coquēdum lebeti: diphryges autem sicut & squama, eousq; coquitur dum colore reliqua uincat. sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum reddatur, digitosq; non inquinet.

##### CHALCITIS.

Chalcitis incoquitur æris modo, coctionemq; ipsius metimur inde si emplastrum fuluum magis & phœniceum euaserit.

prius incoctæ, ac prius quàm reliqua quæ possunt iniici spissescet.

## RESINA.

Resina arida, cum cera immittitur: liquida ante omnia alia ipsa priuatim decoquitur, nisi admodum paululum eius assumatur.

## PIX.

5 Pix ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, liquidæ, dum inspissatur: aridæ, maxime dum non amplius inter coquendum ebullit, neq; in turgescit.

## APOCHYMA, PIX NAVIBVS DERASA.

10 Apochyma læuigatum cribroq; ab excrementis suis secretum, emplastro posteaquam coctum fuerit, inspergitur. Si autem molle fuerit, cum oleo soluitur, sed prima ratio coquendi exactior est, quod scilicet in secunda pondus non conseruetur.

## BITVMEN.

15 Bitumen inter initia iniectum coquitur, non autem id in læuorem deterere oportet, quoniã asperitudines fici oliuarumq; granis interioribus similibus, obtinet. Quapropter in crassiores particulas confringendum est, coquendumq; in aceto, sic ut non agitetur usq; dū ebullire desinat. Ego uero (inquit Timocrates) in oleo decoquens, uoti compos euasi.

## PROPOLIS.

20 Propolin emollire & discoquere oportet. siquidem à coctione neutiquam diffunditur. At si & ceram emplastrum recipiat, propolin cum illa quem admodum & galbanum, contusam iniiciemus.

## AMMONIACVM.

25 Ammoniacum circiter mediam coctionem iniicitur: detritum uero si potest fieri & in tenuē redactum puluerē inspergere conuenit: sin minus, cum liquore quodam læuigatū iniicere: si emplastrū cruentis uulneribus adaptabitur, cū aceto aut ulno: si fistulis aut strumis, omnino cum aceto: at si molle futurū est, qualia sunt quæ ano accommodantur, cum aqua: inde in fordiū spissitudinē coactū aliis refrigeratis infundere ne efferuescat.

30 OPOPANAX.

Opopanax multo post ammoniacū inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex uino aceto uel prius læuigandus est.

## GALBANVM.

35 Galbanum neutiquam coctionē tolerat, uerū emplastro ab igne sublato, quo spissescat, sic ut digros non inquinent, emollitum inditur.

## SAGAPENVM.

Sagapenum tunditur in pila, & teneriusculum redditum cum emplastro ubi ab igne sublatum fuerit, emollitur.

## ALOE.

40 Aloë secundum coctionem inspergitur.

## LACHRYMA PAPAVERIS.

Stomacho igitur iniici debet, si non cōcoquit, aut infirmatur, aut inflatioe laborat, malagmata ex seminibus, meliloto, aloë, absinthio, sampsucho, nardo & mastiche. Iecori autē ex myrobalano confecta, ammoniaco, pinguibus, & chamæmelino. At lieni applicantur, quę constant calce uiua, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, ætugine, ammoniaco & aceto: iis aut qui alui fluore laborāt, ex cēnāthe, alumine, melino & aliis astringētibus præparata. atq; hæc etiā per abusiōem communiter malagmata nominant, & si diuersam à molliendo uim repræsentent. Si uero ardor uiscera  
 10 urgeat, ut in febribus ardentibus, ex croco competūt malagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut intybi, aut herbarū seminalis, adipe suillo, & spuma argenti: si perfrixerunt, ea quę opobalsamum, phyllum, casamum, & piper recipiunt. Pectori, quum sanguis eiicitur, prosunt astringentia siccantiaq; ex alumine, salice, & bitumine. In tabe quę phthisis dicitur, conducunt ex baccis lauri, marrubio, cardamomo, & lixiuio confecta.

15 **MALAGMA EX SERTVLA CAMPANA, DIA**  
 meliloton dicitur.

Croci, nardi gallici, iunci angulosi, cardamomi, iridis, myrrhæ, singulorū unciz duæ, sertulæ campanæ libra, stillæ ammoniacæ tantundem, ceræ librarū tres, resinæ terebinthinæ libra, olei cyprini librarū tres, gleucini librarū  
 20 duæ, bdellii unciz sex, nonnulli etiam cyphi uncias duas addūt, uini quod satis est.

**POLYARCHION EX COMMENTARIO GALENI DE**  
 compositione medicamentorum cata topos.

Ceræ, resinæ terebinthinæ, bdellii, suffiminis ammoniaci, cardamomi, iun  
 25 ci quadrati, singulorum mina, (sertulæ campanæ, ) amomi, nardi Indica, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, singulorū denarii uiginti quinque, olei cyprini hemina, uini Italici quod satis est: præparato ac utitur, interim meraco, interim cetato quod cyprino sit, soluto.

*L. Inflatur  
 tum ex Ga  
 leno,*

**ALITER POLYARCHION.**

30 Xylobalsami, costi, iridis, iunci quadrati, myrrhæ, iunci rotundi floris, cardamomi, thuris, spicę nardi, mastiches, styracis, bdellii, amomi, phylli, croci, cassiæ, pyrethri, aristolochiæ longæ, singulorum uncia, guttę ammoniacę fescuncia, resinæ frictæ tres unciz, resinæ terebinthinæ libra, medullæ ceruinę unciz duę, ceræ librę duę, opobalsami unciz sex, uini uncie octo.

**PHILAGRIANVM.**

35 Croci fescuncia, aloës, ammoniaci thymiamatis, bdellii, styracis, singulę unciz, adipis anserini sextās, hyssopi medicamenti triens, palmularū sextans, ceræ libra, nardi selibra, melini uncie sex, uini quod sufficit ad sicca lęuigāda: per triduum macerantur mouenturq; rudicula ter die, deinde incoquū  
 40 tur oleo, secūdo die cardamomum aqua pridie maceratum, tertio autē crocus, uino. Nonnulli cum croco etiā alias quinque myrrhæ uncias adiiciūt:

illis autem exemptis, oleum purum reponunt, omni uero specierum facce in pastillos coacta siccataq; id habent quod crocorna gma dicitur.

## MENDESIVM.

Dictum est Mendesium quod in Aegypto reperitur, ubi & Mendes, hoc est caper colitur. Recipit autem olei balanini libram, alias sextarios decē, myrrha, cassia fistula, singulorum uncias treis, resinę terebinthinę librā, in alio, sextarios decem, cinnamomi uncias treis: hoc non decoquitur, sed aridis inditis diebus sexaginta agitur, inde liquefacta terebinthina in partem olei mittitur, postea rursus diebus aliis septem mouetur, atque sic reconditur.

## MARCIATVM.

Mastiches, cerę, styracis, singulorum uncias tres, hyssopi medicamenti semuncia, opobalsami fescuncia, nardini, glucini, olei omphacini, singulorum uncias tres, medullę ceruinę fescuncia, terebinthinę uncia.

## EMBOLE PRIMA, DIA OMPHACOS.

Aspalathi, rudiculę palmarum, fertulę cāpanę, iridis, iunci rotundi floris, xylobalsami, rosarum siccarum, calami aromatici, singulorum uncie tres, olei omphacini librę decem, uuz immaturę succi tantundem.

## EMBOLE SECUNDA, EX CARYOPHYLLO.

Ammoniacy, spicz nardi, costi, caryophylli, cassię, casami, singulorū uncias tres, in alio etiam habetur arnabo uncias tres, uini quod sufficit.

## EMBOLE TERTIA.

Thuris, gutta ammoniaci, styracis, bdellii, myrrha, mastiches, singulorū uncias tres, uini quod satis est, cerę tractę uncie quinq; opobalsami uncie sex, nonnulli uncias octo. Primę emboles medicamēta, pridie in uuz immaturę succo oleo que macerantur; quotidie rudicula palmea: tertiz ad triduum, post quod in cacabo nitente primū emboles primę medicamenta incoquuntur, quousq; pauxillū a coris uuz relictum fuerit: mox secundę emboles species cum uino immittūtur, rectius aut fieri si prius aliis exemptis, puro deinde oleo ipsę adiiciantur, coquāturq; donec paululū uini super sit, ne aduratur oleū: sublata ab igne eximito, superq; adicito rursus oleo puro tertiz emboles medicamenta, prius ex uino in pila soluta pręter styracem quemadmodum prędixi, hic enim cum aliis inditus promptē soluitur. Coques autem carbonibus quousque bene habere tibi uideantur: sublata ab igne refrigerari finito, insequenti die exceptis diligenter ex oleo calfactis que abundē super ignem ceram adicito, inde sublata rudicula agitato, ubi refrixerint, opobalsamū admisceto, & uitreis uasis reponito.

## GLEVCINVM, EMBOLE PRIMA.

Olei sextari decē, musti aminę sextarii sex, aspalathi uncie quatuor, palmę fructus operimēti quod spathe dicitur uncia sex, iunci rotundi floris tantundē, fertulę campanę uncias quatuor, rosarū uncia, myrrha uncie tres,



foliorum lauri uncia duæ, arboris thuris uncia sex, xylobalsami totidem, inulæ campanæ uncia sex, aristolochiæ longæ uncia tres, iridis tantundem: hæc macerantur in musto.

## ALTERA EMBOLE.

- 9 Nardi gallicæ uncia quatuor, casami, qui est balsami fructus uncia duæ, cyperi, cassiæ, spicæ nardi, asari, amomi, costi, sampsuchi, singulorum uncia tres, calami aromatici, caryophylli, folii herbæ, singulorū uncia, cardamomi uncia quatuor, balsamum uino odorato madefcit.

## EMBOLE TERTIA.

- 10 Mastiches triēs, myrrhæ troglodyticæ, bdellii, singuli sextātes, ladani quadrans, styracis liquidi, thuris masculi, singuli trientes, opobalsami selibra, nonnulli & croci sextantem addunt: præparatur quemadmodum medicamentum ex uua immatura, nisi quod ceram non recipiatur, hic autem septē diebus oportet species duarum embolarum macerari.

- 15 NARDVS CIZICINE, EMBOLE PRIMA.

Olei primi meriti sextarii decem, aspalathi, cypiarum, inulæ campanæ, iridis, xylobalsami, aristolochiæ, cardamomi, iunci rotundi floris, singulorū uncia sex, sampsuchi uncia quatuor, herbæ sabinæ uncia duæ, nonnulli & calami odorati uncias duas immittūt: hæc in uini odorati sextariis quaternis commadescunt.

- 10

## ALTERA EMBOLE.

Cassiae, casami, arnabo, singulorum uncia duæ, spicæ nardi uncia tres, caryophylli uncia, costi, amomi, singulorū uncia, nonnulli etiam nardi gallicæ uncias duas addunt, atque hæc in uino macerantur.

- 25

## TERTIA EMBOLE.

Myrrhæ troglodyticæ, aloës, thuris, singulorū uncia duæ, styracis uncia tres, mastiches uncia quatuor, opobalsami uncia sex, quidam & croci uino laugigati unciam miscent. præparato & hoc sicut comprehensum est.

## DECAMYRON.

- 30 Spicæ nardi, phylli, euphorbii, piperis, costi, adarces, singulorū uncia, mastiches seiscuncia, opobalsami uncia sex, \* nardini libra, ceræ libræ tres.

## PENTAMYRON.

Syracis uncia, mastiches uncia duæ, ceræ albæ uncia tres, opopanax uncia quatuor, nardini uncia quinque, L foliati, phylli, singulorum uncia tres,

- 35 ammoniaci uncia, cassiæ uncia sex, ladani.

## EVODES, A GRATO ODORE DICTVM.

Croci, aloës, mastiches, lablinthii, styracis, ænanthæ, casami, caryophylli, singulorum uncia tres, nardi libra, ceræ tantundem, melini uncia sex, palmulæ duodecim, uini quod satis est.

- 40

## BATION.

Cardamomi, cassiæ, ænanthæ, nardi gallicæ, balauftiorum, propolis, singu

\* Græce est  
rat uia dicitur  
pro myrrina  
sic enim hæc  
bet Orisba  
sim.  
L Hæc sup  
flua sunt ut  
medicamen  
ti nomen est  
Orisbusus,  
indicat,

lorum scrupula octo, herbae sabinae, casami, amomi, singulorum scrupula sex, iunci rotundi floris scrupula octodecim, iridis scrupula quatuor, caryophylli sesquiserupulum, suffiminis Crinati unciae duae, thuris, myrrhae, singulorum uncia, ladani unciae sex: bdellii, mastiches, aloes, nardi, olei lentiscini, singulorum semuncia, resinae aemae quae zygia dicitur, resinae pieae, resinae terebinthinae, singulorum unciae tres, opobalsami uncia, guttae ammoniaci scrupula sex, cerae unciae sex: aenanthino liquida leuigantur, arida quoque contusa. in alio exemplari piperis quoque scrupula octodecim inuenio: nonnulli & moschi scrupulum unum addunt.

## GALENIVM.

Croci semuncia, aloes uncia, mastiches tres unciae, absinthii feminis scrupula octo, aenanthos tantundem, palmulae maiores tres, cerae unciae tres, olei melini unciae sex.

## ERYTHRIVM.

Scyracis unciae quinque, malorum coroncorum unciae viginti, masueche uel masuaphii, croci, singulorum denarii decem, psichae, cyphios, singulorum denarii quinque, aenanthos unciae duae semis, casami, absinthii, singulorum denarii decem, caryophylli scrupula quindecim, guttae ammoniaci scrupula decem, opobalsami scrupula sex & semis, nardi unciae quinque, resinae colophoniae, gleucini, melini, singulorum unciae decem, rosacei denarii decem, propolis unciae quinque, resinae terebinthinae unciae decem, mellis cochlearia decem, phylli denarii decem, spicae nardi tantundem, cerae unciae septem & semis: uino falerno aut aminzo conteruntur.

MALAGMA NILI AD LIENEM, OMNEM-  
que duritiem.

Cerae pondo, guttae ammoniaci pondo, olei cyprini pondo, croci semuncia, secundum alios uncia, aceti quantum satis est.

## CITRINVM.

Cerae, resinae colophoniae singulorum pondo libra, suffiminis ammoniaci, auripigmenti, calcis, aluminis, aceti, singulorum cyathi octo, leuigantur arida in aceto.

## MALAGMA QVOD AD CVREVM AVTHOREM refertur.

Picis aridae libra, cerae, resinae pieae, guttae ammoniaci, nitri, baecarum lauri aridarum, seui taurini, singulorum libram duam, farinam senu graeci sextarius, polinis frumentacei tantundem, chamaeleontis nigri radiis siccae libra.

MALAGMA EX STERCORE CAPRILLO ORIBASII,  
ad lienosos, hydropicos, & iecur induratum.

Cyprini, aut uetustissimi olei libram tres, cerae libram duam semis, fimi caprarum, baecarum lauri cortice detracto, iridis illyriae, singulorum sextarii decem, resinae terebinthinae libra, sinapis, nitri, cyperi, raphani feminis, capparis radi

cis corticis, singulorum uncia tres, cucurbita sylvestris carnis uncia duæ, fœnugræci uncia: interim arida excipiuntur liquidis, interim aceto maccrata: quod si alius profluat, cucurbita iniici non debet.

EX FIMO CAPRILLO, SPHONGION, HY-  
dropicis efficax.

5 Picis brutæ libra duæ semis, nitri libra una, cucurbita sylvestris carnis, pyrethri, opopanax, cocci gnidii, singulorum uncia tres, capparis radice corticis, thuris, iridis, adipis taurini, elaterii, squame æris, apii seminis, lathyridii, singulorum uncia sex, baccarum lauri sextarii dimidium, fœnugræci fari-  
10 næ semuncia, fellis taurini uncia duæ, olei cyprini sextarii dimidium, ceræ libra, resinæ frictæ libra tres, caprilli stercoris montani, cachrys, cyperi, cardamomi, singulorum uncia sex.

EX BACCIS LAVRI.

Ceræ, resinæ, picis, baccarum lauri, seu taurini, singulorum libra, nitri, gut-  
15 tæ ammoniacæ singulorum uncia sex, aceti quantum sufficit.

MEDICAMENTVM DIA SPERMATON.

Cardamomi, cyperi, herbæ sabina, nitri, baccarum lauri, cassia, fertulæ cam-  
panæ, fœnugræci, nardi gallicæ, apii seminis, sampsuchi, anisi, panacis radi-  
cis, thuris, guttæ ammoniacæ, terebinthinæ, singulorum uncia tres, mellis, ce-  
20 ræ, nardi, singulorum libra, seu taurini, (tantundem.)

MALAGMA A' FOEDO ODORE DYSODES  
dictum, ad pleuriticos.

Resinæ piceæ libra, ceræ, rutæ uiridis, cyprini, singulorum uncia sex, sulfa-  
ris uiui, opopanax, saga peni, singulorum drachmæ quatuor, nonnulli &  
25 galbani tantundem addunt.

MALAGMA DIA SAMPSYCHV.

Ceræ pondo, resinæ terebinthinæ pondo duo, sampsuchi, baccarum lauri, fœ-  
nugræci, singulorum sextarius, nardini quod satis est.

MALAGMA APOLLOPHANIS AD IECOROSOS.

30 Ceræ denarii octoginta, resinæ terebinthinæ, manna, singulorum denarii  
quadraginta, mortario irini sedimento uncto contunduntur.

COPTON AD DVRTIEM STOMACHI ET IOGINORIS.

Propolis uncia sex, styracis uncia duæ, mastiches uncia, resinæ terebinthi-  
næ semuncia, facis nardini quantum satis est.

MALAGMA EX OENANTHE.

45 Oenanthæ, aloës, croci, acaciæ, aluminis scissilis, rosarum siccarum, absin-  
thii succi, gallæ, omphacii, thus syriaci, manna, singulorum drachma, olei  
myrtei, ceræ, utriusque libra, palmulæ magnæ \* duæ, uini quod sufficit.

ANTYLIVM.

40 Aluminis scissilis semuncia, aloës uncia, mastiches scrupulū, oenanthæ scru-  
pula sex, omphacii scrupula octo, rosarum siccarum tantundem, thus syriaci

*L. Inflauræ  
tū ex Alex-  
andro.*

*\* Depravatū  
hic est  
exemplar  
græcū.*

scrupula decē spinæ Aegyptiæ totidem, balauftiorū scrupula uiginti, gal-  
larum scrupula quindecim, cerę uncie quinque, olei melini quod sufficit.

MALAGMA EX VINACEIS, DIA GIGARTON DIGITVR.  
Crocī, sandycis, labruscæ, singulorū uncia, aluminis sicci uncie quatuor,  
balauftiorū, omphacii, rosarum floris, myrtorū siccorum, singulorum un-  
cie duæ, ceræ tractæ libra, olei melini libræ duæ, malorū cotoneorū uncie  
quatuor, daſtyli qui nicolai dicuntur decē, uini aminæ quod satis est, uina  
ceorū aridorū uncie octo. in usu, medicamēti uncis tribus, cerę unā mīscēs.

#### ANETHINE.

Anethi uiridis uncie sex, fertulę campanę uncie duę, chamęmeli tātundę,  
capitum papaueris uiridium decē excoſtorū iuris libræ tres, & olei quod  
sufficit: ubi uero consumptū fuerit ius, adipis suilli recētis librę duę addun-  
tur, tritisq; priuatim scillæ toſtæ interioris uncis duabus & medullæ cerui-  
næ totidem, omnia mīscuntur.

#### AMBROSIA AD FEBREIS ARCENDAS APTA.

Argenti spumæ libra, adipis suilli recentis uncie sex, lini seminis succi tan-  
tundę, ceræ tractę uncie nouē, rosacæ libra, mellis uncie tres, croci uncia:  
nonnulli etiam ouorum decem lutea cruda addunt.

#### DE ACOPIIS, INVNCIONIBVS, DROPACIBVS,

& sinapismis.

Cap. XIX.



Copa inde nomen sortiuntur, quod præcipue ad lassitudinis  
quę copos gręce dicitur, puta tensiue, ulcerosę & eius quę ossa  
defatigat, sensum cōueniant, quanquā aliis quoq; morbis cō-  
pluribus sint ex usu. Alia siquidem ipsorum calefaciendi uim  
habent, alia emolliendi. Quę calefaciunt, pipere, pyrethro, cachry, & con-  
similibus constant: neruorū uitiiis, perfrictionibus ualidis & quæ uix ullo  
calore possunt euinci, accōmodata. Quę emolliunt, durities, scitros, & in-  
farctos articularum sinus discutunt, quorū materies capite de emplastris  
comprehensa est. At emollientibus quę ad arce, cachry, euphorbio, cocco  
gnidio, & id genus aliis componuntur, in diuturnis affectibus, & qui ægre  
possunt elidi, quibus etiam sinapismus congruit, utimur. Porro spissitudi-  
nem uniuerſa acopa inter cerata & emplastra mediam habere conuenit.  
Ynguina uero acopis similia, liquidiorē propemodum substantiam ob-  
tinent. At dropax duplicem recipit præparationem: hanc emplastro, il-  
lam malagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illinunt: materiam  
uero acopis & emplastris consinem. Cæterum usum cataplasmatum exhi-  
bet, diuturnis affectibus iisdem quibus & sinapismus, utilis, ideoq; ante il-  
lū assumitur, quo corpus sinapi reddatur idoneū, à sinapismo adhibetur,  
ut affectus reliquias discutiat. Sinapismus materiā quidē uariā non habet,  
uerum diuturnis potissimum affectibus post commemoratā aliorū præ-  
sidiorum uim, efficacissimus est: utilissime autē applicatur capiti in eius

dolore quem cephalæa dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur, Græci heterocraniam uocant, in morbo comitiali, uertiginibus, & insania: pectori aut in suspirio, orthopnoea, hoc est quum non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & rursi longa. At in diuturna humorum è capite in fauceis  
 5 destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & uenter in longis ipsorum morbis eodè obducuntur. Iam conueniens est præsidium sinapi coxendicium & podagricis doloribus, omniq; parti resolutæ, aut alio quodam modo perfrictionem expertæ, ut difficulter excelsi fieri possit. Ac  
 10 tunc profecisse satis id purato, ubi dolor subsequutus fuerit, ualidus, & caro liuidior altiorq; euaserit, & postq; ablorum fuerit mitius pustulæ eruperint. Quod si etiam sensus perierit, animum adhibere negotio cõuenit, parte quæ obliueris sæpius detecta: nam si uel immodice adurantur ira affecti non persentiscunt. Præterea in acutis morbis, utpote lethargo, profunda in somnum delatioe, (cataphora dicitur) & carocho, sinapi inducitur, per initia quidè,  
 15 cruribus: ubi uero materia radices egerit, capiti. Porro qui ira frigori paruerunt ut uix ullo modo queant incallescere, uis crura & inguina sinapi oblinuntur. In his autem qui continua febre laborant, ulcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum locis excarnibus, uitari debet sinapismus: nam partes carnibus uacuas si obducantur sinapi, uruntur, interim etiam nigrescunt.

#### 20 BROMION ACOPON.

Ceræ, resinæ colophonie, singulorum libra, adipis suilli uncie quatuor, butyri uncia sex, althæe, sænugræci, seminis lini, singulorum libram duam, olei libra, galbani uncie duæ & semissis: excoctio succo cum oleo quousq; magna illius pars fuerit absumpta, reliqua cum cera & galbano adiciuntur.

#### 25 ACOPON A VARIETATE POECILON DICTVM.

Succi althææ, sænugræci, seminis lini, rutæ, cumini, singulorum libram duam, medullæ ceruinæ, olei ueteris, adipis anserini, opobalsami: nardi, singulorum libra ceræ, colophonie & resinæ, singulorum sesquialibra, euphorbii, resinæ terebinthinæ, opopanacis, singulorum uncia sex, castorii uncia tres, herbarum unde succus exprimitur, singularum libra iniicietur, coques ut superius.

#### ACOPON AZANITAE.

Adipis suilli libram duam, seui taurini, resinæ colophonie, hyssopi medicamentum, ceræ, singulorum libra, galbani uncia tres.

#### ACOPON BASILII.

35 Althææ, chamæmeli, fertulæ campanæ, lini seminis, sænugræci singulorum sesquialibra, amomi uncia tres: hæc macerantur in uini Ascalonii aut Cilicii sextarii octo, per triduum, coquunturq; ad melleam spissitudinem, deinde succi libram quinque cum olei ueteris libris quatuor & semisse decoquuntur, quousq; modicum succi fuerit relictum, adiciuntur butyri uncia sex, resinæ terebinthinæ uncia quatuor, adipis anserini uncia quindecim, medullæ ceræ  
 40 uinæ cum momento olei læuigatæ uncia quinque, ceræ tractæ libram tres.

rebinthinæ libræ tres, ceræ libra.

# ACOPON EX NIGRA POPVLO, DIA AEGYROS

dicitur, ad eadem.

Loco fructus abietis, nigræ populi fructus æqua portio additur, & reliqua  
5 similiter illi præparantur.

## VNGVENTVM ZOSIMI AD TREMVLOS

celebratum.

Resinæ piceæ uncia sedecim, ceræ uncia quatuor, olei ueteris libra, opopana-  
naxis uncia duæ, adarce uncia, euphorbii tanrundē: nitri uncia quatuor,  
10 aphronitri teneri totidem: nitrum, euphorbiū, adarce cū uino leuigantur,  
deinde adiicitur opopanax, simulq; in leuorem teritur, seorsim autem quæ  
liquari possunt, cum anchusa ad colorem accipiendum eliquantur, refrige-  
rata excipiuntur.

## DROPAX GALLVS, ORIBASII.

15 Resinæ colophonice quæ thus redolet, piceæ & lignosæ dictæ quæ sola in Ita-  
lia nascitur, apochymaris, picis aridæ, ceræ, singulorum libræ quatuor, re-  
sinæ frictæ uncia \* quindecim, picis brutæ libræ duæ, nitri libra, biruminis,  
galbani, adarce, pyrethri, singulorū uncia sex, opopanax, euphorbii, ue-  
ratri albi, piperis, singulorū uncia quatuor, sulfuris uiui uncia tres, casto-  
20 rii, ammoniaci, uuæ passæ syluestris staphis agria dicitur, singulorū uncia  
duæ, olei sicyonii libra, opobalsami uncia sex. ☉

## ALITER SIMPLEX.

Ceræ pondo, picis sicca \* pondo, picis brutæ pondo, resinæ piceæ sesqui-  
pondo, frictæ pondo & quadrans, loco prius nitro exterso imponitur.

25 QVOMODO SINAPISMVS FIAT.

Ficus siccatæ pridie in aqua tepida macerari debent, die insequenti probe ex-  
pressæ ualenter leuigari, deinde acre sinapi, cuiusmodi est syriacū & gyptiūq;  
priuatim conteri, diluto illarum affulo, factaq; massa admisceri, & si quidē  
uehementē sinapismū uoluerimus inducere, parteis duas sinapis cū una  
30 ficuum tēperabimus: sin imbecillē, ecōtrario: si medio crem, æqualeis. Cæ-  
terum sinapi ante quā deteratur, aceto cōmadesens, ut nōnulli faciūt, ar,  
languidius euadit. At sinapi ablato, etiam balneum utile est. Si dolor uehe-  
mēs rubor ue accesserit, & pustulæ, linteolū succo maluæ aut scænu græci cū  
rosaceo madefactū imponemus, deinde rosaceo cerato cū cerusa utemur.

35 Verū in resolutis in quibus sensus labefactatus est, cura adhibebitur, ut sæ-  
pius parrem retegamus, inspiciamusq;. Quum enim admota non percipi-  
ant, sepe immodice exusti sunt. Item caprarū simus cum aceto illitus sina-  
pi est efficacior, & præsertim in coxendicum doloribus.

## ACOPON EX ATRAMENTO LIBRARIO, CVTIS RV

40 borē peculiariter inducens, idq; porissimū in iis quibus al-  
tera capitis pars dolet, ex cōmentariis Alexandri.

\* Orisifus  
libra di. e.

☉ Orisifus  
us addit, zin-  
giberis unci-  
æ duæ,  
• Orisifus  
sesqui pondo.

*Sinapismur*

Euphorbii, atramenti librarii, singulorū drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis albi, singulorū uncie tres, croci drachmæ duæ, acetiquod latis est: ad hæc probe læuiganda, utq; spissitudo sordibus similis ipsi fiat: quo facto illines, à media superciliorū parte incipiēs, adusq; tēpora tota, præsertim si coger pilis careat: ubi refrigerata fuerint, rursum illines: & quū præsidium bene profecerit, in balneū hominem deduces.

QVOMODO DIVERSA OLEI ET VNGVENTORVM genera conficiantur.

Cap. XX.



Nunctionum unguetorumq; uel olei generū quæ unguenta repræsentēt alia sunt simplicia, una olei specie iniecta, alia cōposita ex pluribus cōflata. Ac simpliciu alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur, uerbi causa, rosaceū, chamæmelinū, susinū. Quædā ex fructibus & seminibus cōficiuntur: quædā ex surculis quibusdā nempe rutæ, qui etiā simul cū oleo coquuntur. Ar cū nullus florū coctio, nē recipiat, insolantur potius. uerū si ualidā odoris gratiā repræsentent & pluribus diebus constantē, ex insolaru tenuius ipsorū oleū magisq; utile redditur, quæadmodū rosaceū & chamæmelinū. Qui inualidiores sunt faciliusq; diffilari possunt, minus insolatū tolerāt, ut quorū uirtus prōpterea uanesca, utpote liliū & uiola. Ex iis quæ fructibus & seminibus cōstant nōnulla illis integris oleo iniectis conficiuntur, ueluti melinū, nōnulla contusis uel læuigatis, oleamine ipsorū sequestrato, uel expressis ipsis in cōchulas: uel ex aqua calida, sic ut ipsa discernerētur, exēpli causa, caryinō, sesaminum, amygdalinum, lentiscinū, laurinū, ricininum, raphaninum, atque eius notæ alia. Porro quæ ex stirpibus odoratis cōponuntur, præparari potissimum solent, illis oleo incoctis cū uino uel musto uel aqua, atq; eisdē deinde exemplis. Liqueoribus autem quibusdā oleo contemperatis interrim & adipibus uel medullis, ex huiusmodi aliquo exactam olei spissitudinem sortita, simplici sermone unguēta uel inuēctiones nominantur, ut gleucinum, nardinum, sicyonium & cyprinū. Sunt quæ acopa crassitudine repræsentent, cerā aut resinā aut eiulmodi quippiā recipientia, uocanturq; myracopa, ueluti decameron, amaracinū, atq; his similia. Iam uero aliqua una uice coquuntur, quæ nō diuersam recipiunt materiā, sicuti metopion, mastychinū, sicyoniū: aliqua duabus tribus ue, & quatuor iniectionibus. Primū contumacioribus incoctis, ut diaspalatho, palmea rudicula, thure arbore, lauro: inde aromatis, phyllo, spica nardi, amomo, herba sabina: postremo liquoribus, adipibus & medullis. Si autem eueniat, cera quoq; & resinis inditis. At balsami liquor neutiquā coquitur, sed post absolutam coctionem unguēro mediocriter refrigerato instillatur. imo ex ipsis unguētis sunt quæ nullam coctionē recipiant, sed tantū misceantur, quale est mēdesium. Nonnulli uero uiride unguentum reddere cogitantes, ubi ab igne sustulerint, in olei sextarium intingūt, æruginis rasæ in exactum detritæ læ



uorem seiscunciā, immiscentes, quemadmodum in cyprino & amaracino. Cæterū simplicia quidē unguenta specierū quæ in ipsa mirtuntur, naturā uel eorū ex quibus contusis facta sunt, obtrinēt, ut oleū ueluri materiz rationē obrineat. At quæ uariā magis compositionē sortita sunt, tota eorū natura ad calidū inclinata est, sed quædā ualide calefaciunt emolliuntq; ut etiā articulis recenti cicatrice obduētis & sinibus eorū infarctis conueniant, ueluri metopiū, mendeſiū, marciatū: mediocrius autem est pentamyron, quemadmodū decamyron ualentius ut etiā summa rodat: medioeriter autem calida tenuiaq; dico. At uero modice calida extenuant, leniunt & concoquunt, quale est fusinum, amaracinum, irinum, crocinū, foliatinū. Alia præter quā quod calefaciunt, abunde siccant ineiduntq; ueluri cyprinum & scycioniū. Alia calefaciunt quidē insigniter, sed uires magis confirmār, unde stomacho potissimū & uisceribus resolutis cōperunt, qualia habētur mistichinū, nardinū & gleucinū. Valentius adhuc corroborar, quod ex acore cōſicitur. Iam nōnullis unguētis ob gratū cūtaxat odorē utuntur, ut foliato, spicato, commageno & quæ moschelæ, quasi dicas, ex musco & oleo confecta nuncupantur.

## ROSACEI CONFECTIO.

Rosarum rubrarum detractis unguibus refrigeratarū die nocteq; una, unciz tres, olei omphacini sextarius, urna diligēter cōſtrieta ne perſpirēt, insolabis sub dio diebus quadraginta, atque sic repones non in pauimento, sed assere. Aliqui uero, uice insolatus in puteum urnam diebus quadraginta mittunt, ut ex frigidityte odoris gratia conseruetur. Alii uero ipsam sub terra defodiunt.

## CHAMAEMELINON.

Chamæmeli floris citra alba folia refrigerati, per diem noctemq; unā olei sextarius Italicus, uase linteo simplicei contecto ut perspiret, insolarur, idq; diebus quadraginta, inde secure hoc percolatum repones.

## ANETHINVM.

Anethi uiridis comæ refrigeratæ uncia, olei dulcis sextarius Italicus. Simili modo insolantur, fiet autē & pro temporis ratione anethinum cum insolaris desideratur, sicci enim anethi comam decoquētes cum oleo in cacabo utūtur, & chamæmelino similiter: uerū hæc imbecilliora sunt iis quæ ex uiridibus fiunt & præsertim insolaris.

LILIACEVM, ALII SVSINVM DICVNT, QVOD IN  
Suis forsitan reperiatur.

Foliorum alborum liliorū similiter refrigeratarū unciz duę in olei sextarium Italicū cōiectę exacte circumstringūtur, ne euaporent, & per triduū insolātur, inde primis exēptis proiectisq; aliz duę unciz iniiciūtur per tri duum sublequens, atq; sic reponuntur.

## SVSINVM COMPOSITVM.

Olei sextarii tres, calami odorati librę quinque, myrrha uncię quinę, cardamomi librę tres, lili foliorũ unguibus ablatis refrigeratorium libra, cinnamomi uncię tres, croci cilicii uncię quinę: tota cõfectio tribus iniectionibus distinguenda est. Primũ myrrha & calamus odoratus, uino ad dies quinę macerata ter die mouentur, inde oleo modice incoquantur, deinde cardamomum aqua maceratũ triduo mouetur, similiterq; rursus cũ oleo ad horam unam incoquitur, inde exemptis tertiam liliorum partẽ oleo puro inferemus, tribus diebus post his quoq; exemptis reliqua liliorũ tertia portio immittetur, iterumq; post triduum exemptis proiectionisq; primis, postremo tertia pars cũ croco leuigata iniicietur. Secundũ alios tres dies ablato oleo cinnamomũ cõtusum indetur. Huius in uicem, Arnabo, aut carpesium, aut cassia duplicatum, atque reponetur.

## VIOLACEVM.

Violaceum præparant, modo purpurearũ, modo crocearum, modo cãdi darum uiolarum foliis ungue defecto, triũ unciarũ pondere coniectis in olei omphacini sextarios quinę Italicos: circũstricta exacte, ne perspirẽt, ad dies decem insolantur, tertioq; eadem mutantur ad triduum, quemadmodum lilia: ad repositionem autem pauca iniiciunt exacte arida.

## MELINVM.

Hoc efficitur ex malis coroneis extrinsecus panniculo inuolutis, & in frustra cum suis corticibus dissectis, deinde unciis ternis illorũ, in decẽ olei omphacini sextarios Italicos coniectis, atq; quadraginta dies insolatis.

## SESAMINVM.

Sesaminũ oleum fit, contusis uel leuigatis sesamis, expressisq; per fiseillas in cochleis, oleo ipso ceu in aqua calida segregato, uasisq; uitreis reposito.

## RAPHANINVM.

Eodem modo fit raphaninum in Aegypto, ex semine raphani qui tenuẽ radicem habeat contuso segregatoq;.

## RICININVM, SIVE CICINVM.

Hoc quoq; similiter in Aegypto fit, ex semine ricini qui croton dicitur, pari modo contuso aut leuigato.

## AEGIRINVM.

Verno tempore oleum fit ægirinũ, hoc est ex nigra populo, quum resina circa semẽ copiosa existit: etenim grana populi cõtusa unciis quatuor in dulcis olei sextarium immittunt, diebusq; quadraginta insolant, uel horis tribus in lebe decoquant, atq; sic exempta reponunt.

## AMYGDALINVM.

Conficitur hoc quoq; sicut prædictum, amygdalis amaris iisq; puris, contusis, aqua modica irroratis, separatisq; ut cõprehensum est: Nonnulli rufa amygdala unciis duabus, dulcis olei sextario Italico immissa, in cacabo decoquant.

## AMYGDALINVM, QVOD ET METOPION DICITVR.

Aegyptii huius olei inuentores metopion ipsum nuncupant, quòd galbanum recipiat: germē autem unde galbanum nascitur, metopion appellatur. Hæc recipit olei omphacini sextarios uiginti, amygdalarum amararum libras duas, cardamomi librā, iunci rotundi floris, calami odorati, carpopalsami, singulorum libram, myrrhæ, galbani, singulorum uncias sex, resinæ terebinthinæ, libras duas, uini odorati ad arida imbuenda sextarios quatuor, mellis attici libras treis: resinā & galbanum in læuorē redacta ex olei parte soluta, reliquis in coctis adiiciemus, nec non ipsum mel: Mixta uerò accuratè omnia ab igne tollentes, quum tepidum est medicamentū eximimus, nam refrigeratum concrefcit.

## BALANINON.

Balaninum oleum perinde ut simplex amygdalinum præparatur, ex quereis glandibus.

## CARYINVM.

<sup>15</sup> Hoc quoq; ut supradictum ex uetustis nucibus conficitur.

## LAURINVM.

Purum quidem laurinum simili ratione & lauri fructu cōfit, mixtum uerò hæc recipiet: maturarum oliuarum sextarium, cum duobus baccarum lauri miscemus: teruntur omnia exprimunturq;. Nonnulli æqualem amborum portionem miscent.

## LENTISCINVM.

Lentiscinum oleum laurini modo ex lentisci semine conficitur, idq; bifariam & per se, & cum oliuis immaturis.

## MASTICHINVM.

<sup>25</sup> Mastichinum simplicissimum quidem fit, chiaz mastiches uncia, omphacini olei sextario Italico immissa, excocta q; in cacabo. Nonnulli uerò absinthii & styracis, singulorum unciam adiungunt.

## MASTICHINVM MAGIS VARIVM.

<sup>30</sup> Olei sextarii quinquaginta, inulæ campanæ libræ quinq;, xylobalsami libræ decem, iunci rotundi floris libræ quinq;, cardamomi libræ septem, mastiches libræ quinq;, xylomastiches libræ octo, resinæ terebinthinæ libræ tres, absinthii comæ libra, uini odorati sextarii quinq;, aquæ sextarii decem, arida uino ante tertium diem macerata oleo miscentur, & aqua horis sex coquuntur, ac mastiche & terebinthina iniicitur: accuratè mixta excipiantur: refrigerata transfunduntur.

## SICYONIVM SIMPLEX.

Radix cucumeris syluestris refrigerata duarum unciarum pondere in olei sextarium Italicum mittitur, atq; in lebere coquitur, fitq; sicyonium.

## SICYONIVM COMPOSITVM.

<sup>40</sup> Olei sextarii decē, cucumis syluestris radice de rasæ pōdo, serpilli, fertulæ

campanæ singulorum uncia sex, tedarum piceæ pinguium, althææ, singulorum uncia quinque, scolopendriæ uncia sex, sænugræci sextarii duo. Fœnugræcum aqua primum die uno prius commadefcet, deinde exemptum inditur cōmemoratis unâ cum oleo, & uini sextariis duobus, omnibusq; incoctis adiiciuntur medullæ ceruinæ cū momento olei lēuigatę uncie quatuor, adipis gallinarum totidem, rursus exceptum oleum in aliud uas transfunditur. Nonnulli ipsum post coctionem diebus quadraginta in solant.

#### ALIVD SICYONIVM EFFICACIVS.

Elaterii succi sextarii tres, aristolochiæ rotundę, & longę, styracis, inulę cāpanæ, hyssopi, iridis, cucurbitę syluestris, pulegii, origani, cyperi, thuris arboris, centautii, foliorum lauri, singulorum uncie duę, olei sextarii quinque. Mistâ incoquito dum parum succi teliectum fuerit.

#### CYPRINVM EX COMMENTARIIS POSIDONII.

Olei sextarius, iūci quadrati, inulæ campanæ, iridis, singulorum libra, sampsuchi, hyssopi, uiticis seminis, elelisphaci, singulorū uncia tres, iunci quadrati floris libra. Reliqua omnia pridie in uino macerata coquantur cum oleo horis sex. Excepto oleo puro, iūcus quadratus iniicitur. Si quidem adfit, uiridis cum teneris uirgultis nō concilis: sin minus, certe aridus cōtus cū aqua quæ mōmēto coquetur sēsquihora. At si uoles ipsum tingere postquā ab igne fuerit ablatum, indito æruginis puræ sēsquilibrā. Posidonius autē acrimoniā æruginis uitans, à coctione ( inquit ) triduum dimittes oleū in cacabo bene humido, & tingetur, ita ut uirtus ipsius non offendatur.

#### ALIA SCRIPTVRA CYPRINI.

Cyperii foliorum, lauri foliorum, iridis, cyperi, elelisphaci, singulorū quadrans, thuris arboris, aristolochiæ longę, uiticis seminis, singulorū triens, inulæ cāpanæ, aspalathi, singulorū uncia sex, rutæ uncia duæ, cupressi uncie duę, olei sextarii decē. Hæc prius uino madefacta, incoques oleo. ubi ex emeris iniice rursus xylobalsami, xylocassię singulorū uncias quatuor, sampsuchi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singulorū uncias tres, opopanax uncias duas, iunci quadrati floris uncias sex, æruginis unciam.

#### AMARACINVM.

Inulę cāpanę pondo, xylobalsami librę uiginti, cyperi librę octo, iūci rotundi floris, aspalathi, herbę sabinę, singulorū librę octo, opopanax, amaraci seminis, singulorū librę duę, olei primi meriti sextarii duo, uini odorati sextarii quinque. Alia omnia superius dicta primā iniectionē habent uino prius macerata, secūdā herba sabina, atq; illa quidē horis sex incoquūtur. hoc autē tribus. nonnulli etiam hoc tingentes, æruginis uncias tres iniiciunt.

#### IRINVM.

Iridis, aspalathi, cyperi, singulorū librę quinque, opopanax uncia tres, anchusę uncia duę, olei sextarii triginta, aquę sextarii quindecim. Sūt qui ad iūci rotundi floris uncias sex, cassię uncias tres, xylobalsami uncias

sex, nardi gallicæ, tantundem, omnia confusa aqua pridie macerantur, inde oleo diebus quinque incoquantur in lebece ad sex horas: reponiturq; unguentum.

## CROCINVM, IN QVO ET ALTERIVS CROCO

magmatis confectura explicatur.

Olei omphacini odorati libra, calami odorati, myrrhæ troglodyticæ singulorū uncia quinque, cardamomi uncia septē, croci cilicii uncia sex. primū iniiciatur calamus & myrrha uino lauigata, & ante uncia modo reposita, piperis albi grana quadraginta, myrrhæ troglodyticæ drachma, tunsa, cribrataq; teruntur rursus in mortario adiecta olei nardini libra. ut autē medicamentū reddatur nigrius, nucis cortices cōbustos detritosq; in mortario adiiçito: inde opobalsami cochlearia tria, ceræ sesquilibra admisceto.

## DE OENANTHARIIS.

## Cap. XXI.



On quod œnanthen, hoc est labruscæ florē habeant hęc, (nō nulla enim ne œnanthen quidē recipiunt) sed ex uino & flore liliorum nomen hoc sortita sunt, usus œnanthariorum apud quosdam odoris gratia duntaxat & deliciarum adhibetur, sic ut qui eis utūtur, à lauacro persundantur: & mensē ipsis per spongiam oblinantur. At apud eos qui recte utuntur, etiam fiunt præsidia tum in resolutis, tum in iis quos syncope premit, si roborantibus stomachi cataplasmatibus admisceantur. Item in iis, qui se à morbo præsertim febrili recolligunt, ubi lauacro egrediantur per totum corpus diffundentur: naribusq; admovebuntur, adhuc spirantibus. Trahuntur enim in altū, & spiritū animalem uitalemq; cōfirmant. Ad hæc utilia sunt ad morbum pestiferum uitandū, cū eiusmodi mutationē aer sustinet. Refertur autem huiusmodi unguentum ad Posidoniū authorem, à quo uocatur mesopotamenon.

## OENANTHINI CONFECTIO.

Cassia, myrrhæ, thuris, phylli, amomi, mastiches, costi, carpopalsami, opobalsami, singulorum uncia tres, styracis pinguis uncia quatuor, uini odorati aminaxi, Italici sextarii decem, confusa omnia cribrataq; styracē uero minutim confusum cōponito in urnā oris ampli, cū foliis liliorū pridie refrigeratorū, è domo una in alteram & unguibus detractis: sint autē lilia numero \*. deinde uinū adiiçitur, & opobalsamū: mista, cōmotaq; ante iniectiōnē, & constricto urnæ ostio quadraginta diebus insolatur. Balnei usus est in uiriū ex morbo recreatione. Domus irrorabitur unguēto, uasaq; & spongiæ intinctæ faciei admoventur.

## ALIA CONFECTIO, NOSTRA.

Costi uncia tres, spicæ nardi, arabæ, caryophylli, singulorū uncia, amomi uncia tres, cassiæ, œnanthes, calami, singulorū uncia nouē, styracis, opobalsami, singulorum uncia quatuor, lilia trecenta, uini falerni sextarii decem. Simili modo præparatur.



Yphis materia inter medicamēta quę potui dātur & antidota existit, usus est eius incēsi ad odorē gratū conciliandū, quē admodū & suffiminū. Interim naribus admouetur, ut destillatio nes ex capite in subiectas partes cōcoquat, grauedinesq; & ob structione liberet, purgetq; cerebri uētriculos, itē pestilentialibus morbis cuitādis. Iā per os quoq; assumitur, tū ad hęc, tū ad ea quę pectori inherēscūt, concoquēda: necnō ad frigidiore iecoris affectus, unde & Cyphoide appellata antidota ueteres inuenerunt. Miscetur autē cōpositis medicinis, pręcipue epithematis & antidotis.

## ROSATVM SVFFIMEN.

Costi, amomi, myrrhę, cassię, singulorū uncia, styracis, chiz, bdellii, conchulę Indicę, musci, ladani, singulorū drachmę duę, rosarū purarū uncia uigintinouem, opobalsami \*, uini quod sufficit.

## SVFFIMEN LILINVM: QVOD CRINATON DICVNT.

Liliorū ungue defecto libra, styracis primę notę, uncię nouę, spicę nardi, uncię tres, costi, caryophylli, amomi, mastiches, cōchulę Indicę cōbustę, mellis, singulorum sescuncia, opobalsami uncia quinque, uini quantum satis est. Izuigata conguntur in pastillos.

## CYPHI MAGNVN QVOD VOCANT SOLARE, EX

rebus triginta sex confectum.

Styracis, myrrhę, ladani, aspalathi, inulę campanę, singulorū uncia sex, nardi gallicę, phylli, cupressu seminis, guttę ammoniaci, strobili, splanchini aut loco ipsius conchularū Indicarum maiorū, carpobalsami, singulorū uncię tres, cassię, iridis, selenis, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, singulorum uncię quinque, rosarū siccarum, croci, spicę nardi, herbę sabine, hastulę regię radice, (ali succi) singulorū uncię quatuor, lacaphthi, hoc est picę corticis uel alterius cuiusdam arboris uncia nouem, costi, iunci rotundi floris, singulorū uncia duę, iuniperi maiores quadraginta, minores quinquaginta, amomi, resinę terebinthinę, palmularum purarum, singulorum libra, ficu siccatarum granis exēptis, uuarū passarum acinis ablati singulorū libra duę, mellis despumati libra quinque. Posidonius etiā uini odorati sextarios treis adiecit.

## ALIVD CYPHI, QVOD REBVS VIGINTI OCTO

constat, lunare appellatum.

Bdellii, inulę cāpanę, singulorū uncię septē, iūci rotūdi uncię duę, sphagni uncię quinque, iuniperi minores quinquaginta, cardamomi uncię quinque, aspalathi uncię septē, cassię fistulę uncię quic, spicę nardi uncię duę, cyperi uncię quic, hastulę regię radice, herbę sabine, singulorū uncię quatuor, cupressu seminis, nardi gallicę, malabathri cūfoliis, rosarū siccarū, singulorū uncię tres, costi, croci, singulorū uncię duę, ladani, myrrhę, singulorū uncię septē,

caricarum pinguiū, uuarū passarū, acinis exēptis, singulorū librę duę, stro bilorū uncia octo, resinę terebinthinę libra, styracis uncie sepię, palmula rum pinguium libra, mellis librę quinq;, uini odorati quantum satis est.

CONFECTIO MASVCHAE, QVOD NONNVLLIS

masuaphion uocatur. Cap. XXIII.



Eliloti sextans, xylobalsami, aspalathi, herbę sabinę, myrrhę, amomi, iūci rotūdi floris, foliorū lauri, myrrhę stillatitię, styracis, calami odorati, sampsuchi, singulorū uncia duę, iridis uncie quinq;, phylli, croci, singulorū uncia, opobalsami semū

cia, gūmi libra, rosarum liccarum uncie sex, uini quantum sufficit.

EX COMMENTARIIS ANTYLLI, DE PESSIS. Cap. XXIII.



Essi mulierū locis admoventur, ceterū generales ipsorū disse rētię tres existūt, alii siquidē emolliūt, alii astringūt, alii aperi unt. Emolliētes inflāmationibus uteri, exulcerationi, perfric tioni, strāgulatui, auersioni & inflationibus accōmodātur.

Fiūt autē ex cera tyrrhenica, cyprino, susino, pinguedine anseris aut galli nę, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, scēnugræco, & quę sūt eius generis. Aperiētibus utimur, quū purgationē suppressam irritare sta tuimus, aut uulū cōnuiuentē cōpressam ue emēdare. Preparātur hi ex mel le, artemisia, diētāno, brassica, succo dulcis radiculę, porro, succo rutę, scā monia, & similib\*. Astringētes in cōtrariū aperiētibus usum exhibētur, nā fluxū muliebrē cohibēt, & suspensū contrahūt uterū, prolapsūq; reprimūt. Materia uero astringentiū prius in capite de collyriorū etiā modo cōprehēsa est. Ceterū cōuenit pessi crassitudinē instar strigmēti & paulo spif siorē facere, deinde lanā linamēto tortili similē, duplicatā in medicamen tum tinētā ori uulūz condere, sicut stuppā p̄longā habeat alligatā quo pessus facile possit extrahi, quando uisum fuerit.

PESSVS CROCODES, AD INFLAMMATIONES, AVER siones, duritias, & inflaciones.

Cerę tractę, medullę uitulinę, singulorū denarii sedecim, medullę cerui nę drachmę undecim, adipis anserini drachmę octo, adipis gallinę dra chmę octo, mastiches drachmę quatuor, hyssopi medicamēti drachmę tres, mellis drachmę duę, croci drachmę octo, rosacei quod satis est: cro cus lacte muliebris lzuigatur.

PESSVS AB AVREO COLORE DICTVS CHRYSOS emolliens, laudatissimus.

Croci denarius, æsypi tantundē, medullę ceruinę denarii duo, resinę tere binthinę, cerę, adipis anserini, singulorū denarii tres, ouorū tostorum lu tea sedecim, irini & rosacei quod satis est ex æquo.

PESSVS LIBANIVS, MENSEIS EVOCANS ET VVLVAB uitii singulariter accommodus.



Nardini unguēti uncia sex, ceræ tyrhenicæ uncia quinque, fusini unguēti uncia quatuor, adipis suilli recētis uncia tres, anseris & gallinæ adipis, medullæ ceruinæ, amara cini unguēti, singulorū uncia duæ, seu taurini, resinæ terebinthinæ, ætysi, singulorū uncia: lebece eliquatūr, oēsq; reliqui pelli.

## ENNEAPHARMACVS.

Rosacei unguēti, ricinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ & butyri pares portiones.

## TITIANVS EMOLLIENS.

Ceræ uncia sex, resinæ colophonie uncia quatuor & semis, seu taurini uncia quatuor, guttæ ammoniaci tantundē: ammoniacū aqua soluitur.

## PESSVS AEGYPTIA.

Mellis, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei uel fusini, croci, singulæ partes: in quibus autē inflāmatiō abest, & fordidis, æruginis dimidiā addunt.

## GONE AD CONCIPIENDVM.

Butyri uncia sex, hyssopi medicamēti, medullæ ceruinæ, adipis anseris & gallinæ, resinæ terebinthinæ, aloës singulorū uncia tres, ceræ tyrhenicæ uncia sex, rosacei libræ duæ, myrrhæ, cassiæ, singulorum uncia duæ, spicæ nardi uncia, mellis quod satis est.

## DE MEDICAMENTIS INVICEM ALTERNANTI

bus ex commentariis Galeni.

Cap. XXV.

**A**N Alexandria (inquit) muliere quadam morbo perielitāte, cū quæfissē lychnidē, nec eius fuisset data copia, nisi protinus uide lychnidis usus fuisset acāthii semine, periisset mulier. Vnde rogatus ab amicis ad hanc alternatiū inuicē medicaminū expolitiōnē ueni, iuxta literarum seriē exorsus.

Vice acanthii seminis, Jyehnis.

Amyli, siceus pollen.

\* Aromatum, calamus odoratus.

Guttæ ammoniacæ, propolis.

Aloës Indiæ, aloës uiridis folia uel glauciæ, uel fimus ciconiæ, aut lycion, aut centaurium.

Aspalathi, ericæ fructus.

Aracis, sesamum.

Halicacabi, solani semen.

Amygdalorū amarorū, absinthium.

Bituminis, pix liquida brutia.

Armenii, atramentum Indicum.

Aconiti, iridis syluestris radix.

Ætes, acantha.

Absinthii, abrotanum.

Agarici, euphorbium.

Opobalsami, liquor myrti.

Argemones, seriphon.

Abrotani, organum.

Hastulæ regiæ radices, betæ succus.

Calcis uiuæ, adarce.

Semperuiui succi, lactucæ succus aut folia.

Anchusæ, hyacinthos.

Amianti, aphroselinon.

Salis ammoniaci, sal cappadocius.

Aspalathi, uiricis semen.

Auripigmenti, sandaracha.

Æthiopiciæ oleæ, lachrymæ acaciæ partes duæ.

Acanthæ, cerafiorum acantha.



\* Aliud uice  
huius potest  
idem uidetur

Aſſi lapidis, galaſtites lapis, uel ſal ammoniacus combuſtus.

Salis ammoniaci, cappadocicus.

Adipis uulpinæ, adeps urſinus.

Populi nigre ſurculorum, ſamphy.

Bupreſtis, blattæ pendentes. (chus.

Butyri, lactis bouilli concretum.

Balfami liquoris, ſtillatitia myrrha.

Bdellii, ſphagnus odoratus.

Gentiane radicis, apium odoratū.

Terræ ſamiæ, leucographis ægyptia.

Terræ erethriados, calx thebaica.

Gongylidos, heliotropium.

Dulcis radicula ſucci, ſucco ſycami-

Gruis ſimi, colubæ ſimus. (ni.

Terræ teneræ, plumbago.

Dorycnii, alterci ſemen.

Diſtamni, eleiſphacus.

Baccarum lauri, ſerpylis ſicca.

Dauci, ſemen ſii.

Diphrygis, lapis phrygius.

Dracunculi, androſæ mon.

Eleiſphaci, nepita.

Oleæ lachrymæ, hipocifydis ſuccus.

Serpylli, potamogiton.

Eruce ſeminis, cryſimi ſemen.

Elaterii ſucci, eiufdem herbæ ſuccus.

Eryſimi ſeminis, radix lanariæ.

Ericæ fructus, galla omphacitis.

Ebeni, lotinon aridum.

Erini foliorum, ſimus ciconiæ.

Ebiſci radicis, folia mori.

Veratri nigri, radix papyri.

Enneaphylli, potamogiton.

Olei ueteris, duplicatum oleum co-

quitur cum adipe ſuillo ueteri.

Zingiberis, pyrethrum.

Thapſiæ ſucci, chamæleontis nigri ſuccus. *Maſtichæ ſemen, ſeu. Erucæ, piceæ, piceæ & ſi. min. ap.*

Thapſiæ, clydrion.

Thermuntiadis, lycopſolos.

Sulſuris uiui, ſandaracha.

Aeruginis ferri, ſcoria ferri.

Viſci quernæ, chamæleon niger.

Iridis illyricæ, elenium odoratum.

Cinnamomi, caſſiæ duplicatum.

Caſſiæ, brathæ aut manna, cinna-

momum.

Cyperii, iuniperus maior.

Cardamomi, cyperis ammoniaci.

Coſti, cedri baccæ.

Baccarum cedri, ladanon.

Calami odorati, ſphagnos.

Croci, croco magma.

Crocomagmatis, aloë Indica.

Caſtorei, blattarum fœtentium in-

teſtina.

Cadmiz, leucographis ægyptia.

Crocodili adipis, canis marini adeps

Cicutæ ſeminis, coriandrum.

Cantharidum, phalangia.

Cnidii ſeminis, uiticis ſemen.

Hederæ, liquor perſicus.

Gallæ, ſordes gymnaſiorum.

Cappariſ radicis, ericæ fructus uel

myricæ.

Fimi palumbi, ſimus columbæ.

Ceraunini, leucographis.

Corallii, moly.

Fimi æluri, ſimus ichneumonis.

Cinnaberis, rhodoides.

Cumini, braſſicæ ſemen.

Clinopodii, heliotropium.

Nepitæ, ſylueſtris menta.

Cucurbitæ ſylueſtris, ſemen ricini

quod eſt crotonis.

Cotyledonis, anacardium.

Colophonie, apochyma. l

Rubi canini, halicacabi ſemen.

Crinanthemi, aphrodiſium.

Comari, gutta ammoniaci.

Pumicis, terra Cretica.

Cypheos, carica usta.  
 Buccinorum, ostrea.  
 Cardamomi, cyperus uel myrtus.  
 Cera, lomentū cum propoli coqui-  
 tur teriturq̃.  
 Thuris, terra ampeliris.  
 Lathyridum, coccum gnidium.  
 Lepidii, erythrodanum.  
 Lapidis asii, lapis gagates.  
 Lapidis magneteris, lapis phrygius.  
 Lapidis phrygii, lapis argentyritis.  
 Libystici, semen staphilimi.  
 Lapidis pyritis, lapis pyrobolus.  
 Leucini floris, radix lanaria.  
 Loti seminis, semen betæ.  
 Lepidii radices, folia capparis.  
 Leporis marini, cancer fluuiatilis.  
 Lini seminis, fabæ succus.  
 Lappathi radices, radix pyrethri.  
 Malabathri, cassia, uel nard<sup>o</sup> Indica.  
 Mandragoræ succi, dorycnion.  
 Myrsinati, liquor mori.  
 Mandragoræ, oleæ lachryma.  
 Mastiches, iunci rotundi cor.  
 Myrobalani, peucinon.  
 Maluæ, foenugrecum.  
 Mellis, Japa.  
 Mannæ, thuris cortex.  
 Muscerdæ, mustelæ æquale pondus.  
 Magnesinæ uitreæ, pyxylum Italicū,  
 uel stimum parthicum.  
 Medullæ ceruinæ, adeps ceruina uel  
 medulla uitulina.  
 Malorū cotoneorū, ferrula cāpana.  
 Misyos cyprii, ochra cypria.  
 Mei, myrobalanus.  
 Mororum succi, ruborum folia.  
 Misyos tosti, diphryges.  
 Malabathri, traetylus.  
 Nardi syriaci, iuncus odoratus.  
 Napi, gongilidis semen.

Xylobalsami, radix uiolæ candidæ.  
 Lachrymæ papaueris, succus man-  
 dragoræ.  
 Opopanacis, lac sycamini.  
 Liquoris cyrenaici, liquor syriacus.  
 Opocarpali, liquor myrti.  
 Liquoris fici, liquor mori.  
 Liquoris itææ, liquor hederæ nigræ.  
 Liquoris rhododaphnæ, uiscus quer-  
 neus.  
 Oenāthæ succi, ampelini arboris suc-  
 Hormini, lini semen. (cus.  
 Orizæ, hordeacea farina.  
 Vini rosati, uinum austerum.  
 Ornithogallorum, anthalli.  
 Acoris, gallæ omphacitis.  
 Anacardii, psyche herba.  
 Liquoris peucedani, dulcis radiculæ  
 succus.  
 Propolis, ladanum.  
 Pityocampes, uespæ in cedria.  
 Piperis, zingiber.  
 Pterci, cneori semen.  
 Polypodii, radix chamæleæ, aut cha-  
 mæleontis.  
 Verbasci, chamæleuca.  
 Polytrichi, absinthium.  
 Resinæ piceæ, resina terebinthina.  
 Rosarum siccarum, persi folia arida.  
 Raphanini olei, recininum.  
 Rhodoëidis, smopis.  
 Resinæ colophoniz, apochyma.  
 Radicis lapathi, cynara.  
 Iunci odorati, cardamomum.  
 Cineris cyprii, cinis foliorum oleæ.  
 Myrrhæ troglodyticæ, calamus odo-  
 ratus.  
 Seui ceruini, adeps anserinus.  
 Adipis suilli, adeps uulpinus.  
 Adipis uulpini, adeps ursinus.  
 Lanariæ radices, ueratri nigri radix.

Satyrii, semen erucæ.  
 Salamandra, lacerta uiridis.  
 Sphagni aromatis, iunci rotundi elabo-  
 borati.  
 Syrici, argenti spuma.  
 Recrementi plumbi, recrementum  
 argenti.  
 Sampfuchi, rhus magericum aridū.  
 Sinapis, cardamomum.  
 Sagapeni, piceæ resina arida.  
 Scammoniæ, crotones ricini.  
 Strobilorum, cucumetis semen.  
 Aluminis, sal fossitius.  
 Scynci, satyrion.  
 Strymneos contusi, squama æris.  
 Iunci rotundi, polygoni radix.  
 Recrementi cyprii, melantheria Aeg-  
 yptia.  
 Sisymbrii, ocimum.  
 Vux passæ satiuæ, palmulæ syriacæ  
 cato.  
 Sandonici, abrotanum.  
 Sepiæ testæ, pumex.  
 Serapiadis, præoniæ radix.  
 Scyllæ, bulbosus.  
 Sesamoidis, expressum amaricinū.  
 Zizani, semen lini.  
 Alterci seminis, rubi canini semen.  
 Hypocistidis succi, acaciæ acanthi-  
 dis succus.  
 Liquidæ picis, opopanax.  
 Oesypi, medulla uirulina.  
 Hyacinthi, flos isatidis.  
 Hyperici, anethi semen.  
 Flocium uini, sandaracha.  
 Fuci, anchusa.  
 Phu, sphagnos.  
 Fellis suilli, fel perdicis.  
 Fellis uiperæ, fel ichneumonis.  
 Fellis mustelæ, fel cameli.  
 Fellis cameli, fel alabetæ.  
 Galbani, sagapenum.  
 Chamædryos, lapathi sylvestris ra-  
 dix.  
 Chamæmeli, anthemis.  
 Cerusæ, recrementum plumbi.  
 Psyllii, lenticula palustris.  
 Ocimi, sisymbrium.  
 Ocimoidis, menta sylvestris.

## DE PONDERIBVS ET MENSVRIS.

## Cap. XXVI.

30 **P**ondus grauitate mensor diiudicat, mensuram autem uascu-  
 li concauitate, uasculū uero sicæ quantitatis mensura est, aut  
 humidæ, ut tres quantitatis quæ mensuratur, sint differentiz,  
 una quidē ponderis, altera uero aridæ substantiæ qualis ea quæ  
 in cumulū cogi potest, porro tertia humidæ est substantiæ. Cū autē mul-  
 ta propēq; infinita sint pondera & mēsuræ, pro regionū diuersitate, & utē-  
 35 tium cōsuetudine, de iis quæ omnibus in usu communi sunt, nobis sermo  
 erit præcipuus.

## DE NOTIS PONDERVM ET MENSVRARVM.

Quoniam uero nonnulli literis non integris sed notis signisq; eas demon-  
 strant, satius fuerit, ueteres in hac re imitari, & primum characteras ipsos  
 40 exponere. Primum igitur x litera, cum superscriptum habet alpha, chal-  
 cum, hoc est æreolū signat exempli gratia, x. Si o habeat, choa, quod est cō

gium,  $\lambda$ . Si  $\chi$ , chœnicem,  $\lambda$ . Si  $\chi$ , cheman  $\lambda$ . At  $\kappa$  si habet suprapositum, & lineam rectam, quæ per obliquum inferius cornu ipsius fecet, ceratium, hoc est siliquam notat, ut  $\mu$ . Si  $\circ$  superiectum est, cyathum,  $\mu$ . Si  $\circ$ , corylam, hoc est heminam. Si uero linea utrinque circuli figuram repræsentet, obolū notat  $\omega$ . Si duæ huiusmodi notæ sint, duos signat obolos  $\omega$ . Qui gamma hoc est scrupulum faciunt, prima eius elementa scribunt ad dita linea,  $\gamma$ . Duæ autem cōiunctæ atq; altera parte in angulū coactæ duobus  $\kappa$  literæ cornibus similem ad rectam lineam spectantibus, notant drachmam quæ alio nomine uocatur olca  $\leftarrow$ . proprie uero olca per  $\lambda$  scribitur, cui in medio litera  $\circ$  sit addita,  $\delta$ . Verum si  $\lambda$  adiectum habet, libram signat,  $\lambda$ . Nonnulli uero eadem litera acuto secta accentu, idem ostendunt,  $\lambda$ . At cum  $\tau$  litera, in ipso sui angulo habear, unciam denotat,  $\tau$ . Quod si  $\mu$  in summo uertice habeat oppositum, minam refert,  $\mu$ . Si  $\nu$ , notat mystrum.  $\mu$ . Si, medimnū, id est modium,  $\mu$ . Si  $\circ$ , modium,  $\mu$ . Porro  $\tau$  post se habens  $\xi$  &  $\nu$ , signat tryglion,  $\tau\xi$ . At  $\xi$  cui iuxta sit positum, xesten, qui est sextarius, ostendit,  $\xi$ . Si  $\circ$  apponatur, oxybaphū id est acetabulū  $\xi$ . Alii uero sextarium linea recta  $\xi$  secantes conficiunt,  $\xi$ . Sed  $\lambda$  adiectum literæ  $\mu$ , heminam  $\mu$ .  $\kappa$  addito, ceramium ualeat,  $\kappa$ .

## DE PONDERIBVS.

20

Mina ætica, & Aegyptia habet uncias sedecim. Romana uiginti. Libra uncias duodecim. Vncia drachmas octo. Drachma, habet scrupula tria. Scrupulum, obolos duos. Obolus, siliquas duas. Siliqua, zœolos duos, & duas tertii partes.

## DE MENSVRIS LIQVIDIS.

25

Italicum ceramium habet congios octo, Congius sextarios sex, Sextarius cochleas  $\alpha$  duo, quæ nonnulli triblia nūcupant. Hemina idem tribliū continet, mystra magna tria, acetabula  $\alpha$  quatuor. Nā magnum mystrum habet acetabulū. Acetabulum sesquicyathum habet. Cyathus, chymas paruas seu mystra parua duo. At si uoles & ponderum liquidorum mensurā scire, permultæ liquidarum rerū in examine suo differentia habetur, ut in olei, uini, & mellis exemplo dicemus. Mel igitur uino ponderosius quarta parte, itemq; decima est: quo fit ut ferè tertia pōderis pars melli accedat: caput enim integram huius mensuram, & insuper trientem. Mel autem oleo ex media parte grauius est: cōtinet enim totū olei modum, & ultra semissem. Vinum, oleo nona parte supereminet, totū enim ipsius pondus cōtinet & nonam eius partem. Quò autem res fiat dilucidior, ceu exemplo, particularium mensurarum pondus subiūgemus. Ex quo per ordinem quid communiter hæc differant, cōstituetur, his liquoribus publico consensu perpicuis in usum prolatis, oleo, uino, melle.

## Olei.

## Vini.

## Mellis.

Italica amphora	lib. 72	lib. 80	lib. 108
Congius	lib. 9	lib. 10	lib. 13 $\frac{1}{2}$
Sextarius	lib. 1. uncias 6	lib. 1. uncias 8	uncias 13 $\frac{1}{2}$
5 Hemina	uncias 9	uncias 10	uncias 13 $\frac{1}{2}$
Mystrū magnū	uncias 5	uncias 3. scrup. 8	uncias 4 $\frac{1}{2}$
Acerabulum	drach. 18	uncias 2. scrup. 12.	drach. 27
Cyathus	drach. 12	drach. 12. scrup. 4	uncias 2. drach. 2
Mystrū paruū	drach. 16	scrup. 20	drach. 9
10 Oribasius secūdum Adamantinum	auctor est, sextarium quidem Italicū uini mensura unciarum uigintiquatuor esse, pondere uero unciarū uiginti. cum sextarius mensuræ mellis duas libras, semissem, pendeat.		

## DE ARIDIS.

Aegyptia artaba habet modios quinque. Modius ægyptius & Italicus chæ-  
 15 nices octo. Chænix sextarios duos. Sextarius, semifextarios duos quos &  
 heminas uocant. Hemina habet cyathos octo. Articus medimnus habet  
 semifextaria, quæ hemiecta uocant, duodecim. Hemiectū chænicas quatuor.  
 Ita semimedimnus habebit minas quadraginta nouē, sextarios nonagin-  
 20 tafex. Huiusmodi autem mensurarum pōdus exponere haud facile, quod  
 aridarum rerum infinitæ iuxta momenti lancis rationem differentia exi-  
 stant.

## LIBRI SEPTIMI ET VLTIMI FINIS,

Ioanne Guinterio Anderna-  
 co interprete.



(1)  $\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{\rho} + \frac{1}{\sigma} \right) = -\frac{1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} - \frac{1}{\sigma^2} \frac{d\sigma}{dt}$


2544

22 3 1

1

1900

672



צִיר אֲמוֹנִים לְמִרְמָא